

Movimento retilíneo

Max Jáuregui

1 de Abril de 2018

1 Velocidades média e instantânea

Vamos estudar o movimento de um corpo em uma linha reta, a qual vamos considerar como sendo paralela ao eixo x .

Se em dois instantes de tempo t_1 e t_2 o corpo se encontra respectivamente nas posições x_1 e x_2 , definimos o **deslocamento** do corpo no intervalo $[t_1, t_2]$ por $\Delta x = x_2 - x_1$. Definimos também a **velocidade média** do corpo no intervalo $[t_1, t_2]$ por

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}.$$

Suponhamos que a posição de um automóvel em cada instante de tempo t seja dada por $x(t) = (10 \text{ m/s}^2)t^2 + 5 \text{ m}$. A velocidade média no intervalo $[0 \text{ s}, 1 \text{ s}]$ é dada por

$$v_m = \frac{x(1 \text{ s}) - x(0 \text{ s})}{1 \text{ s} - 0 \text{ s}} = \frac{15 \text{ m} - 5 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

No intervalo $[0, 9 \text{ s}, 1 \text{ s}]$, a velocidade média será

$$v_m = \frac{x(1 \text{ s}) - x(0, 9 \text{ s})}{1 \text{ s} - 0, 9 \text{ s}} = \frac{15 \text{ m} - 13, 1 \text{ m}}{0, 1 \text{ s}} = 19 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Calculando a velocidade média nos intervalos $[0, 99 \text{ s}, 1 \text{ s}]$, $[0, 999 \text{ s}, 1 \text{ s}]$, \dots , vamos perceber que os valores obtidos vão se aproximar cada vez mais de 20 m/s . Logo, é razoável definirmos a velocidade no instante $t = 1 \text{ s}$ como sendo 20 m/s . Essa velocidade é chamada de **velocidade instantânea** e é definida para qualquer instante t por

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}.$$

O limite do lado direito é conhecido como a **derivada** de $x(t)$ em relação a t e é denotada por $\frac{dx}{dt}$.

Sobre derivadas precisamos saber o seguinte:

1. $\frac{d}{dt}[x(t) \pm y(t)] = \frac{dx}{dt} \pm \frac{dy}{dt};$
2. $\frac{d}{dt}[ax(t)] = a \frac{dx}{dt};$
3. $\frac{d}{dt}(t^n) = nt^{n-1};$
4. $\frac{d}{dt}(c) = 0.$




Figura 1: Exemplo de um gráfico x versus t

Usando essas regras podemos derivar qualquer polinômio; por exemplo, se $p(t) = 10t^3 - 2t^2 + 6$, então $\frac{dp}{dt} = 30t^2 - 4t$.

Se a posição de um corpo segue a equação $x(t) = (5 \text{ m/s}^3)t^3 - (10 \text{ m/s}^2)t^2 + 20 \text{ m}$, qual é a velocidade instantânea do corpo no instante $t = 2 \text{ s}$? A velocidade instantânea em qualquer instante t está dada por

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \left(15 \frac{\text{m}}{\text{s}^3}\right)t^2 - \left(20 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)t.$$

Logo, no instante $t = 2 \text{ s}$, vamos ter que $v(2 \text{ s}) = 60 \text{ m/s} - 40 \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$.

2 Gráficos x versus t

Conhecendo a posição de um corpo, que se move em linha reta, em cada instante de tempo, podemos construir um gráfico x versus t representando os pares ordenados $(t, x(t))$ em um plano cartesiano. O objetivo dessa seção é obter informação sobre o movimento de um corpo a a partir de um gráfico x versus t .

Exemplo: Da figura 1 podemos obter a seguinte informação qualitativa sobre o movimento do corpo: O corpo inicialmente está na origem; logo depois se move à direita (assume valores de x maiores do que $x(0 \text{ s})$); no instante t_1 o corpo atinge a posição $x(t_1)$ e logo depois desse instante, o corpo se move à esquerda (assume valores de x menores do que $x(t_1)$); no instante t_2 o corpo passa pela origem e continua se movendo à esquerda; no instante t_3 o corpo atinge a posição $x(t_3)$ e depois desse instante se move à direita passando novamente pela origem no instante t_4 .

Um gráfico x versus t também pode nos dar informação sobre as velocidades média e instantânea. Por exemplo, da figura 2 vemos que

$$\tan \theta = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Portanto, a velocidade média no intervalo $[t_1, t_2]$ é a tangente do ângulo formado entre o eixo x e a reta secante ao gráfico x versus t que passa pelos pontos $(t_1, x(t_1))$ e $(t_2, x(t_2))$.




Figura 2: Cálculo da velocidade média usando um gráfico x versus t .

Na figura 3 consideramos um instante t_3 , com $t_1 < t_3 < t_2$. A velocidade média no intervalo $[t_1, t_3]$ será, pelo que vimos, $\tan \beta$, que nesse caso é menor do que $\tan \theta$. Considerando instantes t cada vez mais próximos de t_1 , a reta secante ao gráfico x versus t que passa pelos pontos $(t_1, x(t_1))$ e $(t, x(t))$ vai se aproximar da reta tangente ao gráfico que passa pelo ponto $(t_1, x(t_1))$. Se essa reta tangente faz um ângulo α com o eixo x , então $\tan \alpha$ será o valor limite da velocidade média, ou seja, $\tan \alpha$ será a velocidade instantânea no instante t_1 . Como essa velocidade instantânea é a derivada da função $x(t)$ em relação a t avaliada no instante t_1 , obtemos a seguinte relação que dá uma interpretação geométrica da derivada:

$$v(t_1) = \frac{dx}{dt}(t_1) = \tan \alpha .$$

A figura 4 ilustra como podemos obter o sinal da velocidade instantânea em qualquer instante de tempo a partir de um gráfico x versus t . Além disso, da figura 4 também podemos obter que $|v(t_1)| < |v(t_2)|$, pois a tangente que passa pelo ponto $(t_2, x(t_2))$ é mais vertical (mais inclinada) do que a que passa pelo ponto $(t_1, x(t_1))$. Analogamente, vamos ter que $v(t_3) < v(t_4)$. Nesse caso ambas as velocidades são positivas e, por conseguinte, não precisamos considerar o valor absoluto.

3 Acelerações média e instantânea

De forma análoga à velocidade média, definimos a **aceleração média** no intervalo $[t_1, t_2]$ por

$$a_m = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} ,$$

onde $v(t_2)$ e $v(t_1)$ são as velocidades instantâneas nos instantes t_2 e t_1 respectivamente. A **aceleração instantânea** em um instante t será definida então por

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} .$$




Figura 3: Cálculo da velocidade instantânea usando um gráfico x versus t .




Figura 4: Sinais da velocidade instantânea.

Como $v = \frac{dx}{dt}$, então

$$a(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2},$$

onde a última expressão é chamada de **segunda derivada** de $x(t)$ em relação a t .

Suponhamos que a posição de um corpo em cada instante de tempo esteja dada por $x(t) = (5 \text{ m/s}^3)t^3 - (10 \text{ m/s}^2)t^2 + 20 \text{ m}$. A velocidade instantânea em qualquer instante t está dada por $v(t) = (15 \text{ m/s}^3)t^2 - (20 \text{ m/s}^2)t$. Logo, $v(0 \text{ s}) = 0 \text{ m/s}$ e $v(1 \text{ s}) = -5 \text{ m/s}$. Com essa informação podemos encontrar que a aceleração média no intervalo $[0 \text{ s}, 1 \text{ s}]$ é

$$a_m = \frac{v(1 \text{ s}) - v(0 \text{ s})}{1 \text{ s} - 0 \text{ s}} = -5 \text{ m/s}^2.$$

Por outro lado, a aceleração instantânea em um instante t qualquer está dada por

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = (30 \text{ m/s}^3)t - 20 \text{ m/s}^2.$$

Em particular, a aceleração instantânea no instante $t = 1\text{ s}$ será $a(1\text{ s}) = 10\text{ m/s}^2$.

Assim como obtivemos as velocidades média e instantânea a partir de um gráfico x versus t , as acelerações média e instantânea podem ser obtidas exatamente da mesma forma a partir de um gráfico v versus t . A situação é diferente usando um gráfico x versus t ; porém, nesse caso é possível pelo menos determinar os sinais das acelerações média e instantânea. Por exemplo, consideremos o gráfico x versus t dado na figura 4. Nele podemos determinar o sinal da velocidade instantânea em qualquer instante e, mais ainda, estimar o módulo dela. Logo, a aceleração média no intervalo $[0\text{ s}, t_1]$ vai ser negativa, pois $v(t_1) < 0\text{ m/s}$ e $v(0\text{ s}) = 0\text{ m/s}$; enquanto que a aceleração média no intervalo $[0\text{ s}, t_3]$ vai ser positiva, pois $v(t_3) > 0\text{ m/s}$. Além disso, a aceleração média no intervalo $[t_3, t_4]$ vai ser positiva, pois $v(t_4) > v(t_3)$.

Para determinar o sinal da aceleração instantânea em um determinado instante t_0 a partir de um gráfico x versus t , precisamos analisar as inclinações das retas tangentes em pontos ao redor de $(t_0, x(t_0))$. Se em uma vizinhança pequena ao redor do instante t_0 o gráfico x versus t é aproximadamente uma linha reta, então a aceleração instantânea no ponto t_0 será igual a 0 m/s^2 . Se nessa vizinhança pequena o gráfico tem forma de \smile , a aceleração instantânea no instante t_0 será positiva. Nesse caso também dizemos que o gráfico x versus t tem **curvatura positiva** no ponto t_0 . Por outro lado, se em uma vizinhança pequena de t_0 o gráfico de x versus t tem forma de \frown , a aceleração instantânea no instante t_0 será negativa e diremos também que o gráfico tem **curvatura negativa** no ponto t_0 . Por exemplo, da figura 4 podemos ver que $a(0\text{ s}) > 0\text{ m/s}^2$, $a(t_1) < 0\text{ m/s}^2$, $a(t_2) > 0\text{ m/s}^2$, $a(t_3) > 0\text{ m/s}^2$ e $a(t_4) > 0\text{ m/s}^2$. Como o gráfico x versus t tem curvatura negativa (\frown) no instante t_2 e curvatura positiva (\smile) no instante t_3 , entre os instantes t_2 e t_3 deve existir um instante t^* para o qual todo instante justo antes de t^* tem curvatura negativa e todo instante justo depois de t^* tem curvatura positiva. O ponto $(t^*, x(t^*))$ é chamado de um **ponto de inflexão** do gráfico e a aceleração instantânea no instante t^* é 0 m/s^2 .

4 Cálculo do deslocamento usando um gráfico v versus t