









COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 3 JULI 2020

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens zijn beschikbaar op https://epistat.wiv-isp.be/covid. De indicatoren die uit deze gegevens voortvloeien, worden voorgesteld in dit dagelijkse rapport op de Sciensanowebsite. Aanvullende grafieken op regionaal en provinciaal niveau zijn beschikbaar via deze link. Het volgen van de evolutie van een dergelijke epidemie gebeurt op basis van trends.

De verminderde circulatie van het virus in de afgelopen weken gaat samen met een evolutie in de rapportage. De belangrijkste indicatoren in dit dagelijks epidemiologische bulletin werden daarom aangepast.

Deze kernindicatoren zijn gebaseerd op de datum van diagnose, overlijden of opname, zoals reeds het geval was voor de grafieken in het rapport. De berekening en de vergelijking maakt gebruik van gegevens op basis van periodes van 7 dagen, waardoor de evolutie in de tijd beter kan worden opgevolgd.

Gegevens voor de 7-daagse periodes worden uitgedrukt als daggemiddelden; de evolutie geeft in % de verandering aan die tussen twee opeenvolgende periodes van 7 dagen wordt waargenomen.

1. Kerncijfers voor België - Trends

Aantal gerapporteerde patiënten	In totaal	Daggemiddelde gedurende de voorlaatste periode van 7 dagen	Daggemiddelde gedurende de laatste periode van 7 dagen	Evolutie
Bevestigde COVID-19 gevallen	61 727	94,0	82,0*	-13%
Sterfgevallen***	9 765	6,7	4,1*	-38%
In ziekenhuizen	4 774	5,0	3,3	-34%
In woonzorgcentra	4 869	1,7	0,9	-50%
Opnames in het ziekenhuis	17 798****	15,3	13,0**	-15%

^{*}Van 23 juni tot 29 juni (gegevens van de laatste 3 dagen nog niet geconsolideerd).

^{****}Het aantal ziekenhuisopnames omwille van COVID-19 met een labo bevestiging op het moment van rapportering sinds 15 maart (de datum waarna meer dan 99% van de ziekenhuizen deelnemen aan de gegevensverzameling) die niet werden doorverwezen door een ander ziekenhuis. Patiënten die opgenomen werden omwille van andere pathologie maar positief hebben getest in een screeningcontext werden niet in deze telling opgenomen.

Bezetting van ziekenhuisbedden	Donderdag 25 juni	Donderdag 2 juli	Evolutie
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	256	183	-29%
Aantal ingenomen ICU bedden	38	35	-8%

De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens en omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.


^{**}Van 26 juni tot 2 juli.

^{***}Sterfgevallen alle locaties inbegrepen.

2. Evolutie en recente situatie


Om de evolutie van de COVID-19 epidemie op te volgen worden vier verschillende indicatoren gebruikt: de bevestigde gevallen, de nieuwe door het labo bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen (ICU) en de sterfgevallen. Hieronder worden deze indicatoren getoond met het 7-daags voortschrijdend gemiddelde (groene lijn). Dit 7-daags gemiddelde wordt gebruikt om een trend aan te tonen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de curve een vloeiend verloop krijgt en dat het zogenaamde weekendeffect wordt uitgevlakt.

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen




Bron: NRC, laboratoria, verplichte melding

Evolutie van het aantal nieuwe door het labo bevestigde opnames in het ziekenhuis




Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

Evolutie van het aantal patiënten in ICU



Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)


Evolutie van het aantal sterfgevallen



Bron: Surveillance COVID-19 mortaliteit (Sciensano)


Naast bovenstaande indicatoren is het ook belangrijk om de recente periode te beschrijven. Onderstaande figuren tonen de verspreiding en de verdeling volgens leeftijd en geslacht van het aantal COVID-19 gevallen voor **de laatste 14 dagen**.

Verspreiding van het bevestigde gevallen voor de laatste 14 dagen



Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform

Het aantal bevestigde gevallen voor de laatste 14 dagen per leeftijdscategorie en geslacht per 100 000 inwoners




Noot: Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 19 gevallen.

3. Beschrijving van de epidemie

3.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19 GEVALLEN


Tot nu toe werden in totaal 61 727 bevestigde gevallen gemeld; 34 714 gevallen (56%) in Vlaanderen, 19 514 (32%) gevallen in Wallonië en 6 439 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1 060 gevallen (2%).



Bron: NRC, laboratoria, verplichte melding. Gerapporteerd aan Sciensano op 2 juli 2020, 16 uur.

*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen twee dagen nog worden geconsolideerd.
Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

Er werden 574 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd tussen 23 juni en 29 juni. Van de 574 nieuwe gevallen waren er 341 (59%) gemeld in Vlaanderen, 140 (24%) in Wallonië, en 93 (16%) in Brussel.




*Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 334 gevallen.

3.2. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 DOOR HET LABONETWERK EN IN WOONZORGCENTRA EN ANDERE RESIDENTIËLE COLLECTIVITEITEN

Tussen begin maart en 2 juli is het aantal uitgevoerde testen door de laboratoria (het nationaal referentiecentrum en de andere klinische laboratoria die de test uitvoeren) opgelopen tot 879 373 testen.

Sinds 10/04 zijn er 391 304 testen uitgevoerd door het nationaal testing platform voor de woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten en triagecentra.

Aantal uitgevoerde diagnostische testen per dag



Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen- als PCR-testen worden weergeven: als op een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als 2 aparte testen beschouwd.

3.3. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19

Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd. Het betreft enkel de door het labo bevestigde gevallen.



614,31021,104,104,105,105,105,100





Evolutie van het aantal patiënten die het

Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.

Tussen 15 maart en 2 juli werden 17 798 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 17 073 personen verlieten het ziekenhuis.

Tussen 26 juni en 2 juli werden 91 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 155 verlieten het ziekenhuis. 13 opgenomen patiënten in deze periode waren afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg (in totaal werden 80 nieuwe opnames gerapporteerd door de ziekenhuizen die dit onderscheid hebben gemaakt in functie van de rapportage).





*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (2 juli 2020)

*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie


Op 2 juli werden 183 ziekenhuisbedden ingenomen door door het labo bevestigde COVID-19-patiënten, waarvan 35 bedden op intensieve zorgen; 13 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 2 ECMO. De voorbije 7 dagen is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 73, waarvan 3 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

3.4. EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT


Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 9 765 sterfgevallen gerapporteerd; 4 896 (50%) in Vlaanderen, 3 385 (35%) in Wallonië, en 1 484 (15%) in Brussel. Sinds het vorige rapport, werden er 2 sterfgevallen verwijderd als gevolg van correcties die ons door de verschillende bronnen werden doorgegeven.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen per gewest en datum van overlijden




Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht*




*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 2724 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest en datum van overlijden



Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden




Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Sterfgevallen **in ziekenhuizen** worden gemeld via de "hospital surge capacity survey" door de ziekenhuizen en hebben alleen betrekking op sterfgevallen die zijn bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CT-scan van de thorax* met suggestieve klinische presentatie van COVID-19. Vanaf 5 mei 2020 worden sterfgevallen van mogelijke gevallen in het ziekenhuis systematisch gerapporteerd. Dit is in overeenstemming met de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie.

*Gevalsdefinitie van een radiologisch bevestigd geval: sinds 1 april is een radiologisch bevestigd geval een persoon wiens laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is, maar voor wie de diagnose van COVID-19 toch wordt behouden op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT scan van de thorax.

Sterfgevallen **buiten het ziekenhuis** (woonzorgcentra, tehuizen, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke COVID-19-gevallen. Bevestigde gevallen betreffen patiënten die een diagnostische test hebben gehad. Mogelijke gevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte.

Cumulatief aantal (mogelijke en bevestigde) sterfgevallen in ziekenhuizen en woonzorgcentra.



Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen

Plaate van overliiden	Vlaan	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
Plaats van overlijden	N	%	N	%	N	%	N	%	
Ziekenhuis	2 166	44%	836	56%	1 772	52%	4 774	49%	
Bevestigde gevallen	2 069	96%	804	96%	1 665	94%	4 538	95%	
Mogelijke gevallen	97	4%	32	4%	107	6%	236	5%	
Woonzorgcentrum	2 665	54%	641	43%	1 563	46%	4 869	50%	
Bevestigde gevallen	651	24%	210	33%	429	27%	1 290	26%	
Mogelijke gevallen	2 014	76%	431	67%	1 134	73%	3 579	74%	
Andere residentiële collectiviteiten	27	1%	1	0%	19	1%	47	0%	
Thuis en andere	19	0%	6	0%	31	1%	56	1%	
Onbekend	19	0%	0	0%	0	0%	19	0%	
TOTAAL	4 896	100%	1 484	100%	3 385	100%	9 765	100%	

Noot: Vanaf 24/04/2020 zijn er gegevens beschikbaar over de diagnostische status van sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen (bevestigde en mogelijke COVID-19-gevallen).

Gerapporteerde sterfgevallen in de periode van 23 juni tot 29 juni

Plaate van overliiden	Vlaaı	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
Plaats van overlijden	N	%	N	%	N	%	N	%	
Ziekenhuis	9	75%	4	80%	10	83%	23	79%	
Bevestigde gevallen	8	89%	3	75%	9	90%	20	87%	
Mogelijke gevallen	1	11%	1	25%	1	10%	3	13%	
Woonzorgcentrum	3	25%	1	20%	2	17%	6	21%	
Bevestigde gevallen	1	33%	0	0%	2	100%	3	50%	
Mogelijke gevallen	2	67%	1	100%	0	0%	3	50%	
Andere residentiële collectiviteiten	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Thuis en andere	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
TOTAAL	12	100%	5	100%	12	100%	29	100%	

Noot: Vanaf 24/04/2020 zijn er gegevens beschikbaar over de diagnostische status van sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen (bevestigde en mogelijke COVID-19-gevallen).



EPIDEMIOLOGICHE OPVOLGING VAN DE COVID-19 EPIDEMIE

Rapportering versie 30 juni 2020

Elke dag verzamelt en rapporteert Sciensano gegevens in functie van de volgende doelstellingen :

- 1. De evolutie van de epidemie en de gevolgen voor de bevolking beschrijven, om het effect van preventieve maatregelen op te kunnen volgen en de autoriteiten te ondersteunen bij het crisisbeheer.
- 2. De aanwezigheid van geclusterde gevallen of een opflakkering van de epidemie detecteren om controlemaatregelen te kunnen nemen.

Deze gegevens worden ook gebruikt door een aantal universitaire onderzoeksgroepen om het verloop van de epidemie te voorspellen.

Sciensano past de rapportage aan in functie van de evolutie van de epidemie.

De piek van de epidemie werd waargenomen in de week van 5 tot 11 april, met een incidentie van 98 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In de week van 10 tot 16 mei zakte de incidentie onder de drempel van 20/100.000 inwoners. en het aantal nieuwe gediagnosticeerde gevallen neemt sindsdien verder af. De epidemie is nu aan het stabiliseren op een niveau van matige intensiteit.


Een aangepaste opvolging en rapportering op maat van deze epidemiologische fase.

Sciensano publiceert elke dag alle beschikbare gegevens in verschillende vormen. *Onderstaande tabel* geeft een overzicht van de manier waarop de monitoringgegevens worden gerapporteerd in deze periode van matige intensiteit.


Doel	Bronnen/indicatoren	Rapportering in periode van matige intensiteit *
Monitoring van de	Gegevens van PCR-	<u>Dagelijks epidemiologisch rapport</u> : gepubliceerd van dinsdag
evolutie van de	diagnostiek (nationaal	tot en met zaterdag. Resultaten weergegeven per dag.
epidemie in de	referentiecentrum, netwerk van	
algemene bevolking	klinische laboratoria en	Interactief dashboard (Epistat): Dagelijkse update, resultaten
(Vroege indicator)	nationaal platform)	worden getoond per dag (datum diagnostiek).
Opvolging van de evolutie in de	Verplichte aangifte bij de gefedereerde autoriteiten via	Wekelijks rapport: publicatie op vrijdag.
woonzorgcentra	verschillende kanalen	
Opvolging van de evolutie in de ziekenhuizen (Indicatoren voor de ernst van de situatie)	Aantal gehospitaliseerde personen Aantal personen in intensieve	Rapportering over het gebruik van de zorgcapaciteit en de ernst van de situatie in het <u>dagelijks epidemiologisch rapport</u> en via <u>Epistat.</u>
	zorgen Aantal personen die beademd worden of ECMO krijgen	Updates van dinsdag tot en met zaterdag, resultaten worden weergegeven per dag.
Opvolging van de evolutie van de mortaliteit (Indicatoren voor de ernst van de situatie)	COVID-19 mortaliteit: overlijdens in het ziekenhuis, in woonzorgcentra en elders	Overlijdens door COVID-19 in het <u>dagelijks epidemiologisch</u> rapport en op het <u>interactief dashboard</u> (<u>Epistat</u>). Updates van dinsdag tot en met zaterdag, resultaten worden weergegeven per dag (datum van overlijden).
	Sterfte door alle oorzaken	Sterfte door alle oorzalen via de <u>Be-MOMO</u> -module op <u>Epistat</u> . Het verband tussen de sterfte door alle oorzaken en de sterfte door COVID-19, en het geheel van de analyses vindt u in het <u>epidemiologisch weekrapport van 19/06/2020</u> .
Monitoring van griepachtige symptomen (griepaal syndroom) en acute luchtweginfecties (Intensiteitsindicator)	Raadplegingen huisartsen voor luchtweginfecties	Raadplegingen huisartsen (per week) op de 'Influenza monitoring'-module op Epistat en wekelijks rapport op woensdag op de influenza pagina.
Thematische rapporten	Verschillende onderwerpen in verband met COVID-19, o.a. seroprevalentiestudie, klinische beschrijving gehospitaliseerde patienten, afwezigheden op het werk,	Een reeks thematische rapporten die dieper ingaan op bepaalde onderwerpen die verband houden met COVID-19. Publicatie <i>ad hoc</i> via de <u>webpagina</u> van de epidemiologische rapporten

3.5. GEOGRAFISCHE VERSPREIDING VAN BEVESTIGDE COVID-19 GEVALLEN PER PROVINCIE EN GEMEENTE SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE


Distributie van het aantal bevestigde gevallen per provincie




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per provincie



Totaal aantal bevestigde gevallen per gemeente



Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per gemeente



4. Preventie en informatie



HOE DRAAG JE EEN STOFFEN MONDMASKER?

1 Het mondmasker opzetten:



Was eerst heel goed je handen.



Zet dan je mondmasker op. Raak hierbij alleen de lintjes of elastieken aan.



Zet het masker eerst goed op je neus. Maak het bovenste lintje goed vast.



Zet het masker goed op je kin. Maak het onderste lintje vast.

Je neus, mond en kin moeten onder het masker zitten. Er mag geen opening zijn aan de zijkanten.









3 Het mondmasker dragen:



Heb je het mondmasker op? Raak het masker niet meer aan.



Zit je masker niet goed? Raak dan alleen de zijkanten aan en zet het goed



Zet je masker niet vaak op en af.

GEEF HET VOORBEELD,
STOP HET VIRUS.

WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

