

## 1 Лекция №3

### Выпуклый анализ

Ввиду важности задачи выпуклого программирования (ЗВП) рассматриваемые основные понятия раздела математики, называемого выпуклым анализом:

1) Выпуклое множество 2) Выпуклая(вогнутая) функция и ее дифференциальные свойства

#### Выпуклые множества точек

**def:** Множество точек называется выпуклым, если оно вместе с  $\forall$  двумя своими точками содержит весь отрезок, соединяющий эти точки **ex:** — Тут нужно иллюстрацию **ex:** круг, сектор, отрезок, прямая, полуплоскость, куб, пирамида

**Теорема 1.** Пересечение  $\forall$  числа выпуклых множеств-выпуклое множеств, too

*Доказательство.* Для простоты - пересечение двух выпуклых множеств:  
 $\forall N, M \in (A \cap B)$ . Множество  $A$  - выпуклое  $\Rightarrow$  отрезок  $MN \in A$ . Аналогично  
 $MN \in B \Rightarrow MN \in (A \cap B) \Rightarrow (A \cap B)$  - выпуклое — тут нужно иллюстрацию ■

**def:** Внутренняя т. множества -  $\exists$  окрестность этой точки: в ней - только точек  $\in$  множеству.

**def:** Граничная точка множества -  $\forall$  окрестность этой точки содержит как точки  $\in$  множеству, так и точек  $\notin$  множеству

**def:** Угловая точка множества - она не является внутренней ни для какого отрезка, целиком  $\in$ -го множеству.

**ex:** — Тут нужно иллюстрацию точка  $M$  - внутренняя, точка  $N$  граничная, точка  $A$  - угловая ( $AP \in$  множеству целиком, но точка  $A$  - не внутренняя точка для  $AP$ ; точка внутренняя точка для  $KL$ , но  $KL \notin$  множеству целиком)

**def:** Замкнутое множество точек - if оно включает все свои граничные точки.

**def:** Ограниченное множество точек - if  $\exists$  шар конечного радиуса с центром в  $\forall$  точке множества, который полностью содержит в себе данное множество.

Можно показать, что если фигура ограничена only прямыми или их отрезками, то она 've конечное число угловых точек. При криволинейности границ - бесконечное множество угловых точек.

**def:** Выпуклое замкнутое множество точек пространства(плоскости), имеющее конечное число угловых точек, называется выпуклым многогранником(многоугольником), если оно ограниченное, и выпуклой многогранной(многоугольной) областью, если оно неограниченное.

**Rem:** Для выпуклого многогранника(многоугольника) угловые точки  $\equiv$  его вершинам.

Для невыпуклого - не обязательно

**ex:** — Тут нужна иллюстрация точка E - вершина, но не угловая точка, т.к. KL  $\in$  множеству целиком и точка E - внутренняя точка для KL.

**Rem:** В ЗЛП часто число параметров объекта  $n > 3 \Rightarrow$  имеем дело с гипермногогранниками в гиперпространстве с координатами  $x_i (i = \overline{1, n}, n > 3)$

## Геометрический смысл решений СЛН и СЛУ

**Теорема 2.** Множество всех решений линейного неравенства

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

- это одно из полупространств, на которые n-мерное гиперпространство делится гиперплоскостью

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

включая и эту гиперплоскость

## Выпуклые множества в n-мерном пространстве. Свойства ЗЛП

### Выпуклые множества в n-мерном пространстве

Рассмотрим в n-мерном пространстве k точек (векторов):

$$x_1 = (x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}), \dots, x_k = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$$

**def:** Точка(вектор)  $X = (x_1, \dots, x_n)$  называется линейной комбинацией точек(векторов)  $X_1, \dots, X_k$ , если справедливо соотношение:

$$X = \alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_k X_k \quad (1)$$

где  $\alpha_j - \text{const } j = \overline{1, k}$

**def:** Точка(вектор) X называется выпуклой линейной комбинацией точек(векторов)  $X = \alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_k X_k$ , если:

1)

$$X = \alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_k X_k$$

2)

$$\alpha_j \geq 0, j = \overline{1, k} \quad (2)$$

3)

$$\sum_{j=1}^k \alpha_j = 1 \quad (3)$$

Очевидно, что в частном случае при  $k=2$  выпуклой линейной комбинацией двух точек  $X_1$  и  $X_2$  является соединяющий их отрезок, т.к.

$$X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 = \left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \\ \alpha_2 = \alpha_1 - 1 \end{array} \right\} \alpha X_1 + (1 - \alpha) X_2$$

- уравнение точек  $X \in [X_1, X_2]$  (см. аналитич. геометр.) — добавить иллюстрацию