
APPUNTI DI GEOMETRIA 2

Anno Accademico 2020/2021

“BEEP BOOP INSERIRE CITAZIONE QUI BEEP BOOP”



INDICE

INDICE ii

| | |
|---|-----------|
| I TOPOLOGIA GENERALE | 1 |
| 1 SPAZI TOPOLOGICI | 3 |
| 1.1 Spazio topologico | 3 |
| 1.1.1 Distanza e spazi metrici | 4 |
| 1.1.2 Finezza: confronto di topologia | 6 |
| 1.1.3 Base della topologia | 7 |
| 1.1.4 Altri concetti topologici: chiusura, interno, frontiera e densità | 9 |
| 1.1.5 Intorni | 10 |
| 1.2 Funzioni continue | 11 |
| 1.3 Omeomorfismi | 13 |
| 1.4 Topologia indotta | 14 |
| 1.5 Sottospazio topologico | 14 |
| 1.5.1 Immersione | 16 |
| 1.6 Prodotti topologici | 17 |
| 1.7 Assiomi di separazione: T_1 e Hausdorff | 20 |
| 1.8 Proprietà topologica | 24 |
| 2 CONNESSIONE E COMPATTEZZA | 27 |
| 2.1 Connessione | 27 |
| 2.2 Compattezza | 37 |
| 3 GRUPPI TOPOLOGICI | 45 |
| 3.1 Gruppi topologici | 45 |
| 4 TOPOLOGIA QUOZIENTE | 51 |
| 4.1 Topologia Quoziente | 51 |
| 4.1.1 Identificazione | 52 |
| 4.1.2 Quozienti tipici | 53 |
| 4.1.3 Quoziente T_2 | 55 |
| 5 AZIONI DI GRUPPO | 57 |
| 5.1 Azione di un gruppo su un insieme | 57 |
| 5.2 Stabilizzatore di un elemento | 58 |
| 5.3 Azione per omeomorfismi | 59 |

| | | |
|--|--|-----|
| 6 SUCCESSIONI | 65 | |
| 6.1 | Numerabilità | 65 |
| 6.2 | Successioni | 69 |
| 6.2.1 | Punti di accumulazione | 70 |
| 6.2.2 | Sottosuccessioni | 70 |
| 6.3 | Successioni e compatti | 72 |
| 6.3.1 | Compattezza per successioni | 73 |
| 6.4 | Spazi metrici completi | 75 |
| | | |
| II OMOTOPIA | 77 | |
| 7 OMOTOPIA | 79 | |
| 7.1 | Lemma di incollamento | 79 |
| 7.2 | Componente connessa e componente c.p.a. | 80 |
| 7.3 | Omotopia tra funzioni continue | 82 |
| 7.4 | Equivalenza omotopica | 84 |
| 7.5 | Retratti e retratti di deformazione | 89 |
| | | |
| 8 IL GRUPPO FONDAMENTALE | 93 | |
| 8.1 | Omotopie fra cammini | 93 |
| 8.2 | Gruppo fondamentale | 98 |
| 8.2.1 | Dipendenza dal punto base | 99 |
| 8.2.2 | Mappe continue e omomorfismo di gruppi | 100 |
| 8.3 | Digressione: Categorie | 101 |
| 8.3.1 | Funtori | 102 |
| 8.4 | Isomorfismi e gruppi fondamentali | 105 |
| 8.5 | Numero di Lebesgue | 108 |
| 8.6 | Teorema di Van Kampen sui generatori | 110 |
| 8.7 | Gruppo fondamentale della sfera | 111 |
| 8.8 | Gruppo fondamentale della circonferenza | 113 |
| 8.8.1 | Mappa esponenziale | 113 |
| 8.8.2 | Sollevamento | 114 |
| 8.8.3 | Dimostrazione del gruppo fondamentale della circonferenza | 118 |
| 8.8.4 | Alcune conseguenze del gruppo fondamentale della circonferenza | 119 |
| 8.8.5 | Gruppo fondamentale del prodotto | 121 |
| 8.9 | Alcuni esempi di gruppi fondamentali | 121 |
| 8.9.1 | Toro | 121 |
| 8.9.2 | Un gruppo fondamentale non abeliano | 122 |
| 8.9.3 | Spazio proiettivo reale | 122 |
| | | |
| III CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TOPOLOGICHE | 125 | |
| 9 VARIETÀ TOPOLOGICHE | 127 | |
| 9.1 | Varietà topologiche | 127 |
| 9.1.1 | Dimensione 1 | 128 |
| 9.1.2 | Dimensione 2 | 128 |
| 9.2 | Somma connessa di superfici compatte | 132 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 9.3 | Classificazione delle superfici topologiche compatte | 137 |
| 9.3.1 | Triangolazione | 138 |
| 9.3.2 | Dimostrazione del teorema di classificazione: prima parte | 139 |
| 9.4 | Orientabilità | 143 |
| 9.4.1 | Dimostrazione del teorema di classificazione: seconda parte | 144 |
| 9.5 | Suddivisione di una superficie compatta | 145 |
| 9.6 | Caratteristica di Eulero | 146 |
| 9.6.1 | Dimostrazione del teorema di classificazione: terza e ultima parte | 147 |
| 9.6.2 | Somma connessa e caratteristica di Eulero | 148 |
| 9.6.3 | Impraticchiamoci! Caratteristica di Eulero | 149 |

IV FORMA CANONICA DI JORDAN 151

| | | |
|------|----------------------------|-----|
| 10 | FORMA CANONICA DI JORDAN | 153 |
| 10.1 | Teorema di Cayley-Hamilton | 153 |
| 10.2 | Forma canonica di Jordan | 154 |

V APPENDICI 159

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 11 | NOTE AGGIUNTIVE | 161 |
| 11.1 | Capitolo 6: successioni | 161 |

BIBLIOGRAFIA 163

I

TOPOLOGIA GENERALE

1

CAPITOLO

SPAZI TOPOLOGICI

“BEEP BOOP INSERIRE CITAZIONE QUA BEEP BOOP.”

NON UN ROBOT, UN UMANO IN CARNE ED OSSA BEEP BOOP.

1.1 SPAZIO TOPOLOGICO

DEFINIZIONE 1.1.0. Uno **spazio topologico** (X, \mathcal{T}) è un insieme X con una famiglia di sottoinsiemi $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ detta **topologia** che soddisfano i seguenti assiomi (detti **assiomi degli aperti**):

1. Il vuoto e l'insieme stesso sono aperti della topologia: $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.
2. L'unione arbitraria di aperti è un aperto: dati $\{A_i\}_{i \in I}$ tali che $A_i \in \mathcal{T}, \forall i \in I$ ($|I| \leq \infty$), allora $\bigcup_{i \in I} A_i = A \in \mathcal{T}$.
3. L'intersezione finita di aperti è aperta: dati $\{A_i\}_{i \in I}$ tali che $A_i \in \mathcal{T}, \forall i \in I$ ($|I| < \infty$), allora $\bigcap_{i \in I} A_i = A \in \mathcal{T}$.

Gli elementi di \mathcal{T} si dicono **aperti** della topologia.

DEFINIZIONE 1.1.1. Si può definire equivalentemente su X una topologia \mathcal{T} usando gli **assiomi dei chiusi**:

1. Il vuoto e l'insieme stesso sono chiusi della topologia: $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.
2. L'unione finita di chiusi è un chiuso: dati $\{C_i\}_{i \in I}$ tale che $C_i \in \mathcal{T}, \forall i \in I$ ($|I| < \infty$), allora $\bigcup_{i \in I} C_i = C \in \mathcal{T}$.
3. L'intersezione arbitraria di chiusi è un chiuso: dati $\{C_i\}_{i \in I}$ tale che $C_i \in \mathcal{T}, \forall i \in I$ ($|I| \leq \infty$), allora $\bigcap_{i \in I} C_i = C \in \mathcal{T}$.

Gli elementi di \mathcal{T} si dicono **chiusi** della topologia.

OSSERVAZIONE. Per verificare il terzo assioma degli aperti (o, equivalentemente, il secondo dei chiusi) è sufficiente verificare che sia vero per soli due sottoinsiemi qualunque, in quanto poi è verificato per induzione.

ESEMPIO.

- **Topologia discreta:** $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$, tutti gli insiemi sono *aperti*.
- **Topologia banale:** $\mathcal{T} = \emptyset$, X , gli unici aperti sono *banali*.

1.1.1 Distanza e spazi metrici

DEFINIZIONE 1.1.2. Su un insieme X una funzione $d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ è una **distanza** se:

1. *Positività della distanza:* $\forall x, y \in X \quad d(x, y) \geq 0$ e $d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. *Simmetria:* $\forall x, y \in X \quad d(x, y) = d(y, x)$
3. *Disuguaglianza triangolare:* $\forall x, y, z \in X \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

DEFINIZIONE 1.1.3. Uno **spazio metrico** (X, d) è un insieme su cui è definita una distanza.

DEFINIZIONE 1.1.4. Definita la **palla aperta di centro** x come l'insieme degli elementi di X che soddisfano la seguente condizione:

$$B_\varepsilon(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < \varepsilon\} \quad (1.1)$$

Ogni spazio metrico ha una **topologia** \mathcal{T}_d **indotta dalla distanza**, i cui aperti sono definiti come:

$$A \subseteq X \text{ aperto } (A \in \mathcal{T}) \text{ se } \forall x \in A, \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subseteq A.$$

ESEMPIO.

- Su un qualunque insieme X si può definire la *distanza banale*:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = y \\ 1 & \text{se } x \neq y \end{cases} \quad (1.2)$$

In questo modo, ogni punto è una palla aperta e dunque ogni sottoinsieme è un aperto, dando allo spazio la *topologia discreta*. In particolare, ogni insieme può essere uno spazio metrico.

- Su $X = \mathbb{R}$ si può definire come distanza il *valore assoluto* $d(x, y) = |x - y|$, che induce la **topologia Euclidea** \mathcal{E}_{eucl} , definita con le palle aperte di raggio ε :

$$B_\varepsilon(x) = \{y \in \mathbb{R} \mid |x - y| < \varepsilon\} \quad (1.3)$$

nel seguente modo:

$$A \subseteq \mathbb{R} \text{ aperto } (A \in \mathcal{E}_{uc\ell}) \text{ se } \forall x \in A, \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subseteq A.$$

- Su $X = \mathbb{R}^n$ si può definire come distanza la *norma Euclidea*: $d(x, y) = \|x - y\|$ che induce la *topologia Euclidea* $\mathcal{E}_{uc\ell}$ in modo analogo al caso precedente.

$$B_\varepsilon(x) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\| < \varepsilon\}$$

$$A \subseteq \mathbb{R}^n \text{ aperto } (A \in \mathcal{E}_{uc\ell}) \text{ se } \forall x \in A, \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subseteq A.$$

ATTENZIONE! Non tutte le topologie sono indotte da una distanza! Definiamo la **topologia dei complementari finiti** sull'insieme X nel modo seguente:

$$A \subseteq \mathbb{R} \text{ aperto } (A \in CF) \text{ se } X \setminus A \text{ è finito.}$$

$$C \subseteq \mathbb{R} \text{ chiuso } (C \in CF) \text{ se } C \text{ è finito.}$$

Alcune osservazioni:

- Se un aperto A è tale se il suo complementare $\mathcal{C}A$ è finito, si ha che:

$$A = \mathcal{C}(\mathcal{C}A) = X \setminus (X \setminus A) = X \setminus \{\text{un numero finito di punti}\} \quad (1.4)$$

In altre parole A è aperto è pari ad X privato al più di un numero finito di punti.

- Se X è finito, la topologia CF coincide con la topologia discreta: ogni sottoinsieme di X è finito e dunque un aperto.
- Se X è infinito, ad esempio \mathbb{R} , la topologia *non* è quella discreta: $[0, 1]$ per la topologia discreta è un chiuso ma per quella CF non lo è in quanto *non* è finito.

1.1.1.1 Norme esotiche

Possiamo definire su \mathbb{R}^n una famiglia di distanze dette **norme**; qui di seguito ne elenchiamo alcune. Definiti i punti $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ abbiamo:

- **Norma infinito:** $d_\infty(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$
- **Norma uno:** $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$
- **Norma due:** $d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2}$
- **Norma p:** $d_p(x, y) = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p}$

Si ha inoltre $\lim_{p \rightarrow +\infty} d_p = d_\infty$.

Valgono inoltre le seguenti diseguaglianze:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad d_\infty(x, y) \leq d_2(x, y) \leq d_1(x, y) \leq n d_\infty(x, y) \quad (1.5)$$

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo senza perdere di generalità che $d_\infty(x, y) = |x_1 - y_1|$.

$$\begin{aligned} d_2(x, y) &= \sqrt{|x_1 - y_1|^2 + \dots + |x_n - y_n|^2} \geq \sqrt{|x_1 - y_1|^2} = |x_1 - y_1| = d_\infty(x, y) \\ d_2(x, y) &= |x_1 - y_1| + \dots + |x_n - y_n| \leq |x_1 - y_1| + \dots + |x_1 - y_1| = n|x_1 - y_1| = nd_\infty(x, y) \end{aligned}$$


Notiamo che $|x_i - y_i|$ sono sempre positive, allora sia $a_i := |x_i - y_i|$. Segue che $a_1^2 + \dots + a_n^2 \leq (a_1 + \dots + a_n)^2$ perché $a_i, \dots, a_n \geq 0$. Allora:

$$\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2} \leq a_1 + \dots + a_n \implies d_2 \leq d_1$$

□

Queste diseguaglianze danno le seguenti inclusioni¹:

$$B_1(\varepsilon) \subseteq B_2(\varepsilon) \subseteq B_\infty(\varepsilon) \subseteq B_1(n\varepsilon) \quad (1.6)$$



Questo ci porta a dire che le topologie indotte da queste distanze sono la stessa.

Preso adesso $X = \mathcal{C}([0, 1]) = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ continua}\}$, esso è uno spazio vettoriale infinito, con $0_{\mathcal{C}} \equiv O_{[0, 1]}$ (cioè la funzione *identicamente nulla*). In questo caso possiamo comunque adattare le norme precedenti con delle “somme infinite”, ovvero degli integrali.

- **Norma infinito:** $d_\infty(f, g) = \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$
- **Norma uno:** $d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$
- **Norma due:** $d_2(f, g) = \sqrt{\int_0^1 |f(x) - g(x)|^2 dx}$
- **Norma p:** $d_p(f, g) = \sqrt[p]{\int_0^1 |f(x) - g(x)|^p dx}$

A differenza del caso su \mathbb{R}^n , ogni norma genera in realtà una topologia distinta!

1.1.2 Finezza: confronto di topologia

DEFINIZIONE 1.1.5. Sia X un insieme e $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ due topologie di X . Si dice che \mathcal{T}_1 è **meno fine** di \mathcal{T}_2 se tutti gli aperti della prima topologia sono aperti della seconda:

$$\forall A \in \mathcal{T}_1 \implies A \in \mathcal{T}_2 \quad (1.7)$$

In modo analogo si dice anche che \mathcal{T}_2 è **più fine** di \mathcal{T}_1 .

In altre parole, una topologia più fine ha più aperti rispetto a quella confrontata.

¹ Qui usiamo la notazione $B_i(r)$ per indicare la palla aperta di raggio r e centro fissato x rispetto alla norma i .

ESEMPI.

- La *topologia banale* è la *meno fine* di tutte, dato che ogni topologia contiene \emptyset, X .
- La *topologia discreta* è la *più fine* di tutte, dato che ogni topologia è contenuta in $\mathcal{P}(X)$.
- Su \mathbb{R} la topologia dei complementari finiti è *meno fine* di quella euclidea. Infatti un aperto $A \in CF$ su \mathbb{R} è definito come $A = \mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$, cioè:

$$A = (-\infty, x_1) \cup (x_1, x_2) \cup \dots \cup (x_n, +\infty)$$

Per n punti gli $n+1$ intervalli ottenuti sono aperti della topologia euclidea; essendo unione di aperti, anche A è un aperto di $\mathcal{E}_{\text{eucl}}$

OSSERVAZIONE. Se definiamo due topologie \mathcal{T}_1 e \mathcal{T}_2 sono due topologie di un insieme X , l'intersezione $\mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2$ è anch'essa una topologia di X e, per costruzione, è *meno fine* di \mathcal{T}_1 e \mathcal{T}_2 .

1.1.3 Base della topologia

DEFINIZIONE 1.1.6. Sia (X, \mathcal{T}) uno spazio topologico. \mathcal{B} è una **base** per \mathcal{T} se:

1. La base è costituita da parti per la topologia \mathcal{T} : $A \in \mathcal{B} \implies A \in \mathcal{T} (\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T})$.
2. Tutti gli aperti della topologia sono unioni degli aperti delle basi: $A \in \mathcal{T} \implies \exists B_i \in \mathcal{B}, i \in I: A = \bigcup_{i \in I} B_i$.

ATTENZIONE! La base \mathcal{B} non è detto che sia una topologia! Ad esempio, le unioni sono aperti della topologia, ma non è detto che siano interni alla base \mathcal{B} .

ESEMPI.

- Nella *topologia euclidea* di \mathbb{R}^n una base è

$$\mathcal{B} = \{B_\varepsilon(x) \mid x \in \mathbb{R}^n, \varepsilon > 0\} \quad (1.8)$$

Infatti, $\forall x \in A$ aperto $\exists \varepsilon_x > 0 : B_{\varepsilon_x}(x) \subseteq A$ per la definizione della topologia; segue che $A = \bigcup_{x \in A} B_{\varepsilon_x}(x)$.

- Nella *topologia euclidea* di \mathbb{R} una base è

$$\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \quad (1.9)$$

Un'altra base per \mathbb{R} nella $\mathcal{E}_{\text{eucl}}$ è

$$\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

Dato $x \in \mathbb{R}$, esiste sempre una successione $\{x_n\} \in \mathbb{Q}$ decrescente o crescente tale che $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$, essendo \mathbb{Q} denso in \mathbb{R} . Allora presa $a_n \searrow a$ e $b_n \nearrow b$, si ha:

$$(a, b) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (a_n, b_n)$$

Questa base con estremi razionali ha *infiniti elementi*, ma in *misura minore* rispetto a quella ad estremi reali.

^aPer una discussione più approfondita a riguardo, si guardi sez. XXX a pag. XXX.

TEOREMA 1.1.O. TEOREMA DELLE BASI. (MANETTI, 3.7)

Sia X un insieme e $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una famiglia di sottoinsiemi di X . \mathcal{B} è la base di un'unica topologia se e solo se:

1. L'insieme X deve essere scritto come unione di elementi della famiglia: $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$.
2. Per ogni punto dell'intersezione di elementi della famiglia deve esserci un'altro elemento di essa che contiene il punto ed è sottoinsieme dell'intersezione:

$$\forall A, B \in \mathcal{B} \quad \forall x \in A \cap B \quad \exists C \in \mathcal{B} : x \in C \subseteq A \cap B \quad (1.10)$$

DIMOSTRAZIONE. Sia \mathcal{B} la famiglia di sottoinsiemi che verifica i punti 1 e 2. Allora devo trovare una topologia di cui \mathcal{B} è base. Definiamo \mathcal{T} tale che:

$$A \in \mathcal{T} \iff A \text{ è unione di elementi di } \mathcal{B}$$

Verifichiamo gli assiomi degli aperti su \mathcal{T} .

- I $X \in \mathcal{T}$ per ipotesi 1, $\emptyset \in \mathcal{T}$ perché è l'unione sugli insiemi di indici vuoto ($I = \emptyset$).
- II Sia $A_i = \bigcup_j B_{ij}$, con $B_{ij} \in \mathcal{B}$. Allora:

$$\bigcup_i A_i = \bigcup_i \left(\bigcup_j B_{ij} \right) = \bigcup_{i,j} B_{ij} \implies \bigcup_i A_i \in \mathcal{T}$$

- III Sia $A, B \in \mathcal{T}$, cioè $A = \bigcup_i A_i$ e $B = \bigcup_j B_j$ con $A_i, B_j \in \mathcal{B}$. Allora:

$$A \cap B = \left(\bigcup_i A_i \right) \cap \left(\bigcup_j B_j \right) = \bigcup_{i,j} \underbrace{A_i \cap B_j}_{\in \mathcal{T} \text{ per l'ipotesi 2}} \in \mathcal{T}$$

□

ESEMPIO. Sia $X = \mathbb{R}$ e $\mathcal{B} = \{[a, b] \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. Verifichiamo che \mathcal{B} soddisfa il teorema appena enunciato.

1. $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-n, n]$.
2. Preso $[a, b] \cap [c, d]$ si ha che esso è \emptyset o è $[e, f]$, con $e = \max\{a, c\}$, $f = \min\{b, d\}$; in entrambi i casi l'intersezione è elemento di \mathcal{B} .

Esiste dunque una topologia su \mathbb{R} che ha base \mathcal{B} ; questa *non* è base per la topologia Euclidea, ad esempio, dato che gli intervalli semiaperti non sono inclusi in $\mathcal{E}_{\text{eucl}}$.

Notiamo inoltre che $(a, b) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left[a + \frac{1}{n}, b \right)$, dunque la topologia definita \mathcal{B} comprende gli aperti della topologia Euclidea: $\mathcal{E}_{\text{eucl}}$ è meno fine di questa topologia.

1.1.4 Altri concetti topologici: chiusura, interno, frontiera e densità

Ricordiamo che, dato uno spazio topologico (X, \mathcal{T}) e un sottoinsieme $A \subseteq X$, si ha:

- A aperto della topologia se $A \in \mathcal{T}$.
- A chiuso della topologia se $\mathcal{C}A = X \setminus A \in \mathcal{T}$.

ATTENZIONE! Essere aperto oppure essere chiuso *non si escludono a vicenda*! Un insieme può essere aperto, chiuso, entrambi o nessuno dei due. Ad esempio, il vuoto e l'insieme stesso sono aperti e chiusi allo stesso tempo, dato che per ipotesi sono aperti i loro complementari $\mathcal{C}\emptyset = X \setminus \emptyset = X$ e $\mathcal{C}X = X \setminus X = \emptyset$ sono anch'essi aperti.

DEFINIZIONE 1.1.7. Sia X spazio topologico e $A \subseteq X$. La **chiusura** \overline{A} di A è il più piccolo chiuso contenente A :

$$\overline{A} = \bigcap_{\substack{A \subseteq C \\ C \text{ chiuso}}} C \quad (1.11)$$

PROPRIETÀ:

- $A \subseteq \overline{A}$.
- \overline{A} è un chiuso in quanto intersezione (arbitraria) di chiusi.
- A è un chiuso $\iff A = \overline{A}$.

DEFINIZIONE 1.1.8. Un punto x è **aderente** ad A se $x \in \overline{A}$.

DEFINIZIONE 1.1.9. Sia X spazio topologico e $A \subseteq X$. L'**interno** A° di A è il più grande aperto contenuto in A :

$$A^\circ = \bigcup_{\substack{B \subseteq A \\ B \text{ aperto}}} B \quad (1.12)$$

PROPRIETÀ:

- $A^\circ \subseteq A$.
- A° è un aperto in quanto unione (arbitraria) di aperti.
- A è un aperto $\iff A = A^\circ$.

DEFINIZIONE 1.1.10. Un punto x è **interno** ad A se $x \in A^\circ$.

DEFINIZIONE 1.1.11. Sia X spazio topologico e $A \subseteq X$. La **frontiera** ∂A di A sono i punti della chiusura di A non contenuti nel suo interno o, in altri termini, i punti aderenti sia ad A sia al suo complementare.

$$\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A} \quad (1.13)$$

PROPRIETÀ:

- $\partial A \subseteq \overline{A}$.
- ∂A è un chiuso.

DEFINIZIONE 1.1.12. Sia X spazio topologico e $A \subseteq X$. A è **denso** è denso in X se $\overline{A} = X$ o, in altri termini, tutti i punti di X sono aderenti ad A .

ESEMPIO. Il più piccolo chiuso contenente \mathbb{Q} è \mathbb{R} , poiché ogni reale è aderente ai razionali. Dunque \mathbb{Q} è denso in \mathbb{R} .

1.1.5 *Intorni*

DEFINIZIONE 1.1.13. Sia X spazio topologico e $x \in X$. V è un **intorno** di x se $\exists A$ aperto tale che $x \in A \subseteq V$ o, in altri termini, se x è interno ad V . Definiamo inoltre la **famiglia degli intorni** di x $I(x) \subseteq \mathcal{P}(X)$:

$$I(x) = \{V \subseteq X \mid V \text{ è intorno di } x\} \quad (1.14)$$

OSSERVAZIONE. Dato $A \subseteq X$, per ogni $x \in A$ tale che A è intorno di x si può definire un aperto $A_x \subseteq A$, con $x \in A_x$. L'unione arbitraria di questi A_x risulta essere contenuta in A e pari al suo interno. Dunque, si può definire l'interno di A come $A^\circ = \{x \in A \mid A \in I(x)\}$; segue che A è aperto se e solo se A è intorno di ogni punto in A .

LEMMA 1.1.0. PROPRIETÀ DEGLI INTORNI. (MANETTI, 3.20, 3.21)

1. *Si possono estendere gli intorni:* $U \in I(x)$, $U \subseteq V \implies V \in I(x)$
2. *Le intersezioni di intorni sono ancora intorni:* $U, V \in I(x) \implies U \cap V \in I(x)$
3. *Caratterizzazione della chiusura per intorni:*
 $B \subseteq X$, allora $x \in \overline{B} \iff \forall U \in I(x) \quad U \cap B \neq \emptyset$.

DIMOSTRAZIONE.

- I L'aperto A che soddisfa la definizione di $U \in I(x)$ è per costruzione contenuto anche in V , dunque A è un aperto che soddisfa la definizione di V intorno di x .
- II Definiti gli aperti $A_U \subseteq U$, $A_V \subseteq V$ che soddisfano la definizione di intorni di x , l'intersezione $A = A_U \cap A_V$ è un aperto contenente x . Dato che $A = A_U \cap A_V \subseteq U \cap V$, $U \cap V$ per definizione di intorno di x .

III Per connotominale.

$$\begin{aligned}
 x \notin \overline{B} &\iff x \notin B \wedge x \notin \partial B \\
 &\iff x \in X \setminus B \wedge x \notin \overline{B} \cap \overline{X \setminus B} \\
 &\iff x \in X \setminus B \wedge x \notin \partial(X \setminus B) \\
 &\iff x \in (X \setminus B)^o \\
 &\iff \exists U \in I(X) : x \in U \subseteq X \setminus B \\
 &\iff \exists U \in I(x) : U \cap B = \emptyset
 \end{aligned}$$

□

DEFINIZIONE 1.1.14. Sia X spazio topologico, $x \in X$ e $I(x)$ la famiglia degli intorni di x . Una sottofamiglia $\mathcal{J} \subseteq I(x)$ è un **sistema fondamentale di intorni** di x se $\forall U \in I(x) \exists V \in \mathcal{J} : V \subseteq U$.

1.2 FUNZIONI CONTINUE

DEFINIZIONE 1.2.0. Siano X, Y spazi topologici. Una funzione $f : X \longrightarrow Y$ si dice **continua** se la controimmagine di aperti in Y è un aperto in X :

$$\forall A \text{ aperto in } Y, f^{-1}(A) \text{ è aperto in } X \quad (1.15)$$

Alternativamente, f è continua se la controimmagine di chiusi in Y è un chiuso in X .

$$\forall C \text{ chiuso in } Y, f^{-1}(C) \text{ è chiuso in } X \quad (1.16)$$

OSSERVAZIONE.

- Si ha la definizione di continuità con i chiusi perché la controimmagine si “comporta bene” con i complementari:

$$f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A)$$

- È sufficiente verificare la definizione per gli aperti una base di Y perché la controimmagine si “comporta bene” con le unioni di insiemi:

$$f^{-1}\left(\bigcup_i A_i\right) = \bigcup_i f^{-1}(A_i)$$

LEMMA 1.2.0. (MANETTI, 3.25)

Siano X, Y spazi topologici e $f : X \longrightarrow Y$ funzione. f è continua iff $\forall A \subseteq X \quad f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.

DIMOSTRAZIONE. Ricordiamo che per ogni funzione si ha:

- $f(f^{-1}(C)) \subseteq C$
- $A \subseteq f^{-1}(f(A))$

\implies) Sia $A \subseteq X$. Dobbiamo dimostrare che $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$. Sappiamo che se un insieme è contenuto in un altro, lo stesso vale per le immagini e le controimmagini. Allora:

$$\begin{aligned} f(A) &\subseteq \overline{f(A)} \\ A &\subseteq f^{-1}(f(A)) \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)}) \end{aligned}$$

$f^{-1}(\overline{f(A)})$ è un chiuso (in X in quanto controimmagine tramite una funzione continua di un chiuso) che contiene A . Ma allora anche la chiusura, che è il più piccolo chiuso contenente A , è contenuta in $f^{-1}(\overline{f(A)})$. Segue quindi:

$$\begin{aligned} \overline{A} &\subseteq f^{-1}(\overline{f(A)}) \\ f(\overline{A}) &\subseteq f(f^{-1}(f(A))) \subseteq \overline{f(A)} \end{aligned}$$

\Leftarrow) Sia $C \subseteq Y$ chiuso e sia $A = f^{-1}(C)$. Dobbiamo dimostrare che A è chiuso in X . Poiché $A \subseteq \overline{A}$ è vero per definizione, dimostriamo che $\overline{A} \subseteq A$. Per ipotesi:

$$\begin{aligned} f(\overline{A}) &\subseteq \overline{f(A)} \\ f(\overline{f^{-1}(C)}) &\subseteq \overline{f(f^{-1}(C))} \subseteq \overline{C} = C \end{aligned}$$

Applicando nuovamente la controimmagine:

$$\begin{aligned} f(\overline{f^{-1}(C)}) &\subseteq C \\ \overline{A} = \overline{f^{-1}(C)} &\subseteq f^{-1}(f(\overline{f^{-1}(C)})) \subseteq f^{-1}(C) = A \end{aligned}$$

Dunque la controimmagine A di un chiuso C è un chiuso. □

TEOREMA 1.2.0. MANETTI, 3.26 La composizione di funzioni continue è continua.

$$f : Y \longrightarrow Z, \quad g : X \longrightarrow Y \text{ continue} \implies f \circ g : X \longrightarrow Z \text{ continua} \quad (1.17)$$

DIMOSTRAZIONE. La controimmagine della composizione di funzioni $f \circ g$ è definita come $f^{-1}(f \circ g) = g^{-1} \circ f^{-1}$. Allora A aperto in $Z \implies f^{-1}(A)$ aperto $\implies g^{-1}(f^{-1}(A))$ aperto. □

DEFINIZIONE 1.2.1. (MANETTI, 3.27)

Siano X, Y spazi topologici e $f : X \longrightarrow Y$ funzione. Dato $x \in X$ f è **continua** in x se:

$$\forall U \in I(f(x)) \exists V \in I(x) : f(V) \subseteq U \quad (1.18)$$

Questa è la generalizzazione della definizione tradizionale della continuità affrontata in *Analisi UNO*.

TEOREMA 1.2.1. (MANETTI, 3.28)

Siano X, Y spazi topologici e $f : X \longrightarrow Y$ funzione. f è continua per aperti $\iff f$ è continua in $x \forall x \in X$.

DIMOSTRAZIONE. \implies) Sia $x \in X$ e $U \in I(f(x))$. Per definizione di intorno $\exists A$ aperto in Y tale che $f(x) \in A \subseteq U$. Basta porre $V = f^{-1}(A)$: per continuità è aperto in X e, dato che $x \in f^{-1}(A)$ perché $f(x) \in A$, allora V è intorno di x . Segue che $f(V) = f(f^{-1}(A)) \subseteq A \subseteq U$.

\impliedby) Sia $A \subseteq Y$ aperto. Dobbiamo dimostrare che $f^{-1}(A)$ sia aperto. Preso $x \in f^{-1}(A)$ si ha che $f(x) \in A$; dunque A è, in quanto aperto, intorno di $f(x)$. Allora, poiché f è continua in x , $\exists V \in I(x)$ tale che $f(V) \subseteq A$.

Segue che $x \in V \subseteq f^{-1}(A)$, cioè $f^{-1}(A)$ è intorno di x poiché contiene un intorno V dello stesso punto. Dunque $f^{-1}(A)$ aperto perché è intorno di ogni suo punto. \square

DEFINIZIONE 1.2.2. Siano X, Y spazi topologici e $f : X \longrightarrow Y$ funzione.

- f è **aperta** se $\forall A$ aperto in X $f(A)$ è aperto in Y .
- f è **chiusa** se $\forall C$ chiuso in X $f(C)$ è chiuso in Y .

OSSERVAZIONE. È sufficiente verificare la definizione di funzione aperta per gli aperti di una base di X perché l'immagine si “comporta bene” con le unioni di insiemi:

$$f\left(\bigcup_i A_i\right) = \bigcup_i f(A_i)$$

ATTENZIONE! Una funzione f aperta che non sia omeomorfismo non è necessariamente una funzione aperta. Si prenda $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ (la proiezione sulla prima coordinata):

- f è *continua* per ovvi motivi.
- f è *aperta*. Infatti, presa una base su \mathbb{R}^2 come $\{B_\varepsilon(x, y)\}$, si ha che $f(B_\varepsilon(x, y)) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ che sono aperti in \mathbb{R} .
- f non è *chiusa*. Prendiamo $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 1\}$ e definiamo la funzione

$g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ continua; vediamo facilmente come $C = g^{-1}(\{1\})$ e, essendo $(x, y) \mapsto xy$

1 chiuso in \mathbb{R} , C è controimmagine continua di un chiuso e dunque chiuso.

Si ha dunque $f(C) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, che tuttavia non è un chiuso della topologia Euclidea in quanto non contiene infiniti punti (una base della \mathcal{E}_{ucl} è formata da intervalli, che dunque contengono infiniti punti).

DEFINIZIONE 1.3.0. Siano X, Y spazi topologici e $f : X \longrightarrow Y$ funzione. f è un **omeomorfismo** se è *biunivoca*, *continua* e la sua inversa è *continua*; più precisamente, esiste $g : Y \rightarrow X$ continua tale per cui $g \circ f = Id_X$ e $f \circ g = Id_Y$. Due spazi topologici si dicono **omeomorfi** se esiste un omeomorfismo fra i due; in notazione $X \cong Y$.

INTUITIVAMENTE... Possiamo immaginare l'omeomorfismo come una *deformazione* che *piega* e *allunga* uno spazio senza formare *strappi* (f continua), creare *nuovi punti* (f iniettiva), *sovraposizioni* (f suriettiva) o *incollamenti* (f^{-1} continua): in questo modo si può trasformare lo spazio in un altro che mantenga le stesse *proprietà topologiche* dell'originale.

Si vede allora facilmente che un *quadrato* ed un *cerchio* sono omeomorfi, mentre una *sfera* ed un *toro* (la versione “topologica” di una ciambella col buco, si veda pag. ??) non lo sono, dato che non posso creare né far sparire quel buco; allo stesso modo una *retta* non è omeomorfa ad un *punto*, dato che non posso “accumulare” tutti i punti della retta in uno solo!

Seppur questa “visualizzazione” è una buona intuizione del funzionamento degli omeomorfismi, **non è completamente accurata**. Ad esempio, un *nastro di Möbius* (per la si veda ??) con un mezzo-giro ed uno con tre mezzi-giri sono omeomorfi, ma con la nostra intuizione non si arriva a dire perché.

LEMMA 1.3.0. (MANETTI, 3.31)

Siano X, Y spazi topologici e $f : X \longrightarrow Y$ funzione *continua*. Allora vale:

1. f omeomorfismo $\iff f$ aperta e biettiva.
2. f omeomorfismo $\iff f$ chiusa e biettiva.

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo la prima condizione, la seconda è analoga.

\Rightarrow) Un omeomorfismo è biettiva per definizione. Dimostriamo dunque che f sia aperta, cioè $\forall A \in X$ aperto $f(A) \in Y$ è aperto. Ma definita $g : Y \longrightarrow X$ l'inversa continua dell'omeomorfismo f (cioè $f^{-1} = g$), si ha che $\forall A \in X$ $g^{-1}(A) = f(A)$ è aperto.
 \Leftarrow) f è già biettiva e continua per ipotesi. Dobbiamo dimostrare che l'inversa $g : Y \longrightarrow X$ sia continua, cioè $\forall A \in X$ aperto $g^{-1}(A) \in Y$ è aperto. Ma $g^{-1}(A) = f(A)$ che è aperto perché f è aperta. \square

1.4 TOPOLOGIA INDOTTA

DEFINIZIONE 1.4.0. Dati:

- Uno spazio topologico X .
- Un insieme Y .
- Una funzione $f : Y \longrightarrow X$

Allora su Y si può definire la **topologia indotta** come la topologia meno fine tra tutte quelle che rendono f continua.

1.5 SOTTOSPAZIO TOPOLOGICO

DEFINIZIONE 1.5.0. Sia X uno spazio topologico (X, \mathcal{T}) e $Y \subseteq X$ un suo sottoinsieme. Su Y si può definire la seguente *topologia di sottospazio*:

$$U \subseteq Y \text{ aperto in } Y \iff \exists V \subseteq X \text{ aperto in } X (V \in \mathcal{T}) : U = V \cap Y \quad (1.19)$$

Definita l'**inclusione** $i : Y \xhookrightarrow{\quad} X$, la topologia di sottospazio è la topologia indotta da i , cioè la topologia meno fine fra tutte quelle che rendono continua l'inclusione.

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo la continuità dell'inclusione. Se A aperto in X , $i^{-1}(A) = A \cap Y$ (tutti gli elementi di A contenuti in Y) è aperto in Y per definizione. \square

DEFINIZIONE 1.5.1. Sia X uno spazio topologico (X, \mathcal{T}) e $Y \subseteq X$ un suo sottoinsieme. Allora:

- $A \subseteq Y$ **aperto** in $Y \iff A = U \cap Y$ con U aperto in X .
- $C \subseteq Y$ **chiuso** in $Y \iff C = U \cap Y$ con U chiuso in X .
- Se \mathcal{B} è una base della topologia di $X \implies \mathcal{B}' := \{B \cap Y \mid B \in \mathcal{B}\}$ è base della topologia di sottospazio.

OSSERVAZIONE. Se $A \subseteq Y$ è aperto della topologia di X , allora A è aperto in Y poiché $A = A \cap Y$.

ESEMPI. Sia $Y = [0, 1] \subset \mathbb{R} = X$ in topologia Euclidea.

- $A = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ è aperto in Y in quanto è già aperto in X .
- $A = \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ è chiuso in Y in quanto è già chiuso in X .
- $B = \left(\frac{1}{2}, 1\right]$ è aperto in Y in quanto si ha, ad esempio, $A = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \cap Y$.

LEMMA 1.5.0. (MANETTI, 3.55)

Sia $A \subseteq Y \subseteq X$ con X spazio topologico e Y sottospazio topologico. Definiamo:

- $c\ell_Y(A) =$ chiusura di A in Y .
- $c\ell_X(A) =$ chiusura di A in X .

Allora $c\ell_Y(A) = c\ell_X(A) \cap Y$.

DIMOSTRAZIONE. Preso $\mathcal{C} = \{C \subseteq X \mid C$ chiuso in X e $A \subseteq C\}$, per definizione di chiusura si ha:

$$c\ell_X(A) = \bigcap_{C \in \mathcal{C}} C$$

Ora sia $\mathcal{C}' = \{C \cap Y \mid C \in \mathcal{C}\}$. Allora, usando i chiusi del sottospazio:

$$c\ell_Y(A) = \bigcap_{C \in \mathcal{C}} (C \cap Y) = \left(\bigcap_{C \in \mathcal{C}} C \right) \cap Y = c\ell_X(A)$$

.

\square

1.5.1 Immersione

DEFINIZIONE 1.5.2. Sia $f : X \longrightarrow Y$ funzione tra X, Y spazi topologici. Se:

- f continua.
- f iniettiva

Allora f è un'immersione se e solo se ogni aperto in X è controimmagine di un aperto di Y per f , cioè se e solo se si ha che:

$$B \subseteq X \text{ è aperto in } X \iff B = f^{-1}(A), A \text{ aperto in } Y \quad (1.20)$$

OSSERVAZIONE. Per costruzione f è immersione se la topologia su X è la topologia indotta, dunque la meno fine che rende f continua.

Se sull'immagine $f(X) \subseteq Y$ mettiamo la topologia di sottospazio di Y , si ha che

$$f : X \longrightarrow Y \text{ immersione} \iff f_\bullet : X \longrightarrow f(X) \text{ è omeomorfismo}$$

ESEMPIO. Esempio di *non* immersione.

$$\begin{aligned} & [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ & t \mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) \end{aligned} \quad (1.21)$$

Notiamo innanzitutto che $f([0, 1]) = S^1$. Si ha:

- f_\bullet è continua per ovvi motivi
- f_\bullet iniettiva, dato che l'unico caso problematico poteva essere $t = 1$ che *non* nel dominio (si avrebbe avuto infatti $f_\bullet(0) = f_\bullet(1)$).
- f_\bullet suriettiva per costruzione.

Tuttavia f_\bullet non è immersione, dato che f_\bullet^{-1} non è continua. Preso $P = (1, 0) \in S^1$, f_\bullet^{-1} non è continua in P . Infatti, gli intorni di 0 in $[0, 1]$ sono del tipo $U = [0, \varepsilon]$, dunque dovrei trovare $\forall U$ un intorno V di $P \in S^1$: $f_\bullet^{-1}(V) \subseteq U$.

Tuttavia, solo la parte superiore di $V \in I(P)$ ha la controimmagine interna ad U : la parte inferiore, poiché sono le immagini di punti prossimi all'estremo 1 del dominio, non hanno controimmagini in U . Pertanto, non abbiamo l'omeomorfismo di f_\bullet e dunque l'immersione.

DEFINIZIONE 1.5.3. Sia $f : X \longrightarrow Y$ funzione tra X, Y spazi topologici.

- f si dice **immersione aperta** se f è chiusa.
- f si dice **immersione chiusa** se f è aperta.

LEMMA 1.5.1. (MANETTI, 3.59)

Sia $f : X \longrightarrow Y$ funzione continua tra X, Y spazi topologici.

1. f iniettiva e aperta $\implies f$ è immersione (aperta)
2. f iniettiva e chiusa $\implies f$ è immersione (chiusa)

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo il caso chiuso, il caso aperto è analogo. Preso $C \subseteq X$ chiuso, sappiamo che $f(C)$ è chiuso in Y , ma possiamo sempre dire che $f(C) = f(C) \cap f(X)$ in quanto $f(C) \subseteq f(X)$. Dunque $f(C)$ è un chiuso del sottospazio $f(X)$. Segue che ogni chiuso di C è un chiuso dell'immagine di f , dunque $f_\bullet : X \longrightarrow f(X)$ è:

- Continua perché lo è f .
- Biunivoca perché f_\bullet è iniettiva in quanto lo è f e suriettiva per definizione.
- Chiusa per costruzione.

f_\bullet è dunque omeomorfismo ed f è immersione (chiusa). \square

1.6 PRODOTTI TOPOLOGICI

DEFINIZIONE 1.6.0. Siano P, Q spazi topologici e $P \times Q$ il suo prodotto cartesiano. Definite le **proiezioni**:

$$\begin{aligned} p : P \times Q &\longrightarrow P \\ (x, y) &\longmapsto x \end{aligned} \tag{1.22}$$

$$\begin{aligned} q : P \times Q &\longrightarrow Q \\ (x, y) &\longmapsto y \end{aligned} \tag{1.23}$$

La **topologia prodotto** \mathcal{P} è la topologia *meno fine* fra quelli che rendono p e q *continue*. In particolare, ricordando l'osservazione 1.2, la topologia prodotto è l'intersezione di *tutte* le topologie che rendono continue p e q .

TEOREMA 1.6.0. (MANETTI, 3.61)

1. Una *base* della topologia \mathcal{P} è data dagli insiemi della forma $U \times V$ dove $U \subseteq P$ aperto, $V \subseteq Q$ aperto.
2. p, q sono aperte; inoltre $\forall (x, y) \in P \times Q$ le restrizioni:

$$\begin{aligned} p| : P \times \{y\} &\longrightarrow P \\ (x, y) &\longmapsto x \end{aligned} \tag{1.24}$$

$$\begin{aligned} q| : \{x\} \times Q &\longrightarrow Q \\ (x, y) &\longmapsto y \end{aligned} \tag{1.25}$$

Sono *omeomorfismi*.

3. Data $f : X \longrightarrow P \times Q$ con X spazio topologico, si ha che:

$$f \text{ continua} \iff f_1 = p \circ f, f_2 = q \circ f \text{ continue} \tag{1.26}$$

DIMOSTRAZIONE.

I Dimostriamo che:

- A) La famiglia $\{U \times V\}$ è base per una topologia \mathcal{T} .
- B) \mathcal{T} è meno fine di \mathcal{P} .
- C) \mathcal{T} è meno fine di P .

In questo modo avremo che la topologia \mathcal{T} è la topologia prodotto \mathcal{P} e ne conosceremo una base.

- a) Segue dal teorema delle basi 1.1 (Manetti, 3.7). Infatti
- $P \times Q$ appartiene alla famiglia $\{U \times V\}$, dato che per definizione gli insiemi stessi P e Q sono aperti.
 - L'intersezione di due elementi della famiglia appartiene alla famiglia: $(U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2)$.
- b) Per definizione \mathcal{P} è la meno fine fra tutte le topologie sul prodotto. Dunque, per dimostrare A) basta vedere che p, q sono continue rispetto alla topologia \mathcal{T} .
- Presi la proiezione p , sia $U \subseteq P$ aperto. Si ha che $p^{-1}(U) = U \times Q$ è aperto in \mathcal{T} in quanto è prodotto di aperti; in particolare sta nella base! Dunque p è continua, e un ragionamento analogo vale per q .
- c) Dobbiamo dimostrare che ogni aperto di \mathcal{T} è anche aperto di \mathcal{P} . Presi $U \subseteq P, V \subseteq Q$ allora:

$$U \times V = (U \cap P) \times (V \cap Q) = (U \times P) \cap (V \times Q) = p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$$

Poichè p, q sono continue e U, V sono aperti, anche $p^{-1}(U), q^{-1}(V)$ sono aperti; segue che la loro intersezione è aperta e dunque $U \times V$ è aperto della topologia \mathcal{T} .

- II Dimostriamo il caso con $p|$, dato che il caso con $q|$ è analogo. Preso un aperto della base $U \times V$, studiamo gli aperti del sottospazio $P \times \{y\}$.

$$(U \times V) \cap (P \times \{y\}) = \begin{cases} \emptyset & \text{se } y \notin V \\ U \times \{y\} & \text{se } y \in V \end{cases}$$

Gli aperti del sottospazio $P \times \{y\}$ sono tutte e solo le unioni di $U \times \{y\}$, al variare di Y di aperti dello spazio P . Si ha dunque:

$$p| (U \times \{y\}) = U$$

Dunque, essendo $p|$ continua perché restruzione della proiezione (che è continua per definizione), biettiva per costruzione e aperta per i risultati appena ottenuti si ha che $P \times \{y\}$ e P sono omeomorfi, cioè $p|$ è omeomorfismo.

Per dimostrare che p sia aperta, preso A aperto in $P \times Q$, si ha:

$$p(A) = p \left[\bigcup_{y \in \mathbb{Q}} (A \cap P \times \{y\}) \right] = \bigcup_{y \in \mathbb{Q}} p(A \cap P \times \{y\}) \quad (1.27)$$

Per i ragionamenti della prima parte, $A \cap P \times \{y\}$ è aperto di $P \times \{y\}$ e sappiamo dunque che $p| (A \cap P \times \{y\})$ è aperto: ne segue che $p(A \cap P \times \{y\})$ è aperto in P al variare di y . Allora anche $p(A)$ è aperto (in quanto è unione di aperti) e dunque p è aperta.

- III \implies) Poiché $f : X \longrightarrow P \times Q, p : P \times Q \longrightarrow P$ e $q : P \times Q \longrightarrow Q$ sono continue, le composizioni $f_1 = p \circ f : X \longrightarrow P, f_2 = q \circ f : X \longrightarrow Q$ sono banalmente continue. \Leftarrow) Dobbiamo dimostrare che f sia continua.

Sia $A = U \times V \subseteq P \times Q$ aperto della base:

$$\begin{aligned} f^{-1}(U \times V) &= f^{-1}(p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)) = f^{-1}(p^{-1}(U)) \cap f^{-1}(q^{-1}(V)) \\ &= (pf)^{-1}(U) \cap (qf)^{-1}(V) \end{aligned}$$

Per ipotesi pf, qf sono continue, dunque loro controimmagini di aperti sono ancora aperti; inoltre, essendo la loro intersezione un aperto, segue l'implicazione. \square

PROPOSIZIONE 1.6.0. Siano X, Y spazi topologici e $X \times Y$ il prodotto. Allora:

1. Date le basi \mathcal{B} della topologia di X e \mathcal{C} della topologia di Y , allora:

$$\mathcal{D} = \{U \times V \mid U \in \mathcal{B}, V \in \mathcal{C}\} \quad (1.28)$$

è una base per la topologia prodotto.

2. Dati $x \in X, y \in Y$, siano $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ un sistema fondamentale di intorni di x e $\mathcal{V} = \{V_j\}_{j \in J}$ un sistema fondamentale di intorni di y . Poniamo $W_{ij} := U_i \times V_j \subseteq X \times Y$. Allora:

$$\mathcal{W} = \{W_{ij}\}_{j \in J} \quad (1.29)$$

è un sistema fondamentale di intorni di $(x, y) \in X \times Y$.

3. Se $A \subseteq X, B \subseteq Y$, allora $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$. In particolare, il prodotto di chiusi è chiuso.

DIMOSTRAZIONE.

- I Segue dalla dimostrazione dal primo punto del teorema 1.4 ((MANETTI, 3.61)).
- II Per definizione di sistema fondamentale di intorni si ha:

$$\begin{aligned} \forall U \in I(x) \exists U_i \in \mathcal{U} : U_i \in U \\ \forall V \in I(y) \exists V_j \in \mathcal{V} : V_j \in V \end{aligned}$$

\implies) Per ogni intorno U di x e V di y , si ha $W \in I(x, y)$. Inoltre, presi gli intorni U_i e V_j definiti come sopra, si ha che $W_{ij} = U_i \times V_j \in I(x, y)$ per definizione di topologia prodotto; segue che, per ogni intorno W di questa forma esiste W_{ij} tale che:

$$W_{ij} = U_i \times V_j \subseteq U \times V \subseteq W$$

\Leftarrow) Prendiamo un intorno $W \in I(x, y)$, esiste un aperto $W' \subseteq W$. Poiché W' appartiene al prodotto $X \times Y$, si ha che $W' = \bigcup_k U_k \times V_k$ con U_k e V_k aperti di X e Y . Preso allora $(x, y) \in W'$, esiste gli aperti U_k e V_k che contengono rispettivamente x e y .

Segue dunque che $U_k \in I(x)$ e $V_k \in I(y)$ e dunque dal sistema fondamentale di intorni si ha che $\exists U_i \in \mathcal{U}, V_j \in \mathcal{V}$ tali che $U_i \in U_k, V_j \in V_k$. Allora definito $W_{ij} = U_i \times V_j$, si ha per ogni intorno W di esiste W_{ij} tale che:

$$W_{ij} = U_i \times V_j \subseteq U_k \times V_k \subseteq W' \subseteq W$$

III

$$\begin{aligned}
 (xy) \in \overline{A \times B} &\iff \forall W \in I(x, y) \quad W \cap (A \times B) \neq \emptyset \\
 &\iff \forall U \in I(x), \forall V \in I(y) \quad (U \times V) \cap (A \times B) \neq \emptyset \\
 &\iff \forall U \in I(x), \forall V \in I(y) \quad (U \cap A) \times (V \cap B) \neq \emptyset \\
 &\iff \forall U \in I(x), \forall V \in I(y) \quad U \cap A \neq \emptyset, V \cap B \neq \emptyset \\
 &\iff \forall U \in I(x) \quad U \cap A \neq \emptyset, \forall V \in I(y) \quad V \cap B \neq \emptyset \\
 &\iff x \in \overline{A} \wedge y \in \overline{B} \iff ()(xy) \in \overline{A} \times \overline{B}
 \end{aligned}$$

In particolare, se A e B sono chiusi, avendo che $A = \overline{A}$ e $B = \overline{B}$, otteniamo:

$$A \times B = \overline{A} \times \overline{B} = \overline{A \times B}$$

□

OSSERVAZIONE. Il prodotto di un numero **finito** di spazi topologici è pari al prodotto di due spazi:

$$X \times Y \times Z = (X \times Y) \times Z$$

In particolare una base di aperti di $X_1 \times \dots \times X_n$ è data da:

$$\mathcal{B} = \{A_1 \times \dots \times A_n \mid A_i \text{ aperto in } X_i\}$$

1.7 ASSIOMI DI SEPARAZIONE: T1 E HAUSDORFF

DEFINIZIONE 1.7.0. Uno spazio topologico X si dice **T1** se ogni sottoinsieme finito è chiuso, in particolare se e solo se tutti i punti sono chiusi.

In termini di intorni, X è **T1** se presi due punti distinti x e y esiste un intorno per il punto x che non contiene y e viceversa:

$$\forall x, y \in X \quad x \neq y \implies \begin{cases} \exists U \in I(x) \quad y \notin U \\ \exists V \in I(y) \quad x \notin V \end{cases} \quad (1.30)$$

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo che la definizione di **T1** implica quella per intorni e viceversa.

⇒) Siano $x, y \in X$ $x \neq y$. Per ipotesi $\{x\}$ è chiuso, dunque $V = X \setminus \{x\}$ è aperto. Poiché $y \neq x$, allora $y \notin \{x\} \implies y \in V$, ed essendo V aperto, $V \in I(y)$. Dunque V è intorno di y e banalmente $x \notin V$.

⇐) Dobbiamo dimostrare che $\forall x \quad \{x\}$ è chiuso, cioè $A = X \setminus \{x\}$ è aperto. Sia $y \in A$: $y \notin \{x\} \implies y \neq x$. Per ipotesi allora esiste un intorno V di y tale che $x \notin V$. Necessariamente si ha che $V \subseteq A$, dunque A è anch'esso intorno di y . Per l'arbitrarietà di y , A è intorno di ogni suo punto, dunque A è aperto. □

OSSERVAZIONE.

1. X è **T1** se e solo se per ogni punto $x \in X$ si ha:

$$\{x\} = \bigcap_{U \in I(x)} U \quad (1.31)$$

2. Ogni spazio metrico è **T1**

DIMOSTRAZIONE.

I \implies) Se X è **T1**, allora $\forall \{y\} \subseteq X$ è chiuso. Fissato x , prendiamo $y \in \bigcap_{U \in I(x)} U$. Allora $\forall U \in I(x) \quad \{y\} \cap U \neq \emptyset$. Da ciò segue che $x \in \overline{\{y\}} = \{y\}$, cioè $y = x$. Allora $\{x\} = \bigcap_{U \in I(x)} U$.

\Leftarrow) Per dimostrare che X è **T1** è sufficiente dimostrare che $\{x\}$ è chiuso, dato che ogni insieme finito in X si può vedere come unione finita di singoletti $\{x\}$ e per gli assiomi dei chiusi otteniamo un chiuso. In particolare, ci basta dimostrare che $\overline{\{x\}} \subseteq \{x\}$, essendo l'altra implicazione ovvia per definizione.

Sia $y \in \{x\}$. Per definizione di chiusura $\forall V \in I(y) \quad V \cap \overline{\{x\}} \neq \emptyset \implies \forall V \in I(y) \quad V \cap \{x\} = \{x\}$, cioè l'intersezione dei V deve incontrare $\{x\}$:

$$\bigcap_{V \in I(y)} V \cap \{x\} = \{x\}$$

Per ipotesi, $\bigcap_{V \in I(y)} V = \{y\}$, dunque $\{y\} \cap \{x\} = \{x\} \implies y \in \{x\} \implies \overline{\{x\}} \subseteq \{x\}$ e vale le ipotesi.

II Se X è metrico e $x \in X$, il sistema fondamentale di intorni di X sono gli intorni centrati in X di raggio arbitrario, cioè $B_\varepsilon(x)$. Allora:

$$\bigcap_{U \in I(x)} U = \bigcap_{\varepsilon > 0} B_\varepsilon(x) = \{x\}$$

E per la proposizione precedente si ha che X metrico è **T1**. □

DEFINIZIONE 1.7.1. Uno spazio topologico X si dice di **Hausdorff** o **T2** se per ogni coppia di punti distinti esistono due intorni disgiunti:

$$\forall x, y \in X \quad x \neq y \implies \exists U \in I(x) \quad \exists V \in I(y) : U \cap V = \emptyset \quad (1.32)$$

OSSERVAZIONE.

1. X è di **Hausdorff** se e solo se per ogni punto $x \in X$ si ha:

$$\{x\} = \bigcap_{U \in I(x)} \overline{U} \quad (1.33)$$

2. Essere **Hausdorff** implica essere **T1**, ma non il viceversa.
3. Ogni spazio metrico è di **Hausdorff**.

DIMOSTRAZIONE.

- I \implies) Sia X di **Hausdorff**. Fissato x , sia $y \in \overline{U}$, con $U \in I(x)$. Per definizione di \overline{U} , $\forall V \in I(y) \quad V \cap U \neq \emptyset$. Se $y \neq x$, si avrebbe un assurdo, dato che $\nexists V \in I(y) : U \cap V = \emptyset$ e dunque X non sarebbe di **Hausdorff**.
- \Leftarrow) Dobbiamo dimostrare che X è di **Hausdorff**. Sia $x \neq y$. Allora $y \notin \{x\} = \bigcap_{U \in I(x)} \overline{U}$. Allora, per definizione di chiusura si ha che $\forall U \in I(x) \exists V \in I(y) : V \cap U = \emptyset$. Segue dunque la tesi.
- II Avendo per ogni coppia di punti distinti due intorni disgiunti in quanto **Hausdorff**, banalmente i due intorni verificano la definizione di **T1** per intorni. Il viceversa *non* è vero: prendendo la topologia dei complementari finiti CF su uno spazio X *non* finito, essa è **T1** ma non **Hausdorff**.
- III Presi $x \neq y$, allora $d(x, y) = d > 0$. Dunque, per disugualanza triangolare si ha sempre che:

$$B_{d/4}(Y) \cap B_{d/4}(Y) = \emptyset$$

□

PROPOSIZIONE 1.7.0. 1.21(MANETTI, 3.6.8)Sottospazi e prodotti di spazi di **Hausdorff** sono **Hausdorff**.**DIMOSTRAZIONE.**

- Sia $Y \subseteq X$ con X spazio topologico, Y con la topologia di sottospazio. Prendiamo $x, y \in Y$ con $x \neq y$. X di **Hausdorff** implica che $\exists U, V \subseteq X$ intorni rispettivamente di x e y tali che $U \cap V = \emptyset$. Basta prendere allora $U \cap Y, V \cap Y$: sono intorni sempre di x e y in Y che restano comunque disgiunti.
- Sia $X \times Y$ con X, Y spazi topologici. Prendiamo $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$. Questo significa che $x_1 \neq x_2$ oppure $y_1 \neq y_2$. Scegliamo senza perdita di generalità $x_1 \neq x_2$. Essendo X di **Hausdorff**, $\exists U_1, U_2$ (intorni) aperti in X tali che $x_1 \in U_1, x_2 \in U_2 : U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Allora:

$$\begin{aligned} U_1 \times Y \text{ intorno di } (x_1, y_1) \\ U_2 \times Y \text{ intorno di } (x_2, y_2) \end{aligned} \implies U_1 \times Y \cap U_2 \times Y = (U_1 \cap U_2) \times (Y \cap Y) = \emptyset$$

□

TEOREMA 1.7.0. (MANETTI, 3.6.9)Sia X spazio topologico. La **diagonale** $\Delta \subseteq X \times X$ è l'insieme delle coppie che hanno uguali componenti:

$$\Delta = \{(x, x) \mid x \in X\} \tag{1.34}$$

Si ha:

 X di **Hausdorff** $\iff \Delta$ chiuso in $X \times X$.**DIMOSTRAZIONE.** \implies) Dobbiamo dimostrare che Δ è chiuso, cioè $X \times X \setminus \Delta$ aperto,

ovvero $X \times X \setminus \Delta$ è intorno di ogni suo punto.

Preso $(x, y) \in X \times X \setminus \Delta \implies x \neq y$ dato che *non* appartiene alla diagonale. Essendo X di **Hausdorff**, $\exists U, V : x \in U, y \in V$ (intorni) aperti disgiunti. Allora $U \times V \cap \Delta = \emptyset$: se così non fosse, ci potrebbero essere dei valori della diagonale che appartengono ad $U \times V$, cioè esisterebbe almeno una coppia (x', y') tale che $x' = y'$, ovvero gli intorni non sarebbero disgiunti. Allora $(x, y) \in U \times V \subseteq X \times X \setminus \Delta$.

\Leftarrow) Siano $x, y \in X, x \neq y$. Allora $(x, y) \in X \times X \setminus \Delta$, che è aperto per ipotesi. Necessariamente esiste un aperto della base della topologia prodotto che contiene la coppia: $(x, y) \in U \times V \subseteq X \times X \setminus \Delta$. Per gli stessi ragionamenti dell'altra implicazione, si ha che $x \in U, y \in V$ con U, V aperti (e dunque intorni) disgiunti. Segue che X è di **Hausdorff**. \square

PROPOSIZIONE 1.7.1.

- Siano $f, g : X \longrightarrow Y$ continue, Y di **Hausdorff**. Sia C il luogo dei punti dove f e g coincidono:

$$C = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\} \quad (1.35)$$

Allora C è chiuso.

- Sia $f : X \longrightarrow X$ continua, X di **Hausdorff**. Sia $F_{ix}(f)$ il luogo dei **punti fissi** di f e g coincidono:

$$F_{ix}(f) = \{x \in X \mid f(x) = x\} \quad (1.36)$$

Allora $F_{ix}(f)$ è chiuso.

- Siano $f, g : X \longrightarrow Y$ continue, Y di **Hausdorff** e $A \subseteq X$ denso in X . Allora

$$\forall x \in A \quad f(x) = g(x) \implies \forall x \in X \quad f(x) = g(x) \quad (1.37)$$

- Sia $f : X \longrightarrow Y$ continua, Y di **Hausdorff**. Sia Γ_f il **grafico** di f le insieme delle coppie $(x, f(x))$ formate dai punti del dominio e le corrispettive immagini tramite f .

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in X \times Y \mid y = f(x)\} \quad (1.38)$$

Allora Γ_f è chiuso in $X \times Y$.

DIMOSTRAZIONE.

I Definiamo la funzione $h : X \longrightarrow X \times Y$. Essa è continua perché le componenti sono continue; considerata la diagonale Δ_Y di $Y \times Y$, si ha che

$C = h^{-1}(\Delta_Y)$ è la controimmagine tramite una funzione continua di un chiuso e quindi chiuso.

II Basta porre al punto 1 $g = Id_X$.

III Per ipotesi $A \subseteq h^{-1}(\Delta_Y)$. In quanto A è denso in X , $\overline{A} = X$. Dunque:

$$X = \overline{A} \subseteq \overline{h^{-1}(\Delta_Y)} = h^{-1}(\Delta_Y)$$

Questo è vero in quanto Y è di **Hausdorff** e la diagonale Δ_Y è un chiuso: segue che $h^{-1}(\Delta_Y)$ è chiuso e dunque pari alla sua chiusura. Si ha la tesi.

IV Definiamo la funzione continua $l : X \times Y \longrightarrow Y \times Y$. Allora $\Gamma_f = l^{-1}(\Delta_Y)$ è un chiuso.

□

1.8 PROPRIETÀ TOPOLOGICA

DEFINIZIONE 1.8.0. Una **proprietà topologica** P è una caratteristica degli spazi topologici per cui se ogni spazio X che possiede quella proprietà P è omeomorfo ad uno spazio Y , allora anche Y ha quella proprietà (e viceversa):

$$X \cong Y \implies [X \text{ ha } P \iff Y \text{ ha } P] \quad (1.39)$$

In altre parole, una proprietà topologica è **invariante** rispetto agli omeomorfismi.

OSSERVAZIONE. Per verificare che P è una proprietà topologica dati due spazi omeomorfi $X \cong Y$, basta in realtà verificare solo che se X ha la proprietà P allora anche Y la ha. Invece, si può verificare che due spazi **non** sono omeomorfi trovando una proprietà topologica che non condividono tra di loro.

ESERCIZIO. (MANETTI, 3.56)

Siano X, Y spazi topologici con Y di **Hausdorff**. Se esiste $f : X \longrightarrow Y$ continua e iniettiva, allora X è di **Hausdorff**.

DIMOSTRAZIONE. Siano $x, y \in X$ con $x \neq y$. Essendo f iniettiva, $f(x) \neq f(y) \in Y$: in quanto Y è di **Hausdorff**, $\exists U, V$ (intorni) aperti disgiunti in Y che contengono rispettivamente $f(x)$ e $f(y)$.

Per continuità di f le controimmagini di questi intorni aperti sono aperti e per iniettività sono ancora disgiunti: $\exists f^{-1}(U), f^{-1}(V)$ (intorni) aperti disgiunti che contengono rispettivamente x e y . Segue che X è di **Hausdorff**.

□

PROPOSIZIONE 1.8.0. Essere di **Hausdorff** è una proprietà topologica, ovvero:

$$X \cong Y \implies [X \text{ è di Hausdorff} \implies Y \text{ è di Hausdorff}] \quad (1.40)$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $f : X \longrightarrow Y$ un omeomorfismo tra i due spazi. Allora f è per definizione continua e iniettiva. Per l'esercizio 1.1 (MANETTI, 3.56) segue che X di **Hausdorff** $\implies Y$ di **Hausdorff**.

□

TEOREMA 1.8.0. X, Y di **Hausdorff** $\iff X \times Y$ di **Hausdorff**.

DIMOSTRAZIONE.

\implies) Si veda la proprietà (MANETTI, 3.6.8).

\iff) Si fissi $y_0 \in Y$. Definita la funzione $f : X \longrightarrow X \times Y$, essa è continua
 $x \mapsto (x, y_0)$

ed iniettiva, dunque per l'esercizio 1.1 (MANETTI, 3.56) segue che X è di **Hausdorff**.

Definito $x_0 \in X$ e $f : Y \longrightarrow X \times Y$, allo stesso modo si verifica che Y è di **Hausdorff**.

□

CAPITOLO 2

CONNESIONE E COMPATTEZZA

“BEEP BOOP INSERIRE CITAZIONE QUA BEEP BOOP.”

NON UN ROBOT, UN UMANO IN CARNE ED OSSA BEEP BOOP.

2.1 CONNESSIONE

DEFINIZIONE 2.1.0. Uno spazio topologico X si dice **connesso** se gli unici sottoinsiemi aperti e chiusi sono \emptyset , X .

Uno spazio non *connesso* si dice **sconnesso** oppure **non connesso**.

LEMMA 2.1.0. (MANETTI, 4.2)

Sono condizioni equivalenti:

1. X è *sconnesso*.
2. $X = A \cup B$ con A , B aperti, non vuoti, disgiunti.
3. $X = A \cup B$ con A , B chiusi, non vuoti, disgiunti.

DIMOSTRAZIONE.

2 \iff 3) Sono equivalenti: se A è aperto e disgiunto da B tale che $X = A \cup B$ significa che $B = \complement A = X \setminus A$ e dunque chiuso; analogamente per B aperto si ha che A è chiuso: allora A , B chiusi e aperti propri.

1 \implies 2) Esiste $\emptyset \subsetneq A \subsetneq X$ con A aperto e chiuso. Allora basta porre $B = \complement A = X \setminus A$: essendo il complementare di A è aperto e chiuso, sono disgiunti e tali per cui $B \neq X$, $B \neq \emptyset$. A e B soddisfano la tesi.

1 \implies 2) A aperto, B aperto $\implies A$ chiuso perché $A = \complement X = X \setminus B$. Inoltre A non vuoto, B non vuoto $\implies A \neq X$. Dunque A è aperto, chiuso e $A \neq \emptyset$, X è pertanto soddisfa la tesi: esiste un sottoinsieme aperto e chiuso che non il vuoto o l'insieme stesso. \square

OSSERVAZIONE. Il lemma 2.1 (MANETTI, 4.2) ci dice che è sufficiente trovare solo due aperti (o chiusi) che soddisfano la condizione di cui sopra per affermare la sconnessione.

Viceversa, per dimostrare la connessione, dobbiamo dimostrare che per ogni coppia di aperti (o chiusi) non vuoti, la cui unione è X , essi non siano disgiunti.

ESEMPIO. Esempi di spazi topologici *sconnessi* in topologia Euclidea.

- $X = \mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.
- $X = [0, 1] \cup (2, 3)$.

LEMMA 2.1.1. (MANETTI, 4.4)

Sia X spazio topologico e $A \subseteq X$ con A aperto e chiuso. Sia $Y \subseteq X$, Y *connesso*. Allora $Y \cap A = \emptyset$ (cioè $Y \subseteq Y \setminus A$) oppure $Y \subseteq A$.

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo $Y \cap A$: esso è intersezione di due aperti e chiusi per ipotesi (Y è aperto e chiuso perché *connesso*), cioè è aperto e chiuso. Essendo Y *connesso*, un suo sottoinsieme aperto e chiuso o è l'insieme vuoto oppure è l'insieme stesso, cioè $Y \cap A = \emptyset$ (cioè $Y \subseteq Y \setminus A$) oppure $Y \cap A = Y$ (cioè $Y \subseteq A$). \square

TEOREMA 2.1.0. (MANETTI, 4.6)

Con la topologia Euclidea, $X = [0, 1]$ è *connesso*.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo $X = [0, 1] = C \cup D$ con:

- C, D entrambi chiusi.
- C, D entrambi aperti.

Dobbiamo dimostrare che C, D non sono disgiunti, ovvero $C \cap D \neq \emptyset$. Supponiamo sia $0 \in C$ e poniamo $d = \inf D$. Essendo D un chiuso, $d \in \overline{D} = D$.

- Se $d = 0$, $d \in C \cap D \neq \emptyset$.
- Se $d > 0$ allora $[0, d] \subseteq C$ perché non sta in D . Il passaggio alla chiusura mantiene l'inclusione, dunque $[0, d] \subseteq \overline{C} = C$. Segue che $d \in C$ e dunque $C \cap D \neq \emptyset$. \square

TEOREMA 2.1.1. (MANETTI, 4.7)

L'immagine continua di un *connesso* è un *connesso*:

$$f : X \longrightarrow Y \text{ continua, } X \text{ connesso} \implies f(X) \text{ connesso} \quad (2.1)$$

TEOREMA 2.1.2. Sia $Z \subseteq f(X)$, Z aperto, chiuso in $f(X)$ non vuoto. Per dimostrare che $f(X)$ sia connesso ci è sufficiente dimostrare che $Z = f(X)$: in questo modo gli unici aperti e chiusi sono i sottoinsiemi impropri:

- Z aperto: $\exists A$ aperto in Y : $Z = A \cap f(X)$.
- Z chiuso: $\exists C$ chiuso in Y : $Z = C \cap f(X)$.

Allora:

- $f^{-1}(Z) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(f(X)) = f^{-1}(A) \implies f^{-1}(Z)$ è uguale alla controimmagine continua di un aperto in Y , cioè è uguale ad un aperto di X .
- $f^{-1}(Z) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(f(X)) = f^{-1}(C) \implies f^{-1}(Z)$ è uguale alla controimmagine continua di un chiuso in Y , cioè è uguale ad un chiuso di X .

ne continua di un chiuso in Y , cioè è uguale ad un chiuso di X . Segue che $f^{-1}(Z)$ è aperto e chiuso in X . Notiamo inoltre che, essendo $Z \neq \emptyset$, allora $f^{-1}(Z) \neq \emptyset$: essendo X connesso per ipotesi, necessariamente $f^{-1}(Z) = X$.

OSSERVAZIONE. Dal teorema precedente segue che essere *connesso* è una proprietà topologica! Infatti, se vale per una qualunque funzione continua $f : X \longrightarrow Y$, allora varrà anche per omeomorfismi tra X e Y ; in particolare, si avrà per suriettività che $f(X) = Y$ connesso.

DEFINIZIONE 2.1.1. Un **arco** o **cammino** α da un punto x a un punto y in uno spazio topologico X è una funzione continua che parametrizza un *percorso* finito fra gli estremi x e y :

$$\alpha : [0, 1] \longrightarrow X \text{ continua : } \alpha(0) = x, \alpha(1) = y \quad (2.2)$$

DEFINIZIONE 2.1.2. Uno spazio topologico X si dice **connesso per archi** o **c.p.a.** o *path-connected* se per ogni coppia di punti in X esiste un arco che li collega:

$$\forall x, y \in X \exists \alpha : [0, 1] \longrightarrow X \text{ continua : } \alpha(0) = x, \alpha(1) = y \quad (2.3)$$

TEOREMA 2.1.3. (MANETTI, 4.7)

X c.p.a. $\implies X$ connesso.

DIMOSTRAZIONE. Sia $X = A \cup B$, con A, B aperti non vuoti. Vogliamo dimostrare che $A \cap B \neq \emptyset$. Essendo non vuoti, prendiamo $a \in A, b \in B$. In quanto X è c.p.a., esiste il cammino (continuo) $\alpha : [0, 1] \longrightarrow X$ tale che $\alpha(0) = a, \alpha(1) = b$.

Studiamo la controimmagine di α :

$$\begin{aligned} \alpha^{-1}(X) &= \alpha^{-1}(A \cup B) = [0, 1] \\ [0, 1] &= \alpha^{-1}(A \cup B) = \alpha^{-1}(A) \cup \alpha^{-1}(B) \end{aligned}$$

$\alpha^{-1}(A), \alpha^{-1}(B)$ sono entrambi aperti e non vuoti in quanto controimmagini (continue) di aperti non vuoti ($0 \in \alpha^{-1}(A), 1 \in \alpha^{-1}(B)$).

Poiché $[0, 1]$ è connesso, allora le controimmagini trovate non sono disgiunte. Segue allora:

$$\exists t \in \alpha^{-1}(A) \cap \alpha^{-1}(B) \implies \alpha(t) \in \alpha(\alpha^{-1}(A) \cap \alpha^{-1}(B)) \subset \alpha(\alpha^{-1}(A)) \cap \alpha(\alpha^{-1}(B)) = A \cap B$$

□

DEFINIZIONE 2.1.3. Dati due cammini in uno spazio X :

$$\alpha : [0, 1] \longrightarrow X \quad \alpha(0) = x, \alpha(1) = y$$

$$\beta : [0, 1] \longrightarrow X \quad \beta(0) = y, \beta(1) = z$$

Allora possiamo creare un cammino $\alpha * \beta$ con la **congiunzione di cammini**:

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t) & \text{se } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ \beta(2t-1) & \text{se } \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases} \quad (2.4)$$

LEMMA 2.1.2. Sia A, B c.p.a, $A \cap B \neq \emptyset \implies A \cup B$ c.p.a.

DIMOSTRAZIONE. Se $x, y \in A$ oppure $x, y \in B$ esiste per ipotesi un arco che li collega. Dobbiamo allora trovare un arco in $A \cup B$ da x a y $\forall x \in A, y \in B$. Preso $z \in A \cap B$, per ipotesi esistono due cammini ad esso:

$$\alpha : [0, 1] \longrightarrow A \quad \alpha(0) = x, \alpha(1) = z$$

$$\beta : [0, 1] \longrightarrow B \quad \beta(0) = z, \beta(1) = y$$

Usando la *giunzione di cammini*, si ha:

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t) & \text{se } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ \beta(2t-1) & \text{se } \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases} \quad (2.5)$$

Il cammino $\alpha * \beta : [0, 1] \longrightarrow A \cup B$ è quello richiesto. \square

OSSERVAZIONE.

- Usando la giunzione di cammini, si ha che:

$$X \text{ è c.p.a.} \iff \exists z \in X : \forall x \in X \quad \exists \alpha : [0, 1] \longrightarrow X : \alpha(0) = z, \alpha(1) = x$$

In altre parole, uno spazio è **c.p.a.** se e solo se esiste un punto per cui ogni altro punto è collegato tramite un arco.

- Per ogni arco α esiste l'arco inverso, percorso al contrario: $\bar{\alpha}(t) = \alpha(1-t)$.

DEFINIZIONE 2.1.4. In \mathbb{R}^n , un **segmento** \overline{PQ} è la combinazione lineare tra i punti P e Q , parametrizzato come:

$$\overline{PQ} = \{P + tQ \mid t \in [0, 1]\} \quad (2.6)$$

DEFINIZIONE 2.1.5. Un sottoinsieme $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ è **convesso** se per ogni coppia di punti esiste un segmento che li collega contenuto interamente in Y .

$$\forall P, Q \in Y \quad \overline{PQ} \subseteq Y \quad (2.7)$$

DEFINIZIONE 2.1.6. Un sottoinsieme $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ è **stellato** per P se esiste un $P \in Y$ tale che per ogni altro punto esiste un segmento che li collega contenuto interamente in Y .

$$\exists P \in Y : \forall Q \in Y \quad \overline{PQ} \subseteq Y \quad (2.8)$$

ESEMPIO.

- Gli intervalli aperti e semiaperti sono **c.p.a.**, dunque sono *connessi*: l'arco α è banalmente il segmento pari all'intervallo aperto.
- Preso $X \subseteq \mathbb{R}^n$ *convesso*, qualunque segmento è anche per costruzione un arco: X è anche **c.p.a.** e dunque *connesso*.
- $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ non è *convesso* (per $(0, 1)$ e $(0, -1)$ non si hanno segmenti interni ad X) ma è **c.p.a.** (basta prendere un cammino che "giri attorno" all'origine) e dunque è *connesso*.
- Preso $X \subseteq \mathbb{R}^n$ *stellato* per $P \in X$, qualunque segmento con P è anche per costruzione un arco: X è anche **c.p.a.** per l'osservazione 2.3 e dunque *connesso*.
- Ogni insieme *convesso* è anche *stellato* per P , basta fissare un qualunque punto come nostro P . In generale, un insieme è convesso se e solo se è *stellato* per ogni suo punto.

Vediamo ora che conseguenze hanno questi teoremi in \mathbb{R} con la topologia Euclidea.

TEOREMA 2.1.4. Sia $I \subseteq \mathbb{R}$. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1. I è un intervallo, ovvero I è *convesso*.
2. I è **c.p.a.**
3. I è *connesso*.

DIMOSTRAZIONE.

- 1) \Rightarrow 2) Siccome I è convesso $\Rightarrow I$ *stellato* $\Rightarrow I$ **c.p.a.** $\Rightarrow I$ *connesso*.
- 2) \Rightarrow 3) Vale in generale che **c.p.a.** \Rightarrow *connesso*.
- 3) \Rightarrow 1) Per contronominale mostriamo che I non è intervallo $\Rightarrow I$ sconnesso. I non è intervallo significa che

$$\begin{aligned} & \exists a < b < c, a, c \in I, b \notin I \\ & b \notin I \Rightarrow I = \left(\underbrace{I \cap (-\infty, b)}_{\in a} \right) \cup \left(\underbrace{I \cap (b, +\infty)}_{\in c} \right) \end{aligned}$$

ovvero I è unione di aperti, non vuoti e disgiunti $\implies I$ sconnesso. \square

OSSERVAZIONE.

- Come conseguenza immediata di questo teorema si ha il **teorema di esistenza degli zeri** per funzioni continue da \mathbb{R} in \mathbb{R} , infatti se l'immagine continua di un connesso è un connesso, per tali funzioni vale che l'immagine continua di un intervallo è un intervallo.
- Per $n \geq 1$ la sfera $S^n := \left\{ (x_1, \dots, x_{n+1}) \mid \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \right\}$ è **c.p.a.**, infatti $\forall x, y \in S^n$ si trova sempre un arco come intersezione di S^n e del piano H passante per il centro della sfera, x e y .

Vediamo ora un risultato per funzioni continue da S^n in \mathbb{R}

TEOREMA 2.1.5. Sia $f : S^n \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora $\exists x \in S^n : f(x) = f(-x)$. In particolare f non è iniettiva.

DIMOSTRAZIONE. Costruiamo una funzione $g(x) = f(x) - f(-x)$, essa è continua perché somma di funzioni continue. Siccome S^n è connesso allora $g(S^n) \subseteq \mathbb{R}$ è connesso \implies per il teorema precedente $g(S^n)$ è un intervallo.

Si considerino un punto $y \in S^n$ arbitrario e le sue immagini $g(y)$ e $g(-y)$: esse appartengono all'intervallo dell'immagine $g(S^n)$, quindi se ne può considerare il loro punto medio:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}[g(y) - g(-y)] &= \frac{1}{2}[f(y) - f(-y) - f(y) + f(-y)] = 0 \\ \implies \exists x \in S^n : g(x) &= 0, \text{ ovvero } f(x) = f(-x) \end{aligned}$$

\square

Come conseguenza di questo teorema si ha che un aperto di \mathbb{R} non sarà mai omeomorfo ad un aperto di \mathbb{R}^n , vediamolo più precisamente.

TEOREMA 2.1.6. Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ e $U \subseteq \mathbb{R}^n$, con $n \geq 2$. Se I, U sono aperti allora I non è omeomorfo a U .

DIMOSTRAZIONE. Si consideri un omeomorfismo $g : U \longrightarrow I$. Siccome $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto allora esiste una palla aperta di raggio ε contenuta in U , se ne considera il bordo $S^n \subseteq U$. Si considera dunque la restrizione $g|_{S^n} : S^n \longrightarrow I$, che per il teorema precedente non è iniettiva. Dunque g non è un omeomorfismo. \square

OSSERVAZIONE. Il teorema appena visto è un caso particolare del **TEOREMA DELL'INVARIANZA DELLA DIMENSIONE**, che cita:

Siano $U \subseteq \mathbb{R}^n, V \subseteq \mathbb{R}^m$ aperti. Se $U \cong V \implies n = m$. Equivalentemente $n \neq m \implies U \not\cong V$

TEOREMA 2.1.7. Siano $\{X_i\}_{i \in I}$ una famiglia di sottoinsiemi di uno spazio topologico X . Se ogni X_i è connesso e $\bigcap_{i \in I} X_i \neq \emptyset$ allora $\bigcup_{i \in I} X_i$ è connesso.

DIMOSTRAZIONE. Sia $Z \subseteq Y := \bigcup_{i \in I} X_i$ un aperto, chiuso non vuoto. Vogliamo dimostrare che $Z = X$, cosicché X risulti connesso. Basta l'inclusione $Y \subseteq Z$. Si considera l'intersezione di Z e di un connesso, dunque essa sarà banale

$$X_i \cap Z = \begin{cases} \emptyset \\ X_i \end{cases}$$

Dimostriamo ora che non è vuota, infatti siccome Z non è vuoto ed è contenuto nell'unione ci sarà un connesso per cui l'intersezione non è vuota:

$$\begin{aligned} Z \neq \emptyset, Z \subseteq \bigcup_{i \in I} X_i &\implies \exists i_0 : X_{i_0} \cap Z \neq \emptyset \\ X_{i_0} \text{ è connesso} &\implies X_{i_0} \cap Z = X_{i_0} \implies X_{i_0} \subseteq Z \\ \text{Siccome } \bigcap_{i \in I} X_i \neq \emptyset &\implies \exists x \in \bigcap_{i \in I} X_i \implies x \in X_{i_0} \subseteq Z \implies x \in Z \\ \text{Siccome } x \in \bigcap_{i \in I} X_i \text{ ex } x \in Z &\implies \forall i \in I, X_i \cap Z \neq \emptyset \end{aligned}$$

Quindi per $\forall i, X_i \subseteq Z \implies Y \subseteq Z \implies Y = Z$, quindi Y è connesso perché l'unico aperto e chiuso non vuoto è banale (Y). \square

TEOREMA 2.1.8. X, Y sono spazi topologici connessi $\iff X \times Y$ è connesso.

DIMOSTRAZIONE. \Leftarrow) Si sfrutta la continuità delle proiezioni e che l'immagine continua di un connesso è connessa:

$$\begin{aligned} p : X \times Y &\longrightarrow X \text{ continua e suriettiva} \implies p(X) = X \text{ connesso} \\ q : X \times Y &\longrightarrow Y \text{ continua e suriettiva} \implies q(Y) = Y \text{ connesso} \end{aligned}$$

\Rightarrow) Si vuole sfruttare il teorema sull'unione di connessi, prestando attenzione che la loro intersezione non sia vuota, quindi si scrive il prodotto come unione di connessi già noti: $X \times Y = \bigcup_{y \in Y} X \times \{y\}$, infatti $X \times \{y\} \cong X$ che per ipotesi è connesso, tuttavia

$$\bigcap_{y \in Y} X \times \{y\} = \emptyset !$$

Cerchiamo dunque di unire un insieme in modo tale che l'intersezione non sia vuota:

sia $x_0 \in X$ e $Y_{x_0} = \{x_0\} \times Y$ e poniamo $X_y = X \times \{y\}$ e si ha quanto voluto:

$$\begin{aligned} X \times Y &= \bigcup_{y \in Y} X_y \cup Y_{x_0} \text{ e } X_y \cap Y_{x_0} = (x_0, y) \\ &\implies \bigcap_{y \in Y} (X_y \cup Y_{x_0}) \neq \emptyset \end{aligned}$$

Dunque $X \times Y$ è unione di connessi la cui intersezione non è vuota, quindi per il teorema precedente è connesso. \square

Approfondiamo ora la differenza fra essere spazio connesso o **c.p.a.** mostrando esempi di un tipo ma non dell'altro. Prima però dimostreremo un teorema sulla caratterizzazione di un insieme denso che ci tornerà utile.

TEOREMA 2.1.9. Sia X uno spazio topologico e $A \subseteq X$ un suo sottoinsieme, allora:

$$A \text{ è denso} \iff \forall U \subseteq X \text{ aperto e } U \neq \emptyset, \quad U \cap A \neq \emptyset$$

DIMOSTRAZIONE. \implies) Se A è denso allora $\overline{A} = X$. Supponiamo che $\exists V$ aperto : $V \cap A = \emptyset$. Siccome V è aperto allora $X \setminus V$ è chiuso, inoltre $V \cap A = \emptyset$, quindi $A \subseteq X \setminus V$. Essendo A contenuto in un chiuso allora lo sarà anche la sua chiusura, siccome è il più piccolo chiuso che lo contiene:

$$\overline{A} = X \subseteq X \setminus V \implies V = \emptyset$$

Ne segue che l'unico aperto che non interseca A è l'insieme vuoto.

\iff) Consideriamo un chiuso $K \supseteq A$. Siccome è chiuso allora il suo complementare $X \setminus K$ è aperto. Per ipotesi dunque si ha che $V \cap A \neq \emptyset$ oppure $V = \emptyset$, passando al complementare si ottiene che:

$$A \subseteq K \implies X \setminus K \subseteq X \setminus A \implies V \subseteq X \setminus A \implies V \cap A = \emptyset \implies V = \emptyset \implies K = X \implies \overline{A} = X$$

L'ultima implicazione è dovuta al fatto che ogni chiuso che contiene A si è dimostrato essere solo X per cui esso sarà la sua chiusura. \square

TEOREMA 2.1.10. Sia X uno spazio topologico e $Y \subseteq X$ connesso, allora

$$\forall W: Y \subseteq W \subseteq \overline{Y} \implies W \text{ connesso}$$

In particolare la chiusura di un connesso è connessa.

DIMOSTRAZIONE. Per dimostrare che W è connesso si considera un suo sottoinsieme $Z \subseteq W$ aperto, chiuso e non vuoto e si mostra che è pari a W .

$$Z \subseteq W \text{ aperto} \implies \exists A \subseteq X \text{ aperto : } Z = W \cap A$$

$$Z \subseteq W \text{ chiuso} \implies \exists C \subseteq X \text{ chiuso : } Z = W \cap C$$

Si vuole sfruttare il fatto che Y è connesso:

$$Z \cap Y = A \cap W \cap Y \stackrel{!}{=} A \cap Y \text{ aperto in } Y \quad Z \cap Y = C \cap W \cap Y \stackrel{!}{=} C \cap Y \text{ aperto in } Y$$

Dove il passaggio indicato con (!) è dovuto al fatto che $Y \subseteq W$. Per poter sfruttare la connessione di Y e dedurre che $Z \cap Y = Y$ dobbiamo prima provare che tale intersezione non è vuota e per farlo sfruttiamo il teorema precedente:

$$\begin{aligned} Y &\text{ denso in } W, \text{ infatti } c\ell_W(Y) = c\ell_X(Y) \cap W = \overline{Y} \cap W = W \\ Z &\text{ aperto in } W \implies Z \cap Y \neq \emptyset \implies Z \cap Y = Y \implies Y \subseteq Z \end{aligned}$$

Tuttavia Y è denso in W e Z è chiuso in W che contiene Y , quindi

$$c\ell_W(Y) = W \subseteq Z \implies W = Z \implies W \text{ connesso}$$

□

Vediamo ora degli esempi di spazi connessi ma non **c.p.a.**

ESEMPIO. SENO DEL TOPOLOGO

Sia $Y \subseteq \mathbb{R}^2$ con la topologia euclidea e $Y = \{(x, \frac{1}{x}) \mid x > 0\}$, detto anche **seno del topologo**. Esso è **c.p.a.** perché per connettere due punti basta percorrere la curva stessa del grafico. Quindi Y è connesso, dunque per teorema 27 \overline{Y} è connesso. Tuttavia \overline{Y} non è **c.p.a.** in quanto $\overline{Y} = Y \cup \{(0, y) \mid -1 \leq y \geq 1\}$ ed i punti sull'asse delle y e sulla curva Y non si possono connettere tramite un arco continuo.

ESEMPIO. LA PULCE ED IL PETTINE

Si consideri il “pettine” come il seguente sottospazio di \mathbb{R}^2 con la topologia euclidea:

$$Y = \{(x, 0) \mid 0 \leq x \geq 1\} \cup \bigcup_{r \in \mathbb{Q}, 0 \leq r \leq 1} \{(r, y) \mid 0 \leq y \leq 1\}$$

Presi due punti su Y si possono collegare fra loro scendendo alla base del pettine $[0, 1]$ e risalendo sui “denti” di ascissa razionale. Quindi Y è **c.p.a.**, allora Y è connesso e $\overline{Y} = [0, 1] \times [0, 1]$.

Si consideri ora la “pulce”, ovvero un punto P di ascissa irrazionale ed ordinata 1, ad esempio $P = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$. Sia $Z = Y \cap P$, per il teorema precedente segue che Z è connesso, infatti:

$$Y \subseteq Z \subseteq \overline{Y} = [0, 1] \times [0, 1]$$

Tuttavia Z non è **c.p.a.**, infatti preso un cammino $\alpha : [0, 1] \longrightarrow Z \subseteq \mathbb{R}^2$ tale che $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ con $\alpha(0) = (0, 0)$ e $\alpha(1) = P$, per continuità $y(t) \neq 0 \implies x(t) \in \mathbb{Q}$, che non è vero per P che ha ascissa irrazionale, dunque non esiste un cammino continuo che colleghi l’origine e P , dunque Z non è **c.p.a.**

OSSERVAZIONE. L’immagine continua di uno spazio **c.p.a.** è **c.p.a.**, ovvero dato X **c.p.a.**, $f : X \longrightarrow Y$ continua, allora $f(X)$ è **c.p.a.**

Dati $a, b \in X$ si vuole trovare un cammino fra $f(a)$ e $f(b)$ in $f(X)$. Si consideri la

composizione seguente fra il cammino α fra a e b con la funzione f stessa. Siccome ha come dominio $[0, 1]$ ed è continua essendo composizione di funzione continue è in effetti un cammino fra le due immagini:

$$f \circ \alpha : [0, 1] \xrightarrow{\alpha} X \xrightarrow{f} Y$$

L'intuizione geometrica che ci ha portati alla definizione di connessione è stata "di quanti pezzi è fatto uno spazio?". Se uno spazio è connesso è fatto di un solo "pezzo", cerchiamo ora di definire cosa sono i "pezzi" e come sono fatti.

DEFINIZIONE 2.1.7. Sia X uno spazio topologico e $C \subseteq X$. Si dice che C è una **componente connessa** se

- C è connesso.
- C è **massimale**, ovvero $C \subseteq A$, A connesso $\implies C = A$.

Scelto $x \in X$ si può definire la **componente connessa di un punto**, ovvero $C(x) = \bigcup \{C \mid C \text{ connesso}, x \in C\}$

La componente connessa di un punto è effettivamente una componente connessa, infatti è connessa perché unione di connessi con intersezione non vuota (x stesso) e se $C(x) \subseteq A \implies x \in A \implies A \subseteq C(x) \implies A = C(x)$.

Vediamo ora qualche proprietà delle componenti connesse, in particolare che sono chiuse e formano una partizione.

TEOREMA 2.1.11. Sia X uno spazio topologico, allora:

1. le componenti connesse sono chiuse.
2. le componenti connesse formano una partizione di X .

DIMOSTRAZIONE.

- I Sia C una componente connessa. Per ogni insieme vale che $C \subseteq \overline{C}$, ma C è connesso, quindi \overline{C} è connesso. Siccome C è massimale allora $C = \overline{C}$, ovvero è chiuso.
- II Per dimostrare che le componenti connesse formano una partizione di X dobbiamo mostrare che X è unione disgiunta delle componenti connesse. Prima di tutto dimostriamo che sono un ricoprimento

$$\forall x \in X, x \in C(x) \implies X = \bigcup_{x \in X} C(x)$$

Mostriamo ora che sono disgiunti prendendo due componenti connesse C e D ed analizzando il caso in cui la loro intersezione non è vuota, in particolare sfruttiamo la massimalità:

$$C \cap D \neq \emptyset \implies C \cup D \text{ connesso} \implies C = C \cup D = D$$

□

ESEMPIO. Sia $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ con la topologia Euclidea. La componenti connesse di \mathbb{Q} sono i punti, quindi i punti sono chiusi in \mathbb{Q} , il che è una riconferma dato che sappiamo che

\mathbb{Q} è Hausdorff. Tuttavia non possono essere aperti altrimenti avremmo la topologia discreta!

Inoltre siccome \mathbb{Q} ha più di una componente连通的 significa che non è connesso! Invece \mathbb{R} è connesso grazie all'assioma di completezza.

OSSERVAZIONE. Dati due spazi omeomorfi si ha che hanno lo stesso numero di componenti connesse in quanto l'immagine continua di connessi è connessa. Quindi il **numero di componenti connesse** ci fornisce un criterio per determinare quando due spazi non sono omeomorfi!

2.2 COMPATTEZZA

DEFINIZIONE 2.2.0. Sia X uno spazio topologico. Un **ricoprimento aperto** di X è una famiglia $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$ di aperti di X tali che $X = \bigcup_{i \in I} A_i$.

Un **sottoricoprimento** \mathcal{B} di un ricoprimento aperto \mathcal{A} è una famiglia di aperti di \mathcal{A} la cui unione è ancora tutto X .

ESEMPI. RICOPRIMENTI APERTI

- $\mathbb{R} = (-\infty, 2) \cup (0, +\infty)$ è un ricoprimento aperto
- $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (n, -n)$ è un ricoprimento aperto
- $\mathbb{R} = \bigcup_{p \text{ primo}} (-p, p)$ è un ricoprimento aperto

DEFINIZIONE 2.2.1. RICOPRIMENTO APERTO

Uno spazio topologico X si dice **compatto** se dato un qualsiasi ricoprimento aperto \mathcal{A} si può sempre estrarre un sottoricoprimento *finito* \mathcal{B} .

L'importanza della definizione risiede nel fatto che non si chiede che esista un ricoprimento \mathcal{A} finito, infatti basterebbe banalmente X stesso che è aperto, bensì che da \mathcal{A} si possa sempre estrarre un numero finito di aperti che ricopra ancora X .

ESEMPI. SPAZI NON COMPATTI

- \mathbb{R} con la topologia euclidea: si consideri il ricoprimento aperto $\mathbb{R} = (-\infty, 2) \cup (0, +\infty)$, esso non ammette sottoricoprimento finito.
- Gli intervalli aperti o semiaperti della forma $[a, b)$ hanno come ricoprimento aperto $\mathcal{A} = \left\{ \left[a, b - \frac{1}{n} \right) \right\}$ che non ammette un sottoricoprimento finito.

TEOREMA 2.2.0. L'immagine continua di un compatto è un compatto, ovvero dati X, Y spazi topologici, $f : X \longrightarrow Y$ continua, allora

$$X \text{ compatto} \implies f(X) \text{ compatto}$$

DIMOSTRAZIONE. Si considera un ricoprimento aperto di $f(X)$ e se ne vuole trovare un sottoricoprimento finito tramite le controimmagini, sfruttando così la compattezza di X .

Sia $\mathcal{A} = \{A_i\}$ ricoprimento aperto di $f(X)$, allora $\forall i \in I, A_i \subseteq Y$ aperto e $\bigcup_{i \in I} A_i \supseteq f(X)$.

Si considerino ora le controimmagini, che saranno aperte perché f è continua:

$\mathcal{B} = \{f^{-1}(A_i)\}$ è un ricoprimento aperto di X . Tuttavia X è compatto, quindi posso estrarre un sottoricoprimento finito

$$X = f^{-1}(A_1) \cup \dots \cup f^{-1}(A_n) \implies f(X) \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_n \implies f(X) \text{ compatto}$$

□

Da questo teorema segue che essere compatti è una proprietà topologica.

TEOREMA 2.2.1. L'intervallo $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ con la topologia euclidea è compatto.

DIMOSTRAZIONE. Sia $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$ un ricoprimento aperto di $[0, 1]$ con A_i aperti in \mathbb{R} , quindi $[0, 1] \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$.

Sia $X = \{t \in \mathbb{R} \mid [0, t] \text{ è coperto da un numero finito di } A_i\}$. Mostriamo che non è vuoto

$$t = 0, [0, 0] = \{0\} \subseteq A_{i=0} \implies 0 \in X \implies X \neq \emptyset$$

Siccome X non è vuoto per la completezza dei reali ne posso considerare l'estremo superiore $b = \sup X$. Ci sono due casi: $b > 1$ e $b \leq 1$, dimostriamo che il primo è possibile e che il secondo è assurdo sfruttando le proprietà dell'estremo superiore:

- $b > 1 \implies \exists t \in X: 1 < t < b \implies [0, 1] \subseteq [0, t] \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_n$
- $b \leq 1 \implies b \in [0, 1] \implies \exists A_0 \in \mathcal{A}: b \in A_0$, visto che \mathcal{A} è un ricoprimento aperto A_0 è aperto, dunque contiene b con tutto un suo intorno, ovvero $\exists \delta > 0: B_\delta(b) = (b - \delta, b + \delta) \subseteq A_0$. Mostriamo ora che A_0 non copre solo $[0, b]$ ma va oltre, quindi si ottiene l'assurdo che $b \neq \sup X$. Sia dunque $0 < h < \delta$, allora

$$[0, +h] = [0, t] \cup [t, b+h] \subseteq \underbrace{A_1 \cup \dots \cup A_n}_{t \in X} \cup \underbrace{A_0}_{B_\delta(b) \subseteq A_0}$$

Quindi $b+h$ è coperto da un numero finito di aperti, il che implica che $b+h \in X$, il che è assurdo perché $b = \sup X$.

□

Notiamo che questo teorema implica che un intervallo $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ è compatto, infatti è omeomorfo a $[0, 1]$ e la compattezza è una proprietà topologica.

Vediamo ora un esempio di spazio compatto che non abbia la topologia euclidea.

ESEMPIO. Uno spazio X con la topologia cofinita è compatto.

Ricordiamo che gli aperti nella topologia cofinita sono i sottoinsiemi il cui complementare è finito, quindi un ricoprimento aperto sarà della forma:

$$\mathcal{A} = \{A_i\}, A_0 = X \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$$

Si considerino gli A_i che contengano i punti x_i che non sono in A_0 , ovvero:

$$A_i \in \mathcal{A} : x_i \in A_i \implies X = A_0 \cup A_1 \cup A_n$$

OSSERVAZIONE. Notiamo che se X è finito allora X è compatto per qualsiasi topologia, in quanto se la sua cardinalità è finita allora lo sarà anche quella del suo insieme delle parti, dai cui elementi scelgo gli aperti di una topologia. Dunque i casi interessanti di spazi compatti sono quelli il cui insieme di sostegno non è finito.

Inoltre se X ha la topologia discreta vale anche il viceversa ovvero

$$X \text{ top. discreta} \implies (X \text{ compatto} \iff X \text{ finito})$$

Sia $\mathcal{A} = \{A_x\}_{x \in X}$, $A_x := \{x\}$, che è aperto in quanto X ha la topologia discreta. Siccome X è compatto allora esiste un sottoricoprimento finito, ovvero un numero finito di aperti di \mathcal{A} che lo ricopre, ossia $X = \{x_1\} \cup \{x_2\} \cup \dots \cup \{x_n\} \implies X \text{ finito.}$

TEOREMA 2.2.2. MANETTI 4.41.1

Un chiuso in un compatto è un compatto, ovvero se X è uno spazio topologico compatto, $C \subseteq X$ chiuso allora C è compatto.

DIMOSTRAZIONE. Sia $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$ un ricoprimento di X , sia $C \subseteq X$ chiuso, allora $A := X \setminus C$ è aperto in X .

Sia $\mathcal{A}' = \{A_i, A\}$ ricoprimento aperto di X . Siccome X è compatto esiste un suo sottoricoprimento finito

$$X = A_1 \cup \dots \cup A_n \cup A \implies C = X \setminus A = A_1 \cup \dots \cup A_n$$

ovvero C è compatto. □

OSSERVAZIONE. MANETTI, 4.41.2 L'unione finita di compatti è un compatto, ovvero se K_1, \dots, K_n sono compatti allora $K = K_1 \cup \dots \cup K_n$ è compatto, infatti basta prendere l'unione dei sottoricoprimenti finiti.

Vediamo ora che relazione c'è fra le due proprietà topologiche di essere uno spazio T_2 e compatto.

TEOREMA 2.2.3. MANETTI, 4.48

Un compatto in un Hausdorff è chiuso, ovvero se X è di Hausdorff, $K \subseteq X$ è compatto allora K è chiuso.

DIMOSTRAZIONE. Per dimostrare che K è chiuso mostriamo che il suo complementare è aperto, ovvero che è intorno di ogni suo punto, in modo tale da poter usare agilmente l'essere T_2 .

$$\begin{aligned} K \text{ chiuso} &\iff X \setminus K \text{ aperto} \iff \exists A \subseteq X \setminus K \text{ aperto} : x_0 \in A \\ &\quad A \subseteq X \setminus K \iff A \cap K = \emptyset \end{aligned}$$

Per poter sfruttare che X è T_2 scriviamo A come intorno di x_- e K come intorno di y :

$$x_0 \in X \setminus K, y \in K \stackrel{!}{\implies} x \neq y \implies \exists U_y \in I(y), \exists V_y \in I(y) : U_y \cap V_y = \emptyset$$

$$\text{Sia } V = \bigcup_{y \in K} V_y \implies V \supseteq K \stackrel{!!}{\implies} V = V_{y_1} \cup \dots \cup V_{y_n}$$

$$\text{Sia } U = U_{y_1} \cap \dots \cap U_{y_n} \in I(x_0)$$

$$\implies V_{y_i} \cap U_{y_i} = \emptyset \implies V \cap K = \emptyset \implies U \subseteq X \setminus K$$

dove (!) indica che X è T_2 e (!!) che K è compatto. \square

TEOREMA 2.2.4. MANETTI, 4.42

Un sottospazio $K \subseteq \mathbb{R}$ è compatto $\iff K$ chiuso e limitato.

DIMOSTRAZIONE. \implies) Siccome \mathbb{R} è T_2 e K è compatto allora per il teorema precedente K è chiuso.

Per vedere che è limitato consideriamo un ricoprimento aperto $\mathcal{A} = \{(-n, n) \cap K\}_{n \in \mathbb{N}}$ di K . Siccome è compatto allora esiste un sottoricoprimento finito, ovvero:

$$K \subseteq (-n_1, n_1) \cup \dots \cup (-n_m, n_m) \implies K \subseteq (-M, M), M := \max m_i$$

quindi K è limitato.

\impliedby) K è limitato, quindi $K \subseteq [-n, n]$, che è compatto e K è chiuso per ipotesi, dunque per il teorema 2.15 è compatto. \square

OSSERVAZIONE. Da notare che il teorema precedente non afferma che gli unici compatti di \mathbb{R} sono gli intervalli chiusi e limitati, ma anche una loro unione finita potrebbe esserlo.

TEOREMA 2.2.5. MANETTI, 4.43

Sia $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ con X compatto e \mathbb{R} con la topologia euclidea. Se f è continua allora ammette massimo e minimo.

DIMOSTRAZIONE. f continua e X compatto $\implies f(X)$ compatto, e per il teorema precedente ciò equivale al fatto che $f(X)$ è chiuso e limitato.

$$\begin{aligned} f(x) \text{ limitata} &\implies \sup \{f(x)\} < +\infty \\ f(x) \text{ chiusa} &\implies \sup \{f(x)\} = \max \{f(x)\} \end{aligned} \} \implies f(x) \text{ ammette massimo.}$$

Analogamente per il minimo. \square

OSSERVAZIONE. Per poter parlare di massimo e minimo c'è bisogno di un ordinamento sul codominio, mentre il dominio X potrebbe anche non averne uno!

Vogliamo ora vedere come si comporta la compattezza rispetto al prodotto, prima però va dimostrato un lemma che ci tornerà utile nella dimostrazione del teorema.

LEMMA 2.2.0. TUBE LEMMA

Siano X, Y spazi topologici con Y compatto, $x_0 \in X$, $A \subseteq X \times Y$: A aperto e $\{x_0\} \times Y \subseteq A$. Allora $\exists U \subseteq X$ con $x_0 \in U$, aperto tale che $\{x_0\} \times Y \subseteq U \times Y \subseteq A$

DIMOSTRAZIONE. A aperto in $X \times Y \implies A = \bigcup_{i \in I} (U_i \times V_i)$ aperti della base, quindi $\{U_i \times V_i\}$ è un ricoprimento aperto di $\{x_0\} \times Y \cong Y$ compatto, dunque esiste un sottoricoprimento finito $\{x_0\} \times Y \subseteq (U_1 \times V_1) \cup \dots \cup (U_n \times V_n)$. Se necessario si eliminano gli aperti che sono disgiunti da $\{x_0\} \times Y$ e poniamo $U = U_1 \cap \dots \cap U_n$, allora

$$\{x_0\} \times Y \subseteq U \times Y \subseteq (U_1 \times V_1) \cup \dots \cup (U_n \times V_n) \subseteq A$$

□

TEOREMA 2.2.6. MANETTI, 4.49.2

X, Y compatti $\iff X \times Y$ è compatto.

DIMOSTRAZIONE. \Leftarrow) Si considerino le proiezioni, che sono funzioni continue. Essendo $X \times Y$ compatto allora le immagini delle proiezioni saranno compatte, ed essendo le proiezioni suriettive allora X, Y sono compatti.

\Rightarrow) Sia $\mathcal{A} = \{A_i\}$ un ricoprimento aperto di $X \times Y$, cerchiamo un sottoricoprimento finito.

Per sfruttare la compattezza di Y notiamo che $Y \cong \{x\} \times Y \subseteq A_{x_1} \cup \dots \cup A_{x_n} = A_x$, che possiamo pensare come sottoricoprimento "verticale" finito. Notiamo inoltre che gli A_{x_i} dipendono dalla $\{x\}$ scelta.

Per il Tube Lemma dimostrato sopra allora

$$\exists U_x \subseteq X \text{ aperto} : \{x\} \times Y \subseteq U_x \times Y \subseteq A_x = A_{x_1} \cup \dots \cup A_{x_n}$$

Tuttavia X è compatto, dunque $X = U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_n}$ unione finita, sfruttando le proiezioni si ottiene la tesi:

$$\begin{aligned} X \times Y &= p^{-1}(X) = p^{-1}\left(U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_n}\right) = (U_{x_1} \times Y) \cup \dots \cup (U_{x_n} \times Y) \subseteq \\ &\subseteq \left(A_{x_1,1} \cup \dots \cup A_{x_1,n_1}\right) \cup \dots \cup \left(A_{x_m,1} \cup \dots \cup A_{x_m,n_m}\right) \end{aligned}$$

□

Sfruttiamo ora che il prodotto di compatti è compatto per generalizzare il teorema 2.17 allo spazio \mathbb{R}^n .

TEOREMA 2.2.7. $K \subseteq \mathbb{R}^n$ compatto $\iff K$ chiuso e limitato.

DIMOSTRAZIONE.

\Rightarrow) K è compatto in \mathbb{R}^n che è un Hausdorff, quindi K è chiuso per il teorema 2.16. Per dimostrare che è limitato consideriamo un ricoprimento di palle aperte centrate

nell'origine e si sfrutta subito che K è compatto

$$K \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n(\mathbf{0}) \implies K \subseteq B_{n_1}(\mathbf{0}) \cup \dots \cup B_{n_m}(\mathbf{0}) \subseteq B_M(\mathbf{0})$$

con $M = \max n_i$.

\iff) K è limitato, quindi $K \subseteq [-a, a]^n$ che è compatto perché prodotto di compatti, ma K è anche chiuso, quindi per il teorema 2.15 è compatto. \square

In realtà vale un teorema più generale, che si dimostrerà poi nel corso di Istituzioni di Analisi.

TEOREMA: Sia X uno spazio metrico completo, allora $K \subseteq X$ compatto $\iff K$ chiuso e totalmente limitato, ovvero $\forall \varepsilon > 0$, K è contenuto in un'unione finita di palle di raggio ε . In \mathbb{R}^n vale limitato \iff totalmente limitato, ma ad esempio considerato lo spazio metrico

$$\mathcal{C}([0, 1]) := \left\{ f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continua} \right\}, \text{ con } d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$$

Una palla di centro $\mathbf{0}$ e raggio 1 quale $B_1(\mathbf{0}) = \left\{ f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continua}, -1 \geq f(x) \leq 1 \right\}$ è chiusa e limitata, tuttavia in $\mathcal{C}([0, 1])$ non è compatta.

TEOREMA 2.2.8. MANETTI 4. 52

Sia $f : X \longrightarrow Y$ continua con X è compatto e $Y T_2$, allora f è chiusa.

DIMOSTRAZIONE. Per dimostrare che f è chiusa consideriamo $C \subseteq X$ chiuso e mostriamo che $f(C)$ è chiuso sfruttando rispettivamente i teoremi 2.15, 2.13 e 2.16:

$$C \subseteq X \text{ chiuso in compatto} \implies C \text{ compatto} \implies f(C) \text{ compatto in } T_2 \implies f(C) \text{ chiuso}$$

\square

In generale vale il teorema di Kuratowski-Mrówka, che dice che Y è compatto se e solo se per qualsiasi spazio topologico X la proiezione $p_X : X \times Y \longrightarrow X$ è chiusa, ne dimostreremo una versione più debole.

TEOREMA 2.2.9. MANETTI, 4.49.1

Siano X, Y spazi topologici con Y compatto, allora la proiezione $p : X \times Y \longrightarrow X$ è chiusa.

DIMOSTRAZIONE. Per dimostrare che p è chiusa mostriamo che preso un $C \subseteq X \times Y$ chiuso allora $p(C) \subseteq X$ è chiuso, ovvero che il suo complementare $X \setminus p(C)$ è intorno di ogni suo punto.

Se $p(C) = X$ allora è già chiuso, se invece $p(C) \neq X$ allora $\exists x_0 \in X \setminus p(C)$, dimostriamo che quest'ultimo insieme è intorno di x_0 . Si consideri la fibra di x_0 :

$$p^{-1}(\{x_0\}) = \{x_0\} \times Y \subseteq (X \times Y) \setminus C = A$$

con A aperto perché complementare di un chiuso.

Si rientra dunque nelle ipotesi del Tube lemma e si ottiene che

$$\exists U \subseteq X \text{ aperto} : p^{-1}(U) = U \times Y \subseteq A \implies U \cap p(C) = \emptyset \implies x_0 \in U \subseteq X \setminus p(C)$$

□

3

CAPITOLO

GRUPPI TOPOLOGICI

“BEEP BOOP INSERIRE CITAZIONE QUA BEEP BOOP.”

NON UN ROBOT, UN UMANO IN CARNE ED OSSA BEEP BOOP.

3.1 GRUPPI TOPOLOGICI

Conoscendo le strutture di gruppo e spazio topologico su un insieme vogliamo vedere come possono essere compatibili fra loro.

DEFINIZIONE 3.1.0. Un insieme G si dice gruppo topologico se

- G è un gruppo
- G è uno spazio topologico
- Le operazioni sono continue, ovvero le mappe $\mu : G \times G \longrightarrow G$ e $i : G \longrightarrow G$
$$(x, y) \longmapsto xy \quad x \longmapsto x^{-1}$$
sono funzioni continue.

Vediamo ora degli esempi noti di gruppi topologici.

ESEMPI.

- $(\mathbb{R}^n, +, \mathcal{E}_{\text{eucl}}), (\mathbb{C}^n, +, \mathcal{E}_{\text{eucl}})$
- $(\mathbb{R}^*, \bullet, \mathcal{E}_{\text{eucl}}), (\mathbb{R}^*, \bullet, \mathcal{E}_{\text{eucl}})$ con la topologia indotta di sottospazio
- $(M_{n,m}(\mathbb{R}), \bullet, \mathcal{E}_{\text{eucl}})$ con la topologia indotta di sottospazio di $\mathbb{R}^{n,m}$, ad esempio $[0, 1]$

OSSERVAZIONE. I gruppi topologici $GL(n, \mathbb{R})$ e $GL(n, \mathbb{R})$ sono aperti di $M_{n,n}$.

Infatti considerata la funzione determinante $\det : \mathbb{R}^{n,n} \longrightarrow \mathbb{R}$ essa è continua in quanto per calcolare il determinante si opera solo con somme e prodotti. Si ha che $GL(n, \mathbb{R})$ è il complementare dell'insieme delle matrici che hanno determinante nullo, il quale è un chiuso in quanto controimmagine di un chiuso quale $\{0\}$ di una funzione

continua. Dunque tale gruppo topologico è aperto, analogamente per \mathbb{C} .

Vediamo ora altri sottoinsiemi di $M_{n,n}$:

- SL dato da $\{\det A = 1\}$ è il *gruppo speciale lineare*
- O determinato dall'equazione $A^t A = I$ è il *gruppo ortogonale*
- SO = O \cap SL è il *gruppo speciale ortogonale*
- U determinato dall'equazione $A^{t*} \bar{A} = I$ è il *gruppo unitario*
- SU = U \cap SL è il *gruppo speciale unitario*

Ci sono delle operazioni sulle matrici che sono continue:

- *moltiplicazione matriciale*: continua perché definita tramite somme e prodotti di elementi delle matrici
- *inversa*: è una funzione che ad una matrice A associa $\frac{1}{\det A}$ per prodotti e somme di elementi della matrice, dunque è continua

OSSERVAZIONE. Per i gruppi topologici in generale vale la moltiplicazione destra e sinistra sono omeomorfismi:

$$\begin{aligned} L_h : G &\longrightarrow G & R_n : G &\longrightarrow G \\ g &\longmapsto hg & g &\longmapsto gh \\ (L_h)^{-1} &= L_{h^{-1}} & (R_h)^{-1} &= R_{h^{-1}} \end{aligned}$$

Ne segue che un gruppo topologico è **omogeneo**, ovvero

$$\forall g, h \in G \exists \varphi : G \longrightarrow G \text{ omeomorfismo t.c. } \varphi(g) = h$$

infatti basta porre $\varphi = L_{hg^{-1}}$ oppure $\varphi = R_{g^{-1}h}$

Il seguente teorema ci permette di caratterizzare i gruppi topologici Hausdorff grazie alla chiusura dell'elemento neutro.

TEOREMA 3.1.0. Sia G un gruppo topologico, $e \in G$ il suo elemento neutro, si ha che

$$G \text{ } T_2 \iff \{e\} \text{ chiuso}$$

DIMOSTRAZIONE.

$\Rightarrow)$ $G \text{ } T_2 \implies G \text{ } T_1 \implies$ tutti i punti sono chiusi, in particolare anche $\{e\}$.

$\Leftarrow)$ Per dimostrare che $G \text{ } T_2$ si utilizza la caratterizzazione con la diagonale chiusa, sfruttando l'omogeneità dei gruppi topologici:

$$\begin{aligned} \varphi : G \times G &\longrightarrow G \\ (g, h) &\longmapsto gh^{-1} \end{aligned} \quad , \quad (g, h) = (h, g) \iff g = h \iff \varphi((g, h)) = gh^{-1} = e$$

$$\implies \Delta_G = \varphi^{-1}(\{e\})$$

Per ipotesi $\{e\}$ è chiusa, quindi Δ_G è chiuso e dunque $G \text{ } T_2$. \square

OSSERVAZIONE. $GL(n, \mathbb{R})$ è sconnesso. Mostriamo che è unione di due aperti non vuoti di

sguenti sfruttando la funzione determinante $\det : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^*$, infatti essendo continue le controimmagini di aperti saranno aperti:

$$\begin{aligned}\det^{-1}((0, +\infty)) &= \mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R}) \\ \det^{-1}((-∞, 0)) &= \mathrm{GL}^-(n, \mathbb{R})\end{aligned}\implies \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = \mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R}) \sqcup \mathrm{GL}^-(n, \mathbb{R})$$

Dimostriamo un lemma che generalizza il teorema 2.8 e che ci sarà utile nella dimostrazione successiva sulla connessione di alcuni gruppi topologici.

LEMMA 3.1.0. MANETTI 4.18

Sia $f : X \longrightarrow Y$ continua. Se f è suriettiva aperta o chiusa, Y è connesso e le fibre sono connesse, ovvero se $\forall y \in Y f^{-1}(y)$ è connesso, allora X è connesso.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo che f sia aperta e consideriamo $A_1 \neq \emptyset \neq A_2$ aperti (per f chiusa si considerano dei chiusi e si procede in modo analogo) t.c. $X = A_1 \cup A_2$. Per dimostrare che X è connesso mostriamo che $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$:

$$\begin{aligned}f \text{ aperta} &\implies f(A_1), f(A_2) \text{ aperti} \\ f \text{ suriettiva} &\implies f(X) = Y \implies f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2) = Y \\ Y \text{ connesso} &\implies f(A_1) \cap f(A_2) \neq \emptyset \implies \exists y_0 \in f(A_1) \cap f(A_2) \implies \begin{cases} f^{-1}(y_0) \cap A_1 \neq \emptyset \\ f^{-1}(y_0) \cap A_2 \neq \emptyset \end{cases} \\ \begin{cases} (f^{-1}(y_0) \cap A_1) \cup (f^{-1}(y_0) \cap A_2) = f^{-1}(y_0) \\ \text{fibre connesse} \end{cases} &\implies f^{-1}(y_0) \cap A_1 \cap A_2 \neq \emptyset \implies A_1 \cap A_2 \neq \emptyset\end{aligned}$$

□

TEOREMA 3.1.1. $\forall n \geq 1, \mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R})$ e $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ sono connessi.

DIMOSTRAZIONE. Si procede per induzione su n per $\mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R})$, il caso $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ è analogo.

$$n = 1 \quad \begin{cases} \mathrm{GL}^+(1, \mathbb{R}) = (0, +\infty) \\ \mathrm{GL}(n, \mathbb{C}) = \mathbb{C} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^2 \setminus 0 \end{cases} \quad \text{connessi.}$$

$n > 1$) Supponiamo che $\mathrm{GL}^+(n-1, \mathbb{R})$ sia connesso e dimostriamo che lo è anche $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$. Cerchiamo dunque una funzione continua da $\mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R})$ a $\mathrm{GL}(n-1, \mathbb{R})$ che soddisfi le ipotesi del lemma precedente. Pertanto si considera la funzione prima colonna $p : \mathbb{R}^{n,n} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ che mappa la prima colonna di A . Siccome $\mathbb{R}^{n,n} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n,n-1}$ allora p è una proiezione, dunque per il punto 2 della proposizione 1.4 è aperta.

Restringiamo ora p a $\mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R})$ nel modo seguente $p : \mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ che è una funzione continua, suriettiva e aperta, inoltre $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ è connesso per $n > 1$. Calcoliamo ora le fibre e mostriamo che sono tutte omeomorfe fra loro e connesse, quindi prima ne troviamo una, mostriamo che è connessa poi dimostriamo che sono

tutte omeomorfe. A questo scopo consideriamo il seguente vettore e la sua fibra

$$y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\} \implies p^{-1}(y_0) = \begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

con $(*, \dots, *) \in \mathbb{R}^{n-1}$ arbitrario in quanto non influisce nel calcolo del determinante e con $A \in \mathrm{GL}^+(n-1, \mathbb{R})$, da cui segue che $p^{-1}(y_0) = \mathbb{R}^{n-1} \times \mathrm{GL}^+(n-1, \mathbb{R})$, dunque $p^{-1}(y_0)$ è connesso visto che i due fattori lo sono per ipotesi.

Mostriamo ora che tutte le fibre sono omeomorfe a $p^{-1}(y_0)$. Sia $y \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ e sia $A \in \mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R})$ tale che $p(A) = y$, ovvero y è la prima colonna di A . In generale vale la relazione $p(AB) = Ap(B)$ e la moltiplicazione sinistra $L_A : \mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R})$

$$B \longmapsto AB$$

è un omeomorfismo. Dimostriamo che vale $p^{-1}(y) = L_A(p^{-1}(y_0)) = Ap^{-1}(y_0)$, in modo tale da avere tutte le fibre omeomorfe fra loro:

$$\supseteq) \quad B \in p^{-1}(y_0) \implies B = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdot \\ 0 & \cdots & \cdot \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdot \end{pmatrix} \implies p(AB) = Ap(B) = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = p(A) = y$$

$$\subseteq) \quad C \in p^{-1}(y) \implies C = \begin{pmatrix} y & * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

$$\text{Poniamo } B = A^{-1}C \implies p(B) = p(A^{-1}C) = A^{-1}p(C) = A^{-1}y = A^{-1}p(A) = \\ = p(A^{-1}A) = p(I) = y_0$$

$$\text{Siccome } C = AB \implies B \in p^{-1}(y_0)$$

Quindi siccome tutte le fibre sono tutte omeomorfe ad una fibra connessa allora sono tutte connesse e valgono le ipotesi del lemma precedente, per cui $\mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R})$ è connesso. \square

COROLLARIO 3.1.0. $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ e $\mathrm{SL}(n, \mathbb{C})$ sono connessi.

DIMOSTRAZIONE. Siccome $\mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R})$ e $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ sono connessi, basta considerare la seguente funzione:

$$f : \mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$$

$$A \longmapsto \begin{pmatrix} \frac{a_{1,1}}{\det A} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{a_{n,1}}{\det A} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Siccome f è continua e suriettiva e $\mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R})$ è connesso allora $f(\mathrm{GL}^+) = \mathrm{SL}$ è connesso. \square

COROLLARIO 3.1.1. O non è connesso.

DIMOSTRAZIONE. Siccome O è sottogruppo di GL e la connessione è una proprietà topologica allora O non è connesso. In particolare si può dividere in base a $\det = +1$ e $\det = -1$. \square

TEOREMA 3.1.2. $SO(n), U(n)$ e $SU(n)$ sono compatti e connessi.

DIMOSTRAZIONE. Per dimostrare che sono *compatti* essendo sottospazi di $\mathbb{R}^{n \times n}$ per il teorema 2.20 basta dimostrare che sono chiusi e limitati. In particolare essendo definiti tramite equazioni che sono luoghi di zeri di polinomi in a_{ij} allora sono chiusi:

$$SO(n) : \begin{cases} A^t A = I \\ \det A = 1 \end{cases}, \quad U(n) : A^t \bar{A} = I, \quad SU(n) : \begin{cases} A^t \bar{A} = I \\ \det A = 1 \end{cases}$$

Siccome $SU(n) \subseteq U(n) \subseteq SO(n)$ basta dimostrare che $SO(n)$ è limitato:

$$A \in SO(n) \implies \sum_{i=1}^n a_{ij}^2 = 1, \forall i = 1, \dots, n \implies \sum_{i=1}^n a_{ij}^2 = n \implies SO(n) \subseteq S_{\sqrt{n}} \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$$

dove $S_{\sqrt{n}}$ è la sfera di raggio \sqrt{n} , dunque $SO(n)$ è limitato. Ne segue che anche $U(n)$ e $SU(n)$ lo sono, dunque sono tutti chiusi e limitati in $\mathbb{R}^{n \times n}$, quindi compatti.

Per dimostrare che sono *connessi* si procede analogamente al teorema precedente sfruttando il lemma che lo precede. Si consideri $p : SO(n) \longrightarrow S^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$ funzione prima colonna, essa è continua, suriettiva e chiusa in quanto è un compatto (appena dimostrati) in un T_2 , e le sue fibre sono connesse $p^{-1}\left(\begin{pmatrix} 1 & & & \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$ con $A \in SO(n-1)$, dunque per il lemma precedente $SO(n)$ è connesso. \square

OSSERVAZIONE. GL e SL non sono compatti perché non sono limitati, inoltre GL è aperto e non chiuso.

CAPITOLO 4

TOPOLOGIA QUOZIENTE

"BEEP BOOP INSERIRE CITAZIONE QUA BEEP BOOP."

NON UN ROBOT, UN UMANO IN CARNE ED OSSA BEEP BOOP.

4.1 TOPOLOGIA QUOZIENTE

Torniamo ora a parlare di costruzioni topologiche, in particolare ci domandiamo quale sia la topologia più adatta per un insieme quoziante. Ne diamo prima una definizione come topologia indotta da una funzione fra uno spazio topologico ed un insieme, poi vedremo altre definizioni equivalenti tramite una funzione fra spazi topologici e con insiemi quozienti.

Accenniamo fin da subito che la situazione è *duale* rispetto a quella dei sottospazi, analizzati nella sezione 1.5.

DEFINIZIONE 4.1.0. Dato X uno spazio topologico, Y un insieme e $f : X \longrightarrow Y$ funzione suriettiva, la **topologia quoziante** su Y indotta da f è la topologia più fine che rende f continua.

Analizziamo ora chi sono i suoi aperti: $A \subseteq Y$ aperto $\iff f^{-1}(A) \subseteq X$ aperto. Notiamo che l'implicazione \Rightarrow è necessaria perché f sia continua, mentre l'implicazione \Leftarrow è quella che caratterizza la topologia quoziante, infatti se si considera un insieme $B \subseteq Y$ che non è aperto allora la sua controimmagine $f^{-1}(B) \subseteq X$ non sarà aperta, dunque la topologia su Y è la più fine.

Per verificare che un sottoinsieme sia aperto in Y con la topologia quoziante bisogna verificare che la sua controimmagine è aperta.

Vediamo ora un esempio che giustifica la terminologia "topologia quoziante".

ESEMPIO. Sia X uno spazio topologico e \sim una relazione di equivalenza su X . Posto $Y = X/\sim$ insieme quoziante e $\pi : X \xrightarrow{x \mapsto \sim} Y$ proiezione al quoziante, la topologia quoziante su Y è quella che rende la proiezione continua.

Ricordiamo il primo teorema fondamentale di isomorfismo per gli *insiemi*, altresì chiamato decomposizione canonica.

Data una qualsiasi funzione suriettiva $f : X \longrightarrow Y$ vi è la seguente relazione di equivalenza: $\forall x, y \in X, x \sim y \iff f(x) = f(y)$, inoltre $\exists! h : X/\sim \longrightarrow Y$ biunivoca tale che $f = h \circ \pi$, basta porre $h([x]) := f(x)$, in modo tale che il diagramma commuti. Mostriamo che è ben definita e biunivoca.

$$\begin{aligned} [x] = [y] &\iff x \sim y \iff f(x) = f(y) \iff h([x]) = h([y]) \implies h \text{ ben definita e iniettiva} \\ f \text{ suriettiva} &\implies h \text{ suriettiva} \end{aligned}$$

4.1.1 Identificazione

Tenendo a mente il concetto di immersione illustrato a pagina 16 illustriamo il concetto duale di identificazione.

DEFINIZIONE 4.1.1. Siano X, Y spazi topologici e $f : X \longrightarrow Y$ una funzione continua e suriettiva; f si dice **identificazione** se Y ha la topologia quoziante indotta da f .

In generale è difficile determinare quando una data funzione è un'identificazione, quindi ne cerchiamo una condizione sufficiente.

TEOREMA 4.1.0. MANETTI, 5.4


Sia $f : X \longrightarrow Y$ continua, suriettiva e chiusa (o aperta), allora f è un'identificazione chiusa (o aperta).

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo che f sia aperta. Dimostrare che è un'identificazione è equivalente al mostrare che $A \subseteq Y$ aperto $\iff f^{-1}(A) \subseteq X$ aperto. L'implicazione \Rightarrow è garantita dalla continuità di f , per quanto riguarda l'implicazione opposta \Leftarrow invece siccome f è suriettiva allora $f(f^{-1}(A)) = A$ e siccome f è aperta allora anche A è aperto. \square

Vediamo ora un esempio di identificazione chiusa e non aperta.

ESEMPIO. Si consideri $f : [0, 2\pi] \longrightarrow S^1$. È una funzione continua, suriettiva e chiusa (compatto in T_2), dunque è un'identificazione chiusa.

Tuttavia f non è aperta, infatti dato $A = [0, 1] \subseteq [0, 2\pi]$ aperto, ma $f(A)$ non è aperto in S^1 .



OSSERVAZIONE. Gli omeomorfismi sono identificazioni chiuse e aperte.

Vediamo ora che relazione c'è fra le identificazioni ed i quozienti dati da relazioni di equivalenza.

TEOREMA 4.1.1. PROPRIETÀ UNIVERSALE DELLE IDENTIFICAZIONI, MANETTI, 5.6

Dati X, Y, Z spazi topologici, g una qualsiasi funzione continua, f identificazione con le mappe come in figura, allora

$\exists! h$ continua : $g = h \circ f \iff (\forall x, y \in X, f(x) = f(y) \implies g(x) = g(y))$
ovvero se e solo se g è costante sulle fibre di f .

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ g \downarrow & \swarrow \exists! h & \\ Z & & \end{array}$$

DIMOSTRAZIONE. Idealmente se f fosse invertibile definiremmo $h = g \circ f^{-1}$. Tuttavia l'invertibilità di f non è fra le ipotesi, quindi si sfrutta al meglio l'ipotesi della suriettività e si considera una controimmagine tramite f e se ne fa l'immagine tramite g , ovvero $y \in Y, h(y) := g(x)$ con $x \in f^{-1}(y)$. Con questa costruzione h è ben definita siccome g sarà costante sulle fibre di f .

Verifichiamo che h è continua tramite la definizione:

$$U \subseteq Z \text{ aperto}, h^{-1}(U) \subseteq Y \iff f^{-1}(h^{-1}(U)) \subseteq X \text{ aperto} \iff g^{-1}(U) \subseteq X \text{ aperto}$$

Siccome g è continua allora lo è anche h . \square

Come conseguenza si ha che data f continua, \sim relazione di equivalenza e X/\sim spazio topologico con la topologia quoziante indotta dalla proiezione π si ha che $\exists g$ continua $\iff (x \sim y \implies f(x) = f(y))$, ovvero π è costante sulle fibre di f .

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi \downarrow & \swarrow g & \\ X/\sim & & \end{array}$$

In particolare se f è la relazione d'equivalenza indotta da \sim , ovvero se si è nelle ipotesi del primo teorema fondamentale di isomorfismo degli insiemi allora $(x \sim y \iff f(x) = f(y)) \implies \exists! \bar{f}$ biettiva, continua. Dunque vale

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi \downarrow & \swarrow \bar{f} & \\ X/\sim & & \end{array}$$

$$\bar{f} \text{ omeomorfismo} \iff f \text{ identificazione} \quad (4.1)$$

Riprendiamo l'esempio precedente ed esaminiamolo in termini di spazio quoziante.

ESEMPIO. $D^n/\sim \cong S^n$

$f : D^1 = [0, 2\pi] \longrightarrow S^1$, f identificazione $\implies S^1 \cong [0, 2\pi]/\sim$, con \sim tale che

sia costante sulle fibre di f : $s \sim t \iff \begin{cases} \cos s = \cos t \\ \sin s = \sin t \end{cases} \iff s = t \text{ oppure } s = 0, t = 2\pi$

Si può generalizzare in dimensione n con $f : D^n \longrightarrow S^n$, $x \mapsto (2x\sqrt{1-\|x\|^2}, 2\|x\|^2 - 1)$ identificazione, dunque $D^n/\sim \cong S^n$ per la relazione $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \iff \begin{cases} (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \\ x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2 = 1 \end{cases}$

ovvero ogni punto è in relazione con sé stesso e tutti i punti sul bordo sono identificati.

4.1.2 Quozienti tipici

Vedremo ora degli esempi di spazi quoziante usati frequentemente.

4.1.2.1 Contrazione di A ad un punto

Sia X uno spazio topologico, $A \subseteq X$, $\forall x, y \in X$ $x \sim y \iff x = y$ oppure $x, y \in A$, ovvero ogni punto è in relazione con sé stesso e tutti i punti di A sono in relazione fra loro, dunque quoziendo si "contraggono" ad un unico punto.

ESEMPIO. $D^n/S^{n-1} \cong S^n$

Cerchiamo ora di generalizzare l'esempio precedente. Ricordiamo che relazione c'è fra i dischi e le sfere:

$$\begin{aligned} D^n &= \text{disco in } \mathbb{R}^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\} \\ S^{n-1} &= \text{bordo di } D^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\} \end{aligned}$$

Considerando \sim come la contrazione di S^{n-1} ad un punto, si ha che $D^n/S^{n-1} \cong S^n$

ATTENZIONE! Anche se X è T_2 non è detto che X/A è T_2 !

Se A non è chiuso allora X/A non è neanche T_1 , infatti $\pi^{-1}([A]) = A$ non chiuso implica che $[A]$ non lo è, quindi per la caratterizzazione degli spazi T_1 (vedasi X/A non è T_1 . Tuttavia se X è T_2 , $K \subseteq X$ è compatto allora X/K è T_2

4.1.2.2 Cono su uno spazio

DEFINIZIONE 4.1.2. Sia X uno spazio topologico, si definisce **cilindro** su X lo spazio $X \times [0, 1]$.

Il **cono** su X invece è il quoziante $X \times [0, 1] / X \times \{1\}$ oppure $X \times [0, 1] / X \times \{0\}$.

OSSERVAZIONE. Un cono è sempre c.p.a. rispetto al "vertice".

ESEMPIO. Cono su $S^n \cong D^{n+1}$

$$n=0) S^0 = \{-1, 1\} = X \rightsquigarrow X \times [0, 1] \rightsquigarrow X \times [0, 1] / X \times \{1\} \cong D^1$$

$$n=1) S^1 = X \rightsquigarrow X \times [0, 1] \rightsquigarrow X \times [0, 1] / X \times \{1\} \cong D^2 \quad f : S^n \times [0, 1] \longrightarrow D^{n+1} \quad \text{è continua,} \\ (\mathbf{x}, t) \longmapsto t\mathbf{x}$$

suriettiva, chiusa (compatto in T_2), dunque f è identificazione.

Verifichiamo che la relazione di equivalenza indotta da f è proprio quella di contrazione:

$$(\mathbf{x}, t) \sim (\mathbf{y}, s) \iff f(\mathbf{x}, t) = f(\mathbf{y}, s) \iff t\mathbf{x} = s\mathbf{y} \iff \begin{cases} \mathbf{x} = \mathbf{y}, t = s \\ t = s = 0 \end{cases}$$

$$\text{Se } t \neq 0 \implies \mathbf{x} = \frac{s}{t}\mathbf{y}, \text{ ma } \|\mathbf{x}\| = 1 \implies \left| \frac{s}{t} \right| \underbrace{\|\mathbf{y}\|}_{=1} = 1 \implies \left| \frac{s}{t} \right| = 1 \implies s = t \implies \mathbf{x} = \mathbf{y}$$

4.1.2.3 Retta con 2 origini

Analizziamo un particolare spazio topologico che spesso fungerà da controesempio, in particolare per le varietà topologiche (vedi sezione): la retta con 2 origini.

Sia $X = \mathbb{R} \times \{a, b\}$ Vogliamo definire una relazione di equivalenza che lasci "separate" solo

le origini:

$$(x, \alpha) \sim (y, \beta) \iff \begin{cases} x = y, \alpha = \beta \\ x = y \neq 0 \end{cases}$$

PROPRIETÀ

1. $Y := X/\sim$ è c.p.a., infatti se i punti (x, α) e (y, β) sono tali che $x \neq 0 \neq y$ basta prendere il segmento \overline{xy} sulla retta $\mathbb{R} \times \{a\}$ e proiettarlo. Per unire $(0, a)$ e $(0, b)$ basta unire entrambi con un cammino al punto $(1, a) = (1, b)$
2. Y non è T_2 : tutti gli intorni di $(0, a)$ si intersecano con tutti gli intorni di $(0, b)$
3. Y è localmente omeomorfo a \mathbb{R} , infatti ogni punto ha un intorno omeomorfo ad un intervallo aperto di \mathbb{R}
4. $\exists K_1, K_2 \subseteq Y$ compatti t.c. $K_1 \cap K_2$ non è compatto: basta prendere $K_1 = \pi([-1, 1] \times \{a\})$ e $K_2 = \pi([-1, 1] \times \{b\})$ compatti in Y , ma $K_1 \cap K_2 = [-1, 0] \cup (0, 1)$ non è compatto in Y

4.1.3 Quoziente T_2

Cerchiamo ora delle condizioni per avere un quoziente Hausdorff.

TEOREMA 4.1.2. Sia $f : X \longrightarrow Y$ continua e identificazione con X compatto e T_2 , allora sono equivalenti:

1. Y è T_2
2. f chiusa
3. $K = \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid f(x_1) = f(x_2)\}$ chiuso in $X \times X$

DIMOSTRAZIONE. 1 \implies 3) Si vuole utilizzare la caratterizzazione di essere T_2 con la chiusura della diagonale Δ_Y , ovvero il teorema 1.5. Bisogna dunque vedere K come controimmagine continua di Δ_Y : si consideri $h := f \times f : X \times X \longrightarrow Y \times Y$ continua $(x_1, x_2) \mapsto (f(x_1), f(x_2))$

perché lo è f . Inoltre $K = h^{-1}(\Delta_Y)$ e Y è $T_2 \implies K$ chiuso in quanto controimmagine di

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \nwarrow & \nearrow \\ & X \times X & \xrightarrow{h=f \times f} Y \times Y \\ & \swarrow & \searrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

un chiuso tramite una funzione continua.

3 \implies 2) Per dimostrare che f è chiusa bisogna far vedere che $\forall C \subseteq X, C$ chiuso $\implies f(C) \subseteq Y$ chiuso, ma f è identificazione $\iff f^{-1}(f(C)) \subseteq X$ chiuso. Notiamo che $f^{-1}(f(C)) = p_1(k \cap p_2^{-1}(C))$, infatti

$$p_2^{-1}(C) = X \times C \implies K \cap p_2^{-1}(C) = \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid f(x_2) \in C\}$$

$$p_2 \text{ continua e } C \text{ chiuso} \implies p_2^{-1}(C) \text{ chiuso}$$

$$K \text{ chiuso} \implies K \cap p_2^{-1}(C) \text{ chiuso}$$

$$X \text{ compatto e } T_2 \implies p_1 \text{ chiuso} \implies p_1(K \cap p_2^{-1}(C)) \text{ chiuso}$$

$2 \implies 1$) Serve il teorema di Wallace, pertanto non affronteremo la dimostrazione. \square

OSSERVAZIONE. Nella dimostrazione $1 \implies 3$) non si è utilizzato che f è un'identificazione, dunque vale in generale!

CAPITOLO 5

AZIONI DI GRUPPO

"BEEP BOOP INSERIRE CITAZIONE QUA BEEP BOOP."

NON UN ROBOT, UN UMANO IN CARNE ED OSSA BEEP BOOP.

5.1 AZIONE DI UN GRUPPO SU UN INSIEME

DEFINIZIONE 5.1.0. Sia G un gruppo e X un insieme. Si definisce il *gruppo simmetrico* sull'insieme X come $S(X) := \{ f : X \longrightarrow X \mid f \text{ biunivoca}\}$. Un'*azione* di G su X è

- $\Phi : G \longrightarrow S(X)$ morfismo di gruppi, ovvero $\Phi(g.h) = \varphi(g)\Phi(h)$
- $\varphi : G \times X \longrightarrow X$ t.c. $e.x = x, \forall x \in X$ e $g.(h.x) = (gh).x$
 $(g, x) \longmapsto g.x$

Se ho Φ definisco $\varphi(g, x) = \underbrace{\Phi(g)}_{\in S(X)}(x)$.

Se ho φ definsco $\Phi(g) : X \longrightarrow X$
 $x \longmapsto \varphi(g, x)$

DEFINIZIONE 5.1.1. Su X definiamo una relazione che dimostreremo essere di equivalenza: $x \sim y \iff \exists g \in G: y = g.x$

Dimostrimo che è una relazione di equivalenza:

- riflessiva: $x = e.x$
- simmetrica: $y = g.x \implies x = g^{-1}.y$
- transitiva: $y = g.x, z = h.y \implies z = (hg).x$

DEFINIZIONE 5.1.2. Le classi di equivalenza date da questa relazione sono dette *orbite*

$$[x] = G.x = \{y \in X \mid \exists g: y = g.x\} = \{g.x \mid g \in G\}$$

L'insieme quoziante detto *spazio delle orbite* si scrive come X/G

Vediamo ora un esempio di azione e di orbite.

ESEMPIO. 1. $X = \mathbb{R}^n, G = \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}), \varphi(A, \mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ è la moltiplicazione matrice per vettore.

Analizziamo le orbite: $G.\mathbf{0} = \{\mathbf{0}\}$, ovvero il vettore nullo è un'orbita. Siano ora $\mathbf{v} \neq \mathbf{0} \neq \mathbf{w}$. Esiste $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$: $\mathbf{w} = A\mathbf{v}$? Sì, se $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}, G.\mathbf{v} = \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$.

Quindi $\mathbb{R}^n/\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = \{a, b\}$ con $a = [\mathbf{0}]$ e $b = [\mathbf{v}], \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$

5.2 STABILIZZATORE DI UN ELEMENTO

DEFINIZIONE 5.2.O. Lo **stabilizzatore di un elemento** è l'insieme degli elementi di G che fissano x :

$$H_x := \{g \in G \mid g.x = x\} \quad (5.1)$$

H_x è un sottogruppo di isotropia di x . Inoltre, se H_x è banale, allora l'azione è **libera**.

DIMOSTRAZIONE. H_x è chiuso rispetto all'azione:

- $1_G \in H_x$ per definizione dell'azione $g \cdot (1_G \cdot x) = g \cdot x = x \forall x$.
- $\forall g, h \in H_x$, allora $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = g \cdot x = x$.

□

OSSERVAZIONE. L'insieme G/H_x dei laterali sinistri di H_x in G è in corrispondenza biunivoca con l'orbita $O(x)$. Inoltre, se G è finito, la cardinalità dell'orbita è pari all'indice di H_x in G .

DIMOSTRAZIONE. Sia data:

$$\begin{aligned} \alpha : G/H_x &\longrightarrow O(x) \\ g \cdot H_x &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

Mostriamo che α è ben definita e biunivoca.

1. *Ben definizione:* se $g \cdot H_x = \tilde{g} \cdot H_x$ allora $g^{-1}\tilde{g} = h \in H_x \implies \tilde{g} = gh \in H_x$. Si ha:

$$\alpha(\tilde{g} \cdot H_x) = \tilde{g} \cdot x = (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = g \cdot x = \alpha(g \cdot H_x)$$

Poiché $g \cdot H_x = \tilde{g} \cdot H_x \implies g \cdot x = \tilde{g} \cdot x$ la funzione è ben definita.

2. *Iniettività:*

$$\begin{aligned} \alpha(g_1 \cdot H_x) = \alpha(g_2 \cdot H_x) &\implies g_1 \cdot x = g_2 \cdot x \implies g_2^{-1} \cdot (g_1 \cdot x) = g_2^{-1} \cdot (g_2 \cdot x) \\ &\implies (g_2^{-1} \cdot g_1) \cdot x = 1_G \cdot x = x \end{aligned}$$

Ne segue che $(g_2^{-1} \cdot g_1) \in H_x \implies g_2^{-1} \cdot g_1 = h \in H_x \implies g_1 \cdot H_x = g_2 \cdot H_x$.

3. *Suriettività:* se $y \in O(x)$, per definizione $\exists g \in G : y = g \cdot x$, cioè $y = \alpha(g \cdot H_x)$. Ne consegue, dal teorema di Lagrange, che $|O(x)| = [G : H_x] = \frac{|G|}{|H_x|}$.

□

OSSERVAZIONE. Punti nella stessa orbita hanno stabilizzatori **coniugati**:

$$x_2 = g \cdot x_1 \implies H_{x_2} = g \cdot H_{x_1} \cdot g^{-1} \quad (5.2)$$

DIMOSTRAZIONE. \subseteq) Sia $h \in H_{x_2}$. Si ha:

$$h \cdot x_2 = x_2 \implies h \cdot (g \cdot x_1) = g \cdot x_1 \implies (g^{-1}hg) \cdot x_1 = x_1$$

Segue che $\forall h \in H_{x_2} \ g^{-1}hg \in H_{x_1}$, ma allora $h = g(g^{-1}h^{-1}g)g^{-1} \in g \cdot H_{x_1} \cdot g^{-1}$. Pertanto per l'arbitrarietà di h si ha $H_{x_2} \subseteq g \cdot H_{x_1} \cdot g^{-1}$

\supseteq) Sia $h \in H_{x_1}$ e consideriamo ghg^{-1} . Se moltiplico (con l'azione \cdot) per x_2 :

$$(ghg^{-1}) \cdot x_2 = (ghg^{-1}) \cdot g \cdot x_1 = (gh) \cdot (g^{-1}g) \cdot x_1 = (gh) \cdot x_1 = g \cdot (h) \cdot x_1 = g \cdot x_1 = x_2$$

Pertanto $\forall h \in H_{x_1} \ (ghg^{-1}) \cdot x_2 = x_2$ e per l'arbitrarietà di h si ha $g \cdot H_{x_1} \cdot g^{-1} \subseteq H_{x_2}$ □

5.3 AZIONE PER OMEOMORFISMI

DEFINIZIONE 5.3.0. Sia X uno spazio topologico e G un gruppo che agisce su X . Diciamo che G **agisce per omeomorfismi** se $\forall g \in G$ l'applicazione:

$$\begin{aligned} \theta_g : X &\longrightarrow X \\ x &\longmapsto g \cdot x \end{aligned} \quad (5.3)$$

è un *omeomorfismo*.

Questo è equivalente a chiedere che l'azione sia data da un *omomorfismo* di gruppi:

$$\Phi : G \longrightarrow \{\text{omeomorfismi } X \rightarrow X\} \leq S(X) \quad (5.4)$$

ESERCIZIO. G agisce per omeomorfismi se e solo se θ_g è continua $\forall g \in G$.

DIMOSTRAZIONE. ... □

PROPOSIZIONE 5.3.0.

1. Sia X uno spazio topologico e G un gruppo che agisce su X per omeomorfismo. Sia π la proiezione dall'insieme allo spazio delle orbite X/G :

$$\pi : X \longrightarrow X/G \quad (5.5)$$

Allora π è aperta e, se G è finito, π è anche chiusa.

2. Sia X di **Hausdorff** e G gruppo finito che agisce su X per omeomorfismi. Allora X/G è di Hausdorff.

DIMOSTRAZIONE.

- I Sia $A \subseteq X$ un aperto. Vogliamo dimostrare che $\pi(A)$ è aperto in X/G . Un aperto della topologia quoziante è tale se la controimmagine dell'aperto nel quoziante è un aperto: si deve allora dimostrare che $\pi^{-1}(\pi(A))$ è aperto in X .
Ogni elemento di A è contenuto in un orbita, dunque $\pi(A)$ contiene le orbite degli $x \in A$; la controimmagine $\pi^{-1}(\pi(A))$ risulta dunque pari all'unione di tutte le orbite in X che intersecano l'insieme A :

$$\pi^{-1}(\pi(A)) = \bigcup_{g \in G} g \cdot A$$

Ma allora $g \cdot A = \{g \cdot x \mid x \in A\}$ è un aperto $\forall g \in G$ poiché un omeomorfismo porta aperti in aperti; l'unione di aperti è aperta, dunque $\pi^{-1}(\pi(A))$ è aperto in X cioè $\pi(A)$ è aperto in X/G .

Preso C chiuso, dobbiamo allo stesso modo dimostrare $\pi(C)$ chiuso in X/G , cioè $\pi^{-1}(\pi(C))$ chiuso in X . Usando lo stesso ragionamento, otteniamo che:

$$\pi^{-1}(\pi(C)) = \bigcup_{g \in G} g \cdot C$$

Con $g \cdot C = \{g \cdot x \mid x \in C\}$ chiuso per omeomorfismo. In particolare, essendo G finito, segue che l'unione dei $g \cdot C$ è finita e dunque anch'essa è un chiuso. Segue dunque $\pi^{-1}(\pi(C))$ chiuso in X e $\pi(C)$ chiuso in X/G .

- II Siano $p, q \in X/G$ distinti. Vogliamo dimostrare che esistono intorni di p e q disgiunti.

Siano $x, y \in X$ tali che $\pi(x) = p$ e $\pi(y) = q$ e consideriamo il gruppo finito $G = \{g_1 = 1_G, g_2, \dots, g_n\}$. Le orbite di x e y sono diverse: se così non fosse, si avrebbe $\pi(x) = \pi(y)$ e cioè $p = q$, il che è assurdo! Allora:

$$g_i \cdot x \neq g_j \cdot y \quad \forall i, j$$

Definiti gli (intorni) aperti $U \in I(x)$ e $V \in I(y)$ disgiunti (in quanto X di **Hausdorff**), possiamo considerare gli altri (intorni) aperti disgiunti $g_i \cdot U \in I(g_i \cdot x)$, $g_i \cdot V \in I(g_i \cdot y)$.

Allora:

$$\tilde{U} := \bigcup_i g_i \cdot U \quad \tilde{V} := \bigcup_i g_i \cdot V \tag{5.6}$$

Sono entrambi aperti. Vogliamo costruire $U \in I(x)$ e $V \in I(y)$ in modo che siano (intorni) aperti disgiunti tali che, costruiti come sopra \tilde{U}, \tilde{V} , si abbia $\tilde{U} \cap \tilde{V} = \emptyset$. Così, passando al quoziante con π , si otterranno degli intorni $\pi(\tilde{U})$ di p e $\pi(\tilde{V})$ di q che soddisfano $\pi(\tilde{U}) \cap \pi(\tilde{V}) = \emptyset$.

- Costruiamo U e V : $\forall i$ sappiamo che $x \neq g_i \cdot y$ in X (in quanto le orbite di x e y sono distinte. In quanto X è di **Hausdorff**, si ha che $\forall i \exists U_i, V_i$ (intorni) aperti disgiunti tali che $x \in U_i$ e $g_i \cdot y \in V_i$. Notiamo che $y \in g_i^{-1} \cdot V_i$; allora definiamo

$$U := \bigcap_i^n U_i \in I(x) \quad V := \bigcap_{i=1}^n g_i^{-1} \cdot V_i \in I(y)$$

- Ricaviamo \tilde{U} e \tilde{V} : $\forall i$ (e quindi per ogni elemento di G) abbiamo:

$$U \cap (g_i \cdot V) \subseteq U_i(g_i \cdot g_i^{-1} \cdot V_i) = U_i \cap V_i = \emptyset \implies U \cap (g_i \cdot V) = \emptyset$$

Allora $\forall i, j$ abbiamo:

$$(g_i \cdot U) \cap (g_j \cdot V) = (g_i \cdot U) \cap (g_i g_i^{-1} g_j \cdot V) = g_i \cdot (U \cap (g_i^{-1} g_j) \cdot V)$$

Ma $g_i^{-1} g_j \in G$, dunque $U \cap (g_i^{-1} g_j) \cdot V = \emptyset$. Segue che:

$$(g_i \cdot U) \cap (g_j \cdot V) = \emptyset \implies \left(\bigcup_i g_i \cdot U \right) \cap \left(\bigcup_i g_i \cdot V \right) = \emptyset \implies \tilde{U} \cap \tilde{V} = \emptyset$$

□

ESEMPIO. $(\mathbb{Z}, +)$ agisce in \mathbb{R} per **traslazione**:

$$m \cdot x = x + m \quad (5.7)$$

Se mettiamo ad \mathbb{R} la topologia Euclidea, allora l'azione è per omeomorfismi, dato che fissato $m \in \mathbb{Z}$: $\theta_m : \mathbb{R} \xrightarrow{\quad} \mathbb{R}$ è continua.
 $x \longmapsto x + m$

- *Orbite*: $O(x) = \{x + m \mid m \in \mathbb{Z}\}$ rappresenta tutti i numeri che hanno mantissa uguale (ad esempio, preso $x = 1.5$, nella sua orbita abbiamo $1.5, 2.5, -1.5, 25.5, \dots$).
- *Stabilizzatore*: $H_x = \{m \in \mathbb{Z} \mid x + m = x\} = \{0\}$ è banale, dunque l'azione è libera.
- *Spazio delle orbite*: \mathbb{R}/\mathbb{Z} è insiemisticamente in corrispondenza biunivoca con $[0, 1]$, in particolare un sistema di rappresentanti di \mathbb{R}/\mathbb{Z} sono le orbite al variare di $x \in [0, 1]$. Inoltre, lo spazio delle orbite è compatto essendo immagine continua di un compatto ($\pi([0, 1]) = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$). Si può dimostrare che è omeomorfo a S^1 .

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo $f : R \xrightarrow{\quad} S^1 \subseteq \mathbb{R}$
 $t \longmapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$.

- f è continua.
- f è suriettiva.
- $f(t_1) = f(t_2) \iff t_1 - t_2 \in \mathbb{Z} \iff t_1, t_2$ nella stessa orbita $\iff \pi(t_1) = \pi(t_2)$

Allora la relazione di equivalenza indotta da f è quella dell'azione di \mathbb{Z} su \mathbb{R} .

Inoltre, f induce $\bar{f} : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \longrightarrow S^1$ continua per le proprietà della topologia quoziente e che rende commutativo il diagramma a lato. Infatti \bar{f} è biunivoca in quanto suriettiva (lo è f) ed iniettiva (per conseguenza del sistema di rappresentanti che si ha su \mathbb{R}/\mathbb{Z}).

Inoltre, essendo \mathbb{R}/\mathbb{Z} compatto ed S^1 di **Hausdorff**, \bar{f} è chiusa e dunque \bar{f} è l'**omeomorfismo** cercato. Per questo motivo, si ha anche che f è un'*identificazione aperta*. □

DIGRESSIONE. Si può sempre vedere \mathbb{R}^2 come lo spazio dei complessi \mathbb{C} . Allora $S^1 \in$

$\mathbb{C} \implies S^1 = \{z \mid |z| = 1\}$. La funzione di prima si può anche riscrivere come:

$$(\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)) \leftrightarrow \cos(2\pi t) + i \sin(2\pi t) \leftrightarrow e^{2\pi i t} \quad (5.8)$$

ESEMPIO. $G = GL(n, \mathbb{R})$ agisce su \mathbb{R}^n con l'azione di moltiplicazione matrice per vettore:

$$A \cdot \underline{v} = A\underline{v} \quad (5.9)$$

L'azione è per omeomorfismi, dato che fissato $A \in G$: $\theta_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ è continua.
 $\underline{v} \longmapsto A\underline{v}$

- *Orbite:* definite $O(\underline{v}) = \{A\underline{v} \mid A \in G\}$ ci sono solo due orbite, $[0]$ e $[\underline{v}]$ con $\underline{v} \neq 0$, dato che ogni vettore può essere scritto come prodotto di un vettore per un'opportuna matrice di cambiamento di base.
- *Spazio delle orbite:* $\mathbb{R}^n/G = \{[0], [\underline{v}]\}$. Considerando la proiezione al quoziente $\pi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n/G$, si ha che $\pi^{-1}([\underline{v}]) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, che è un aperto ma *non* è un chiuso. Per definizione di aperto della topologia quoziente $\{[\underline{v}]\}$ è aperto ma non chiuso in \mathbb{R}^n/G , dunque non tutti i punti nello spazio delle orbite sono chiusi. Segue che \mathbb{R}^n/G non è **T1** e tanto meno è di **Hausdorff**.

ESEMPIO. $G = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, inteso come gruppo moltiplicativo, agisce su $X = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ con l'azione di moltiplicazione per uno scalare:

$$\lambda \cdot \underline{x} = \lambda \underline{x} \quad (5.10)$$

L'azione è per omeomorfismi, dato che fissato $\lambda \in G$: $\theta_\lambda : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$
 $\underline{x} \longmapsto \lambda \underline{x}$

è continua.

- *Orbite:* $O(\underline{x}) = \{\lambda \underline{x} \mid \lambda \in G\}$ rappresentano tutte le rette vettoriali passanti per l'origine in \mathbb{R}^{n+1} a cui sono state tolte l'origine.
- *Spazio delle orbite:* $\frac{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}}{G} = \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è lo **spazio proiettivo reale**, spazio topologico rispetto alla topologia quoziente indotta dall'azione. $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è di **Hausdorff** e **compatto**.

DEFINIZIONE 5.3.1. Lo **spazio proiettivo reale** $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ (o \mathbb{RP}^n) di dimensione n è lo spazio topologico delle rette vettoriali passanti origine in \mathbb{R}^{n+1} , a cui sono state tolte l'origine. È definito come lo spazio quoziente rispetto all'azione del gruppo moltiplicativo \mathbb{R}^* :

$$\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) = \frac{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}}{\mathbb{R}^*} \quad (5.11)$$

PROPOSIZIONE 5.3.1. $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è di **Hausdorff**, **compatto** e **c.p.a.**

DIMOSTRAZIONE. I Dati $p, q \in \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$, $p \neq q$ essi sono della forma $p = [\underline{x}]$ e $q = [\underline{y}]$.

Allora:

$$[\underline{x}] \neq [\underline{y}] \quad \mathcal{L}_0(\underline{x}) \neq \mathcal{L}_0(\underline{y})$$

Con $\mathcal{L}_0(\underline{x})$, $\mathcal{L}_0(\underline{y})$ le rette vettoriali descritte da \underline{x} e \underline{y} .

Prendiamo gli (intorni) aperti disgiunti $U \setminus 0 \in I(\underline{x})$, $V \setminus 0 \in I(\underline{y})$ in $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Allora, passando al quoziente, $\pi(U \setminus 0)$ e $\pi(V \setminus 0)$ formano due fasci di rette a forma di “doppio cono infinito” con vertice nell’origine; questi due coni sono (intorni) aperti in quanto

$$\pi^{-1}(\pi(U \setminus 0)) = U \setminus 0 \quad \pi^{-1}(\pi(V \setminus 0)) = V \setminus 0$$

Inoltre sono intorni disgiunti di p e q , dunque $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è di **Hausdorff**.

- II Per dimostrare che $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è compatto, mostreremo che $\pi(S^n) = \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$, dato che $S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ è compatto.

Notiamo che, presa l’orbita di un vettore \underline{v} , si ha:

$$[\underline{v}] = \{\lambda \underline{v} \mid \lambda \in \mathbb{R}^*\} = \left\{ \underbrace{\lambda \|\underline{v}\|}_{=\mu \in \mathbb{R}^*} \underbrace{\frac{\underline{v}}{\|\underline{v}\|}}_{\in S^1} \mid \lambda \in \mathbb{R}^* \right\} = \{\mu \underline{x} \mid \mu \in \mathbb{R}^*\} = [\underline{x}]$$

Dunque ogni orbita dello spazio proiettivo reale si può scrivere come l’orbita di un vettore appartenente alla sfera S^n . Segue che non solo π è suriettiva, ma anche $\pi|_{S^n}$ è suriettiva, cioè $\pi|_{S^n}(S^n) = \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$; segue dunque che $\pi(S^n) = \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$. Dato che S^n è compatto e **c.p.a.**, segue che anche lo spazio proiettivo reale è compatto e **c.p.a.** (in quanto immagine continua tramite π di S^n). □

6

CAPITOLO

SUCCESSIONI

“BEEP BOOP INSERIRE CITAZIONE QUA BEEP BOOP.”

NON UN ROBOT, UN UMANO IN CARNE ED OSSA BEEP BOOP.

6.1 NUMERABILITÀ

DEFINIZIONE 6.1.0. Un insieme X è **numerabile** se è finito oppure esiste una biezione tra l’insieme X e i naturali \mathbb{N} .

DEFINIZIONE 6.1.1. Uno spazio topologico X è **a base numerabile** se esiste una base \mathcal{B} della topologia tale che \mathcal{B} sia numerabile. Si dice anche che X soddisfa il **secondo assioma di numerabilità**.

DEFINIZIONE 6.1.2. Uno spazio topologico X è *primo-numerabile* se ogni punto ammette un sistema fondamentale di intorni che sia numerabile. Si dice anche che X soddisfa il **primo assioma di numerabilità**.

OSSERVAZIONE.

1. Il secondo assioma di numerabilità implica il primo.
2. Se X è finito, X soddisfa sempre i due assiomi.
3. Se X è spazio metrico, X è sempre *primo-numerabile*.
4. Se X è *a base numerabile*, ogni sottospazio Y di X è *a base numerabile*. In particolare Y è *primo-numerabile*.
5. Se X e Y sono *a base numerabile*, allora $X \times Y$ è *a base numerabile*. In particolare $X \times Y$ è *primo-numerabile*.
6. Non è vero che il quoziente di X spazio *a base numerabile* (o *primo-numerabile*) è sempre *a base numerabile* (o *primo-numerabile*).

DIMOSTRAZIONE.

- I Se X ha base numerabile \mathcal{B} e $x \in X$, allora $\{A \in \mathcal{B} \mid x \in A\}$ è un sistema fondamentale di intorni di x ed è chiaramente numerabile.
- II Ogni base e sistema fondamentale di intorni contiene necessariamente un numero finito di elementi.
- III Preso $x \in X$, allora $\{B_{1/n}(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ è un sistema fondamentale di intorni ed è numerabile.
- IV Se \mathcal{B} è una base numerabile per X , $\{A \cap Y \mid A \in \mathcal{B}\}$ è base numerabile per Y .
- V Se \mathcal{B}_X è una base numerabile per X e \mathcal{B}_Y base numerabile per Y , allora $\{A \times B \mid A \in \mathcal{B}_X, B \in \mathcal{B}_Y\}$ è base di $X \times Y$ numerabile: il prodotto cartesiano di due insiemi numerabili rimane numerabile.
- VI La contrazione di \mathbb{Z} in \mathbb{R} ad un punto, cioè il quoziente \mathbb{R}/\mathbb{Z} , non è primo-numerabile né tanto meno a base numerabile, pur essendo \mathbb{R} a base numerabile in quanto metrico^a.

□

^aNelle “Note aggiuntive”, a pag. 161, si può trovare la dimostrazione di ciò.

ESEMPIO. \mathbb{R} con la topologia Euclidea è *a base numerabile*. Presa infatti:

$$\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q}, a < b\}$$

- È numerabile (è definita con i razionali \mathbb{Q} , che sono numerabili)
- È una base perché, dati $x, y \in \mathbb{R}$, $x < y$:

$$(x, y) = \bigcup_{\substack{a, b \in \mathbb{Q} \\ x < a < b < y}} (a, b)$$

PROPOSIZIONE 6.1.0. Sia X a base numerabile. Allora ogni ricoprimento aperto di X ammette un sottoricoprimento numerabile.

DIMOSTRAZIONE. Sia \mathcal{A} un ricoprimento aperto di X , \mathcal{B} una base numerabile per X e $x \in X$. Allora $\exists U_x \in \mathcal{A}$ tale che $x \in U_x$. Essendo \mathcal{B} base, $\exists B_x \in \mathcal{B}$ tale che $x \in B_x \subseteq U_x$. Abbiamo così determinato un sottoinsieme numerabile della base \mathcal{B} :

$$\tilde{\mathcal{B}} := \{B_x \mid x \in X\}$$

Allora esiste in particolare $E \subseteq X$ numerabile tale che:

$$\tilde{\mathcal{B}} := \{B_x \mid x \in E\}$$

Se consideriamo ora $\tilde{\mathcal{A}} := \{U_x \mid x \in E\}$, notiamo che:

- $\tilde{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}$.
- $\tilde{\mathcal{A}}$ è numerabile perché lo è E .
- $X = \bigcup_{B_x \in \tilde{\mathcal{B}}} B_x = \bigcup_{x \in E} B_x \subseteq \bigcup_{x \in E} U_x$.

Segue che $\tilde{\mathcal{A}}$ è un sottoricoprimento numerabile di A . □

DEFINIZIONE 6.1.3. Uno spazio topologico X si dice **separabile** se contiene un sottoinsieme E denso e numerabile.

ESEMPI.

- Se X è numerabile, allora è separabile perché l'insieme stesso è un sottoinsieme numerabile e denso.
- \mathbb{R}^n con la topologia euclidea è separabile perché si ha $E = \mathbb{Q}^n$ denso in \mathbb{R}^n .

LEMMA 6.1.0. Se X è una base numerabile, allora è separabile.

DIMOSTRAZIONE. Sia \mathcal{B} una base numerabile. Per ogni $U \in \mathcal{B}$ sia $x_U \in U$ un punto e sia:

$$E = \{x_U \mid U \in \mathcal{B}\}$$

- E è numerabile perché lo è \mathcal{B} : abbiamo preso un punto per ogni elemento della base numerabile.
- E è denso: se $A \subseteq X$ è aperto non vuoto, allora $\exists U \in \mathcal{B}$ tale che $x_U \in U \subseteq A \implies x_U \in A \implies E \cap A \neq \emptyset$.

□

PROPOSIZIONE 6.1.1. Se X è spazio metrico, X è sempre primo-numerabile ed è:

$$\text{una base numerabile} \iff \text{separabile}$$

DIMOSTRAZIONE.

- \Rightarrow) Sempre vera per ogni spazio anche non metrico (lemma 6.1).
- \Leftarrow) Sia $E \subseteq X$ sottoinsieme numerabile e denso e consideriamo:

$$\mathcal{B} = \{B_{1/n}(e) \mid e \in E, n \in \mathbb{N}\}$$

Questo insieme è numerabile: mostriamo che sia una base. Per far ciò fissiamo $U \subseteq X$ aperto e prendiamo $x \in U$: vogliamo trovare un aperto di \mathcal{B} contenuto in U contenente x .^a

Sia $n \in \mathbb{N}$ tale che $B_{1/n}(x) \subseteq U$. Cerchiamo opportuni $e \in E, m \in \mathbb{N}$ tale che:

$$x \in B_{1/m}(e) \subseteq B_{1/n}(x) \subseteq U$$

Consideriamo la palla $B_{1/2n}(x)$. Siccome E è denso in X , $\exists e \in E \cap B_{1/2n}(x)$.

Prendiamo ora la balla $B_{1/2n}(e) \in \mathcal{B}$:

- contiene x perché se $e \in B_{1/2n}(x) \implies d(e, x) < \frac{1}{2n} \implies x \in B_{1/2n}(e)$
- $B_{1/2n}(e) \subseteq B_{1/n}(x) \subseteq U$; infatti, preso $y \in B_{1/2n}(e)$ si ha:

$$d(x, y) \leq d(x, e) + d(e, y) < \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n}$$

$$\implies y \in B_{1/n}(x) \subseteq U.$$

Segue la tesi. □

^aGli elementi della base sono già aperti banalmente. Per l'arbitrarietà di x , troviamo un ricoprimento aperto di U costituito da aperti di \mathcal{B} contenuto interamente in U , cioè $U = \bigcup_{i \in I} B_i$.

ESEMPIO. Si può vedere che \mathbb{R}^n è base numerabile anche perché è uno spazio metrico ed è separabile.

ATTENZIONE! Un insieme con una certa topologia può essere a base numerabile (o primo-numerabile), ma non necessariamente rispetto ad un'altra!

ESEMPIO. RETTA DI SORGENTFREY.

Consideriamo $X = \mathbb{R}$ con la topologia avente come base:

$$\mathcal{B} = \{[a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b\} \quad (6.1)$$

Mostriamo \mathcal{B} è base per una topologia, è separabile, primo-numerabile ma *non* è a base numerabile.

- *Base per una topologia:* usiamo il teorema delle basi (Manetti, 3.7), pag. 8.

I $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$ è ovvio.

II Prendiamo $A = [a, b)$, $B = [c, d)$ e consideriamo:

$$\forall x \in A \cap B = [\max\{a, b\}, \min\{c, d\}]$$

Allora basta prendere $C = A \cap B \in \mathcal{B}$ per soddisfare $x \in C \subseteq A \cap B$.

- *Separabile:* $E = \mathbb{Z}$ è numerabile ed è denso perché vale sempre $[a, b) \cap \mathbb{Z} \neq \emptyset$, dunque ogni aperto non vuoto interseca E ; segue che X è separabile.
- *Primo-numerabile:* sì $a \in \mathbb{R}$ allora $\left\{[a, a + \frac{1}{n}] \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ è un sistema fondamentale di intorni di a numerabile. Preso U intorno di a , $\exists b > a$ tale che $[a, b) \subseteq U$; inoltre, $\exists n \in \mathbb{N}$ tale che $a + \frac{1}{n} < b$, cioè:

$$\left[a, a + \frac{1}{n}\right) \subseteq [a, b) \subseteq U$$

- *Non a base numerabile:* presa una base $\tilde{\mathcal{B}}$ per X , mostriamo che non è numerabile. Sia $x \in \mathbb{R}$. Allora:


$$[x, \infty) = \bigcup_{y > x} [x, y)$$

È aperto. In particolare, esiste un aperto dipendente dal punto x , cioè $U(x) = [x, b) \in \tilde{\mathcal{B}}$ (per un certo $b > x$) per cui $x \in U(x) \subseteq [x, \infty)$.

Notiamo che se $x \neq y$, allora $U(x) \neq U(y)$: preso $y > x$, segue che $x \notin [y, \infty) \supseteq U(y) \implies x \notin U(y) \implies U(x) \neq U(y)$. L'applicazione:

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\longrightarrow \tilde{\mathcal{B}} \\ x &\longmapsto U(x) \end{aligned} \quad (6.2)$$

è iniettiva, dunque $\tilde{\mathcal{B}}$ non è iniezione con i naturali e pertanto $\tilde{\mathcal{B}}$ *non* è numerabile.



6.2 SUCCESSIONI

DEFINIZIONE 6.2.0. Una **successione** in uno spazio topologico X è una funzione $a : \mathbb{N} \longrightarrow X$ che indichiamo con $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{a_n\}$.

DEFINIZIONE 6.2.1. Sia $\{a_n\}$ una successione in X . Diciamo che $\{a_n\}$ **converge** a $p \in X$ se $\forall U \in I(p) \exists n_0 \in \mathbb{N} : a_n \in U, \forall n \geq n_0$.

OSSERVAZIONE. Se X è di **Hausdorff**, una successione convergente ha un **unico** limite.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo che $\{a_n\}$ converga a p e q . Mostriamo che $p = q$. Siano $U \in I(p)$ e $V \in I(q)$.

- Siccome $\{a_n\}$ converge a p , $\exists n_0$ tale che $a_n \in U \forall n \geq n_0$.
 - Siccome $\{a_n\}$ converge a q , $\exists n_1$ tale che $a_n \in V \forall n \geq n_1$.
- $$\implies a_n \in U \cap V \quad \forall n \geq \max_{n_0, n_1} \implies U \cap V \neq \emptyset \implies p = q$$

L'ultima implicazione deriva dal fatto che X è di **Hausdorff**. Infatti, se in **Hausdorff** $p \neq q \implies U \cap V = \emptyset$, vale anche la sua negazione: $U \cap V \neq \emptyset \implies p = q$. \square

DEFINIZIONE 6.2.2. Se X è di **Hausdorff** e $\{a_n\}$ è convergente, ha senso parlare del **limite** della successione:

$$p = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \tag{6.3}$$

Se X non è di **Hausdorff**, la stessa successione può convergere a più punti, dunque non esiste il limite della successione.

ESEMPI.

- Se X ha la topologia banale $\mathcal{T} = \{X, \emptyset\}$, l'unico intorno di qualunque punto è X . Allora ogni successione $\{a_n\}$ in X converge sempre ad un qualunque punto p .
- Se X ha la topologia discreta, $\{a_n\}$ successione in X converge a $p \iff \exists n_0 : a_n = p, \forall n \geq n_0$, cioè se la successione è finitamente costante. Infatti, nella topologia discreta anche il singololetto $\{p\}$ è intorno di p , dunque eventualmente la successione avrà solo termini nel singololetto.

OSSERVAZIONE. Se X spazio metrico:

$$a_n \text{ CONVERGE A } p \iff \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : d(x, y) < \varepsilon, \forall n \geq n_0 \quad (6.4)$$

DIMOSTRAZIONE.

\Rightarrow) $U = B_\varepsilon(p)$ è l'intorno di convergenza che soddisfa l'implicazione.

\Leftarrow) Sia $U \in I(p)$. Allora $\exists \varepsilon : B_\varepsilon(p) \subseteq U$. Ma allora, dato che per le ipotesi $\exists n_0 : d(p, a_n) < \varepsilon, \forall n \geq n_0$, cioè $a_n \in B_\varepsilon(p) \subseteq U \Rightarrow a_n \in U \forall n \geq n_0$. \square

6.2.1 Punti di accumulazione

DEFINIZIONE 6.2.3. Un punto $p \in X$ è **punto di accumulazione per la successione** $\{a_n\}$ se:

$$\forall U \in I(p), \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : a_n \in U \quad (6.5)$$

ESERCIZIO. Se X è spazio metrico, allora:

$$p \text{ PUNTO DI ACCUMULAZIONE PER } a_n \iff \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : d(x, y) < \varepsilon, \forall n \geq n_0 \quad (6.6)$$

DEFINIZIONE 6.2.4. Un punto $p \in X$ è **punto di accumulazione per il sottoinsieme** $B \subseteq X$ se:

$$\forall U \in I(p), \exists b \in B : b \in U \setminus \{p\} \quad (6.7)$$

L'insieme dei punti di accumulazione per il sottoinsieme B è chiamato **derivato** di B .

ESERCIZIO. Data la successione $\{a_n\}$ in X e definito $A := \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$:

- $p \in X$ punto di accumulazione per la successione non è mai punto di accumulazione per l'insieme A .
- $p \in X$ punto di accumulazione per l'insieme A in generale non è punto di accumulazione per la successione; se X è metrico allora vale l'implicazione

6.2.2 Sottosuccessioni

DEFINIZIONE 6.2.5. Una **sottosuccessione** di $\{a_n\}$ è la composizione di $a : \mathbb{N} \longrightarrow X$ con un'applicazione *strettamente crescente* $k : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ $n \longmapsto k(n)$. Si indica con $\{a_{k_n}\}$.

LEMMA 6.2.0.  Sia $\{a_n\}$ una successione su X e $p \in X$. Valgono le seguenti implicazioni:

$$(1) \{a_n\} \text{ converge a } p \quad (6.8)$$

\Downarrow

$$(2) \{a_n\} \text{ ha una sottosuccessione convergente a } p \quad (6.9)$$

\Downarrow 

(3) p è un punto di accumulazione per $\{a_n\}$ (6.10)

\Downarrow **

(4) $p \in \overline{A}$ dove $A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq X$ (6.11)

DIMOSTRAZIONE. (1) \Rightarrow (2) La sottosuccessione convergente è la successione stessa.

(2) \Rightarrow (3) Sia $\{a_{k(n)}\}$ una sottosuccessione convergente a p e sia $U \in I(p)$.

Se $a_{k(n)}$ converge a p si ha che $\exists n_0 : a_{k(n)} \in U, \forall n \geq n_0$. Poichè $k(n)$ è strettamente crescente, $\exists n_1 : k(n) \geq N, \forall n \geq n_1$. Allora preso:

$$n = \max\{n_0, n_1\}$$

Abbiamo che $a_{k(n)} \in U, k(n) \geq N$.^a Segue che p è punto di accumulazione per $\{a_n\}$.

(3) \Rightarrow (4) $p \in \overline{A} \iff \forall U \in I(p) A \cap U \neq \emptyset$. Allora sia U intorno di p : voglia che $U \cap A \neq \emptyset$. Essendo p punto di accumulazione per $\{a_n\}$, $\exists n : a_n \in U \Rightarrow U \cap A \neq \emptyset$. \square

^aL'intorno U è arbitrario.

LEMMA 6.2.1. Sia X primo-numerabile, $\{a_n\}$ successione in X e $p \in X$. Allora vale anche il viceversa di *, cioè:

$\{a_n\}$ ha una sottosuccessione convergente a $p \iff p$ è di accumulazione per $\{a_n\}$ (6.12)

DIMOSTRAZIONE. \Rightarrow) Vale per *.

\Leftarrow) Sia $\{U_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ sistema fondamentale di intorni di p numerabile per ipotesi (X primo-numerabile). Consideriamo i seguenti insiemi:

$$\tilde{U}_m := U_1 \cap \dots \cap U_m \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

■ \tilde{U}_m è intorno di p , in quanto intersezione finita di intorni di p .

■ $\tilde{U}_m = U_1 \cap \dots \cap U_m \supseteq U_1 \cap \dots \cap U_m \cap U_{m+1} = \tilde{U}_{m+1}$.

Segue che $\{\tilde{U}_m\}$ è ancora un sistema fondamentale di intorni (numerabile) di p , infatti, se V è intorno di p , $\exists m : V \supseteq \tilde{U}_m \supseteq U_m$.

A meno di sostituire U_m con \tilde{U}_m , possiamo supporre che $U_1 \supseteq U_2 \supseteq U_3 \supseteq \dots$

Costruiamo una sottosuccessione di $\{a_n\}$ convergente a p . Sicuramente:

■ $\exists k(1) \in \mathbb{N} : a_{k(1)} \in U_1$.

■ $\exists k(2) \geq k(1) + 1 : a_{k(2)} \in U_2$.

E così via: $\forall m \exists k(m) \geq k(m-1) + 1$ tale che $a_{k(m)} \in U_m$, ottenendo una sottosuccessione $\{a_{k(m)}\}$. Notiamo in particolare che:

⊕ Se $m_2 \geq m_1$, allora $a_{k(m_2)} \in U_{m_2} \subseteq U_{m_1}$.

Mostriamo che $\{A_{k(n)}\}$ converge a p .

Sia V intorno di p . Dal sistema fondamentale di intorni $\exists m_0$ tale che $U_{m_0} \subseteq V$. Da \odot si ha che $\forall m \geq m_0 \quad a_{k(m)} \in U_{m_0} \subseteq V$. \square

PROPOSIZIONE 6.2.0. CARATTERIZZAZIONE DELLA CHIUSURA IN TERMINI DI SUCCESSIONI.

Sia X uno spazio topologico *primo-numerabile*. Sia $Y \subseteq X$ e $p \in X$. Sono equivalenti

- Esiste una successione in Y convergente a p .
- p è di accumulazione per una successione in Y .
- $p \in \overline{Y}$

DIMOSTRAZIONE.

(1) \Rightarrow (2) Non è necessario che X sia primo-numerabile, è immediato dal lemma 6.2

\blacktriangleleft (pag. 70).

(2) \Rightarrow (3) Non è necessario che X sia primo-numerabile. Se p di accumulazione per $\{a_n\}$ con $a_n \in Y \quad \forall n \Rightarrow A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq Y$. Allora segue dal lemma 6.2 \blacktriangleleft (pag. 70) che $p \in A = \overline{\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}} \subseteq \overline{Y}$

(3) \Rightarrow (1) Sia $\{U_n\}$ un sistema fondamentale di intorni di p tale che $U_n \supseteq U_{n+1} \quad \forall n$. Allora:

$$p \in \overline{Y} \Rightarrow \forall n \quad Y \cap U_n \neq \emptyset \Rightarrow \forall n \quad \exists y_n \in Y \cap U_n$$

In modo analogo a \odot (pag. 71), se $n_2 \geq n_1$, allora $y_{n_2} \in U_{n_2} \subseteq U_{n_1}$. Allora $\{y_n\}$ è una successione in Y , mostriamo che converge a p .

Sia V intorno di p . Dal sistema fondamentale di intorni $\exists n_0$ tale che $U_{n_0} \subseteq V$. Dal ragionamento analogo a \odot si ha che $\forall n \geq n_0 \quad y_n \in U_{n_0} \subseteq V$. \square

6.3 SUCCESSIONI E COMPATTI

PROPOSIZIONE 6.3.0. (MANETTI, 4.46)

Sia X spazio topologico e sia $K_n \subseteq X \quad \forall n \in \mathbb{N}$ un sottospazio chiuso, *compatto* e non vuoto. Supponiamo inoltre che:

$$K_n \supseteq K_{n+1} \quad \forall n \Rightarrow K_1 \supseteq K_2 \supseteq K_3 \supseteq \dots$$

Allora: $\bigcap_{n \geq 1} K_n \neq \emptyset$.

DIMOSTRAZIONE. Iniziamo in K_1 . Consideriamo $A_n := K_1 \setminus K_n$:

- K_n chiuso in $X \Rightarrow K_n$ chiuso in K_1 . Allora A_n complementare di un chiuso, dunque aperto in $K_1 \quad \forall n \geq 1$.
- $K_n \supseteq K_{n+1} \Rightarrow A_n \subseteq A_{n+1} \quad \forall n \geq 1$.

Sia allora $N \in \mathbb{N}$.

$$\bigcup_{n=1}^N A_n = A_N = K_1 \setminus \underbrace{K_N}_{\neq \emptyset} \subsetneq K_1$$

Allora nessuna unione *finita* degli A_n ricopre K_1 , cioè $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subsetneq K_1$, altrimenti $\{A_n\}$ sa-

rebbe un ricoprimento aperto di K_1 che *non* ammette sottoricoprimento finito (assurdo, in quanto K_1 è *compatto*!).

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n = \bigcup_{n \geq 1} K_1 \setminus K_n = K_1 \setminus \left(\bigcap_{n \geq 1} K_n \right) \subsetneqq K_1 \implies \bigcap_{n \geq 1} K_n \neq \emptyset$$

□

LEMMA 6.3.0. In uno spazio topologico *compatto* X ogni successione in X ha punti di accumulazione.

DIMOSTRAZIONE. Sia $\{a_n\}$ successione in X ; per definizione:

$$p \in X \text{ punto di accumulazione per } \{a_n\} \iff \forall U \in I(p), \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : a_n \in U$$

Per N fissato sia $A_N := \{a_n \mid n \geq N\} \subseteq X$. Allora:

$$\begin{aligned} p \in X \text{ punto di accumulazione per } \\ \{a_n\} \iff \forall U \in I(p), \forall N \in \mathbb{N} U \cap A_N \neq \emptyset \iff \forall N \in \mathbb{N}, p \in \overline{A}_N := C_N \end{aligned}$$

Dunque $\{\text{punti di accumulazione di } \{a_n\}\} = \bigcap_{N \in \mathbb{N}} C_N$ e:

$$\{a_n\} \text{ ha punti di accumulazione} \iff \bigcap_{N \in \mathbb{N}} C_N \neq \emptyset$$

- $A_B \neq \emptyset$ per definizione, dunque C_N è un chiuso non vuoto.
- X è compatto, C_N chiuso in X compatto $\implies C_N$ compatto.

Poiché $A_N = \{a_n \mid n \geq N\} \supseteq A_{N+1} = \{a_n \mid n \geq N+1\}$, si ha:

$$C_N = \overline{A_N} \subseteq \overline{A_{N+1}} = C_{N+1}$$

Abbiamo trovato una successione di compatti contenuto l'uno nel successivo. Allora per la proposizione 6.4 (pag. 72, (MANETTI, 4.46)). si ha che $\bigcap_{n \geq 1} C_N \neq \emptyset$. Segue che esiste un punto di accumulazione per la successione. □

6.3.1 Compattezza per successioni

DEFINIZIONE 6.3.0. Sia X spazio topologico. X si dice **compatto per successioni** se ogni successione ammette una sottosuccessione convergente.

OSSERVAZIONE. Per il lemma 6.2 (pag. 70), se X è compatto per successioni allora ogni successione in X ha un punto di accumulazione.

LEMMA 6.3.1. Sia X primo-numerabile. Allora:

1. X compatto per successioni \iff Ogni successione in X ha un punto di accumulazione.
2. X compatto $\implies X$ compatto per successioni.

DIMOSTRAZIONE.

- I \implies) Vale per l'osservazione precedente.
 \Leftarrow) Vale per il lemma 6.3, pag. 71: se ogni successione ha un punto di accumulazione in X primo numerabile, allora ogni sottosuccessione ammette una sottosuccessione convergente a p , cioè X è compatto per successioni.
II Se X è compatto, allora ogni successione in X ha dei punti di accumulazione e per il punto 1) segue che X è compatto per successioni. \square

PROPOSIZIONE 6.3.1. CARATTERIZZAZIONE DELLA COMPATTEZZA IN TERMINI DI SUCCESSIONI

Sia X uno spazio topologico a base numerabile. Allora sono equivalenti:

1. X compatto.
2. X compatto per successioni
3. Ogni successione in X ammette un punto di accumulazione.

DIMOSTRAZIONE. Sappiamo già che 2) \iff 3) e 1) \implies 2) dal lemma precedente. Dobbiamo dimostrare 2) \implies 1). Dimostriamo per contronominale ($\neg 1 \implies \neg 2$): se X non è compatto, allora X non è compatto per successioni, cioè esiste una sottosuccessione in X che non ha alcuna sottosuccessione convergente.

- X non compatto $\implies \exists \tilde{\mathcal{A}}$ ricoprimento aperto di X che non ha sottoricoprimenti finiti.
- X a base numerabile $\implies \exists \mathcal{A}$ sottoricoprimento di $\tilde{\mathcal{A}}$ che sia numerabile.

Poiché ogni sottoricoprimento di \mathcal{A} è anche un sottoricoprimento di $\tilde{\mathcal{A}}$, significa che \mathcal{A} non ha sottoricoprimenti finiti. Definiamo:

$$\mathcal{A} := \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$$

Allora:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \bigcup_{j=1}^n A_j \subsetneq X \implies \exists x_n \in X \setminus \bigcup_{j=1}^n A_j$$

Costruisco così una successione $\{x_n\}$ successione in X tale per cui:

$$\textcircled{B} \quad x_n \notin A_j \quad \forall j \leq n.$$


Mostriamo che $\{x_n\}$ non ha sottosuccessioni convergenti. Sia $\{x_{k(n)}\}$ una sottosuccessione arbitraria di $\{x_n\}$ e sia $p \in X$, mostriamo che essa non converga ad un qualunque p .

- \mathcal{A} è un (sotto)ricoprimento di $X \implies \exists N : p \in A_N$
- Da \textcircled{B} (pag. 74) abbiamo che $x_n \notin A_N \quad \forall n \geq N$ (dato che $x_n \notin A_j \quad \forall j \leq n$, in particolare in A_N per ogni $n \geq N$); si ha allora $x_{k(n)} \notin A_n \quad \forall n : k(n) \geq N$.

Essendo $k(n)$ crescente, $\exists n_0 : k(n) \geq N \quad \forall n \geq n_0$. Segue che se $n \geq n_0$ allora $x_{k(n)} \notin A_N$. Poiché A_N è intorno di p , segue che $\{x_{k(n)}\}$ non converge a p . \square

TEOREMA 6.3.o. Sia X spazio metrico. Allora:

$$X \text{ compatto} \iff X \text{ compatto per successioni} \quad (6.13)$$



6.4 SPAZI METRICI COMPLETI

DEFINIZIONE 6.4.o. Sia (X, d) uno spazio metrico. Una successione $\{a_n\}$ si dice **di Cauchy** se:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : d(a_n, a_m) < \varepsilon, \forall n, m \geq n_0 \quad (6.14)$$

DEFINIZIONE 6.4.1. Uno spazio metrico (X, d) si dice **completo** se ogni successione di Cauchy è convergente.

OSSERVAZIONE.

1. Ogni successione *convergente* è di Cauchy.
2. Una successione di Cauchy è *convergente* se e solo se ha punti di accumulazione.
3. Una successione di Cauchy è *convergente* se ha una sottosuccessione convergente.
4. Se X è *compatto*, allora ogni successione di Cauchy è *convergente*.
5. Se X è spazio metrico *compatto*, allora X è spazio metrico *completo*; non è vero il viceversa.

DIMOSTRAZIONE.

I Se $a_n \rightarrow p$ per $n \rightarrow +\infty$ significa che:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : d(a_n, p) < \varepsilon, \forall n \geq n_0$$

Considerati $n, m \geq n_0$ si ha:

$$d(a_n, a_m) \leq d(a_n, p) + d(p, a_m) < 2\varepsilon \quad (6.15)$$

Per l'arbitrarietà di ε vale la convergenza.

- II \implies) Sempre vera per 6.2 (▲ (pag. 70)).
 \Leftarrow) Sia $\{a_n\}$ una successione di Cauchy e sia p un punto di accumulazione. Sia $\varepsilon > 0$: dalla definizione di successione di Cauchy $\exists n_0$ tale per cui $d(a_n, a_m) <$

$\varepsilon \forall n, m \geq n_0$.

Essendo p di accumulazione, $\exists n_1 \geq n_0$ tale per cui $d(p, a_{n_1}) < \varepsilon$. Allora, se $n \geq n_0$ si ha:

$$d(a_n, p) \leq d(a_n, a_{n_1}) + d(a_{n_1}, p) < 2\varepsilon$$

Dunque $\{a_n\}$ converge a p .

- III Poiché X è metrico, X è primo-numerabile, dunque avere un punto di accumulazione è equivalente ad avere una sottosuccessione convergente.
- IV Se X è compatto, ogni successione ha punti di accumulazione, in particolare quelle di Cauchy: per il punto 2) tutte le successioni di Cauchy risultano allora convergenti.
- V Segue dal punto 4). Un controsenso del viceversa è \mathbb{R}^n , dato che è completo ma non è compatto (si veda il teorema seguente).

□

TEOREMA 6.4.O. \mathbb{R}^n in metrica euclidea è uno spazio metrico completo.

DIMOSTRAZIONE. Sia $\{a_n\}$ di Cauchy in \mathbb{R}^n . Mostriamo che $\{a_n\}$ è eventualmente limitata^a. Poiché la successione di Cauchy è definita per ogni ε , fissiamo $\varepsilon = 1$. Allora:

$$\exists n_0 : \|a_n - a_m\| \leq 1 \quad \forall n, m \geq n_0$$

Sia $M := \max_{n_0, \dots, n_0} \|a_n\|$. Se $n \geq n_0$ si ha:

$$\|a_n\| = \|a_n - a_{n_0} + a_{n_0}\| \leq \|a_n - a_{n_0}\| + \|a_{n_0}\| \leq 1 + M$$

Questo significa che $\{a_n\} \subseteq \overline{B_{1+M}(0)}$. Questa palla chiusa è uno spazio metrico *indotto* in \mathbb{R}^n e compatto, cioè è uno *spazio metrico completo*. Allora la successione di Cauchy, trovandosi in uno spazio metrico completo, converge in esso, e dunque converge anche in \mathbb{R}^n . □

^aSupponendo chiaramente che la successione sia ben definita, ci interessa solamente che la successione sia limitata dopo un n_0 : prima di ciò ho un numero finito di termini $a_0, \dots, a_{n_0} < \infty$ e posso chiaramente prendere una palla (chiusa) che li contenga, ad esempio di raggio $M + 1$ con M definito come nella dimostrazione.

ATTENZIONE! La **completezza** non è una proprietà topologica! Per esempio, \mathbb{R} e $(0, 1)$ con metrica euclidea sono omeomorfi rispetto alla topologia indotta dalla metrica, ma \mathbb{R} abbiamo appena dimostrato che è completo, mentre $(0, 1)$ si può vedere che non lo è!

II

O_MOTOPIA

7

CAPITOLO

OMOTOPIA

“BEEP BOOP INSERIRE CITAZIONE QUA BEEP BOOP.”

NON UN ROBOT, UN UMANO IN CARNE ED OSSA BEEP BOOP.

ti

7.1 LEMMA DI INCOLLAMENTO

LEMMA 7.1.0. LEMMA DI INCOLLAMENTO

Siano X, Y spazi topologici e $X = A \cup B$. Siano $f : A \longrightarrow Y$ e $g : B \longrightarrow Y$ continue tali che $f(x) = g(x) \forall x \in A \cap B$, cioè $f|_{A \cap B} = g|_{A \cap B}$. Consideriamo l'**incollamento** $h : X \longrightarrow Y$ definito da:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & x \in A \\ g(x) & x \in B \end{cases} \quad (7.1)$$

Se A e B sono entrambi aperti in X , oppure se A e B sono entrambi chiusi in X , allora h è continua.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo A e B aperti. Sia $U \subseteq Y$ aperto. Allora:

$$h^{-1}(U) = \underbrace{f^{-1}(U)}_{\subseteq B} \cap \underbrace{g^{-1}(U)}_{\subseteq B}$$

Essendo f, g continue, segue che $f^{-1}(U)$ è aperto in A e $g^{-1}(U)$ è aperto in B .

In quanto A, B aperti, per definizione di aperto del sottospazio^a $f^{-1}(U)$ e $g^{-1}(U)$ sono aperti su $X \implies h^{-1}(U)$ aperto.

Il caso di A e B chiuso è esattamente analogo. \square

^aPoichè un aperto del sottospazio è dato dall'intersezione del sottospazio con un aperto di X , se abbiamo che anche il sottospazio è aperto di X , l'intersezione è aperta: in questo caso ogni aperto del

sottospazio è anche aperto di X .

7.2 COMPONENTE CONNESSA E COMPONENTE C.P.A.

Riprendiamo la trattazione delle componenti connesse e **c.p.a.** introdotte nel Capitolo 2.

DEFINIZIONE 7.2.0. Una **componente connessa** di X spazio topologico è uno spazio $C \subseteq X$ connesso tale per cui:

$$C \subseteq A \subseteq X \text{ con } A \text{ connesso} \implies C = A \quad (7.2)$$

OSSERVAZIONE.

- Le componenti connesse formano una *partizione* di X .
- Se $x \in X$ si può definire la componente connessa che contiene x :

$$C(x) = \bigcup \{C \subseteq X \mid x \in C, C \text{ connesso}\} \quad (7.3)$$

item Le componenti connesse possono essere viste come classi di equivalenza per la seguente relazione di equivalenza su X :

$$x, y \in X \quad x \sim_C y \iff \exists C \subseteq X \text{ connesso} : x, y \in C \quad (7.4)$$

DIMOSTRAZIONE. Innanzitutto mostriamo che la relazione è di equivalenza:

- **RIFLESSIVA:** $x \sim_C x$ è vero, dato che $\{x\}$ è sempre un connesso.
- **SIMMETRICA:** ovvia dalla definizione.
- **TRANSITIVA:** Supponiamo $x \sim_C y, y \sim_C z$. Allora $\exists C, D \subseteq X$ connessi tale che $x, y \in C$ e $y, z \in D$. Allora $C \cup D$ contiene sia x che z . Inoltre, essendo $y \in C \cap D \implies C \cap D \neq \emptyset$, dunque $C \cup D$ è un connesso: vale $x \sim_C z$.
Mostriamo che le classi di equivalenza sono le componenti connesse per x .
 - \subseteq) Se $C \subseteq X$ è una componente connessa, allora $\forall x, y \in C$ si ha $x \sim_C y$, cioè C è interamente contenuta in $C_0 = [x] = [y]$ classe di equivalenza per \sim_C : $C \subseteq C_0$.
 - \supseteq) Sia $z \in C_0$ classe di equivalenza e sia $x \in C$ componente connessa. Allora: $x \sim_C z \implies \exists T \subseteq X \text{ connesso} : x, z \in T$.

Consideriamo $C \cup T$. C e T sono connessi, $x \in C \cap T \implies C \cap T \neq \emptyset$: $C \cup T$ è ancora connessa. In quanto C è componente connessa, dato che $C \subseteq C \cup T$ per definizione segue che $C = C \cup T$, cioè $T \subseteq C$. Ma allora $z \in C$ e segue che $C_0 \subseteq C$. \square

DEFINIZIONE 7.2.1. Una **componente c.p.a.** di X è una classe di equivalenza per la relazione \sim_A così definita:

$$x, y \in X \quad x \sim_A y \iff \exists \alpha \text{ CAMMINO IN } X : \alpha(0) = x, \alpha(1) = y \quad (7.5)$$

DIMOSTRAZIONE. Mostriamo che sia una relazione di equivalenza:

- **RIFLESSIVA:** $x \sim_A x$ è vero, dato che esiste sempre il **cammino costante** nel punto x :

$$\begin{aligned} c_x : I &\longrightarrow X \\ t &\longmapsto x \end{aligned} \tag{7.6}$$

- **SIMMETRICA:** se $x \sim_A y$ sappiamo che $\exists \alpha : I \longrightarrow X$ tale per cui $\alpha(0) = x$, $\alpha(1) = y$. Possiamo definire il **cammino inverso**:

$$\begin{aligned} \bar{\alpha} : I &\longrightarrow X \\ t &\longmapsto \alpha(1-t) \end{aligned} \tag{7.7}$$

◊ $\bar{\alpha}$ è continuo, perché composizione di applicazioni continue:

$$\begin{aligned} I &\longrightarrow I \xrightarrow{\alpha} X \\ t &\longmapsto 1+t \longmapsto \alpha(1-t) \end{aligned}$$

◊ $\bar{\alpha}(0) = \alpha(1) = y$, $\bar{\alpha}(1) = \alpha(0) = x$.

Allora il cammino $\bar{\alpha}$ definisce $y \sim_A x$.

- **TRANSITIVA:** Supponiamo $x \sim_A y$, $y \sim_A z$. Allora $\exists \alpha, \beta : I \longrightarrow X$ tale che $\alpha(0) = x$, $\alpha(1) = y$, $\beta(0) = y$, $\beta(1) = z$. Usando la **giunzione di cammini**:

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t) & \text{se } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ \beta(2t-1) & \text{se } \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases} \tag{7.8}$$

In particolare:

$$\begin{cases} (\alpha * \beta)(0) = \alpha(0) \\ (\alpha * \beta)(1) = \beta(1) \end{cases}$$

Poiché $\alpha * \beta$ soddisfa le ipotesi del lemma di incollamento, essa è continua e collega con un cammino unico x e z , dunque vale $x \sim_A z$.

□

OSSERVAZIONE.

1. Le componenti **c.p.a.** formano una partizione di X
2. Sia $C \subseteq X$ un sottospazio **c.p.a.** per cui vale che $C \subseteq A \subseteq X$ con A **c.p.a.** $\implies C = A$, allora C è una componente **c.p.a..**
3. In generale le componenti **c.p.a.** non sono né aperte né chiuse.
4. Se A è una componente **c.p.a.**, allora A è **c.p.a.** e dunque **connessa**: A è allora interamente contenuta in una componente connessa, cioè le componenti connesse sono unioni di componenti **c.p.a..**

DIMOSTRAZIONE. INSERIRE DIM PUNTO 2

□

ESEMPIO. Ricordiamo l'esempio della *pulce e il pettine*, cioè lo spazio $X \subseteq \mathbb{R}^2$ descritto da:

$$\begin{aligned} X &= Y \cup \{p\} \\ Y &= (I \times \{0\}) \cup \bigcup_{r \in \mathbb{Z}} (\{r\} \times I) \\ p &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 \right) \end{aligned}$$

Questo spazio X è connesso, non **c.p.a.**: infatti, le componenti **c.p.a.** sono due, Y e $\{p\}$.

7.3 OMOTOPIA TRA FUNZIONI CONTINUE

INTUITIVAMENTE... Dati due spazi topologici X , Y e due funzioni $f, g : X \longrightarrow Y$, si ha un'**omotopia** tra le due funzioni se una funzione può essere “*deformata in modo continuo*” nell'altra (e viceversa).

Per far ciò vogliamo trovare una famiglia di funzioni $\{f_t\}_{t \in [0, 1]}$ tale che ogni funzione $f_t : X \longrightarrow Y$ sia continua e vari “*con continuità*” al variare di $t \in [0, 1]$ fra $f_0 = f$ e $f_1 = g$.

DEFINIZIONE 7.3.O. Due funzioni continue $f, g : X \longrightarrow Y$ si dicono **omotope** se

$\exists F : X \times I \longrightarrow Y$ continua tale che:

$$F(x, 0) = f(x) \quad F(x, 1) = g(x) \quad \forall x \in X \quad (7.9)$$

La funzione F è detta **omotopia** tra f e g ; denotiamo che le funzioni sono omotope con $f \sim g$.

Inoltre, definiamo gli elementi della famiglia di funzioni $\{f_t\}_{t \in [0, 1]}$ nel seguente modo:

$$\forall t \quad f_t := F(\bullet, t) : X \longrightarrow Y : f_0 = f, f_1 = g \quad (7.10)$$

OSSERVAZIONE. Ricordando la definizione di *segmento* (30, 2.5), la funzione:

$$\begin{aligned} I &\longrightarrow \overline{PQ} \\ t &\longmapsto tA + (1-t)B \end{aligned}$$

È biunivoca ed, in particolare, è omeomorfismo.

ESEMPIO. Dato un sottospazio $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ convesso, allora spazio topologico X e per ogni funzione $f, g : X \longrightarrow Y$ continua, allora f e g sono *omotope*.

DIMOSTRAZIONE. L'omotopia è:

$$F : X \times I \longrightarrow Y, F(x, y) = (1-t)f(x) + tg(x)$$

- $\overline{f(x)g(x)} \subseteq Y$, cioè $(1-t)f(x) + tg(x) \in Y \forall x \in X, t \in I$.
- F è continua perché composizione di funzioni continue:

$$\begin{array}{ccccccc} X \times I & \longrightarrow & Y \times Y \times I & \subseteq & \mathbb{R}^{2n+1} & \longrightarrow & Y \subseteq \mathbb{R}^n \\ (x, t) & \longmapsto & (f(x), g(x), t) & \longmapsto & (1-t)f(x) + tg(x) & & \end{array}$$

- $F(x, 0) = f(x), F(x, 1) = g(x) \forall x \in X$.

□

OSSERVAZIONE. Sia $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ (non necessariamente convesso!) e $f, g : X \longrightarrow Y$ continue tale che $\overline{f(x)g(x)} \subseteq Y \forall x \in X$. Allora f è omotopa a g con la stessa omotopia F definita nel caso di Y convesso.

ATTENZIONE! Nel parlare di omotopie è estremamente importante verificare che siano ben definite! Infatti, prendiamo ad esempio $Y = S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ e le funzioni costanti in p e in q , rispettivamente $f : X \longrightarrow S^1$ e $g : X \longrightarrow S^1$.

Considerata $F : X \times I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $F(x, y) = (1-t)f(x) + tg(x) = (1-t)p + tq$, essa non è ben definita in Y : presi due punti della sfera S^1 il segmento non è mai contenuto in essa!

LEMMA 7.3.0. Siano X, Y due spazi topologici. L'omotopia è una relazione di equivalenza sull'insieme delle funzioni continue da X a Y .

DIMOSTRAZIONE.

- **RIFLESSIVA:** Sia $f : X \longrightarrow Y$ continua. Consideriamo:

$$F : X \times I \longrightarrow Y$$

Tale che $F(x, t) = f(x)$. Essa è:

- ◊ Continua perché lo è f .
- ◊ $F(x, 0) = F(x, 1) = f(x) \forall x \in X$.

Allora $f \sim f$.

- **SIMMETRICA:** Supponiamo $f \sim g$, cioè $\exists F : X \times I \longrightarrow Y$ tale che:

$$F(x, 0) = f(x), F(x, 1) = g(x) \forall x \in X$$

Consideriamo $G : X \times I \longrightarrow Y$ tale che $G(x, t) = F(x, 1-t)$. Essa è:

- ◊ Continua perché composizione di funzioni continue.

- ◊ $G(x, 0) = F(x, 1) = g(x), G(x, 1) = F(x, 0) = f(x) \forall x \in X$.

Allora $g \sim f$.

- **TRANSITIVA:** Siano $f, g, h : X \longrightarrow Y$ continue, $f \sim g$ e $g \sim h$, cioè:

$$\exists F : X \times I \longrightarrow Y, G : X \times I \longrightarrow Y$$

$$\begin{aligned} F(x, 0) &= f(x) & G(x, 0) &= g(x) & \forall x \in X \\ F(x, 1) &= g(x) & G(x, 1) &= h(x) \end{aligned}$$

Consideriamo $H : X \times I \longrightarrow Y$:

$$H(x, t) = \begin{cases} F(x, 2t) & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ G(x, 2t-1) & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

◊ H è continua per il lemma di incollamento:

* È ben definita per $t = \frac{1}{2}$.

* H è continua separatamente su $X \times [0, \frac{1}{2}]$ e $X \times [\frac{1}{2}, 1]$, entrambi chiusi.

◊ $H(x, 0) = F(x, 0) = f(x), H(x, 1) = G(x, 1) = h(x) \forall x \in X$.

Allora $f \sim h$. □

LEMMA 7.3.1. COMPOSIZIONE DI OMOTOPIE (MANETTI 10.13)

Siano X, Y, Z spazi topologici e siano $f_1, f_2 : X \longrightarrow Y$ continue ed omotope, $g_1, g_2 : Y \longrightarrow Z$ continue ed omotope. Allora $g_1 \circ f_1, g_2 \circ f_2 : X \longrightarrow Z$ sono omotope:

$$f_1 \sim f_2, g_1 \sim g_2 \implies g_1 \circ f_1 \sim g_2 \circ f_2 \quad (7.11)$$

DIMOSTRAZIONE. Sappiamo che:

- $\exists F : X \times I \longrightarrow Y$ continua tale che $F(x, 0) = f_1(x), F(x, 1) = f_2(x) \forall x \in X$.
- $\exists G : Y \times I \longrightarrow Z$ continua tale che $G(y, 0) = g_1(y), G(y, 1) = g_2(y) \forall y \in Y$.

Sia $H : X \times I \longrightarrow Z$ data da $H(x, t) = G(F(x, t), t)$.

- H è continua perché composizione di funzioni continue.
- $H(x, 0) = G(F(x, 0), 0) = G(f_1(x), 0) = g_1(f_1(x)) \forall x \in X$.
- $H(x, 1) = G(F(x, 1), 1) = G(f_2(x), 1) = g_2(f_2(x)) \forall x \in X$.

Allora H è l'omotopia cercata. □

7.4 EQUIVALENZA OMOTOPICA

DEFINIZIONE 7.4.0. Siano X, Y due spazi topologici. Diciamo che X e Y sono **omotopicamente equivalenti**, o che hanno lo stesso **tipo di omotopia**, se esistono due applicazioni continue:

$$f : X \longrightarrow Y \text{ e } g : Y \longrightarrow X \quad (7.12)$$

Tali che:

$$g \circ f \sim Id_X \text{ e } f \circ g \sim Id_Y \quad (7.13)$$

In tal caso f e g si dicono **equivalenze omotopiche**.

OSSERVAZIONE.

1. Se X e Y sono *omeomorfi*, allora sono anche *omotopicamente equivalenti*.
2. Consideriamo $X = \mathbb{R}^n$ in topologia Euclidea e $Y = \{\text{1 punto}\}$. Allora X e Y sono omotopicamente equivalenti.

DIMOSTRAZIONE.

I L'omotopia è una relazione riflessiva, dunque se abbiamo $h = k$ e $h \sim h$, allora si ha $h \sim k$. Nel caso di un isomorfismo, preso f e la sua inversa g , possiamo affermare:

$$\begin{cases} g \circ f = Id_X \\ f \circ g = Id_Y \end{cases} \implies \begin{cases} g \circ f \sim Id_X \\ f \circ g \sim Id_Y \end{cases}$$

II Consideriamo $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow Y = \{\text{1 punto}\}$ e $g : Y = \{\text{1 punto}\} \longrightarrow \mathbb{R}^n$
 $\underline{x} \longmapsto \underline{0}$.
 f e g sono *continue*, inoltre:

$$\begin{aligned} f \circ g : Y = \{\text{1 punto}\} &\longrightarrow Y = \{\text{1 punto}\} \implies f \circ g = Id_Y \\ g \circ f : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n \implies g \circ f = O_{\mathbb{R}^n}(\text{applicazione nulla}) \\ \underline{x} &\longmapsto \underline{0} \end{aligned}$$

Per l'osservazione 1) da $f \circ g = Id_Y$ a $f \circ g \sim Id_Y$.

Abbiamo che $g \circ f = O_{\mathbb{R}^n}$ è omotopa a $Id_{\mathbb{R}^n}$, poiché \mathbb{R}^n è *convesso* e due applicazioni continue a valori in \mathbb{R}^n sono sempre omotope, come dimostrato nell'esempio 7.2, pag. 82. Una di queste, ad esempio, è la seguente:

$$F : \mathbb{R}^n \times I \longrightarrow \mathbb{R}^n, F(\bar{x}, t) = t \cdot \bar{x}$$

- F è continua.
- $F(\bar{x}, 0) = \underline{0} = (g \circ f)(x)$.
- $F(\bar{x}, 1) = \bar{x} = Id_{\mathbb{R}}^n(\bar{x})$.

□

ATTENZIONE! Se $n > 0$, \mathbb{R}^n e $\{\text{1 punto}\}$ non sono omeomorfi, dato che non possono essere in corrispondenza biunivoca.

ESERCIZIO. Essere omotopicamente equivalenti è una relazione di equivalenza sull'insieme degli spazi topologici.

DIMOSTRAZIONE.

- **RIFLESSIVA:** $X \sim X \iff \exists f, g$ continue per cui $g \circ f \sim Id_X$, $f \circ g \sim Id_X$. Ponendo $f \equiv Id_X \equiv g$ vale banalmente $g \circ f = f \circ g = Id_X \sim Id_X$.
- **SIMMETRICA:** Da $X \sim Y$ sappiamo che $\exists f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow X$ continue per cui $g \circ f \sim Id_X$, $f \circ g \sim Id_Y$; se vogliamo mostrare $Y \sim X$ dobbiamo cercare $h : Y \longrightarrow X$, $k : X \longrightarrow Y$ per cui $k \circ h \sim Id_Y$, $h \circ k \sim Id_X$. Ponendo $h \equiv g$ e $k \equiv f$, esse soddisfano la richiesta.

■ TRANSITIVA: Da $X \sim Y$ e $Y \sim Z$:

◊ $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow X$ continue tali che $g \circ f \sim Id_X$, $f \circ g \sim Id_Y$.

◊ $h : Y \longrightarrow Z$, $k : Z \longrightarrow Y$ continue tali che $k \circ h \sim Id_Y$, $h \circ k \sim Id_Z$.

Vogliamo trovare $a : X \longrightarrow Z$, $b : Z \longrightarrow X$ continue tali che $b \circ a \sim Id_X$, $a \circ b \sim Id_Z$. Se definiamo:

$$a := h \circ f : X \longrightarrow Z$$

$$b := g \circ k : Z \longrightarrow X$$

Si ha allora:

$$b \circ a = (g \circ k) \circ (h \circ f) = g \circ (k \circ h) \circ f$$

$$a \circ b = (h \circ f) \circ (g \circ k) = h \circ (f \circ g) \circ k$$

Dalla composizione di funzioni omotope:

$$\begin{aligned} f \sim f & \implies (k \circ h) \circ f \sim Id_Y \circ f & \implies g \circ (k \circ h) \circ f \sim g \circ Id_Y \circ f \\ k \circ h \sim Id_Y & & g \sim g \\ & & \\ g \circ (k \circ h) \circ f & \sim g \circ Id_Y \circ f & \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ b \circ a & \sim g \circ f & \\ h \sim h & & \backslash \\ & & Id_X \end{aligned}$$

$\implies b \circ a \sim Id_X$. In modo analogo:

$$\begin{aligned} k \sim k & \implies (f \circ g) \circ k \sim Id_Y \circ k & \implies h \circ (f \circ g) \circ k \sim g \circ Id_Y \circ f \\ f \circ g \sim Id_Y & & h \sim h \\ & & \\ h \circ (f \circ g) \circ k & \sim h \circ Id_Y \circ k & \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ a \circ b & \sim h \circ k & \\ h \sim h & & \backslash \\ & & Id_Z \end{aligned}$$

$\implies a \circ b \sim Id_Z$.

□

DEFINIZIONE 7.4.1. Uno spazio topologico è **contraibile** o *contrattile* se ha lo stesso tipo di omotopia di un punto.

ESEMPI.

1. \mathbb{R}^n è contraibile: si veda l'osservazione precedente.

2. Dall'esempio seguente, per transitività del tipo di equivalenza, si può affermare che *tutti* i \mathbb{R}^n sono tutti omotopicamente equivalenti tra di loro.
3. Ogni sottospazio $X \subseteq \mathbb{R}^n$ convesso di è contraibile.
4. Ogni sottospazio $X \subseteq \mathbb{R}^n$ stellato di è contraibile.

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo l'esempio 4): l'esempio 3) è automaticamente dimostrato perché un convesso è stellato per ogni suo punto.

Sia $P_0 \in X$ il punto rispetto al quale X è stellato e consideriamo l'inclusione del singoletto $\{P_0\}$ in X e la funzione costante da X al punto, entrambe costanti:

$$i : \{P_0\} \hookrightarrow X \quad g : X \longrightarrow \{P_0\}$$

Allora consideriamo:

- $g \circ i : \{P_0\} \longrightarrow \{P_0\}$ è pari all'identità $Id_{\{P_0\}}$ del singoletto e dunque ovviamente omotopa ad essa.
- $\varphi := i \circ g : X \longrightarrow X$ è una funzione costante. Vogliamo dimostrare che φ è omotopa a Id_X . Siccome X è stellato rispetto a P_0 , $\forall P \in X$ si ha $\overline{PP_0} \subseteq X$. Allora definiamo la funzione:


$$\begin{aligned} F : X \times I &\longrightarrow X \\ (P, t) &\longmapsto tP + (1-t)P_0 \end{aligned}$$

Ha senso definire ciò proprio perché su $X \subseteq \mathbb{R}^n$ ci sono le operazioni di somma e prodotto per scalari. Oltre ad essere ben definita per quanto detto prima ($F(P, t) \in X$), F è continua e $F(P, 0) = P_0 = \varphi(0)$, $F(P, 1) = P = Id_X(P)$. Si ha l'omotopia cercata. □

ESEMPIO. $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ non è né convesso, né stellato.

LEMMA 7.4.0. Se X è contraibile, allora X è c.p.a..

DIMOSTRAZIONE. Con il seguente diagramma ricordiamo le funzioni in gioco con la comprimibilità.



Necessariamente dobbiamo mappare g ad un punto di X , ad esempio x_0 .

Il singoletto e X sono in equivalenze omotopica, in particolare da ciò si ha una funzione costante in x_0 :

$$\varphi := g \circ f : X \longrightarrow X$$

$$x \longmapsto x_0$$

In quanto f e g sono in equivalenza omotopica, si ha che $\varphi \sim Id_X$, cioè esiste un omotopia fra le due funzioni:

$$F : X \times I \longrightarrow X \text{ continua} : F(x, 0) = \varphi(x) = x_0, F(x, 1) = Id_X(x) = x \quad \forall x \in X$$

Fissato $x \in X$ sia $\alpha : I \longrightarrow X$ dato da $\alpha(t) = F(x, t)$:

- α è continua perché lo è f .
- $\alpha(0) = F(x, 0) = x_0, \alpha(1) = F(x, 1) = x$.

Segue che α è un cammino da x_0 a un qualunque punto x in X , dunque X è c.p.a.. \square

ESERCIZIO. Se X e Y sono omotopicamente equivalenti, allora:

1. X è c.p.a. $\iff Y$ è c.p.a..
2. X è connesso $\iff Y$ è connesso.

DIMOSTRAZIONE. Siano f, g le equivalenze omotopiche.

$$\begin{array}{ccc} X & \begin{matrix} \nearrow f \\ \searrow g \end{matrix} & Y \end{array}$$

I Se consideriamo $f \circ g \sim Id_Y$, l'omotopia che la definisce è:

$$F : Y \times I \longrightarrow Y : F(y, 0) = f(g(y)), F(y, 1) = y \quad \forall y \in Y$$

Possiamo usare F per costruire, ad $y \in Y$ fissato, un arco in Y che collega y ad un punto di $f(X) \subseteq Y$. Infatti, consideriamo $\alpha : I \longrightarrow Y$ dato da $\alpha(t) = F(y, t)$:

- α è continua perché lo sono f e g .
- $\alpha(0) = F(y, 0) = f(g(y)) \in f(X) \subseteq Y, \alpha(1) = F(y, 1) = y$.

\Rightarrow) Supponendo X c.p.a., allora $f(X)$ è c.p.a.. Per i ragionamenti appena fatti abbiamo che ogni punto di Y ha un arco che lo collega ad un punto di $f(X)$, dunque per giunzione di cammini anche Y è c.p.a..

\Leftarrow) Supponendo che Y sia c.p.a., applicando all'equivalenza omotopica $g : Y \longrightarrow X$ un procedimento analogo a \Rightarrow) si ha che X è c.p.a.^a.

II Sia X connesso (ma non c.p.a., altrimenti ricadiamo nel punto 1) dell'esercizio), mentre supponiamo che Y si può scrivere come unione disgiunta di due aperti A e B : $Y = A \cup B$. Ma allora:

$$X = f^{-1}(Y) = f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$$

Per continuità di f anche $f^{-1}(A)$ e $f^{-1}(B)$ sono aperti disgiunti in X connesso. Segue che necessariamente uno dei due deve essere vuoto^b, ad esempio $f^{-1}(A) = \emptyset$, cosicché $X = f^{-1}(B)$.

Per i ragionamenti visti nel punto 1) possiamo trovare un arco che collega un qualsiasi punto $y \in Y$ con $f(g(y)) \in f(X)$. In particolare, dato che $f \circ g$ mappa Y in B , si avrà $f(g(y)) \in B$: ma allora $y \in B$ necessariamente, dato che se fosse in A i due aperti non sarebbero disgiunti! Per l'arbitrarietà di y segue che $A = \emptyset$ e dunque anche Y è connesso.

Il viceversa è analogo.

□

^aIn realtà è sufficiente, per i ragionamenti visti sopra, dire che se X e Y sono omotopicamente equivalenti, allora X è c.p.a. $\iff f(X)$ è c.p.a..

^bIn quanto se non fosse così, X non sarebbe connesso.

ESEMPIO. Le sfere $S^n \forall n \geq 1$ sono spazi topologici c.p.a. *non* contraibili.

7.5 RETRATTI E RETRATTI DI DEFORMAZIONE

DEFINIZIONE 7.5.0. Sia X uno spazio topologico e $A \subseteq X$ un suo sottospazio. Diciamo che A è un **retratto** di X se:

$$\exists r : X \longrightarrow A \text{ continua} : r|_A = Id_A, \text{ cioè} : r(a) = a \forall a \in A \quad (7.14)$$

In tal caso r è detta **retrazione**.

OSSERVAZIONE. Se r è una retrazione, per costruzione è suriettiva, dunque A **eredita** da X tutte le proprietà topologiche che si trasmettono per mappe continue (ad esempio connesso, c.p.a., compatto).

ESEMPI.

- Dato $x_0 \in X$, $\{x_0\}$ è sempre un retratto: infatti la mappa costante $X \longrightarrow (x_0)$ soddisfa banalmente le ipotesi di retrazione.
- Presi $X = [0, 1]$, $A = (0, 1]$ non è un retratto di X (non è compatto!).
- Presi $X = [0, 1]$, $\tilde{A} = \{0, 1\}$ non è un retratto (non è *connesso*!).

ESEMPIO. LA RETRAZIONE RADIALE.

Sia $X = \mathbb{R}^n \setminus \{\underline{0}\}$ e $A = S^{n-1} \subseteq X$. Vogliamo definire una retrazione di X su A , cioè una funzione continua $r : \mathbb{R}^n \setminus \{\underline{0}\} \longrightarrow A = S^{n-1}$ tale che $r|_{S^{n-1}} = Id_{S^{n-1}}$. Definiamo allora la **retrazione radiale**:

$$\begin{aligned} r : \mathbb{R}^n \setminus \{\underline{0}\} &\longrightarrow S^{n-1} \\ \underline{x} &\longmapsto r(\underline{x}) = \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|} \end{aligned} \quad (7.15)$$

- r è ben definita perché $\underline{x} \neq \underline{0} \implies \|\underline{x}\| \neq 0$.
- r continua.
- Se $\underline{x} \in S^{n-1}$, allora $\|\underline{x}\| = 1$, cioè $\forall \underline{x} \in S^{n-1} r(\underline{x}) = \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|} = \underline{x}$.

DEFINIZIONE 7.5.1. Sia X uno spazio topologico e $A \subseteq X$ un suo sottospazio. Diciamo che A è un **retratto di deformazione** se:

- $r|_A = Id_A$, cioè r è un retratto.
- Se $i : A \hookrightarrow X$ è l'inclusione di A in X , allora $i \circ r : X \longrightarrow X$ è omotopa all'identità di X ($i \circ r \sim Id_X$).

OSSERVAZIONE. Se A è un retratto di deformazione di X , allora A e X hanno lo stesso tipo di omotopia.

DIMOSTRAZIONE.

- $r : X \longrightarrow A$ e $i : A \hookrightarrow X$ sono continue.
- $i \circ r \sim Id_X$ per ipotesi.
- $r \circ i : A \longrightarrow A$ è la restrizione di r ad A che, per ipotesi, è proprio l'identità di A , cioè $r \circ i = r|_A = Id_A$ e banalmente sono omotope.

□

ESEMPIO. Mostriamo che $S^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n \setminus \{\underline{0}\}$ è un retratto di deformazione. Sfruttiamo la retrazione radiale definita a pag. 89:

$$\begin{aligned} r : \mathbb{R}^n \setminus \{\underline{0}\} &\longrightarrow S^{n-1} \\ \underline{x} &\longmapsto r(\underline{x}) = \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|} \end{aligned}$$

Considero ora l'inclusione, definendo per comodità $X = \mathbb{R}^n \setminus \{\underline{0}\}$:

$$\begin{aligned} i : S^{n-1} &\longrightarrow X \\ r : X &\longrightarrow X \\ \underline{x} &\longmapsto \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|} \\ \tilde{r} := i \circ r : X &\longrightarrow X \\ \underline{x} &\longmapsto \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|} \end{aligned}$$

Vogliamo che \tilde{r} sia omotopa a Id_X . Osserviamo che $\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\underline{0}\} = X$ il segmento da \underline{x} a $\frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|}$ non contiene, per costruzione, l'origine: allora esso è interamente contenuto in $\mathbb{R}^n \setminus \{\underline{0}\} = X$. Dunque, riprendendo l'osservazione di pag. 83 definiamo l'omotopia:

$$\begin{aligned} F : X \times I &\longrightarrow X \\ (\underline{x}, t) &\longmapsto (1-t)\underline{x} + t\frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|} \end{aligned}$$

Infatti F è ben definita, continua e $F(\underline{x}, 0) = \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|} = \tilde{r}(\underline{x})$, $F(\underline{x}, 1) = \underline{x} = Id_X(\underline{x})$.

COROLLARIO 7.5.0. In generale vale che S^{n-1} è retratto di deformazione di $\mathbb{R}^n \setminus \{1 \text{ punto}\}$; in particolare hanno lo stesso tipo di omotopia.

INTUITIVAMENTE... Se l'omeomorfismo permette di deformare uno spazio *mantenendo certe qualità*, l'equivalenza omotopica risulta essere una forma **più debole** di trasformazione, in cui posso sempre deformare uno spazio *perdendo* tuttavia certe qualità. Riprendendo l'intuizione (non sempre corretta) di omeomorfismo enunciata nel Capitolo 1, possiamo vedere allora l'equivalenza omotopica come una deformazione che *piega* e *allunga* uno spazio senza formare *strappi* (f continua) ma che *permette* fino ad un certo punto *sovraposizioni* e *incollamenti* (ad esempio, non posso far sparire alcuni fori né

ammassare indiscriminatamente troppi punti).

Dunque, sotto queste condizioni, posso rendere la *retta* un *punto*, mentre il *piano* senza un punto si può trasformare in una *circonferenza*. Allo stesso tempo però, non posso “concentrare” la *sfera* in uno solo *punto*.

Ancor più che con il ragionamento intuitivo sull’omeomorfismo è necessario esercitare **estrema cautela** nell’applicare questa nozione euristica di omotopia.

DEFINIZIONE 7.5.2. Un **bouquet di n circonferenze** è uno spazio topologico ottenuto unendo in un punto n copie di S^1 .

ESEMPI. ALTRI ESEMPI DI EQUIVALENZE OMOTOPICHE.

1. $\mathbb{R}^2 \setminus \{2 \text{ punti}\}$ ha lo stesso tipo di omotopia di un *bouquet di due circonferenze*: si può ottenere attraverso una composizione (continua) di retrazioni radiali e lineari.
2. $\mathbb{R}^2 \setminus \{n \text{ punti}\}$ ha lo stesso tipo di omotopia di un *bouquet di n circonferenze*.
3. $\mathbb{R}^3 \setminus \{1 \text{ retta}\}$ ha lo stesso tipo di omotopia di $\mathbb{R}^2 \setminus \{1 \text{ punto}\}$ per retrazioni lineari, dunque ha la stessa omotopia di S^1 per i ragionamenti precedenti.
4. Per $\mathbb{R}^3 \setminus \{2 \text{ rette}\}$ dobbiamo distinguere a seconda della relazione fra le due rette.
 - Se le rette sono **disgiunte**, X è sempre omeomorfo a:

$$\mathbb{R}^3 \setminus \{\text{asse } z\} \setminus \{x = y = 1\} = \tilde{X}$$

Cioè lo spazio \mathbb{R}^3 privato di due rette perpendicolari al piano e distinte. Considerato ora il piano $Y = \{\text{piano } xy\} \setminus \{(0,0), (1,1)\}$, questo risulta un retratto di deformazione di \tilde{X} con retrazione:

$$\begin{aligned} r : \tilde{X} &\longrightarrow Y \\ (x, y, z) &\longmapsto (x, y, 0) \end{aligned}$$

Infatti la funzione è sempre ben definita e continua e, considerata la restrizione di r ad Y , segue che banalmente che è l’identità di Y in quanto tutti i punti di Y hanno già la forma $(x, y, 0)$. Guardando invece $\tilde{r} = i \circ r$ con $i : Y \hookrightarrow \tilde{X}$, un’omotopia con $Id_{\tilde{X}}$ è:

$$F : \tilde{X} \times I \longrightarrow \tilde{X} : F((x, y, z), t) = (x, y, tz)$$

Infatti F è banalmente ben definita continua, con $F(\underline{x}, 0) = (x, y, 0) = \tilde{r}(\underline{x})$ e $F(\underline{x}, 1) = (x, y, z) = Id_{\tilde{X}}(\underline{x})$.

Segue che \tilde{X} , e dunque anche X per omeomorfismo, ha la stessa omotopia di $\mathbb{R}^2 \setminus \{2 \text{ punti}\}$ e di un *bouquet di due circonferenze*.

- Se le due rette sono incidenti, a meno di omeomorfismi si intersecano nell’origine. Consideriamo dunque $X = \mathbb{R}^3 \setminus \{r_1 \cup r_2\}$ e lo spazio $A = S^2 \setminus \{P_1, P_2, Q_1, Q_2\}$. Se prendiamo la retrazione:

$$\begin{aligned} r : X &\longrightarrow A \\ \underline{x} &\longmapsto \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|} . \end{aligned}$$

e l'omotopia:

$$\tilde{r} := \begin{array}{c} i \circ r : X \longrightarrow X \\ \underline{x} \longmapsto \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|} \end{array}$$

Si verifica in modo analogo a come visto nel caso della sfera e dello spazio privato dell'origine (esempio a pagina 7.6), trattando con una *retrazione radiale* ben definita e la sua omotopia nota, che A è retratto di deformazione di X . Segue allora che hanno lo stesso tipo di omotopia.

8

CAPITOLO

IL GRUPPO FONDAMENTALE

“BEEP BOOP INSERIRE CITAZIONE QUA BEEP BOOP.”

NON UN ROBOT, UN UMANO IN CARNE ED OSSA BEEP BOOP.


8.1 OMOTOPIE FRA CAMMINI

NOTAZIONE Se non specificato differentemente, useremo I per indicare l'intervallo $[0, 1]$.

DEFINIZIONE 8.1.0. OMOTOPIA DI CAMMINI.

Siano $\alpha, \beta : I \longrightarrow X$ due cammini da a a b , cioè con *stessi estremi*. Allora α, β sono **cammini omotopi** se $\exists F : I \times I \longrightarrow X$ tale che:

$$\begin{cases} F(t, 0) = \alpha(t) & \forall t \in I \text{ è omotopia tra } \alpha \text{ e } \beta \\ F(t, 1) = \beta(t) \\ F(0, s) = a & \forall s \in I \text{ } F(\bullet, s) \text{ è sempre un cammino tra } a \text{ e } b \\ F(1, s) = b \end{cases} \quad (8.1)$$



F è detta **omotopia di cammini** o **omotopia a estremi fissi**.

DEFINIZIONE 8.1.1. INSIEME DEI CAMMINI.

Indichiamo con $\Omega(X; a, b)$ l'**insieme dei cammini** in X da a a b .

OSSERVAZIONE. L'omotopia di cammini è una relazione di equivalenza su $\Omega(X; a, b)$.

DIMOSTRAZIONE.

- **RIFLESSIVA:** $\alpha \sim \alpha$? Presa $F(t, s) = \alpha(t)$, essa è ben definita, continua e:

$$F(t, 0) = \alpha(t), F(t, 1) = \alpha(t), F(0, s) = \alpha(0) = a, F(1, s) = \alpha(1) = b$$

Cioè è omotopia di cammini tra α e se stessa.

- **SIMMETRICA:** Da $\alpha \sim \beta$ sappiamo che esiste F omotopia di cammini per cui:

$$F(t, 0) = \alpha(t), F(t, 1) = \beta(t), F(0, s) = a, F(1, s) = b$$

Per avere $\beta \sim \alpha$, basta prendere $\tilde{F}(t, s) = F(t, 1 - s)$: essa è ben definita, continua e:

$$\begin{aligned} \tilde{F}(t, 0) &= F(t, 1) = \beta(t), \quad \tilde{F}(t, 1) = F(t, 0) = \alpha(t) \\ \tilde{F}(0, s) &= F(0, s) = a, \quad \tilde{F}(1, s) = F(1, s) = b \end{aligned}$$

Cioè è omotopia di cammini tra β e α .

- **TRANSITIVA:** Da $\alpha \sim \beta$ abbiamo:

$$\begin{cases} F(t, 0) = \alpha(t) \\ F(t, 1) = \beta(t) \end{cases} \quad \begin{cases} F(0, s) = a \\ F(1, s) = b \end{cases}$$

Mentre da $\beta \sim \gamma$:

$$\begin{cases} G(t, 0) = \beta(t) \\ G(t, 1) = \gamma(t) \end{cases} \quad \begin{cases} G(0, s) = a \\ G(1, s) = b \end{cases}$$

Definita allora la seguente funzione:

$$H(t, s) = \begin{cases} F(t, 2s) & \text{se } s \in [0, \frac{1}{2}] \\ G(t, 2s - 1) & \text{se } s \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Essa è ben definita, continua per il lemma di incollamento e tale per cui:

$$\begin{aligned} H(t, 0) &= F(t, 0) = \alpha(t), \quad H(t, 1) = G(t, 1) = \gamma(t) \\ H(0, s) &= a, \quad H(1, s) = b \end{aligned}$$

Cioè è omotopia di cammini tra α e γ . □

RICORDIAMO... Abbiamo già definito due “operazioni” fra insiemi di cammini, senza averle necessariamente formalizzate:

- PRODOTTO DI CAMMINI: $\Omega(X; a, b) \times \Omega(X; b, c) \longrightarrow \Omega(X; a, c)$
 $(\alpha, \beta) \xrightarrow{\hspace{10em}} \alpha * \beta$
- INVERSIONE DI CAMMINI: $\Omega(X; a, b) \longrightarrow \Omega(X; b, a)$
 $\alpha \xrightarrow{\hspace{10em}} \bar{\alpha}$

OSSERVAZIONE. Si ha $\bar{\bar{\alpha}} = \alpha$. Infatti:

$$\bar{\alpha}(t) = \alpha(1-t) \implies \bar{\bar{\alpha}}(t) = \bar{\alpha}(1-t) = \alpha(t)$$

LEMMA 8.1.0. COMPOSIZIONI DI OMOTOPIE DI CAMMINI (KOSNIOWSKI, 14.2)

Dati $\alpha, \alpha' \in \Omega(X; a, b)$ e $b, b' \in \Omega(X; b, c)$, parlando in termini di omotopie di cammini:

$$\alpha \sim \alpha' \text{ e } \beta \sim \beta' \implies \alpha * \beta \sim \alpha' * \beta' \quad (8.2)$$

DIMOSTRAZIONE. Esistono $F, G : I \times I \longrightarrow X$ tali che:

$$\begin{aligned} F(t, 0) &= \alpha(t) & F(0, s) &= a & \forall t, s \in I \\ F(t, 1) &= \alpha'(t) & F(1, s) &= b & \\ G(t, 0) &= \beta(t) & G(0, s) &= b & \forall t, s \in I \\ G(t, 1) &= \beta'(t) & G(1, s) &= c & \end{aligned}$$

Consideriamo $H : I \times I \longrightarrow X$ data da:

$$H(t, s) = \begin{cases} F(2t, s) & \text{se } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ F(2t - 1, s) & \text{se } \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

- H è ben definita per $t = \frac{1}{2}$
- H è continua per il lemma di incollamento, essendo definito sui chiusi $[0, \frac{1}{2}] \times I$ e $[\frac{1}{2}, 1] \times I$ è continua su di essi.
- $H(t, 0) = (\alpha * \beta)(t)$
- $H(t, 1) = (\alpha' * \beta')(t)$
- $H(0, s) = F(0, 0) = a$
- $H(1, s) = G(1, 0) = c$

H è l'omotopia a estremi fissi cercata. \square

LEMMA 8.1.1. CAMBIAMENTO DI PARAMETRI (MANETTI, 11.3)

Sia $\alpha : I \longrightarrow X$ un cammino e $\varphi : I \longrightarrow I$ una funzione continua tale che $\varphi(0) = 0$ e $\varphi(1) = 1$. Allora $\alpha \circ \varphi \sim \alpha$.

DIMOSTRAZIONE. Sia $F : I \times I \longrightarrow X$ data da $F(t, s) = \alpha(s\varphi(t) + (1-s)t)$.

- $s\varphi(t) + (1-s)t$ è una combinazione lineare che è contenuta in $I \subseteq \mathbb{R} \forall t, s \in I$ per convessità dell'intervallo I , da cui segue che F è ben definita.

- F continua perché composizione di funzioni continue.
 - $F(t, 0) = \alpha(t)$
 - $F(t, 1) = \alpha(\varphi(t))$
 - $F(0, s) = \alpha(0)$
 - $F(1, s) = \alpha(s + 1 - s) = \alpha(1)$
- $\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} = \forall t \in I \text{ è omotopia}$
 $\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} = \forall s \in I \text{ ha estremi fissi}$

H è l'omotopia a estremi fissi cercata tra α e $\alpha \circ \varphi$. \square

DEFINIZIONE 8.1.2. CAMMINO COSTANTE.

Il **cammino costante** C_a nel punto a è un cammino che non si sposta mai da esso, cioè è descritto da una funzione costante nel punto:

$$\begin{aligned} C_a : I &\longrightarrow X \\ t &\longmapsto a \end{aligned} \tag{8.3}$$

PROPOSIZIONE 8.1.0. (MANETTI, 11.4 E 11.6)

Sia X spazio topologico e si considerino i cammini:

$$\alpha \in \Omega(X; a, b) \quad \beta \in \Omega(X; b, c) \quad \gamma \in \Omega(X; c, d)$$

Valgono le seguenti proprietà:

1. **ASSOCIAZIVITÀ:** $(\alpha * \beta) * \gamma \sim \alpha * (\beta * \gamma)$.
2. **RAPPORTO COI CAMMINI COSTANTI:** $C_a * \alpha \sim \alpha \sim \alpha * C_b$.
3. **INVERSO:** $\alpha * \bar{\alpha} \sim C_a$ e $\bar{\alpha} * \alpha \sim C_a$.

DIMOSTRAZIONE.

I Scriviamo i due cammini:

$$\begin{aligned} ((\alpha * \beta) * \gamma)(t) &= \begin{cases} \alpha(4t) & t \in [0, \frac{1}{4}] \\ \beta(4t-1) & t \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}] \\ \gamma(2t-1) & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases} \\ ((\alpha * (\beta * \gamma)))(t) &= \begin{cases} \alpha(2t) & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \beta(4t-2) & t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}] \\ \gamma(2t-3) & t \in [\frac{3}{4}, 1] \end{cases} \end{aligned}$$

I due cammini differiscono per una *riparametrizzazione* $\phi : I \longrightarrow I$ di $\alpha * (\beta * \gamma)$ definita in questo modo:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2s = 4t \\ 4s - 2 = 4t - 2 \\ 4s - 3 = 4t - 1 \end{cases} &\implies \begin{cases} s = 2t & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ s = t + \frac{1}{4} & t \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}] \\ s = \frac{t}{2} + \frac{1}{2} & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases} \\ \phi(t) &= \begin{cases} 2t & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ t + \frac{1}{4} & t \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}] \\ \frac{t}{2} + \frac{1}{2} & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases} \end{aligned}$$

- ϕ è ben definita e continua per lemma di incollamento.

- $\phi(0) = 0$ e $\phi(1) = 1$.
- $((\alpha * (\beta * \gamma)))(\phi(t)) = ((\alpha * \beta) * \gamma)(t)$.

Per il lemma del cambiamento di parametro i due cammini sono omotopi.

II Scriviamo i due cammini:

$$(C_a * \alpha)(t) = \begin{cases} a & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \alpha(2t-1) & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

$$(\alpha * C_b)(t) = \begin{cases} \alpha(2t) & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ b & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

I due cammini differiscono per delle *riparametrizzazioni* di α : $\phi : I \longrightarrow I$ e $\psi : I \longrightarrow I$ definite così:

$$\phi(t) = \begin{cases} 0 & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ 2t-1 & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases} \quad \psi(t) = \begin{cases} 2t & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ 1 & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$


- ϕ e ψ sono ben definite e continue per lemma di incollamento.
- $\phi(0) = 0$, $\psi(0) = 0$ e $\phi(1) = 1$, $\psi(1) = 1$.
- $(C_a * \alpha)(t) = \alpha(\phi(t))$ e $(\alpha * C_b)(t) = \alpha(\psi(t))$.

Per il lemma del cambiamento di parametro i due cammini sono entrambi omotopi a α , si hanno quindi le equivalenze omotopiche cercate.

III È sufficiente dimostrare che $\alpha * \bar{\alpha} \sim C_a$. Possiamo immaginare di rappresentare tutte le parametrizzazioni di cammini definiti da un omotopia sul piano $I \times I$, con t sulle ascisse e s sulle ordinate.

In questo modo i punti a di inizio e b di fine sono rappresentati dai segmenti verticali in $t = 0$ e in $t = 1$, mentre i cammini α di inizio e β fine sono segmenti orizzontali in $s = 0$ e $s = 1$. Dunque, all'interno di $I \times I$ possiamo trovare (fissato s) tutti i cammini $F(\bullet, s)$ di estremi a e b compresi tra i cammini α e β : essi sono rappresentati da segmenti orizzontali.

Nel nostro caso, possiamo considerare il punto a di inizio e il punto b di fine del cammino α . Nei due cammini "esterni" o il cammino non si sposta mai da a (C_a), oppure percorre tutto il cammino α fino a b (che è raggiunto per $t = \frac{1}{2}$) e torna poi indietro per lo stesso cammino $(\alpha * \bar{\alpha})$. Tuttavia, dobbiamo considerare anche cammini che percorrono α fino ad un punto c *intermedio* fra a e b , stanno fermi in c per poi tornare indietro. Definiamo la seguente omotopia:



$$F(t, s) = \begin{cases} \alpha(2t) & \text{se } 0 \leq t \leq \frac{s}{2} \\ \alpha(s) & \text{se } \frac{s}{2} \leq t \leq 1 - \frac{s}{2} \\ \alpha(2-2t) & \text{se } 1 - \frac{s}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

Verifichiamo che lo sia:

- F è ben definita grazie alla ben definizione di α : tutti i valori di F risultano interni ad X .
- F è continua per il lemma di incollamento.
- $F(t, 0) = \alpha(0) = C_a(t)$, $F(t, 1) = \alpha * \bar{\alpha}(t)$ e $F(0, s) = a = F(1, s)$.

In questo modo teniamo conto della possibilità del cammino di “fermarsi” per un certo tempo in un particolare punto $\alpha(s)$. \square

8.2 GRUPPO FONDAMENTALE

DEFINIZIONE 8.2.O. LACCIO.

Sia X uno spazio topologico e fissiamo un punto $x_0 \in X$. I **lacci** o **cappi** sono i cammini chiusi in X , cioè tutti i cammini il cui punto iniziale e finale coincidono. Il loro insieme si denota dunque come $\Omega(X; x_0, x_0)$.

OSSERVAZIONE. Possiamo notare come $\forall \alpha, \beta \in \Omega(X; x_0, x_0)$ si ha:

$$\alpha * \beta \in \Omega(X; x_0, x_0) \quad \bar{\alpha} \in \Omega(X; x_0, x_0)$$

Allora, se quozientiamo l’insieme dei lacci rispetto alla relazione di equivalenza data dall’omotopia di cammini, esso possiede una struttura di *gruppo*:

$$\pi_1(X, x_0) = \frac{\Omega(X; x_0, x_0)}{\sim} \quad (8.4)$$

Preso un laccio α , indichiamo la sua classe di equivalenza in $\pi_1(X, x_0)$ con $[\alpha]$. Allora:

- Il prodotto di cammini dà un’operazione ben definita su $\pi_1(X, x_0)$ grazie al lemma 8.1 (Kosniowski, 14.2):

$$[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha * \beta] \quad (8.5)$$

- L’operazione appena definita è associativa per il primo punto della proposizione 8.1 (Manetti, 11.4 e 11.6).
- $[C_{x_0}]$ è l’elemento neutro, sempre per la proposizione 8.1 (Manetti, 11.4 e 11.6):

$$[C_{x_0}] \cdot [\alpha] = [\alpha] = [\alpha] \cdot [C_{x_0}] \quad (8.6)$$

- $[\bar{\alpha}]$ è l’ inverso di $[\alpha]$, cioè $[\alpha]^{-1} := [\bar{\alpha}]$, per la proposizione 8.1 (Manetti, 11.4 e 11.6):

$$[\bar{\alpha}] \cdot [\alpha] = [C_{x_0}] = [\alpha] \cdot [\bar{\alpha}] \quad (8.7)$$

ATTENZIONE! La proposizione 8.1 (Manetti, 11.4 e 11.6) ci garantisce che la composizione di cammini omotopi è omotopa ($(\alpha * \beta) * \gamma \sim \alpha * (\beta * \gamma)$), dunque possiamo parlare della *classe* $[\alpha * \beta * \gamma]$. Tuttavia, al di fuori del quoziente non ha senso $\alpha * \beta * \gamma$!

L’ordine con cui congiungiamo i cammini dà luogo a due cammini certamente omotopi, ma non uguali, dato che la parametrizzazione varia^a.

^aQuesto si vede chiaramente nella dimostrazione della proposizione.

DEFINIZIONE 8.2.1. GRUPPO FONDAMENTALE.

Dato uno spazio topologico X e fissato un punto (detto **punto base**) x_0 , il **gruppo fondamentale** con punto base x_0 è il gruppo $\pi_1(X, x_0)$ definito nell'osservazione precedente. Si chiama anche **primo gruppo fondamentale** o **gruppo di Poincaré**.

8.2.1 Dipendenza dal punto base

TEOREMA 8.2.0. Il gruppo fondamentale dipende *solo* dalla componente **c.p.a.** contenente il punto base x .

In altre parole, se $x, y \in X$ appartengono alla stessa componente **c.p.a.**, preso un arco γ da x a y e costruito:

$$\begin{aligned} \gamma_* : \pi_1(X, x) &\longrightarrow \pi_1(X, y) \\ [\alpha] &\longmapsto [\bar{\gamma} * \alpha * \gamma] \end{aligned} \tag{8.8}$$

È ben definito ed è un *isomorfismo* di gruppi, cioè:

$$\pi_1(X, x) \cong \pi_1(X, y) \tag{8.9}$$

RICORDIAMO... Una funzione fra due gruppi $f : (G, \cdot_G) \longrightarrow (H, \cdot_H)$ è un **omomorfismo di gruppi** se:

$$f(a \cdot_G b) = f(a) \cdot_H f(b) \quad \forall a, b \in G$$

Se f è *biettiva*, allora parliamo di **isomorfismo di gruppi**.

DIMOSTRAZIONE.

- γ_* è ben definito in quanto la classe $[\bar{\gamma} * \alpha * \gamma]$ è ben definita per la composizione dei cammini ed è la classe di equivalenza di un cappio di γ ($\bar{\gamma}$ parte da y e raggiunge x , con α compie un cammino chiuso in x per tornare al punto di partenza y).
- γ_* è un omomorfismo di gruppi:

$$\begin{aligned} \gamma_*([\alpha] * [\beta]) &= \gamma_*([\alpha * \beta]) = [\bar{\gamma} * \alpha * \beta * \gamma] = [\bar{\gamma} * \alpha * C_x * \beta * \gamma] \\ &= [\bar{\gamma} * \alpha * \gamma * \bar{\gamma} * \beta * \gamma] = [\bar{\gamma} * \alpha * \gamma] \cdot [\bar{\gamma} * \beta * \gamma] = \gamma_*([\alpha]) \cdot \gamma_*([\beta]) \end{aligned}$$

Infatti, anche l'elemento neutro viene mappato all'elemento neutro del codominio:

$$\gamma_*([C_x]) = [\bar{\gamma} * C_x * \gamma] = [\bar{\gamma} * \gamma] = [C_y]$$

- Possiamo associare in modo analogo al cammino $\bar{\gamma}$ il cammino:

$$\begin{aligned} \bar{\gamma}_* : \pi_1(X, y) &\longrightarrow \pi_1(X, x) \\ [\alpha] &\longmapsto [\gamma * \alpha * \bar{\gamma}] \end{aligned}$$

In modo assolutamente analogo a come visto sopra, si vede che è un omeomorfismo; verifichiamo ora che $\gamma_\#$ e $\bar{\gamma}_\#$ siano l'uno l'inverso dell'altro:

$$\begin{aligned}\bar{\gamma}_\#(\gamma_\#([\alpha])) &= \bar{\gamma}_\#([\bar{\gamma} * \alpha * \gamma]) = [\gamma * \bar{\gamma} * \alpha * \gamma * \bar{\gamma}] = [C_x * \alpha * C_x] = [\alpha] \\ \gamma_\#(\bar{\gamma}([\alpha])) &= \gamma_\#([\gamma * \alpha * \bar{\gamma}]) = [\bar{\gamma} * \gamma * \alpha * \bar{\gamma} * \gamma] = [C_y * \alpha * C_y] = [\alpha]\end{aligned}$$

Segue che allora $\gamma_\#$ è biettiva. \square

OSSERVAZIONI.

- Se due punti x_1 e x_2 stanno in componenti connesse per archi diverse, *non c'è* alcuna relazione tra $\pi_1(X, x_1)$ e $\pi_1(X, x_2)$.
- Se X è **c.p.a.**, il suo gruppo fondamentale è *unico* a meno di isomorfismo.

ESEMPIO. Sia $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ un sottospazio convesso e $y_0 \in Y$. Allora $\pi_1(Y, y_0) = \{1\}$ è **banale**; in particolare, allora $\pi_1(\mathbb{R}^n, y_0)$ è banale per ogni n .

DIMOSTRAZIONE. Sia $[\alpha] \in \pi_1(Y, y_0)$. Vogliamo mostrare che $[\alpha] = [C_{y_0}]$, cioè che $\alpha \sim C_{y_0}$. Consideriamo $F : X \times I \longrightarrow Y$ tale che:

$$F(t, s) = s(\alpha(t)) + (1-s)y_0$$

- F risulta ben definita: è una combinazione convessa al variare di $s \in [0, 1]$ tra $\alpha(t) \in Y$ (per t fissato) e $y_0 \in Y$.
- F è continua perché composizione di applicazioni continue.
- $F(t, 0) = y_0 = C_{y_0}(t)$, $F(t, 1) = \alpha(t)$.
- $F(0, s) = s\alpha(0) + (1-s)y_0 = sy_0 + (1-s)y_0 = y_0$, $F(1, s) = s\alpha(1) + (1-s)y_0 = sy_0 + (1-s)y_0 = y_0$.

Segue che F è un omotopia tra C_{y_0} e α , dunque segue la tesi. \square

DEFINIZIONE 8.2.2. SPAZIO SEMPLICEMENTE CONNESSO.

Uno spazio topologico X è **semplicemente connesso** se è **c.p.a.** e ha gruppo fondamentale **banale**.

ESEMPI.

- \mathbb{R}^n è semplicemente connesso.
- Ogni convesso di \mathbb{R}^n è semplicemente connesso.

8.2.2 Mappe continue e omomorfismo di gruppi

NOTAZIONE $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ è una funzione continua $f : X \longrightarrow Y$ tale che $f(x_0) = y_0$.

OSSERVAZIONE. Consideriamo $f : X \longrightarrow Y$ continua e due cammini α in X da a a b e β in X da b a c .

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\alpha} & X \xrightarrow{f} Y \\ & \curvearrowright & \\ & f \circ \alpha & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\beta} & X \xrightarrow{f} Y \\ & \curvearrowright & \\ & f \circ \beta & \end{array}$$

Si ha che:

1. $f \circ (\alpha * \beta) = (f \circ \alpha) * (f \circ \beta)$.
2. $f \circ \bar{\alpha} = f \circ \alpha$.
3. Se $\alpha \sim \alpha'$, allora $f \circ \alpha \sim f \circ \alpha'$.

PROPOSIZIONE 8.2.0. Dati X, Y spazi topologici, due punti $x_0 \in X, y_0 \in Y$ e una funzione $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$ continua, si può definire associare un omomorfismo tra i corrispettivi gruppi fondamentali:

$$\begin{aligned} f_* : \pi_1(X, x_0) &\longrightarrow \pi_1(Y, y_0) \\ [\alpha] &\longmapsto [f \circ \alpha] \end{aligned} \tag{8.10}$$

DIMOSTRAZIONE.

- f_* è ben definita: infatti, $f \circ \alpha \in \Omega(Y; y_0, y_0)$ e se $[\alpha] = [\alpha'], \alpha \sim \alpha'$. Per il punto 3 dell'osservazione precedente, si ha $f \circ \alpha \sim f \circ \alpha'$, cioè $[f \circ \alpha] = [f \circ \alpha']$.
- f_* è un omeomorfismo di gruppi: infatti, presi $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(X, x_0)$, si ha:

$$\begin{aligned} f_*([\alpha] \cdot [\beta]) &= f_*([\alpha * \beta]) = [f \circ (\alpha * \beta)]^1 = [(f \circ \alpha) * (f \circ \beta)] = [f \circ \alpha] \cdot [f \circ \beta] = \\ &= f_*([\alpha]) \cdot f_*([\beta]) \end{aligned}$$

$$\text{Inoltre: } f_*([C_{x_0}]) = [f \circ C_{x_0}] = [C_{y_0}]. \quad \square$$

8.3 DIGRESSIONE: CATEGORIE

DEFINIZIONE 8.3.0. CATEGORIA.

Una **categoria** \mathcal{C} consiste di:

- Una **classe** $\text{Ob}(\mathcal{C})$, i cui elementi sono datti **oggetti** di \mathcal{C} .
- Per ogni **coppia** di oggetti X e Y di \mathcal{C} una classe $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, i cui elementi sono detti **morfismi** da X a Y .
- Per ogni **terna** di oggetti X, Y, Z un'operazione binaria detta **composizione** di morfismi:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z) \\ (f, g) &\longmapsto g \circ f \end{aligned} \tag{8.11}$$

Tali che questi oggetti soddisfino i seguenti assiomi:

1. **ASSOCIAZIVITÀ:** Per ogni $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z), h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, W)$ si ha:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f \text{ in } \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, W) \tag{8.12}$$

2. **IDENTITÀ:** Per ogni oggetto X esiste un **morfismo identità** $Id_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ tale che:

$$\begin{aligned} f \circ Id_X &= f & Id_X \circ g &= g \\ \forall f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) && \forall g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, X) & \end{aligned} \tag{8.13}$$

Si dimostra che Id_X è unico per ogni oggetto X .

DEFINIZIONE 8.3.1. ISOMORFISMO.

Un morfismo $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ si dice **isomorfismo** se:

$$\exists g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X) \text{ tale che } g \circ f = Id_X \quad f \circ g = Id_Y \quad (8.14)$$

In tal caso g è unico e si pone $g = f^{-1}$.

Inoltre, due oggetti X e Y sono **isomorfi** se $\exists f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ isomorfismo.

ESEMPI. ESEMPI DI CATEGORIE

- **SET** **Oggetti:** insiemi.
Morfismi: applicazioni tra insiemi.
- **GR**^a **Oggetti:** gruppi.
Morfismi: omomorfismi di gruppi.
- **VECT** _{\mathbb{K}} su campo \mathbb{K} **Oggetti:** spazi vettoriali su \mathbb{K} .
Morfismi: applicazioni lineari.
- **TOP** **Oggetti:** spazi topologici.
Morfismi: applicazioni continue.
- **TOP*** **Oggetti:** spazi topologici con punto base (X, x_0) .
Morfismi: applicazione continue $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$.
- **KTOP** **Oggetti:** spazi topologici.
Morfismi: classi di omotopia di funzioni continue da X a Y .^b
- Preso uno spazio topologico X , si può considerare la categoria \mathcal{C} seguente:
Oggetti: aperti di X .
Morfismi: inclusioni.

Nello specifico, se $U, V \subseteq X$ aperti, allora:

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(U, V) = \begin{cases} \emptyset & \text{se } U \not\subseteq V \\ \{i\} & \text{se } U \hookrightarrow V \end{cases}$$

^aIndicata anche con **GRP**.

^bLa composizione in **KTOP** è garantita dalla composizione di omotopie, cioè dal lemma 7.3 (Manetti 10.13).

ATTENZIONE! Come si evince dall'esempio 6, i morfismi delle categorie possono anche *non* essere funzioni!

8.3.1 Funtori

DEFINIZIONE 8.3.2. FUNTORE.

Siano \mathcal{A}, \mathcal{B} due categorie. Un **funtore** $F : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$ consiste di due funzioni:

1. Una *funzione sugli oggetti* $F : \text{Ob}(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{Ob}(\mathcal{B})$.

$$x \longmapsto F(x)$$
2. Una *funzione sui morfismi* che, a seconda della sua costruzione, definisce due tipi di funtori:
 - Parliamo di **funtore covariante**^a se, per ogni coppia di oggetti X, Y in \mathcal{A} ,

si ha un'applicazione:

$$\begin{aligned} F : \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(F(X), F(Y)) \\ f &\longmapsto F(f) \end{aligned} \quad (8.15)$$

Che preserva i morfismi identità e la composizione:

- ◊ IDENTITÀ: $\forall X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$

$$F(Id_X) = Id_{F(X)} \quad (8.16)$$

- ◊ COMPOSIZIONE: $\forall f \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y), g \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(Y, Z)$

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) \quad (8.17)$$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Z \\ \searrow g \circ f & \nearrow g & \\ Z & & \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \searrow F(g \circ f) & \nearrow F(g) & \\ F(Z) & & \end{array}$$

- Parliamo di **funtore controvariante** se, per ogni coppia di oggetti X, Y in \mathcal{A} , si ha un'applicazione:

$$\begin{aligned} F : \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(F(Y), F(X)) \\ f &\longmapsto F(f) \end{aligned} \quad (8.18)$$

Che preserva i morfismi identità, mentre inverte la direzione della composizione:

- ◊ IDENTITÀ: $\forall X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$:

$$F(Id_X) = Id_{F(X)} \quad (8.19)$$

- ◊ COMPOSIZIONE: $\forall f \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y), g \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(Y, Z)$:

$$F(g \circ f) = F(f) \circ F(g) \quad (8.20)$$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Z \\ \searrow g \circ f & \nearrow g & \\ Z & & \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{ccc} F(X) & \xleftarrow{F(f)} & F(Y) \\ \nearrow F(g \circ f) & \searrow F(g) & \\ F(Z) & & \end{array}$$

^aIn letteratura, il *funtore covariante* spesso viene indicato anche solo come *funtore*.

OSSERVAZIONI. Un funtore porta:

- Isomorfismi in isomorfismi,
- Oggetti isomorfi in oggetti isomorfi.

DIMOSTRAZIONE. Se $f \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y)$ è isomorfismo in \mathcal{A} , $\exists g \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(Y, X)$ tale che

$g = f^{-1}$, cioè $g \circ f = Id_X$, $f \circ g = Id_Y$. Ma allora, se F è covariante:

$$\begin{aligned} F(g) \circ F(f) &= F(g \circ f) = F(Id_X) = Id_{F(X)} \\ F(f) \circ F(g) &= F(f \circ g) = F(Id_Y) = Id_{F(Y)} \end{aligned}$$

$F(f) \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(F(X), F(Y))$ è isomorfismo con inversa $F(g) \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(F(Y), F(X))$. Se F è controvariante:

$$\begin{aligned} F(g) \circ F(f) &= F(f \circ g) = F(Id_Y) = Id_{F(Y)} \\ F(f) \circ F(g) &= F(g \circ f) = F(Id_X) = Id_{F(X)} \end{aligned}$$

$F(f) \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(F(Y), F(X))$ è isomorfismo con inversa $F(g) \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(F(X), F(Y))$. \square

ESEMPI.

1. $F : \underline{\text{GR}} \longrightarrow \underline{\text{SET}}$

Oggetti: $(G, \cdot) \mapsto G$

Morfismi: $f : G \longrightarrow H \mapsto f : G \longrightarrow H$

Questo funtore covariante si chiama anche **funtore dimenticante**, in quanto associa un gruppo all'insieme su cui si base.

$$F : \underline{\text{TOP}} \longrightarrow \underline{\text{SET}}$$

Oggetti: $(G, \mathcal{T}) \mapsto G$

Morfismi: $f : G \longrightarrow H \mapsto f : G \longrightarrow H$

In modo analogo, si definisce il funtore dimenticante fra TOP e SET, che associa lo spazio topologico all'insieme sui cui abbiamo definito la topologia.

2. $F : \underline{\text{VECT}}_{\mathbb{K}} \longrightarrow \underline{\text{VECT}}_{\mathbb{K}}$

Oggetti: $V \mapsto V^* = \{ \text{applicazioni lineari } V \longrightarrow \mathbb{K} \}$

Morfismi: $f : V \longrightarrow W$ lineare $\mapsto f^t : W^* \longrightarrow V^*$
 $\varphi \longmapsto \varphi \circ f$

$$V \xrightarrow{f} W \xrightarrow{\varphi} \mathbb{K}$$

Questo funtore controvariante è chiamata **funzione trasposta**.

3. $F : \underline{\text{TOP}}^* \longrightarrow \underline{\text{GR}}$

Oggetti: $(X, x_0) \mapsto \pi_1(X, x_0)$

Morfismi: $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0) \mapsto f_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, y_0)$
 $[\alpha] \longmapsto [f \circ \alpha]$

Questo funtore covariante si basa sull'omomorfismo tra gruppi fondamentali indotto da $f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$.

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo la funtorialità dell'ultimo esempio.

- IDENTITÀ: $\forall (X, x_0) \in \text{Ob}(\underline{\text{TOP}}^*)$:

$$F(Id_X) = (Id_X)_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0) \implies Id_{\pi_1(X, x_0)}$$

$$[\alpha] \longmapsto [Id_X \circ \alpha] = [\alpha]$$

■ **COMPOSIZIONE:** $(X, x_0) \xrightarrow{f} (Y, y_0) \xrightarrow{g} (Z, z_0)$

Vogliamo che $F(g \circ f) = (g \circ f)_* = g_* \circ f_*$:

$$(g \circ f)_*([\alpha]) = [g \circ f \circ \alpha] = g_*([f \circ \alpha]) = g_* (g_*([\alpha])) = (g_* \circ f_*)([\alpha])$$

□

8.4 ISOMORFISMI E GRUPPI FONDAMENTALI

COROLARIO 8.4.0. Se $f : X \longrightarrow Y$ è un omeomorfismo, allora:

$f_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, y_0)$ è isomorfismo di gruppi, $\forall x_0 \in X$.

RICORDIAMO... Se $g \circ f$ è una funzione biunivoca, allora f è iniettiva e g è suriettiva.

COROLARIO 8.4.1. Sia $A \subseteq X$ un retratto con retrazione $r : X \longrightarrow A$; si consideri inoltre la sua inclusione $i : A \hookrightarrow X$. Si ha che:

- $\forall a \in A \quad i_* : \pi_1(A, a) \longrightarrow \pi_1(X, a)$ è un omomorfismo *iniettivo*.
- $\forall a \in A \quad r_* : \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(A, a)$ è un omomorfismo *suriettivo*.

DIMOSTRAZIONE. Sappiamo dalla definizione che $r|_A = Id_A$; poiché $r \circ i : A \longrightarrow X$,
 $x \longmapsto r(x)$, si ha $r \circ i = r|_A = Id_A$. Allora, passando con il funtore all'omomorfismo di gruppi:

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(A, a) & \xrightarrow{i_*} & \pi_1(X, a) & \xrightarrow{r_*} & \pi_1(A, a) \\ & & \searrow & \nearrow & \\ & & r_* \circ i_* & & \end{array}$$

Notiamo che $r_* \circ i_* = (r \circ i)_* = (Id_A)_*$, cioè $r_* \circ i_*$ è biettiva. In particolare, ne consegue, per quanto detto poco sopra, che i_* è iniettiva e r_* suriettiva. □

TEOREMA 8.4.0. (KOSNIOWSKI, 15.12)

Siano $f, g : X \longrightarrow Y$ continue, omotope e $x_0 \in X$. Allora esiste un *isomorfismo di gruppi*:

$$\varphi : \pi_1(Y, f(x_0)) \longrightarrow \pi_1(Y, g(x_0)) \tag{8.21}$$

Tale che:

$$g_* = \varphi \circ f_* \tag{8.22}$$

Più precisamente, data l'omotopia $F : X \times I \longrightarrow Y$ tra f e g , allora:

$$\gamma := F(x_0, t) : I \longrightarrow Y \tag{8.23}$$

È un arco da $F(x_0, 0) = f(x_0)$ a $F(x_0, 1) = g(x_0)$; dunque:

$$\begin{aligned} \gamma_{\#} : \pi_1(Y, f(x_0)) &\longrightarrow \pi_1(X, g(x_0)) \\ [\alpha] &\longmapsto [\bar{\omega} * \alpha * \omega] \end{aligned} \quad (8.24)$$

è un *isomorfismo di gruppi* e si ha:

$$g_* = \gamma_{\#} \circ f_* \quad (8.25)$$

$$\begin{array}{ccc} & \pi_1(X, x_0) & \\ f_* \swarrow & & \searrow g_* \\ \pi_1(Y, y_0) & \xrightarrow{\gamma_{\#}} & \pi_1(X, g(x_0)) \end{array}$$

COROLLARIO 8.4.2. Se $f : X \longrightarrow X$ è una funzione omotopa all'identità, allora:

$f_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, f(x_0))$ è isomorfismo di gruppi, $\forall x_0 \in X$.

DIMOSTRAZIONE. Data l'omotopia $F : X \times I \longrightarrow Y$ tra f e Id_X , allora:

$$\gamma := F(x_0, t) : I \longrightarrow Y$$

È un arco da $F(x_0, 0) = f(x_0)$ a $F(x_0, 1) = x_0$; dunque, per il teorema precedente segue che

$$\gamma_{\#} : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, f(x_0))$$

è un *isomorfismo di gruppi* e si ha:

$$f_* = \gamma_{\#} \circ (Id_X)_* = \gamma_{\#} \circ Id_{\pi_1(X, x_0)} = \gamma_{\#}$$

In particolare, ne segue che $f_* = \gamma_{\#}$ è isomorfismo. \square

RICORDIAMO... Siano A, B, C, D degli insiemi e f, g, h delle applicazioni come nel diagramma seguente:

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D$$

Tali per cui $g \circ f, h \circ g$ sono biunivoche. Segue che f è biunivoca.

- f è iniettiva perché $g \circ f$ è iniettiva.
- f è suriettiva: preso $b \in B$ e il corrispettivo $g(b) \in C$, dal fatto che $g \circ f$ è biunivoco segue che $\exists a \in A : g(f(a))(g \circ f)(a) = g(b)$. Essendo $h \circ g$ biunivoca, g è iniettiva, dunque $b = f(a) \implies f$ suriettiva e segue allora la tesi.

TEOREMA 8.4.1. INVARIANZA OMOTOPICA DEL GRUPPO FONDAMENTALE (MANETTI, 11.22)

Siano X, Y spazi topologici e $f : X \longrightarrow Y$ un'equivalenza omotopica. Allora $\forall x_0 \in X$ si ha che:

$$f : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, f(x_0)) \quad (8.26)$$

È isomorfismo di gruppi.

DIMOSTRAZIONE. In quanto $f : X \longrightarrow Y$ è un'equivalenza omotopica, necessariamente $\exists g : Y \longrightarrow X$ continua tale che:

$$g \circ f \sim Id_X \quad f \circ g \sim Id_Y$$

Su $g \circ f \sim Id_X$ applichiamo il teorema precedente.

$$\begin{array}{ccc} & \pi_1(X, x_0) & \\ (g \circ f)_* \swarrow & & \searrow (Id_X)_* = Id_{\pi_1(X, x_0)}^a \\ \pi_1(X, g(f_0)) & \xrightarrow{\gamma^\#} & \pi_1(X, x_0) \end{array}$$

isomorfismo di gruppi

Per il corollario appena visto, poiché $g \circ f \sim Id_X$, segue che $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$ è isomorfismo di gruppi. Allora consideriamo lo schema seguente.

$$\begin{array}{ccccc} & & g_* \circ f_* = (g \circ f)_* & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{f_*} & \pi_1(X, f(x_0)) & \xrightarrow{g_*} & \pi_1(X, g(f(x_0))) \\ & & \searrow \widetilde{f}_* \circ g_* & & \downarrow \widetilde{f}_* \\ & & & & \pi_1(X, f(g(f(x_0)))) \end{array}$$

Sapendo che $f \circ g \sim Id_Y$, possiamo dimostrare in modo analogo (usando come punto base $f(x_0) \in Y$) che $\widetilde{f}_* \circ g_* = (\widetilde{f} \circ g)$ è isomorfismo di gruppi.

Applicando il ragionamento insiemistico ricordato in precedenza (pag. 106) segue che f_* è un omomorfismo biettivo, cioè un isomorfismo. \square

^aSi veda a pag. 104.

COROLLARIO 8.4.3. Se X e Y sono spazi topologici c.p.a. e omotopicamente equivalenti, allora hanno gruppi fondamentali isomorfi.

DIMOSTRAZIONE. Dal teorema appena dimostrato sappiamo che se due spazi sono omotopicamente equivalenti, il gruppo fondamentale di X rispetto ad un qualunque punto base in X è isomorfo a quello di Y rispetto $f(x_0)$. In particolare, se gli spazi sono c.p.a., il loro gruppo fondamentale è *unico* a meno di omomorfismi. Segue che il gruppo fondamentale di X è isomorfo all'unico gruppo fondamentale di Y . \square

COROLLARIO 8.4.4. Sia X uno spazio topologico contraibile. Allora X è semplicemente connesso.

DIMOSTRAZIONE. X contraibile significa che X ha lo stesso tipo di omotopia di {1 punto}. Segue che, per il corollario precedente, il gruppo fondamentale di X è banale:

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(\{1\}) = \{1\}$$

Essendo X contraibile, X è anche c.p.a., dunque vale la tesi. \square

COROLLARIO 8.4.5. Sia $i : A \hookrightarrow X$ un retratto di deformazione. Allora $\forall a \in A$:

$$i_* : \pi_1(A, a) \longrightarrow \pi_1(X, a) \quad r_* : \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(A, a) \quad (8.27)$$

Sono isomorfismi di gruppi.

8.5 NUMERO DI LEBESGUE

Per poter calcolare il *gruppo fondamentale* delle sfere S^n , con $n \geq 2$, abbiamo prima bisogno di qualche risultato preliminare.

DEFINIZIONE 8.5.0. DISTANZA DI UN PUNTO DA UN INSIEME IN UNO SPAZIO METRICO.

Sia (X, d) uno spazio metrico e $C \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto; preso $x \in X$, la **distanza di x da C** è definita come:

$$d(x, C) := \inf_{y \in C} d(x, y) \quad (8.28)$$

Vediamo alcune proprietà.

1. Vale $d(x, C) \geq 0$, inoltre $d(x, C) = 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists y \in C : d(x, y) < \varepsilon \iff x \in \overline{C}$.
2. Fissato il sottoinsieme C e facendo *variare* il punto x si vede che la funzione “distanza da C ” è continua:

$$\begin{aligned} d : X &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto d(x, C) \end{aligned}$$

Infatti, presi $x, z \in X$ e $y \in C$ si ha che:

$$d(x, C) \leq d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \implies d(x, C) - d(x, z) \leq d(z, y), \forall y \in C$$

Dunque, al variare di y :

$$d(x, C) - d(x, z) \leq \inf_{y \in C} d(z, y) = d(z, C) \implies d(x, C) - d(z, C) \leq d(x, z)$$

Scambiando simmetricamente x e z si ottiene $|d(x, C) - d(z, C)| \leq d(x, z)$; per l’arbitrarietà di x e $y \in C$ allora la funzione d è continua.

LEMMA 8.5.0. LEMMA DEL NUMERO DI LEBESGUE (KOSNIOWSKI, TEOREMA 23.4)

Sia (X, d) uno spazio metrico compatto e sia \mathcal{A} un ricoprimento aperto di X . Allora $\exists \delta > 0$ tale che, per ogni palla aperta B in X di diametro minore di δ , $\exists U \in \mathcal{A} : B \subseteq U$.

DEFINIZIONE 8.5.1. NUMERO DI LEBESGUE.

Il numero δ descritto nell’enunciato del lemma è detto *numero di Lebesgue* del ricoprimento \mathcal{A} .

DIMOSTRAZIONE. Siccome X è compatto, allora \mathcal{A} ammette un sottoricoprimento finito $\{U_1, \dots, U_n\}$ di aperti. Si considerano i complementari $C_j := X \setminus U_j$, chiusi in X :

$$C_1 \cap \dots \cap C_n = (X \setminus U_1) \cap \dots \cap (X \setminus U_n) = X \setminus (U_1 \cup \dots \cup U_n) = X \setminus X = \emptyset$$

Per ogni $j = 1, \dots, n$ sia $f_j : X \longrightarrow \mathbb{R}$ la funzione distanza da C_j : è continua, positiva

$f_j \geq 0$ e si annulla su C_j chiuso. Sia $F := \max(f_1, \dots, f_n)$: essa è continua perché è il massimo di funzioni continue. Mostriamo che vale sempre $F > 0$:

$$\begin{aligned} f_j \geq 0, \forall j &\implies F \geq 0 \\ \text{Se } \exists x_0 \in X: F(x_0) = 0 &\implies f_j(x_0) = 0, \forall j \implies x_0 \in C_j, \forall j \\ \text{Ma } C_1 \cap \dots \cap C_n = \emptyset &\implies F > 0 \text{ su } X \end{aligned}$$

Quindi, siccome F è continua e positiva su un compatto, allora F ammette minimo $\delta > 0$.

Sia B una palla aperta in X con diametro minore di δ e sia $x_1 \in B$, allora :

$$\max(f_1(x_1), \dots, f_n(x_1)) = F(x_1) \geq \delta \implies \exists j \in \{1, \dots, n\}: f_j(x_1) \geq \delta$$

cioè tale che $d(x_1, C_j) \geq \delta > \text{diam } B$. Mostriamo che $B \subseteq U_j$, ovvero che $B \cap C_j = \emptyset$:

$$y \in B \implies d(y, x_1) < \text{diam } B < \delta \leq d(y, C_j) \implies y \notin C_j \implies B \cap C_j = \emptyset$$

□

COROLARIO 8.5.0. Sia X uno spazio topologico, $\alpha : I \longrightarrow X$ un cammino e \mathcal{A} un ricoprimento di X . Allora esiste una suddivisione finita $0 = t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_k = 1$ di $[0, 1]$ tale che $\forall i = 0, \dots, k-1 \exists U_i \in \mathcal{A} : \alpha([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i$, ovvero l'immagine di ogni intervallino della suddivisione è contenuta nel corrispettivo aperto del ricoprimento.

DIMOSTRAZIONE. I è uno spazio metrico compatto: sia $\widetilde{\mathcal{A}} := \{\alpha^{-1}(U) \mid U \in \mathcal{A}\}$ ricoprimento aperto di I e δ il numero di Lebesgue del ricoprimento \mathcal{A} . Allora basta scegliere una partizione opportuna per poter applicare il lemma:

$$\begin{aligned} |t_{i+1} - t_i| < \delta &\implies \forall i, \exists \varepsilon : t_{i+1} - t_i + 2\varepsilon < \delta &\implies \text{diam}(t_i - \varepsilon, t_{i+1} + \varepsilon) < \delta \\ &\implies \exists U_i \in \mathcal{A} : [t_i - \varepsilon, t_{i+1} + \varepsilon] \subseteq \alpha^{-1}(U_i) \implies \alpha([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i \end{aligned}$$

□

OSSERVAZIONE. Sia X uno spazio topologico. Preso $x_0 \in A \subseteq X$ e l'inclusione del sottoinsieme A in X $i : A \hookrightarrow X$, essa induce un *morfismo di gruppi*:

$$\begin{aligned} i_* : \pi_1(A, x_0) &\longrightarrow \pi_1(X, x_0) \\ [\alpha] &\longmapsto [i \circ \alpha] \end{aligned}$$

Il morfismo, ad un laccio $\alpha : I \longrightarrow A$ in A con punto base x_0 , associa lo stesso laccio ma visto in X , sempre con il punto base x_0 :

$$i \circ \alpha : I \longrightarrow X$$

Ricordiamo, per il corollario 8.6 (pag. 108), che se A è un **retratto** allora i_* è *iniettivo*; segue che se A è un **retratto di deformazione** allora i_* è un *isomorfismo di gruppi*. Consideriamo l'immagine di i_* , ovvero:

$$G_A := \text{Im } i_* = i_*(\pi_1(A, x_0)) \subseteq \pi_1(X, x_0)$$

Esso è il sottogruppo di $\pi_1(X, x_0)$ dei cammini γ che hanno almeno un rappresentante la cui immagine è interamente contenuta in A :

$$G_A = \{[\gamma] \in \pi_1(X, x_0) \mid \exists \tilde{\gamma} \text{ con } [\tilde{\gamma}] = [\gamma] \in \pi_1(X, x_0) : \tilde{\gamma}([0, 1]) \subseteq A\}$$

Quindi, ad ogni sottoinsieme di X possiamo associare un *sottogruppo del gruppo fondamentale* definito dall'immagine del morfismo *indotto* dall'inclusione ed è formato esattamente dalle *classi di cammini* che ammettono rappresentante con *immagine* interamente contenuta nel sottoinsieme.

8.6 TEOREMA DI VAN KAMPEN SUI GENERATORI

RICORDIAMO... Sia G un gruppo qualsiasi e $S \subseteq G$ sottoinsieme. Si dice che S **genera il gruppo** G se ogni $g \in G$ si può scrivere come *prodotto finito* di elementi di S e di loro inversi.

Vediamo ora un risultato generale per poter avere qualche informazione in più sui gruppi fondamentali, sfruttando proprio la nozione di generatore. Si riuscirà a calcolare il gruppo fondamentale $\pi_1(X, x_0)$ di generici spazi X nel corso di *GEOMETRIA 4*.

TEOREMA 8.6.o. TEOREMA DI VAN KAMPEN SUI GENERATORI (MANETTI 11.25).

Sia X uno spazio topologico e siano $A, B \subseteq X$ aperti tali che A, B e $A \cap B$ siano **c.p.a.** e $A \cap B \neq \emptyset, X = A \cup B^a$.

Sia $x_0 \in A \cap B$; consideriamo le inclusioni $i : A \hookrightarrow X$ e $j : B \hookrightarrow X$ con i loro morfismi indotti:

$$i_* : \pi_1(A, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0) \quad \text{e} \quad j_* : \pi_1(B, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0) \quad (8.29)$$

Siano inoltre $G_A := \text{Im } i_*$ e $G_B := \text{Im } j_*$. Allora $\pi_1(X, x_0)$ è generato da $G_A \cup G_B$.

^aPer il teorema 2.8, pag. 33 questo implica che X è **c.p.a.**

DIMOSTRAZIONE. Sia $[\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$. Mostriamo che $[\alpha]$ si può scrivere come prodotto finito di elementi di $G_A \cup G_B$.

Siccome $\{A, B\}$ è un ricoprimento aperto di X , per il corollario 8.7 (pag. 109) esiste una partizione $0 = t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_k = 1$ tale che $\forall i = 0, \dots, k-1, \alpha([t_i, t_{i+1}]) \subseteq A$ oppure $\subseteq B$. Si consideri ora:


$$\alpha_1 := \alpha|_{[t_{i-1}, t_i]} : [t_{i-1}, t_i] \longrightarrow X, \quad \forall i = 1, \dots, k$$

Si può pensare ad essa come un *cammino* in X , se lo riparametrizziamo su $[0, 1]$. Per il *lemma sul cambiamento di parametri* (pag. 95) si ottiene, usando anche la giunzione di cammini:

$$\alpha \sim (((\alpha_1 * \alpha_2) * \alpha_3) * \dots) * \alpha_k$$

Utilizziamo ora la *connessione per archi*. Essendo $A, B, A \cap B$ **c.p.a.**, allora $\forall i = 1, \dots, k-1$:

- Se $\alpha(t_i) \in A \cap B$ si sceglie un arco $\gamma_i : I \longrightarrow A \cap B$ da x_0 a $\alpha(t_i)$.
- Se $\alpha(t_i) \in A \setminus B$ si sceglie un arco $\gamma_i : I \longrightarrow A$ da x_0 a $\alpha(t_i)$.
- Se $\alpha(t_i) \in B \setminus A$ si sceglie un arco $\gamma_i : I \longrightarrow B$ da x_0 a $\alpha(t_i)$.



Grazie a γ_i ora si può ottenere un *cammino chiuso*: $\forall i = 1, \dots, k$ sia $\beta_i := (\gamma_{i-1} * \alpha_i) * \overline{\gamma_i}$:

- β_i è ben definito.
- β_i è, per costruzione, un cammino chiuso con *punto base* x_0 .

Segue che $[\beta_i] \in \pi_1(X, x_0)$.

Mostriamo ora che $\text{Im } \beta_i$ è contenuta o in A o in B . Fissato $i \in \{1, \dots, k\}$, $\text{Im } \alpha_i = \alpha([t_{i-1}, t_i])$ è contenuto o in A o in B , supponiamo quanto segue:

$$\begin{aligned} \text{Im } \alpha_i \subseteq A &\implies \alpha(t_{i-1}) \in A, \alpha(t_i) \in A \implies \gamma_{i-1} \text{ e } \gamma_i \text{ entrambi a valori in } A \\ \implies \text{Im } \beta_i \subseteq A &\implies [\beta_i] \in G_A \end{aligned}$$

In modo analogo si può mostrare da $\text{Im } \alpha_i \subseteq B$ che $[\beta_i] \in G_B$. Quindi $[\beta_i] \in G_A \cup G_B, \forall i$ e:

$$[\alpha] = [\alpha_1 * \dots * \alpha_k] = [\beta_1 * \dots * \beta_k] = [\beta_1] \dots [\beta_k]$$

Pertanto $G_A \cup G_B$ generano $\pi_1(X, x_0)$. □

COROLARIO 8.6.0. (MANETTI, 11.26)

Sia X uno spazio topologico e siano $A, B \subseteq X$ aperti tali che

1. A e B sono semplicemente connessi.
2. $A \cap B \neq \emptyset$ è c.p.a..
3. $X = A \cup B$.

Allora X è semplicemente connesso.

DIMOSTRAZIONE. Per il teorema 2.8 X è connesso, essendo unione di c.p.a. con intersezione non vuota.

Siccome l'intersezione non è vuota, sia $x_0 \in A \cap B$: le ipotesi del *teorema di Van Kampen* appena dimostrato sono soddisfatte, quindi $\pi_1(X, x_0)$ è generato da G_A e G_B . Tuttavia A è semplicemente connesso, dunque $\pi_1(A, x_0) = \{1\}$; considerando:

$$L_* : \pi_1(A, x_0) \longrightarrow G_A \text{ suriettiva} \implies G_A = \{1\}$$

Vale allo stesso modo per $G_B = \{1\}$. Siccome $\pi_1(X, x_0)$ è generato da $G_A \cup G_B = \{1\}$, allora $\pi_1(X, x_0) = \{1\}$. □

OSSERVAZIONE. PROIEZIONE STEREOGRAFICA.


Consideriamo la $S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ sfera n -dimensionale. Si ha che $\forall p \in S^n, S^n \setminus \{1 \text{ punto}\} \cong \mathbb{R}^n$

Ciò si verifica tramite la **proiezione stereografica**.

Essa opera nel seguente modo: si consideri la *sfera* S^n centrata nell'origine e privata del punto $N = (0, 0, \dots, 1)$, detto anche **polo Nord**; la proiezione stereografica sarà:

$$\pi : S^n \setminus \{N\} \longrightarrow H = \{(x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_n = 0\} \quad (8.30)$$

Che, al punto $Q \in S^n$, associa il punto di intersezione $\pi(Q)$ di intersezione della *retta* passante per N e Q con l'iperpiano H .



La proiezione stereografica è in particolare un *omeomorfismo*^a e, poiché $H \cong \mathbb{R}^2$ (in quanto iperpiano di \mathbb{R}^{n+1}), si ha $S^n \setminus \{1 \text{ punto}\} \cong \mathbb{R}^n$.

^aNelle "Note aggiuntive", a pag. ??, si può trovare la dimostrazione di ciò per $n = 2$.

COROLARIO 8.7.0. (MANETTI, 11.27)

La sfera S^n è semplicemente连通的, $\forall n \geq 2$.

DIMOSTRAZIONE. Applichiamo il *teorema di Van Kampen*, scegliendo degli aperti adatti. Sia:

- $N = (0, \dots, 0, 1) \in S^n$ il polo Nord.
- $S = (0, \dots, -1) \in S^n$ il polo Sud.

Definiamo $A := S^n \setminus \{N\}$: esso è aperto, **c.p.a.**, omeomorfo a \mathbb{R}^n per la *proiezione stereografica* e, siccome \mathbb{R}^n è contraibile, lo è anche A ; dunque sarà *semplicemente连通的*. Lo stesso è vero per $B := S^n \setminus \{S\}$.

Si ha $A \cap B = S^n \setminus \{N, S\}$ **c.p.a.** se $n \geq 2$, $A \cap B$ non vuoto e inoltre $S^n = A \cup B$; per il corollario 8.8 si ha che S^n è *semplicemente连通的*. \square

ATTENZIONE! X contraibile implica X semplicemente连通的, ma non vale il viceversa! Infatti, le sfere $S^n, n \geq 2$ sono semplicemente连通的 ma non sono contraibili perché non sono omotopicamente equivalenti ad un punto.


Pertanto, il tipo di omotopia di X determina il gruppo fondamentale di X , ma non vale il viceversa!

8.8 GRUPPO FONDAMENTALE DELLA CIRCONFERENZA

Nella sezione precedente abbiamo analizzato il gruppo fondamentale delle sfere S^n per $n \geq 2$: ci domandiamo ora cosa succede per la circonferenza S^1 .

Siccome la dimostrazione sarà lunga e articolata, preannunciamo che il gruppo fondamentale che otterremo *non* è banale, ma è $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$: nello specifico, l'isomorfismo rappresenta il *numero di giri con segno* che un cammino chiuso fa *intorno* alla circonferenza.¹

Dunque, la nostra intenzione è di formalizzare il concetto che ogni intervallo fra due interi consecutivi “*copre*” la circonferenza.



8.8.1 Mappa esponenziale

DEFINIZIONE 8.8.0. MAPPA ESPONENZIALE.

La **mappa esponenziale** si può considerare come proiezione ad un quoziante per l'azione di \mathbb{Z} su \mathbb{R} , cioè è la seguente funzione continua e *aperta*:

$$\begin{aligned} e : \mathbb{R} &\longrightarrow S^1 \\ t &\longmapsto e^{2\pi i t} \end{aligned}$$

Con questa notazione si considera $S^1 \subseteq \mathbb{C}$, per cui $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.^a

^aSi veda a riguardo la digressione a pag. 61.

Utilizzeremo come punto base per i nostri scopi il punto $(1, 0) \in \mathbb{R}^2$, equivalente a $1 \in \mathbb{C}$.

8.8.1.1 Rivestimento

Vogliamo ora utilizzare questa proprietà per definire il numero di giri che fa un cammino chiuso intorno alla circonferenza.

LEMMA 8.8.0. Sia $U \subsetneqq S^1$ aperto. Allora:

$$e^{-1}(U) = \bigsqcup_{n \in \mathbb{Z}} V_n \quad (8.31)$$

Con $V_n \subseteq \mathbb{R}$ aperto e la restrizione $e|_{V_n} : V_n \longrightarrow U$ è un omeomorfismo $\forall n \in \mathbb{Z}$.

DEFINIZIONE 8.8.1. UNIFORMEMENTE RIVESTITO.

Un tale U aperto di un qualsiasi spazio topologico X si dice **uniformemente rivestito**.

¹Nota: per la dimostrazione del teorema seguiremo il capitolo 16 del libro “A first course in Algebraic Topology” di Kosniowski.

DIMOSTRAZIONE. Si consideri un punto *non* in U , ad esempio supponiamo $1 \notin U$. Si ha che:

$$e^{-1}(1) = \{t \in \mathbb{R} \mid e^{2\pi it} = \cos(2\pi t) + i \sin(2\pi t) = 1\} = \mathbb{Z} \implies \mathbb{Z} \cap e^{-1}(U) = \emptyset$$

Dunque, \mathbb{Z} è *disgiunto* dalla controimmagine di U .

Poniamo ora $V_0 := e^{-1}(U) \cap [0, 1] = e^{-1}(U) \cap (0, 1)$, in quanto la controimmagine di U non contiene interi.


- V_0 è aperto in \mathbb{R} in quanto intersezione di aperti.
- La restrizione $e|_{V_0}$ è iniettiva.
- $e(V_0) = U$ in quanto $e((0, 1)) = S^1 \setminus \{1\}$ e $U \subseteq S^1 \setminus \{1\}$ per ipotesi.

Siccome e è *aperta*, la restrizione $e|_{V_0} : V_0 \longrightarrow U$ è un *omeomorfismo* in quanto è biunivoca, continua e aperta.

Definiamo ora $V_n := V_0 + n = \{x + n \mid x \in V_0\}$, $\forall n \in \mathbb{Z}$. Allora:

$$e^{-1}(U) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} V_n \text{ e } V_n \subseteq (n, n+1)$$

Quindi $V_n \cap V_m = \emptyset$ se $n \neq m$, che implica l'*iniettività* della funzione $e|_{V_n}$ e il fatto che la somma di sopra sia *disgiunta*. Essendo $e(V_n) = U$, allora $e|_{V_n} : V_n \longrightarrow U$ è un omeomorfismo.




□

8.8.2 Sollevamento

DEFINIZIONE 8.8.2. SOLLEVAMENTO.

Sia α un cammino in S^1 . Un **sollevamento** di α è una funzione continua $\tilde{\alpha} : I \longrightarrow \mathbb{R}$ tale che commuti il diagramma a lato, cioè tale che $\alpha = e \circ \tilde{\alpha}$.

Più in generale, dato X spazio topologico e $f : X \longrightarrow S^1$ continua, un *sollevamento* di f è la funzione $\tilde{f} : X \longrightarrow \mathbb{R}$ continua tale che $f = e \circ \tilde{f}$.



Se $\tilde{\alpha}$ è un sollevamento di α , allora:

$$\forall t \in I, e(\tilde{\alpha}(t)) = \alpha(t) \implies e^{2\pi i \tilde{\alpha}(t)} = \cos(2\pi \tilde{\alpha}(t)) + i \sin(2\pi \tilde{\alpha}(t)) = \alpha(t)$$

Dunque $2\pi \tilde{\alpha}(t)$ è una *determinazione dell'angolo* per $\alpha(t) \in S^1$; muovendosi con continuità su S^1 tramite α ci si muove in maniera continua anche tramite $\tilde{\alpha}$, ovvero $2\pi \tilde{\alpha}$ è una **determinazione continua** dell'angolo per α .

ESEMPIO. Fissato $n \in \mathbb{Z}$, si consideri il cammino:

$$\begin{aligned} \gamma : I &\longrightarrow S^1 \\ t &\longmapsto e^{2\pi i nt} \end{aligned}$$

Ad esempio, per $n = 1$ si percorre 1 giro in senso *antiorario*, con $n = 2$ si percorrono 2

giri in senso antiorario, con $n = -1$ si percorre 1 un giro in senso *orario*.

Un sollevamento di γ è dato da $\tilde{\gamma} : I \longrightarrow S^1$ con $\gamma(t) = e(\tilde{\gamma}(t))$. Poiché γ è già scritto in forma esponenziale, si ha $\tilde{\gamma}(t) = nt$.

Andiamo ora a verificare l'*esistenza* di sollevamenti per cammini e vedere se e quando sono *unici*.

TEOREMA 8.8.o. SOLLEVAMENTO DI CAMMINI

Ogni cammino $\alpha : I \longrightarrow S^1$ ammette un sollevamento $\tilde{\alpha} : I \longrightarrow \mathbb{R}$. Inoltre, fissato il punto iniziale, il sollevamento è *unico*: fissato $x_0 \in \mathbb{R}$: $e(x_0) = \alpha(0)$ (ovvero $x_0 \in e^{-1}(\alpha(0))$ fibra di $\alpha(0) \in S^1$), $\exists! \tilde{\alpha} : I \longrightarrow \mathbb{R}$ sollevamento di α a partire da x_0 , cioè $\tilde{\alpha}(0) = x_0$.

DIMOSTRAZIONE.

- **Esistenza:** Per dimostrare l'*esistenza* si sfruttano gli aperti *uniformemente rivestiti*, dividendo I in modo tale da avere sottointervalli la cui immagine tramite α sia contenuta in un *aperto rivestito*; costruiremo induttivamente il sollevamento “a pezzi”, componendo con le inverse locali dell’esponenziale.

$\forall p \in S^1$ punto della circonferenza, sia $U_p \subsetneq S^1$ un intorno aperto *connesso* di p . Allora U_p è *uniformemente rivestito*, quindi $\{U_p\}_{p \in S^1}$ è un ricoprimento aperto di S^1 .

Sia $\alpha : I \longrightarrow S^1$ un cammino; per il corollario 8.7 del *teorema di Lebesgue* si ha che:

$$\begin{aligned} &\exists 0 = t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_k = 1 \text{ suddivisione :} \\ &\forall i = 1, \dots, k, \alpha([t_{i-1}, t_i]) \subseteq U_i \text{ aperto del ricoprimento.} \end{aligned}$$

Costruiamo ora il sollevamento “a pezzi” *induttivamente* su ciascun intervallino $[0, t_i]$: prima si costruisce il passo base per $[0, t_1]$ poi, assumendo di aver già definito il sollevamento fino a t_i , lo si costruisce fino a t_{i+1} .

t_1 Posto $\tilde{\alpha}(0) = x_0$, per $[0, t_1]$ si ha che $\alpha([0, t_1]) \subseteq U_1$ uniformemente rivestito; pertanto, per il lemma 8.4 (pag. 113) vale:

$$e^{-1}(U_1) = \bigsqcup_{n \in \mathbb{Z}} V_n \text{ aperto in } \mathbb{R} : e|_{V_n} : V_n \longrightarrow U_1 \text{ è un omeomorfismo.}$$

Siccome $x_0 \in e^{-1}(\alpha(0))$ e $\alpha(0) \in U_1$ allora $x_0 \in e^{-1}(U_1)$. Tuttavia, i V_n sono disgiunti, quindi $\exists! \bar{n} : x_0 \in V_{\bar{n}}$. Siccome $e|_{V_{\bar{n}}} : V_{\bar{n}} \longrightarrow U_1$ è un

omeomorfismo, allora ha un’ inversa locale $\varphi := (e|_{V_{\bar{n}}})^{-1} : U_1 \longrightarrow V_{\bar{n}}$.

Poniamo ora come primo “pezzo” del sollevamento:

$$\widetilde{\alpha}_1 := \varphi \circ \alpha|_{[0, t_1]}, \quad \widetilde{\alpha}_1 : [0, t_1] \longrightarrow \mathbb{R}$$

t_{i+1} Supponiamo di avere definito $\widetilde{\alpha}_i : [0, t_i] \longrightarrow \mathbb{R}$ continua, sollevamento di $\alpha|_{[0, t_i]}$, ovvero il sollevamento di α da 0 fino a t_i .

Procedendo analogamente al primo intervallo: consideriamo $\alpha([t_i, t_{i+1}]) \subseteq$

U_{i+1} uniformemente rivestito, tale per cui $e^{-1}(U_{i+1}) = \bigsqcup_{m \in \mathbb{Z}} W_m$ con W_m aperti. Fra questi W_m scegliamo quello che contiene il punto di partenza.

$$\tilde{\alpha}_i(t_i) \in e^{-1}(\alpha(t_i)) \implies \tilde{\alpha}_i(t_i) \in e^{-1}(U_{i+1}) \implies \exists! \bar{m}: \tilde{\alpha}_i(t_i) \in W_{\bar{m}}.$$

Sia $\psi := (e|_{W_{\bar{m}}})^{-1} : U_{i+1} \longrightarrow W_{\bar{m}}$ e poniamo $\widetilde{\alpha_{i+1}} : [0, t_{i+1}] \longrightarrow \mathbb{R}$ inversa locale che estende il sollevamento $\tilde{\alpha}_i$ come segue:

$$\widetilde{\alpha_{i+1}}(t) = \begin{cases} \tilde{\alpha}_i(t) & t \in [0, t_i] \\ \psi \circ \alpha(t) & t \in [t_i, t_{i+1}] \end{cases}$$

Tale funzione è continua per il lemma di incollamento 7.1.

Procedendo in questo modo definiamo $\widetilde{\alpha} : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ sollevamento di α a partire da x_0 .

- **Unicità:** Sia $\widehat{\alpha} : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ un altro sollevamento di α a partire da x_0 . Sia Y l'insieme dove $\widetilde{\alpha}$ e $\widehat{\alpha}$ coincidono:

$$Y := \{t \in I \mid \widetilde{\alpha}(t) = \widehat{\alpha}(t)\}$$

Allora:

- ◊ $0 \in Y \implies Y \neq \emptyset$ dato che $\widetilde{\alpha}(0) = \widehat{\alpha}(0) = x_0$.
- ◊ Y è chiuso per l'implicazione $1 \Rightarrow 3$) del teorema 4.3 (pag. 55), dato che si ha che, prese due mappe continue a valori in uno spazio di Hausdorff, l'insieme su cui coincidono è chiuso.

Mostriamo che Y è anche *aperto*, così per la connessione di I si ha che $Y = I$, il che implica $\widetilde{\alpha} = \widehat{\alpha}$. Per dimostrare che Y è aperto dimostriamo che è intorno di ogni suo punto, usando gli intorni uniformemente rivestiti.

Sia $t_0 \in Y$ e sia $\alpha(t_0) \in S^1$. Sia U un intorno aperto di $\alpha(t_0)$ uniformemente rivestito; si ha $e^{-1}(U) = \bigsqcup_{n \in \mathbb{Z}} V_n$ e vale inoltre:

$$\widetilde{\alpha}(t_0) = \widehat{\alpha}(t_0) \in e^{-1}(\alpha(t_0)) \subseteq e^{-1}(U)$$

Per il lemma 8.4 (pag. 8.4) $\exists! \bar{n}: \widetilde{\alpha}(t_0) = \widehat{\alpha}(t_0) \in V_{\bar{n}}$ aperto in \mathbb{R} .

Poniamo $A := \widetilde{\alpha}^{-1}(V_{\bar{n}}) \cap \widehat{\alpha}^{-1}(V_{\bar{n}})$. Si ha:

- ◊ A è aperto in I in quanto intersezione di controimmagine tramite funzioni continue di aperti.
- ◊ $t_0 \in A$.

Mostriamo ora che le due funzioni coincidano su A , ovvero $\widetilde{\alpha}(t) = \widehat{\alpha}(t), \forall t \in A$.

Se $t \in A$, per definizione di A si ha che $\widetilde{\alpha}(t)$ e $\widehat{\alpha}(t) \in V_{\bar{n}}$, dunque per definizione di sollevamento:

$$e(\widetilde{\alpha}(t)) = e(\widehat{\alpha}(t)) = \alpha(t)$$

Ma $e|_{V_{\bar{n}}}$ è iniettiva perché è un omeomorfismo, quindi $\widetilde{\alpha}(t) = \widehat{\alpha}(t) \implies A \subseteq Y \implies t_0$ è interno a Y . Per l'arbitrarietà di t_0 vale Y aperto. \square

DEFINIZIONE 8.8.3. GRADO DI UN CAMMINO CHIUSO IN S^1 .

Sia $\alpha : I \longrightarrow S^1$ un cammino chiuso con punto base $1 \in S^1$ e sia $\tilde{\alpha} : I \longrightarrow \mathbb{R}$ l'unico sollevamento di α a partire da $x_0 = 0 \in e^{-1}(1)$. Si definisce **grado** di α come il punto finale del sollevamento:

$$\deg(\alpha) := \tilde{\alpha}(1) \quad (8.32)$$

OSSERVAZIONE. (1) $\deg(\alpha) \in \mathbb{Z}$.

Quella appena data è una *buona definizione* grazie al teorema precedente che assicura che il sollevamento esiste ed è unico.

Inoltre $\deg(\alpha) \in \mathbb{Z}$: per definizione di sollevamento, siccome il cammino è chiuso:

$$\tilde{\alpha}(1) \in e^{-1}(\alpha(1)) = e^{-1}(\alpha(0)) = e^{-1}(1) = \mathbb{Z}$$

Il grado conta il **numero di giri** con *segno* di α intorno a S^1 , dove il segno è *positivo* se gira in senso *antiorario*, e *negativo* se gira in senso *orario*.

Abbiamo così formalizzato il numero di giri con segno intorno a S^1 .

ESEMPI.

- Sia $\alpha(t) = e^{2\pi it}$, con $t \in [0, 1]$, e sia $\tilde{\alpha}(t) = t$ il sollevamento di α a partire da $x_0 = 0$. Siccome $\tilde{\alpha}(1) = 1 \implies \deg \alpha = 1$, α percorre solo un giro in senso antiorario intorno a S^1 .
- Fissato $n \in \mathbb{Z}$, sia $\gamma : I \longrightarrow S^1$: esso è un cammino chiuso con punto base 1. Il sollevamento di γ con punto base $x_0 = 0$ è dato da $\tilde{\gamma}(t) = nt$, dunque $\deg \gamma = \tilde{\gamma}(1) = n$.

OSSERVAZIONE. (2) $\deg \alpha = \tilde{\alpha}(1) - \tilde{\alpha}(0)$.

Sia $\alpha : I \longrightarrow S^1$ un cammino chiuso con punto base 1, $\tilde{\alpha}_0$ il sollevamento di α con punto base $x_0 = 0$. Preso $n \in \mathbb{Z}$, si consideri $\tilde{\alpha}_n : I \longrightarrow \mathbb{R}$ definita come $\tilde{\alpha}_n = \tilde{\alpha}_0 + n$. Siccome per ogni punto nella *fibra* del punto iniziale esiste ed è unico il *sollevamento*, e siccome la fibra in questo caso è \mathbb{Z} si ha che, per ogni intero, il sollevamento sarà il traslato di $\tilde{\alpha}_0$. Verifichiamolo.

Si ha che $\tilde{\alpha}_n$ è continuo ed è un sollevamento di α , infatti:

$$e(\tilde{\alpha}_n(t)) = e^{2\pi i \tilde{\alpha}_n(t)} = e^{2\pi i (\tilde{\alpha}_0(t) + n)} = e^{2\pi i \tilde{\alpha}_0(t)} e^{2\pi i n} = \alpha(t)$$

Il suo punto iniziale è n , infatti $\tilde{\alpha}_n(0) = \tilde{\alpha}_0(0) + n = n$. Quindi $\tilde{\alpha}_n$ è il sollevamento di α a partire da $x_0 = n$.

Inoltre osserviamo che

$$\tilde{\alpha}_n(1) - \tilde{\alpha}_n(0) = \tilde{\alpha}_0(1) + n - \underbrace{(\tilde{\alpha}_0(0) + n)}_{=0} = \tilde{\alpha}_0(1) = \deg \alpha$$

Pertanto $\deg \alpha = \tilde{\alpha}(1) - \tilde{\alpha}(0)$ con $\tilde{\alpha}$ è un sollevamento qualsiasi.

Si può quindi riformulare la definizione di grado di un cammino chiuso α in S^1 con *punto base qualsiasi* come la differenza fra il punto finale e quello iniziale di un sollevamento

$\widetilde{\alpha}$ qualsiasi del cammino:

$$\deg(\alpha) := \widetilde{\alpha}(1) - \widetilde{\alpha}(0) \quad (8.33)$$

Vediamo ora come si comporta il grado rispetto al prodotto di cammini.

TEOREMA 8.8.1. Siano α, β cammini chiusi in S^1 con punto base 1. Allora:

$$\deg(\alpha * \beta) = \deg \alpha + \deg \beta \quad (8.34)$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $\widetilde{\alpha}$ il sollevamento di α a partire da $x_0 = 0$. Allora definiamo $a := \widetilde{\alpha}(1) = \deg \alpha \in \mathbb{Z}$. Sia $\widehat{\beta}$ il sollevamento di β a partire da a ; si ha:

$$\deg \beta = \widehat{\beta}(1) - \widehat{\beta}(0) = \widehat{\beta} - a$$

Siccome $\widetilde{\alpha}, \widehat{\beta} : I \longrightarrow \mathbb{R}$ e $\widetilde{\alpha}(1) = \widehat{\beta}(0)$ si può considerare il cammino prodotto $\widetilde{\alpha} * \widehat{\beta} : I \longrightarrow \mathbb{R}$. Dimostriamo che è un sollevamento di $\alpha * \beta$:

$$e(\widetilde{\alpha} * \widehat{\beta}(t)) = e^{2\pi i \widetilde{\alpha} * \widehat{\beta}(t)} = \begin{cases} e^{2\pi i \widetilde{\alpha}(t)}, & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ e^{2\pi i \widehat{\beta}(2t-1)}, & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases} = \begin{cases} \alpha(2t), & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \beta(2t-1), & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases} = \alpha * \beta(t)$$

$$(\widetilde{\alpha} * \widehat{\beta})(0) = \widetilde{\alpha}(0) = 0 \implies \deg(\alpha * \beta) = (\widetilde{\alpha} * \widehat{\beta})(1) = \widehat{\beta}(1) = a + \deg \beta = \deg \alpha + \deg \beta$$

□

Si può dimostrare, anche se in questa sede non lo faremo, che il grado è *invariante* per omotopia di cammini; concettualmente consiste nel costruire un sollevamento fra le omotopie per mostrare che hanno lo stesso grado.

TEOREMA 8.8.2. TEOREMA DI MONODROMIA.

Siano α, β cammini chiusi in S^1 con punto base 1 e supponiamo che α e β siano cammini omotopi. Allora $\deg \alpha = \deg \beta$, cioè il grado è invariante per omotopia di cammini.

8.8.3 Dimostrazione del gruppo fondamentale della circonferenza

TEOREMA 8.8.3. GRUPPO FONDAMENTALE DI S^1

$$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z} \quad (8.35)$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $\Phi : \pi_1(S^1, 1) \longrightarrow \mathbb{Z}$. Vogliamo dimostrare che è un **isomorfismo di gruppi** per ottenere la tesi.

- Φ è un'applicazione *ben definita* per il teorema di monodromia.
- Φ è un *morfismo di gruppi*: dati $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(S^1, 1)$ si ha che:

$$\Phi([\alpha] \cdot [\beta]) = \Phi([\alpha * \beta]) = \deg(\alpha * \beta) = \deg \alpha + \deg \beta = \Phi([\alpha]) + \Phi([\beta])$$

- Φ è *suriettiva*: $\forall n \in \mathbb{Z}, \exists \gamma$ cammino chiuso in S^1 e di grado $n \implies \Phi([\gamma]) = n$.

- Φ è *iniettiva*; per far ciò, mostriamo che $\ker \Phi$ è banale. Sia $[\alpha] \in \ker \Phi$, vogliamo dimostrare che $[\alpha] = [C_1]$, cioè $\alpha \sim C_1$ cammino costante in S^1 . Per ipotesi $\deg \alpha = \Phi([\alpha]) = 0$, quindi si consideri il sollevamento di α con punto base $x_0 = 0$. Si ha $\deg \alpha = \tilde{\alpha}(1) = 0$, cioè α è un cammino chiuso. Siccome \mathbb{R} è contraibile, allora è *semplicemente connesso*, dunque $\pi_1(\mathbb{R}, 0) = \{1\}$ e $[\tilde{\alpha}] \in \pi_1(\mathbb{R}, 0) = \{1\}$. Pertanto, $[\tilde{\alpha}] = [C_0] \implies \exists F : I \times I \longrightarrow \mathbb{R}$ omotopia di cammini fra $\tilde{\alpha}$ e C_0 . F è continua e:

$$\begin{cases} F(t, 0) = \tilde{\alpha}(t) & \forall t \in I \\ F(t, 1) = 0 & \end{cases} \quad F(0, s) = F(1, s) = 0, \forall s \in I$$

Sia $G := e \circ F : I \times I \longrightarrow S^1$; G è continua e vale che:

$$\begin{cases} G(t, 0) = e(F(t, 0)) = e(\tilde{\alpha}(t)) = \alpha(t) & \forall t \in I \\ G(t, 1) = e(F(t, 1)) = e(0) = 1 & \end{cases} \quad G(0, s) = G(1, s) = 1, \forall s \in I$$

G è un'omotopia di cammini fra α e C_1 in S^1 , pertanto Φ iniettiva. Concludiamo che Φ è isomorfismo di gruppi e segue dunque la tesi. \square


8.8.4 Alcune conseguenze del gruppo fondamentale della circonferenza

Osserviamo ora, con un esempio sulla circonferenza, che il corollario 8.8 *non* vale se A e B non sono *aperti*.

ESEMPIO. Siano $X = S^1$, $A = (S^1 \cap \{y > 0\}) \cup \{(1, 0)\}$ e $B = S^1 \cap \{y \leq 0\}$: notiamo come non sono aperti in X .

- $A \cong (0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ convesso in \mathbb{R} , allora A è contraibile e dunque semplicemente connesso.
- $B = S^1 \cap \{y \leq 0\} \cong [0, 1]$ convesso in \mathbb{R} , allora B è contraibile e dunque semplicemente connesso.

Si ha che $X = A \cup B$, $A \cap B = \{(1, 0)\} \neq \emptyset$ e **c.p.a.**, ma $X = S^1$ come abbiamo appena dimostrato *non* è semplicemente connesso!



COROLLARIO 8.8.0. (MANETTI, 12.38)

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ il *disco unitario* e $A = \partial D$ il suo *bordo*, ovvero $A = S^1$. Allora A non è un retratto di D .

DIMOSTRAZIONE. Se A fosse un retratto, allora $\pi_1(A)$ dovrebbe essere isomorfo ad un sottogruppo di $\pi_1(D)$. Tuttavia, $\pi_1(A) = \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ e $D \subseteq \mathbb{R}^2$ convesso $\implies \pi_1(D) = \{1\}$, il che è un assurdo in quanto $\mathbb{Z} \not\subset \{1\}!$. \square


OSSERVAZIONE. Allo stesso modo, se X è uno spazio topologico *semplicemente connesso* e $A \subseteq X$ con $A \cong S^1$, allora A *non* può essere un retratto di X .

COROLLARIO 8.8.1. TEOREMA DEL PUNTO FISSO DI BROUWER (MANETTI 12.39)

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ il disco unitario e sia $f : D \longrightarrow D$ continua. Allora f ha un punto fisso, ovvero $\exists x_0 \in D : f(x_0) = x_0$.

DIMOSTRAZIONE. Per assurdo, supponiamo che f non abbia punti fissi, ovvero $f(x_0) \neq x_0, \forall x_0 \in D$. Utilizziamo f per costruire una retrazione che non può esistere per motivi topologici. Sia $r : D \longrightarrow \partial D$ retrazione continua con $r_{\partial D} = Id_{\partial D}$ definita nel modo seguente:

Presa S la semiretta aperta uscente da $f(x)$ (essendo aperta il punto $f(x)$ è escluso) e passante per x (in quanto $x \neq f(x)$ per ipotesi dell'assurdo), si ponga $r(x) = S \cap \partial D$.



Se $x \in \partial D$, allora $x = r(x) \implies r|_{\partial D} = Id_{\partial D} \implies r$ retrazione, il che è assurdo per il corollario precedente. \square

8.8.4.1 Invarianza della dimensione

Grazie al calcolo del gruppo fondamentale della circonferenza si riescono anche a dimostrare dei casi particolari del *teorema di invarianza della dimensione* (che verrà affrontato nel corso di *Topologia Algebrica*).

TEOREMA 8.8.4. TEOREMA DI INVARIANZA DELLA DIMENSIONE.

Siano $U \subseteq \mathbb{R}^n$ e $V \subseteq \mathbb{R}^m$ aperti. Se U e V sono omeomorfi allora $n = m$. Per contronominale, se $n \neq m$ allora U e V non sono omeomorfi.

ESEMPIO. Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto con $n \geq 2$. Allora U non è omeomorfo ad un aperto di \mathbb{R} . Per dimostrarlo basta considerare una palla B in \mathbb{R}^n ed un intervallo I in \mathbb{R} e togliere ad entrambe un punto: nel primo caso si ottiene ancora un *connesso*, mentre nel secondo uno *sconnesso*, dunque non possono essere omeomorfi.

TEOREMA 8.8.5. Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto con $n \geq 3$. Allora U non è omeomorfo ad un aperto di \mathbb{R}^2 .

DIMOSTRAZIONE. Ragionando per assurdo, ipotizziamo che U sia omeomorfo ad un aperto di \mathbb{R}^2 . Sia $B \subseteq U$ una palla aperta di centro p , allora B è omeomorfo ad un aperto A di \mathbb{R}^2 .

Sia $q \in A$ il punto corrispondente a p tramite l'omeomorfismo, dunque $B \setminus \{p\}$ è omeomorfo a $A \setminus \{q\}$, ma $B \setminus \{p\}$ ha lo stesso tipo di omotopia di S^{n-1} .

Infatti, sia S una sfera centrata in p tale per cui $S \subset B$, si ha che $S \cong S^{n-1}$ e $S \subset B \setminus \{p\}$ è un *retratto di deformazione*. Supponiamo per semplicità che $p = \mathbf{0}$; la retrazione è data da:

$$\begin{aligned} r : B \setminus \{\mathbf{0}\} &\longrightarrow S \\ x &\longmapsto R \frac{x}{\|x\|} \end{aligned}$$

Con R raggio di S . Segue che $A \setminus \{q\}$ ha lo stesso tipo di omotopia di $S^{n-1}, n \geq 3 \implies n - 1 \geq 2 \implies S^{n-1}$ è semplicemente connesso, cioè $A \setminus \{q\}$ è *semplicemente connesso*. Dimostriamo ora che questo è assurdo.

A aperto $\Rightarrow \exists C$ circonferenza centrata in q tale che $C \subset A$. Si ha che C è un retratto (in generale *non* di deformazione!) di $A \setminus \{q\}$, sempre con la stessa retrazione di prima:

$$\begin{aligned} f : A \setminus \{q\} &\longrightarrow C \\ x = q + (x - q) &\longmapsto q + r(C) \frac{x-q}{\|x-q\|} \end{aligned}$$

Con $r(C)$ raggio di C e lo spostamento dovuto al fatto che C è centrata in q . Se $x_0 \in C \subset A \setminus \{q\}$, siccome esso è un retratto, si ha che $\mathbb{Z} \cong \pi_1(C, x_0) \hookrightarrow \pi_1(A \setminus \{q\}, x_0) = \{1\}$, da cui l'assurdo. \square

ATTENZIONE! Non abbiamo potuto supporre che A fosse una palla perché non sappiamo che "forma" abbia dato l'omeomorfismo!

8.8.5 Gruppo fondamentale del prodotto

TEOREMA 8.8.6. (MANETTI, 11.17)

Siano X e Y spazi topologici, $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$. Allora:

$$\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \oplus \pi_1(Y, y_0) \quad (8.36)$$

ATTENZIONE! Con \oplus si intende la *somma diretta* di gruppi, da intendersi come *prodotto cartesiano* i cui morfismi sono *componente per componente*. È diversa dalla *somma diretta fra spazi vettoriali*, dato in quest'ultimo caso essa è *interna*!

DIMOSTRAZIONE. Un cammino $\alpha : I \longrightarrow X \times Y$ è determinato dalle sue componenti $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ con $\alpha_1 : I \longrightarrow X$ e $\alpha_2 : I \longrightarrow Y$, dunque c'è la seguente corrispondenza biunivoca:

$$\Omega(X \times Y; x_0, y_0, (x_0, y_0)) \leftrightarrow \Omega(X; x_0, x_0) \times \Omega(Y; y_0, y_0)$$

Allo stesso modo, la mappa $F : I \times I \longrightarrow X \times Y$ è determinata dalle sue componenti (F_1, F_2) con $F_1 : I \times I \longrightarrow X$ e $F_2 : I \times I \longrightarrow Y$; inoltre, si ha che F è omotopia fra i cammini α e β se e solo se F_i è un'omotopia di cammini fra α_i e β_i . Dunque c'è una corrispondenza biunivoca tra i quozienti:

$$\begin{aligned} \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) &\leftrightarrow \pi_1(X, x_0) \oplus \pi_1(Y, y_0) \\ [\alpha] &\leftrightarrow ([\alpha_1], [\alpha_2]) \end{aligned}$$

Essa è anche un morfismo di gruppi, dato che $\alpha * \beta = (\alpha_1 * \beta_1, \alpha_2 * \beta_2)$: i gruppi sono isomorfi. \square

8.9 ALCUNI ESEMPI DI GRUPPI FONDAMENTALI

8.9.1 Toro

DEFINIZIONE 8.9.0. TORO.

Il **toro** T è lo spazio dato dal prodotto $S^1 \times S^1$.

Siccome $S^1 \subset \mathbb{R}^2$, si ha sicuramente che $T \subset \mathbb{R}^4$; tuttavia, esso è *omeomorfo* al sottospazio X di \mathbb{R}^3 che possiamo visualizzare come una “ciambella”. In particolare, si può definire come effetto della *rotazione* attorno all’asse z di una *circonferenza* ad esso disgiunto.


Per il teorema precedente si ha:

$$\pi_1(T) = \pi_1(S^1 \times S^1) = \pi_1(S^1) \oplus \pi_1(S^1) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

Siccome \mathbb{Z} è un gruppo *ciclico infinito*, posso considerare per il gruppo fondamentale $\pi_1(S^1)$ i generatori $\{-1\}$ e $\{1\}$, cioè la classe del cappio di grado 1 e quella di grado -1 ; si utilizzerà come generatore *standard* $\gamma(t) = e^{2\pi it}$.

Per il toro, dunque, consideriamo i generatori corrispondenti a $(1, 0)$ e $(0, 1)$ in $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$; scelto pertanto il punto base $x_0 = (1, 1)$ si hanno:

- $\alpha(t) = (e^{2\pi it}, 1)$, corrispondente ad un giro nel senso della circonferenza indicata in **rosso**.
- $\beta(t) = (1, e^{2\pi it})$, corrispondente ad un giro nel senso della circonferenza indicata in **blu**.



8.9.2 Un gruppo fondamentale non abeliano

Sia X l’unione ad un punto di due circonference in \mathbb{R}^2 , cioè il **bouquet di due circonference** che abbiamo trattato a pag. 91. Si ha che $\pi_1(X, x_0)$ è *infinito*: presi i cammini $[\alpha]$ e $[\beta]$ per ciascuna delle due circonference, con punto base x_0 dato dall’intersezione delle due circonference, essi *non* commutano, ovvero $[\alpha * \beta] \neq [\beta * \alpha]$.

Inoltre $\pi_1(X, x_0)$ è generato da $[\alpha]$ e da $[\beta]$.

8.9.3 Spazio proiettivo reale

Consideriamo ora il caso dello *spazio proiettivo reale*, che abbiamo introdotto nel capitolo Capitolo 5.

Ricordiamo la definizione 5.6:

$$\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) = \frac{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}}{\sim}$$

Dove $x \sim y \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}: y = \lambda x$, cioè \sim è la relazione indotta dall’azione di $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ su $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ per moltiplicazione.

Ricordiamo inoltre la proposizione 5.2 per cui $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è *compatto* e *connesso*; si ha inoltre che $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è di **Hausdorff**.

Considerata la *restrizione* della proiezione $\pi_0 := \pi|_{S^n} : S^n \longrightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$, essa è continua, suriettiva e chiusa (in quanto funzione da compatto in **Hausdorff**), quindi π_0 è un’identificazione. Pertanto, $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è anche un quoziente di S^n rispetto alla relazione che identifica i *punti antipodali* p e $-p$.

Si consideri dunque la funzione associata:


$$\begin{aligned} \varphi : S^n &\longrightarrow S^n & \text{omeomorfismo di } S^n \\ p &\longmapsto -p \end{aligned} \tag{8.37}$$

Tale relazione di equivalenza su S^n è indotta dall'azione del gruppo $\{\pm 1\}$ per moltiplicazione, dunque $\pi_0 : S^n \longrightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è sia chiusa, sia aperta. In particolare, se $U \subset S^n$ è un aperto su cui π_0 è *iniettiva*, allora $\pi_{0|_{S^n}} : U \longrightarrow \pi_0(U)$ è un *omeomorfismo* perché continua, biunivoca e aperta.

Da notare che, se π_0 è iniettiva su U , allora $U \subsetneq S^n$, dunque se $p_0 \in S^n \setminus \{p_0\} \cong \mathbb{R}^n$ segue che $\pi_0(U)$ aperto in $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è omeomorfo ad un aperto di \mathbb{R}^n .

Analizziamo alcuni casi di dimensione *bassa*:

- **$n = 1$: retta proiettiva reale $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$.**
- **$n = 2$: piano proiettivo reale.** La sua descrizione geometrica esplicita può essere *complicata*, tuttavia possiamo trovare un *modello* che ci permetta di studiarlo comodamente. Data la mappa $\pi_0 : S^2 \longrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ e considerata la *calotta superiore* della sfera compreso l'*equatore*, cioè $C := S^2 \cap \{z \geq 0\}$, si ha che $\pi_0(C) = \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$. Dunque, $\pi_{0|_C} : C \longrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ è ancora chiusa ed è ancora un'identificazione.




Sia ora $D \subset \mathbb{R}^2$ il disco unitario; si ha che $D \cong C$ tramite la proiezione ortogonale dei punti della calotta superiore sul piano xy , dunque $D \longrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ è un'identificazione che identifica i *punti antipodali* su ∂D . Lo spazio quoziante che otteniamo su D (e anche su C , chiaramente) è omeomorfo a $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ e prende il nome **modello piano di $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$** .

Da ciò si vede, anche intuitivamente, che il gruppo fondamentale risulta un gruppo di due elementi:

$$\pi_1(\mathbb{P}^2(\mathbb{R}), p_0) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\} \quad (8.38)$$


Vediamo il perché. Preso un punto base p_0 :

- ◊ Qualunque cappio contenuto all'interno del disco, cioè senza toccare alcun punto del bordo, è omotopicamente equivalente al cammino banale C_0 (e quindi la classe è $[C_0]$).




- ◊ Qualunque cappio che va "oltre il bordo" una volta, attraversando il cammino banale e torna indietro al punto base non è banale. Infatti, non possiamo ridurre il cammino ad un cappio sul piano (dato che non avremmo più i punti sul bordo *antipodali*), al più possiamo "ruotarlo" attorno al punto base per ottenere un'altro cappio omotopico al primo che attraversa sempre il bordo².


²Per semplicità, nelle figure abbiamo preso come punto il centro del disco. Questi ragionamenti e quelli successivi si adattano facilmente anche nel caso di un *punto generico*, ponendo una leggera *deformazione* al cappio in modo da fare rotazioni "lecite", cioè che mantengono i punti del cammino posti sul bordo *antipodali*.



Tuttavia, un cappio che va oltre il bordo *due volte* è omotopicamente equivalente al cammino costante. Infatti, possiamo “ruotare” la seconda parte del cappio (nell’immagine indicata con 3 e 4, cioè la parte del laccio dopo che ha già attraversato una volta il bordo) in modo da ottenere il cammino come in figura.



In questo modo, percorrendo il cappio si attraversa il bordo e, quando si arriva al punto base per la prima volta, si torna indietro e si ripercorre il percorso appena fatto all’indietro.



In termini di classi si ha:

$$[\alpha]^2 = [\alpha * \bar{\alpha}] = [C_{p_0}]$$

Ottenendo quindi come gruppo fondamentale un gruppo di due soli elementi.

III

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TOPOLOGICHE

CAPITOLO 9

VARIETÀ TOPOLOGICHE

“BEEP BOOP INSERIRE CITAZIONE QUA BEEP BOOP.”

NON UN ROBOT, UN UMANO IN CARNE ED OSSA BEEP BOOP.

9.1 VARIETÀ TOPOLOGICHE

Si vuole formalizzare il concetto di avere *localmente* la topologia euclidea.

DEFINIZIONE 9.1.0. LOCALMENTE EUCLIDEO.

Uno spazio topologico X si dice **localmente euclideo** di dimensione n se ogni punto di X ammette un intorno aperto omeomorfo ad una palla aperta di \mathbb{R}^n .

DEFINIZIONE 9.1.1. VARIETÀ TOPOLOGICA.

Uno spazio topologico X si dice **varietà topologica** di dimensione n se X è di **Hausdorff**, connesso, a base numerabile e localmente euclideo di dimensione n .

ESEMPI.

- \mathbb{R}^n è una varietà topologica di dimensione n .
- S^n è una varietà topologica compatta di dimensione n , infatti grazie alla proiezione stereografica si ha che $S^1 \setminus \{\ast\} \cong \mathbb{R}$.
- $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ è una varietà topologica compatta di dimensione n .
- Ogni aperto connesso di una varietà topologica di dimensione n è una varietà topologica di dimensione n .

OSSERVAZIONE. La dimensione di una varietà topologica è *ben definita* per l'*invarianza della dimensione*.

OSSERVAZIONI.

- Una varietà topologica è c.p.a..

- Se X è una varietà topologica di dimensione n e Y è una varietà topologica di dimensione m allora $X \times Y$ è una varietà topologica di dimensione $n + m$.

ESEMPIO. $T = S^1 \times S^1$ è una varietà topologica di dimensione 2.

TEOREMA 9.1.0. Sia X uno spazio topologico compatto, connesso, **Hausdorff** e localmente euclideo di dimensione n . Allora X è a *base numerabile*, dunque X è una varietà topologica di dimensione n .

9.1.1 Dimensione 1

Analizziamo il caso di varietà topologiche di dimensione 1, per esempio \mathbb{R} e S^1 .

TEOREMA 9.1.1. Ogni varietà topologica di dimensione 1 è omeomorfo a \mathbb{R} se non è compatta, oppure a S^1 se compatta.

ESEMPIO. Riconsideriamo l'esempio della **retta con 2 origini** (sez. 4.1.2.3, pag. 4.1.2.3): essa è un quoziente non **Hausdorff**, dunque non è una varietà topologica.

9.1.2 Dimensione 2

DEFINIZIONE 9.1.2. SUPERFICIE TOPOLOGICA.

Una varietà topologica di dimensione 2 si dice **superficie topologica**.


ESEMPI.

- Il **piano** \mathbb{R}^2 oppure $\mathbb{R}^2 \setminus \{n \text{ punti}\}$ sono superfici topologiche di dimensione 2 non compatte.
- La **sfera** S^2 è una superficie topologica compatta.
- Il **toro** $T = S^1 \times S^1$ è una superficie topologica compatta.
- Il **piano proiettivo** $P = \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ una superficie topologica compatta.


Vogliamo dare una classificazione delle superfici topologiche *compatte*. Innanzitutto, esaminiamo alcuni esempi di superfici compatte studiandole sul *modello piano*, di cui daremo successivamente una definizione formale.

ESEMPI. MODELLI PIANI.


- Siccome $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ è un quoziente del disco, allora, a meno di omeomorfismo, lo si può anche vedere come un quoziente di $I \times I$ con una relazione di equivalenza sul bordo con parola *abab*.



- Anche il **toro** si può vedere come quoziente di $I \times I$ con parola $aba^{-1}b^{-1}$.



- Vediamo S^2 come quoziente di $I \times I$ con parola $bb^{-1}a^{-1}a$.



OSSERVAZIONE. Sia $P \subset \mathbb{R}^2$ un poligono pieno con un numero *pari* di lati. Sia \sim una relazione di equivalenza che identifica i lati a 2 a 2. Allora $S := P/\sim$ è una superficie topologica compatta, infatti:

- P è connesso e compatto $\implies S$ connesso e compatto.
- S è localmente euclideo di dimensione 2. Infatti, sia $p \in S$:
 - Se p viene da un punto interno al poligono allora si sceglie un intorno aperto U centrato in tale punto tale che $U \cap \partial P = \emptyset$, data la proiezione


$\pi : P \longrightarrow S$, $\pi(U) \cong U$ ed è un intorno aperto di p .

- Se p viene da un punto interno ad un lato grazie all'identificazione dei lati a due a due si ha che passando al quoziente, cioè un intorno aperto di p omeomorfo ad un disco aperto. Se p viene da un vertice, siccome i vertici vengono identificati con i vertici, analogamente al caso dei lati si ottiene un intorno aperto di p in S omeomorfo ad un disco aperto di \mathbb{R}^2 .

3. S è di Hausdorff.

Osserviamo che nella relazione di equivalenza due lati vengono identificati nel modo seguente: $l_i \cong [0, 1]$, dunque scelgo un omeomorfismo $l_1 \xrightarrow{\varphi} l_2$, $p_1 \in l_1 \sim \varphi(p) \in l_2$ e φ manda vertici in vertici.


Il poligono P con la relazione di equivalenza sui lati è detto un **modello piano** della superficie S e può essere schematizzato con una *sequenza di lettere* detta **parola**. Ad esempio, per la parola $aba^{-1}cbc^{-1}$ si ottiene il modello piano seguente:




Inoltre, il modello piano di una superficie compatta *non è unico*.

ESEMPI.


- Abbiamo già visto il modello piano di S^2 sul *quadrato*; per la costruzione effettuata, possiamo unire la sequenza di lati ab in un unico lato c in modo da ottenere un modello costituito da un poligono *improprio a due lati*, con parola cc^{-1} :




- Anche il modello piano di $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ sul *quadrato* può essere trasformato in uno sul poligono a due lati, unificando ba per ottenere un'unico lato c e un modello con parola cc :




- La **bottiglia di Klein** K è la superficie compatta data dal modello piano:



Confrontiamo la costruzione della bottiglia di Klein con la costruzione del *toro*, vista precedentemente. Innanzitutto otteniamo in entrambi il cilindro $S^1 \times I$ con la relazione di equivalenza sul *bordo*; notiamo che nella bottiglia di Klein (il modello inferiore nella figura sotto) il “verso” rispetto al quale *incolleremo* i bordi sono uno l’opposto dell’altro.




Questo comporta che la bottiglia di Klein *non* può essere rappresentata in \mathbb{R}^3 ; tuttavia, possiamo visualizzarla in modo improprio operando un “taglio” nella superficie e compenetrando uno dei due estremi del cilindro nella figura, come di seguito.



9.2 SOMMA CONNESSA DI SUPERFICI COMPATTE


Siano S_1 e S_2 superfici compatte e siano $x \in S_1$ e $y \in S_2$. Siano $D_x \subset S_1$ e $D_y \subset S_2$ intorni di x e y rispettivamente, omeomorfi ad un disco chiuso $D \subset \mathbb{R}^2$:

$$D_x \xrightarrow{h} D_y$$




Togliamo dalle due superfici gli interni dei dischetti, creando dunque lo spazio:

$$Y := (S_1 \setminus D_x^\circ) \sqcup (S_2 \setminus D_y^\circ)$$



Incolliamo ora i due pezzi di Y lungo i bordi dei dischi, cioè mettiamo su Y la seguente relazione di equivalenza:


$$x_1 \sim y_1 \iff x_1 = y_1 \text{ oppure } x_1 \in \partial D, y_1 \in \partial D \text{ e } y_1 = h(x_1) \text{ (o viceversa)}$$



Vediamo ora qualche fatto che *non* dimostriamo:

- Il quoziente è ancora una superficie topologica, che chiamiamo **somma connessa** $S_1 \# S_2$ di S_1 e S_2 .
- La somma connessa $S_1 \# S_2$, a meno di omeomorfismo, *non dipende* dalle scelte fatte come i punti x e y , gli intorni D_x e D_y , l'omeomorfismo h , ma soltanto da S_1 e da S_2 !
- La somma connessa di superfici compatte è, a meno di omeomorfismi, *commutativa* e *associativa*:
 - ◊ **COMMUTATIVA:** $S_1 \# S_2 \cong S_2 \# S_1$.
 - ◊ **ASSOCIAUTIVA:** $(S_1 \# S_2) \# S_3 \cong S_1 \# (S_2 \# S_3)$.
- Se S_1, S_2 sono superfici compatte, allora anche $S_1 \# S_2$ è una superficie topologica compatta.

OSSERVAZIONE. Sia X una superficie compatta. Allora $X \# S^2 \cong X$. Infatti, $S^2 \setminus D_y$ è omeomorfismo ad un *disco chiuso* in \mathbb{R}^2 . Dato che stiamo togliendo un disco anche ad X per poi aggiungerne un altro, ritroviamo X a meno di omeomorfismi.




DEFINIZIONE 9.2.0. SOMMA DI TORI.

Indichiamo con T_g la **somma connessa di $g \geq 1$ tori**:

$$T_g = \underbrace{T \# \dots \# T}_{g \text{ volte}} \quad g \geq 1 \quad (T_1 = T) \quad (9.1)$$


T_g può essere visualizzato sia come “ciambella con g buchi”, sia “come sfera con g manici”.




9.2.0.1 Rappresentazione della somma connessa tramite modelli piani

Supponiamo che S_1 e S_2 abbiano entrambe un modello piano, rappresentato da una parola.


Ad esempio, prendiamo come S_1 un toro, con parola $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1}$. Scegliamone un *vertice* e prendiamo un disco \bar{U} passante per il vertice che non tocca il resto del bordo.




Per fare la somma connessa, togliamo U :



Facciamo lo stesso con la seconda superficie, S_2 (che in questo esempio è anch'essa un toro di parola $a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1}$).



Infine, *incolliamo* lungo i due nuovi lati creati bucando le due superfici:



Il modello ottenuto è un modello piano per $S_1 \# S_2$, la cui parola associata è ottenuta per concatenazione:

$$\underbrace{a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1}}_{\text{modello piano di } S_1} \quad \underbrace{a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1}}_{\text{modello piano di } S_2}$$

ESEMPIO. Il toro T è dato dalla parola $aba^{-1}b^{-1}$. Allora $T_g = T \# \dots \# T$ ha un modello piano dato dalla parola :

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1} \dots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}$$

T_g è un quoziente con $4g$ lati.

DEFINIZIONE 9.2.1. SOMMA CONNESSA DI n PIANI PROIETTIVI Preso il piano proiettivo reale $P = \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$, definiamo la **somma connessa di n piani proiettivi** come:

$$P_n = \underbrace{P \# \dots \# P}_{n \text{ volte}} \quad n \geq 1 \quad (P_1 = P)$$



OSSERVAZIONE.

Studiamo come la *bottiglia di Klein* altro non è che la somma connessa di due piani proiettivi, cioè $K = P \# P = P_2$.


K ha il modello piano quadrato con parola $aba^{-1}b$, mentre invece $P = \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ ha il modello piano a due lati con parola cc .

Pertanto, la somma connessa $P \# P$ ha il modello piano dato dalla parola $ccdd$.

Vogliamo vedere che $aba^{-1}b$ e $ccdd$ danno la stessa superficie. Partiamo dal primo modello e tagliamo lungo la diagonale.



Incolliamo lungo il lato b :




Infatti, otteniamo come modello $aaee$, che corrisponde a $P \# P$.


LEMMA 9.2.0.

$$T \# P = K \# P = P \# P \# P \quad (9.2)$$

DIMOSTRAZIONE. Sappiamo già che, essendo $K = P \# P$, allora $K \# P = P \# P \# P$. Vogliamo invece mostrare ora che $T \# P$ sia uguale a $K \# P$. Facciamo un procedimento di taglia e incolla, partendo da $T \# P$, modello piano con parola $aba^{-1}b^{-1}cc$.




Incolliamo lungo c :




Otteniamo un modello piano di $T \# P$ che può essere descritto dalla parola $dadbab^{-1}$. Prendiamo adesso $K \# P$, di parola $\underbrace{\delta\beta\delta^{-1}\beta}_{K} \underbrace{\gamma\gamma}_{P}$:

$$\underbrace{\delta\beta\delta^{-1}\beta}_{K} \underbrace{\gamma\gamma}_{P}$$



Incolliamo lungo γ :



Ottieniamo un modello piano di $K \# P$ che può essere descritto dalla parola $\delta\alpha\delta\beta\alpha\beta^{-1}$, che corrisponde lettera per lettera al modello $T \# P$. \square

COROLARIO 9.2.0. Se $g \geq 1$ e $n \geq 1$ si ha:

$$T_g \# P_n = P_{n+2g} \quad (9.3)$$

DIMOSTRAZIONE. Se $g = 1$:

$$T \# P_n = \underbrace{T \# P}_{P_3} \# P_{n-1} = P_3 \# P_{n-1} = P \# P_{n+2}$$

Procediamo per induzione su g ; se è vero per $g - 1$, allora:

$$T_g \# P_n = T \# T_{g-1} \# P_n = T \# P_{n+2g-2} = T \# P \# P_{n+2g-3} = P_3 \# P_{n+2g-3} = P_{n+2g}$$

\square

9.3 CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TOPOLOGICHE COMPATTE

TEOREMA 9.3.0. CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TOPOLOGICHE COMPATTE.

Ogni superficie topologica compatta è omeomorfa a S^2 , T_g per qualche $g \geq 1$ oppure P_n per qualche $n \geq 1$.

Inoltre, tali superficie sono tutte distinte, ovvero:

- $T_g \not\cong T_{g'}$ se $g \neq g'$.
- $P_n \not\cong P_{n'}$ se $n \neq n'$.

- $T_g \not\cong P_n \forall n \geq 1, \forall g \geq 1.$
- $S^2 \not\cong T_g \forall g \geq 1.$
- $S^2 \not\cong P_n \forall n \geq 1.$

9.3.1 Triangolazione


DEFINIZIONE 9.3.0. TRIANGOLO GEOMETRICO.

Sia S una superficie compatta. Un **triangolo geometrico** T in S è un applicazione:

$$\varphi : T' \longrightarrow T \subseteq S \quad (9.4)$$

Dove $T' \subseteq \mathbb{R}^2$ è un triangolo *non degenere* (compreso dell'interno), inteso nel senso tradizionale del termine, mentre φ è un omeomorfismo.

I vertici e i lati di T sono le immagini tramite φ dei vertici e dei lati di T' .



DEFINIZIONE 9.3.1. TRIANGOLAZIONE.

Sia S una superficie compatta. Una **triangolazione** di S è una collezione *finita* di triangoli geometrici T_1, \dots, T_r in S tale che:

1. $S = T_1 \cup \dots \cup T_r.$
2. $\forall i \neq j$ si ha che $T_i \cap T_j$ può essere una di queste tre possibilità:
 - $\emptyset.$
 - Un *vertice* di entrambi i triangoli.
 - Un *lato* di entrambi i triangoli.

Una superficie compatta S si dice **triangolabile** se ammette una triangolazione.

ESEMPIO. Il **tetraedro** dà una triangolazione della sfera con 4 triangoli.

Enunciamo ora un teorema (di cui *non* daremo dimostrazione) che ci servirà successivamente per poter classificare le superfici compatte direttamente con i loro modelli piani associati.

TEOREMA 9.3.1. TEOREMA DI RADÒ, 1925.

Ogni superficie compatta è triangolabile.

COROLLARIO 9.3.0. Ogni superficie compatta S ha un modello piano.

DIMOSTRAZIONE. Per il teorema di Radò, S ammette una triangolazione T_1, \dots, T_r . Riporiamo gli r triangoli nel piano, con i lati identificati. Incolliamo poi i lati uno ad uno fino ad ottenere un unico poligono con delle identificazioni sui lati. \square

9.3.2 Dimostrazione del teorema di classificazione: prima parte

La prima parte della dimostrazione del teorema di classificazione si occupa di dimostrare che *tutte le superfici compatte sono omeomorfe a S^2 , T_g o P_n* . Grazie al corollario appena dimostrato, possiamo studiare direttamente il *modello piano* associato alla superficie compatta S in esame, cioè studieremo un *poligono* con i lati identificati a 2 a 2. Diamo ora una nomenclatura utile.

DEFINIZIONE 9.3.2. COPPIE DI LATI.

Nel modello piano, una *coppia di lati* identificati tra di loro:


- È del **primo tipo** se, percorrendo il bordo del poligono, i due lati compaiono con *orientazione opposta*.
- È del **secondo tipo** se, percorrendo il bordo del poligono, i due lati compaiono con la *stessa orientazione*.

ESEMPIO. Nella *bottiglia di Klein K*, modello con parola $aba^{-1}b$, i lati a sono del I tipo, mentre i lati b sono del II tipo.

La dimostrazione è *costruttiva*: procederemo passo per passo, da un modello piano di una qualunque superficie compatta ad ottenere una delle superfici citate nel teorema con un **algoritmo di taglia e incolla**.

DIMOSTRAZIONE.


PASSO 0: se nel modello piano ci sono solo 2 lati abbiamo finito. Infatti, abbiamo solo due superfici con un modello di questo tipo, che abbiamo già visto:




Possiamo supporre che nel modello piano c'è un numero di lati maggiore di 4.

PASSO 1: Eliminazione delle coppie adiacenti del I tipo.

Supponiamo che nel modello piano ci sia una coppia di lati *adiacenti* del I tipo, come in figura.




Incolliamo i lati a della coppia: in questo modo, otteniamo un nuovo modello piano omeomorfo al primo con due lati in meno.




Ripetiamo il passo 1 finché eliminiamo tutte le coppie adiacenti del I tipo. Se alla fine abbiamo due soli lati, ricadiamo nel passo 0 e abbiamo già finito la dimostrazione.

PASSO 2: *Riduzione dei vertici a un'unica classe di equivalenza.*

Supponiamo che i vertici del poligono *non* siano tutti equivalenti. Dunque, esisterà un lato a i cui due vertici P e Q *non* sono equivalenti!



Consideriamo il secondo lato b con vertice Q e, facendo un taglio come in figura, incolliamo il lato a :




Abbiamo ora un vertice Q in meno e un vertice P in più. Ripetiamo questa operazione facendo via via diminuire i vertici Q . Quando rimane solo un vertice Q deve essere parte di una coppia adiacente del I tipo; possiamo pertanto incollare il lato a facendo scomparire il vertice Q .

Alternando i passi 1 e 2 arriviamo ad un modello piano con tutti i vertici identificati e senza coppie adiacenti del I tipo.

OSSERVAZIONE. Quando incolliamo lungo una coppia di lati del I tipo *non* ribaltiamo i lati, dunque le restanti coppie mantengono il tipo. Al contrario, quando invece incolliamo lungo una coppia di lati del II tipo, i lati restanti *possono* cambiare tipo.


Ad esempio, nel passo 2, se a è del primo tipo (come nelle figure precedenti) anche il lato c di taglio è del I tipo e le restanti coppie *non* cambiano tipo. Invece, se a è del II tipo, il lato c è del II tipo.



In altre parole, l'esistenza di *almeno una* coppia di lati del II tipo è *mantenuta* dal passo 2.

PASSO 3: *Rendere adiacenti le coppie del II tipo.*

Supponiamo che ci sia una coppia di lati *b* non adiacenti del II tipo. Operiamo un taglio *c* tra gli estremi finali della coppia e incolliamo la coppia stessa.




In questo modo rendiamo adiacenti tutte le coppie dello stesso tipo.
Se ci sono solo *coppie del II tipo*, abbiamo ottenuto una parola della forma:


$$a_1 a_1 a_2 a_2 \dots a_n a_n \implies [S \cong P_n] \quad (9.5)$$

PASSO 4: *Raggruppare le coppie del I tipo.*

Supponiamo che nel modello piano ci sia almeno una coppia del primo tipo (non adiacente per i passi precedenti).




Allora deve esistere un'altra coppia di lati del I tipo tali che queste coppie si separano a vicenda. Infatti, i vertici sono tutti identificati tra loro, in particolare lo sono i due vertici di *a*. In altre parole, deve esistere un lato *b* nella parte superiore identificato ad un lato *b* nella parte inferiore.




Siccome i lati b non sono adiacenti e abbiamo già reso adiacenti tutte le coppie di lati del II tipo, b deve essere una coppia di lati del I tipo. Operiamo due taglio e incolla per raggruppare le due coppie.

4.1 Taglio un lato c lungo gli estremi finali di a e incollo b .



4.2 Taglio un lato d lungo gli estremi finali di c e incollo a .



In queste operazioni incolliamo lungo coppie del I tipo, pertanto i tipi delle coppie *non cambiano!*

- Se nel modello piano compaiono *solo* coppie del I tipo, dopo un numero finito di passi otteniamo la parola:

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} \implies S \cong T_g \quad (9.6)$$


- Se invece nel modello piano compaiono sia coppie adiacenti del II tipo, sia sequenze $aba^{-1}b^{-1}$ di coppie del I tipo, allora S è data dalla somma connessa di tori e piani proiettivi, con almeno un piano proiettivo, pertanto per il corollario 9.1 (pag. 137) segue che $S \cong P_n$ □

OSSERVAZIONE. Si ottiene sempre un piano proiettiva se e solo nel modello iniziale c'è almeno una coppia di lati del II tipo (perché i passi mantengono il tipo).

9.4 ORIENTABILITÀ

DEFINIZIONE 9.4.0. NASTRO DI MÖBIUS.

Definiamo il **nastro di Möbius** (aperto) $N_0 \subseteq \mathbb{R}^3$ come lo spazio $[0, 1] \times (0, 1)$ ($[0, 1] \times [0, 1]$ nel caso chiuso N) con i lati quozientati come in figura.



OSSERVAZIONE. N_0 è una superficie topologica, ma *non* è compatta in quanto *non* è chiuso.

INTUITIVAMENTE... Immaginiamo di essere una figura bidimensionale posta sulla sfera S^2 ; essa è libera di muoversi su di essa. Qualunque percorso chiuso essa faccia, la figura tornerà al punto di partenza *esattamente come era partita*.

Prendiamo invece il *nastro di Möbius*. Dopo un percorso attorno al nastro, la figura torna al punto di partenza non com'era partita, bensì ci ritorna la sua *immagine speculare*!

Oltre a questo strano avvenimento, notiamo che la figura nel caso della sfera percorre sempre e solo un percorso sull'esterno o sull'interno della sfera, ma *mai contemporaneamente su entrambi*. Nel caso del nastro di Möbius, la figura percorre l'*intera superficie* in un unico percorso.

A livello intuitivo, la sfera è una superficie *orientabile*: non esistono percorsi che mi ribaltano una figura piana su di essa e (vista come superficie in \mathbb{R}^3) ho due lati ben distinti, l'interno e l'esterno della sfera. Il nastro di Möbius, invece, *non è orientabile*: la figura può ribaltarsi e, allo stesso tempo, percorre tutta la superficie; in altre parole, non esiste un "interno" o un "esterno" del nastro.

I comportamenti sul nastro di Möbius che abbiamo appena osservato si presentano anche in superfici come il piano proiettivo reale o la bottiglia di Klein; in particolare, si ha questo proprio perché possiamo identificare su di esse un percorso esattamente *analogo* a quello visto sul nastro di Möbius.


Possiamo formalizzare l'orientabilità utilizzando questo principio.

DEFINIZIONE 9.4.1. ORIENTABILITÀ.


Una superficie topologica si dice **orientabile** se contiene un sottospazio omeomorfo al nastro di Möbius (aperto o chiuso). Altrimenti S si dice **non orientabile**.

ESEMPI.


- N_0 *non* è orientabile.
- $P = \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ *non* è orientabile:



- K non è orientabile:



- Una superficie il cui modello piano contiene una coppia di lati del II tipo non è orientabile:



NOTAZIONE

1. S^2 e T_g sono orientabili $\forall g \geq 1$.
2. Se una superficie compatta è omeomorfa a un sottospazio di \mathbb{R}^3 , allora è orientabile ed è rappresentabile.

OSSERVAZIONE. L'orientabilità è una proprietà topologica, cioè è mantenuta per omeomorfismo.

9.4.1 Dimostrazione del teorema di classificazione: seconda parte

Noto ciò, con il concetto di orientabilità possiamo fare un passettino avanti nella classificazione delle superfici.

COROLLARIO 9.4.0.

$$\begin{aligned} S^2 &\not\cong P_n \quad \forall n \geq 1 \\ T_g &\not\cong P_n \quad \forall n \geq 1, \quad \forall g \geq 1 \end{aligned}$$

COROLLARIO 9.4.1. Sia S una superficie compatta con un suo modello piano. Allora S è orientabile se e solo se il modello non contiene coppie di lati del II tipo.

DIMOSTRAZIONE.

- \Rightarrow) Se c'è una coppia di lati del II tipo, costruiamo facilmente un nastro di Möbius collegandone gli estremi.
 \Leftarrow) Applicando l'algoritmo del taglia e incolla, se non ci sono lati del II tipo otteniamo una superficie omeomorfa a S^2 o a T_g , entrambe superfici orientabili. \square

9.5 SUDDIVISIONE DI UNA SUPERFICIE COMPATTA**DEFINIZIONE 9.5.0. LATO.**

Un **lato** in S superficie compatta è un sottospazio $L \subseteq S$ con un'applicazione continua $f : [0, 1] \longrightarrow L$ tale che valga una delle due proprietà seguenti:

- f è omeomorfismo tra $[0, 1]$ e L .
- f è iniettivo su $[0, 1]$, $f(0) = f(1)$ e f induce un omeomorfismo tra L e S^1 (cioè f è un'identificazione).

Definiamo come **vertici** del lato, rispetto ai due casi sopra:

- $f(0)$ e $f(1)$.
- $f(0)$.

DEFINIZIONE 9.5.1. SUDDIVISIONE DI UNA SUPERFICIE COMPATTA.

Una **suddivisione** \mathcal{S} di una superficie compatta S è data da:

- Un sottoinsieme finito V di S , i cui punti sono detti **vertici**.
- Un insieme finito L_1, \dots, L_m in S di lati

Tali che:

1. $\forall L_i \cap V = \{\text{vertici di } L_i\}$.
2. $\forall i \neq j L_i \cap L_j \subseteq V$.
3. $S \setminus (L_1 \cup \dots \cup L_m)$ ha un numero finito di componenti connesse dette **facce** della suddivisione e ogni faccia è omeomorfa a un disco aperto di \mathbb{R}^2 .


ESEMPIO. Una triangolazione T_1, \dots, T_r di S induce sempre una suddivisione, in cui:

- $V = \text{vertici di } T_1, \dots, T_r$.
- $L_1, \dots, L_m = \text{lati di } T_1, \dots, T_r$.
- Facce = interni di T_1, \dots, T_r .


Pertanto, ogni superficie compatta ammetta almeno una suddivisione perché esiste sempre una triangolazione per il *Teorema di Radò*.

ESEMPI.

- S^2 ha una suddivisione (ulteriore a quella data dal tetraedro) data da un **unico vertice**, un **unico lato** e **due facce**.



- Il toro ha una suddivisione data da un **unico vertice**, **due lati** e un'**unica faccia**.



9.6 CARATTERISTICA DI EULERO

DEFINIZIONE 9.6.0. CARATTERISTICA DI EULERO.

Data una suddivisione \mathcal{S} di una superficie compatta S , essa avrà:


- v vertici.
- e lati.
- f facce.

La **caratteristica di Euler** di \mathcal{S} è:

$$\chi(S, \mathcal{S}) = v - e + f \in \mathbb{Z} \quad (9.7)$$

ESEMPI.

- Il tetraedro ha 4 vertici, 6 lati e 4 facce, pertanto S^2 ha come caratteristica di Euler $\chi(S, \mathcal{S}_1) = 4 - 6 + 4 = 2$.
- Riprendendo la suddivisione della sfera precedente, descritta dalla tripletta $(v, e, f) = (1, 1, 2)$, la caratteristica di Euler secondo questa suddivisione è $\chi(S, \mathcal{S}_1) = 1 - 1 + 2 = 2$.
- Il toro ha una suddivisione $(v, e, f) = (1, 2, 1)$, con caratteristica di Euler $\chi(S, \mathcal{S}) = 1 - 2 + 1 = 0$.
- Possiamo costruire una suddivisione alternativa del toro direttamente sul modello piano, nel modo seguente:



Allora abbiamo $(v, e, f) = (2, 6, 4)$ con caratteristica di Eulero $\chi(S, \mathcal{S}) = 2 - 5 + 4 = 0$.

Notiamo che, in questi esempi, suddivisioni diverse di una stessa superficie hanno stessa caratteristica di Eulero. Questo *non* è un caso: il seguente teorema (che non dimostreremo) ci garantisce ciò.

TEOREMA 9.6.0. Date due suddivisioni \mathcal{S}_1 e \mathcal{S}_2 della stessa superficie compatta S , si ha:

$$\chi(S, \mathcal{S}_1) = \chi(S, \mathcal{S}_2) \text{ tent}$$

DEFINIZIONE 9.6.1. CARATTERISTICA DI EULERO.

Sia S una superficie compatta. La **caratteristica di Eulero** $\chi(S) \in \mathbb{Z}$ è la caratteristica di Eulero di una qualsiasi suddivisione di S .

COROLLARIO 9.6.0. La **caratteristica di Eulero** è un'invariante per omeomorfismo.

DIMOSTRAZIONE. Siano S_1 e S_2 due superfici compatte omeomorfe tra di loro e siano \mathcal{S}_1 una suddivisione di S_1 . Usando l'omeomorfismo, costruiamo una suddivisione \mathcal{S}_2 di S_2 con lo stesso numero di vertici, lati e facce di \mathcal{S}_1 . Allora:

$$\chi(S_1) = \chi(S_1, \mathcal{S}_1) = \chi(S_2, \mathcal{S}_2) = \chi(S_2)$$

□

ESEMPIO.

- $\chi(S^2) = 2$.
- $\chi(T) = 2$

9.6.1 Dimostrazione del teorema di classificazione: terza e ultima parte

Forti di questo nuovo invariante per omeomorfismi, possiamo concludere la dimostrazione del teorema di classificazione delle superfici compatte.

Innanzitutto, vediamo per bene che relazione c'è tra la caratteristica di Eulero e il modello piano di una superficie.

OSSERVAZIONE. Sia S una superficie compatta avente un modello piano con $2n$ lati identificati a coppie. Esso dà una suddivisione nativa di S in cui:

- I *vertici* v sono le immagini in S dei vertici del poligono e il loro numero è il numero di classi di equivalenza sui vertici del modello piano.
- I *lati* n sono le immagini in S dei lati del poligono e il loro numero è il numero di coppie di lati del modello piano.
- C'è solo *una* faccia, data dall'immagine dell'interno del poligono.

In altre parole:

$$\chi(S) = v - n + 1 \tag{9.8}$$

DIMOSTRAZIONE.

- P_n è espresso dalla parola $a_1a_1a_2a_2\dots a_na_n$ e la suddivisione data dal modello

piano ha un solo vertice, n lati e una faccia. Allora:

$$\chi(P_n) = 1 - n + 1 = 2 - n \quad \forall n \geq 1 \quad (9.9)$$

In particolare:

$$\begin{aligned} \chi(P) &= 1 \\ \chi(K) &= \chi(P_2) = 0 = \chi(T) \end{aligned}$$

Ma $T \not\cong K$ in quanto T è orientabile, mentre K non lo è.

Notiamo che $\chi(P_n) \leq 1 \quad \forall n \geq 1$ e $\chi(P_n) = 2 - n$ è una funzione iniettiva. Pertanto, se $n_1 \neq n_2$, allora $\chi(P_{n_1}) \neq \chi(P_{n_2})$ e, in quanto invariante per omeomorfismi, segue che $P_{n_1} \not\cong P_{n_2}$.

In altre parole, tutte le superfici P_n sono non omeomorfe tra di loro.

- T_g è espresso dalla parola $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1}$ e la suddivisione data dal modello piano ha un solo vertice, $2g$ lati e una faccia. Allora:

$$\chi(T_g) = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g \quad \forall g \geq 1 \quad (9.10)$$

In particolare, se poniamo $T_0 = S^2$ come caso “degenero” di toro non buco e $\chi(T_g) = 2 - 2g \quad \forall g \geq 0$:

- ◊ La caratteristica di Eulero delle superfici orientabili è sempre *pari* e minore di 2.
- ◊ $\chi(S) \leq 2$ per ogni superficie compatta.

Notiamo che $\chi(T_g) = 2 - 2g$ è una funzione iniettiva. Pertanto, se $g_1 \neq g_2$, allora $\chi(T_{g_1}) \neq \chi(T_{g_2})$ e, in quanto invariante per omeomorfismi, segue che $T_{g_1} \not\cong T_{g_2}$. In altre parole, tutte le superfici T_g sono non omeomorfe tra di loro. \square

9.6.2 Somma connessa e caratteristica di Eulero

LEMMA 9.6.0. Siano S_1, S_2 due superfici compatte. Allora:

$$\chi(S_1 \# S_2) = \chi(S_1) + \chi(S_2) - 2 \quad (9.11)$$

DIMOSTRAZIONE. Scegliamo una triangolazione (v_1, e_1, f_1) e (v_2, e_2, f_2) per S_1 e S_2 , rispettivamente. Per costruire $S_1 \# S_2$ scegliamo un triangolo su S_1 e uno su S_2 . Incolliamo le due superfici lungo i bordi di questi due triangoli. Otteniamo così una triangolazione per $S_1 \# S_2$ con (v_3, e_3, f_3) :

$$\begin{cases} v_3 = v_1 + v_2 - 3 \\ e_3 = e_1 + e_2 - 3 \\ f_3 = f_1 - 1 + f_2 - 1 = f_1 + f_2 - 2 \\ \implies \chi(S_1 \# S_2) = v_3 - e_3 + f_3 = v_1 + v_2 - 3 - (e_1 + e_2 - 3) + f_1 + f_2 - 2 = \chi(S_1) + \chi(S_2) \end{cases}$$

\square

OSSERVAZIONE. Possiamo ora calcolare in un altro modo $\chi(P_n)$ e $\chi(T_g)$, per induzione:

$$\chi(P) = 1$$

$$\chi(P_2) = \chi(P \# P, =) 1 + 1 - 2 = 0$$

$$\chi(P_n) = \chi(P \# P_{n-1}, =) \chi(P_n) + \chi(P_{n-1}) - 2 = 1 + 2 - (n-1) - 2 = 2 - n$$

In modo analogo per T_g :

$$\chi(T) = 0$$

$$\chi(T_2) = \chi(T \# T, =) 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\chi(T_g) = \chi(T \# T_{g-1}, =) \chi(T_g) + \chi(T_{g-1}) - 2 = 0 + 2 - 2(g-1) - 2 = 2 - 2g$$


9.6.3 Impratichiamoci! Caratteristica di Eulero

ESERCIZIO. PROVA D'ESAME LUGLIO 2018.

Sia S la superficie compatta data dalla parola $abcdea^{-1}b^{-1}c^{-1}d^{-1}e^{-1}$. Determinare la classe di S nella classificazione delle superfici compatte.

SOLUZIONE. Tutte le coppie di lati sono del II tipo, pertanto S è orientabile, cioè può essere S^2 o T_g per un qualche $g \geq 1$, e la caratteristica di Eulero è del tipo $\chi(S) = 2 - 2g$. S ha un modello piano seguente con 10 lati identificati a coppia, che dà origine ad una suddivisione di S con 5 lati a, b, c, d, e , una faccia e v vertici, con v il numero di classi di equivalenza sui vertici del modello.

Per calcolare v , disegniamo il modello piano e raggruppiamo i vertici.



Su 10 vertici ho 2 classi di equivalenza, quindi $v = 2$. Pertanto:

$$\chi(S) = v - 5 + 1 = 2 - 4 = -2 = 2 - 2g \implies 2g = 4 \implies g = 2 \implies S \cong T_2$$

IV

FORMA CANONICA DI JORDAN

CAPITOLO 10

FORMA CANONICA DI JORDAN

“BEEP BOOP INSERIRE CITAZIONE QUA BEEP BOOP.”

NON UN ROBOT, UN UMANO IN CARNE ED OSSA BEEP BOOP.

10.1 TEOREMA DI CAYLEY-HAMILTON

[...]

TEOREMA 10.1.0. Sia $A \in \mathbb{K}^{n, n}$ e $m_A(t)$ il suo polinomio minimo. Allora, preso $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$m_A(\lambda) = 0 \iff \lambda \text{ è un autovalore di } A \quad (10.1)$$

DIMOSTRAZIONE.

\implies) Segue dal teorema di Cayley-Hamilton perché $m_A(\lambda) = 0 \implies C_A(\lambda) = 0 \implies \lambda$ autovalore.

\impliedby) Sia λ un autovalore di A con autovettore associato \underline{v} . Si ha:

$$\begin{aligned} A\underline{v} &= \lambda\underline{v} \\ A^2\underline{v} &= A(A\underline{v}) = A(\lambda\underline{v}) = \lambda A\underline{v} = \lambda^2\underline{v} \end{aligned}$$

Allo stesso modo si arriva a $A^k\underline{v} = \lambda^n\underline{v}$. Preso un generico polinomio $p(t) \in \mathbb{K}[t]$, esso si può esprimere come:

$$p = \sum_{i=0}^d c_i t^i \quad c_i \in \mathbb{K}$$

Allora $p(A) = \sum_{i=0}^d c_i A^i$ e dunque:

$$p(A)\underline{v} = \left(\sum_{i=0}^d c_i A^i \right) \underline{v} = \sum_{i=0}^d c_i (A^i \underline{v}) = \sum_{i=0}^d c_i (\lambda^i \underline{v}) = \underbrace{\left(\sum_{i=0}^d c_i \lambda^i \right)}_{\in \mathbb{K}} \underline{v} = p(\lambda) \underline{v}$$

Consideriamo ora un polinomio $p \in I_A$. Per sua definizione $p(A) = 0$; in particolare, da quanto scritto sopra:

$$O\underline{v} = p(\lambda) \underline{v}$$

Ed essendo v un autovettore, $v \neq 0$; dall'equazione sopra necessariamente segue $p(\lambda) = 0$. In particolare, essendo $p \in I_A$ generato dal polinomio minimo m_A (cioè $p(t) = m_A(t)q(t)$ con $q(t) \neq 0$), segue che $m_A(\lambda) = 0$. \square

10.2 FORMA CANONICA DI JORDAN

D'ora in poi, se non altresì specificato, considereremo $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, cioè tratteremo di matrici $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ e endomorfismi fra spazi vettoriali complessi.

OSSERVAZIONE. Poichè \mathbb{C} è algebricamente chiuso, ogni polinomio $p \in \mathbb{C}[t]$ si fattorizza completamente come prodotto di fattori lineari:

$$C_A(t) = (t - \lambda_1)^{m_1} \dots (t - \lambda_r)^{m_r} \text{ con } m_i \text{ molteplicità algebrica di } \lambda_i \quad (10.2)$$

Nel caso del polinomio minimo, si ha: Poichè \mathbb{C} è algebricamente chiuso, ogni polinomio $p \in \mathbb{C}[t]$ si fattorizza completamente come prodotto di fattori lineari:

$$m_A(t) = (t - \lambda_1)^{h_1} \dots (t - \lambda_r)^{h_r} \text{ con } 1 \leq h_i \leq m_i \forall i = 1, \dots, r \quad (10.3)$$

Sia $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ una matrice associata a un endomorfismo $f : V \longrightarrow V$. Se f è diagonalizzabile, esiste una base in cui la matrice di f è diagonale. Anche quando tuttavia la matrice non è diagonalizzabile, vogliamo cercare una base in cui la matrice di f è *particolarmente semplice*.

DEFINIZIONE 10.2.0. Un **blocco di Jordan** $J = J_k(\lambda)$, di autovalore $\lambda \in \mathbb{C}$ e dimensione K , è una matrice quadrata $k \times k$ con sulla diagonale solo l'autovalore e sopra ogni elemento della diagonale 1:

$$J = J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 & 0 \\ \vdots & & & \lambda & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad (10.4)$$

OSSERVAZIONE.

- J è determinato da λ e k .
- Il polinomio caratteristico di J è $C_J(t) = (t - \lambda)^k$, cioè λ è l'unico autovalore di J con molteplicità algebrica k .

OSSERVAZIONE. Definiamo il blocco di Jordan di dimensione k con autovalore zero, necessario per calcolare l'autospazio V_λ :

$$N = J - \lambda I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 & 0 \\ \vdots & & & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (10.5)$$

Si ha che $\text{rk } N = k - 1 \implies \dim V_\lambda = \dim \ker N = k - \text{rk } N = 1$, cioè J non è mai diagonalizzabile se $k > 1$, dato che $1 = \dim V_\lambda \leq m_\lambda = k$.

Se la base \mathcal{B} dello spazio V (in cui stiamo operando con l'endomorfismo associato a J) è $\{\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_k\}$, notiamo che \underline{e}_1 è l'unico autovettore di N e $V_\lambda = \mathcal{L}(\underline{e}_1)$. Si vede che J agisce in modo particolare sui vettori di \mathcal{B} :

$$\begin{cases} J\underline{e}_1 = \lambda \underline{e}_1 \\ J\underline{e}_2 = \underline{e}_1 + \lambda \underline{e}_2 \\ \dots \\ J\underline{e}_k = \underline{e}_{k-1} + \lambda \underline{e}_k \end{cases}$$

Anche N agisce in modo altrettanto particolare sui vettori di \mathcal{B} :

$$\begin{cases} N\underline{e}_1 = \underline{0} \\ N\underline{e}_2 = \underline{e}_1 \\ \dots \\ N\underline{e}_k = \underline{e}_{k-1} \end{cases}$$

Cioè, cominciando da \underline{e}_k e applicando N ripetutamente otteniamo gli altri vettori della base.

$$\underline{e}_1 \xleftarrow[N]{} \underline{e}_2 \xleftarrow[N]{} \cdots \xleftarrow[N]{} \underline{e}_{k-1} \xleftarrow[N]{} \underline{e}_k$$

Ad esempio, con N^2 si ha:

$$\begin{cases} N^2 \underline{e}_1 = \underline{0} \\ N^2 \underline{e}_2 = N(N\underline{e}_2) = N\underline{e}_1 = \underline{0} \\ \dots \\ N^2 \underline{e}_k = N(N\underline{e}_k) = N\underline{e}_{k-1} = \underline{0} \end{cases}$$

Infatti, se guardiamo la matrice N^2 , si ha:

$$N^2 = (J - \lambda I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 & 1 & \vdots \\ & & \ddots & 1 & 0 \\ \vdots & & & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Si ha dunque, ad ogni potenza successiva di N , lo “spostamento” della diagonale di 1 verso destra. In particolare:

$$N^{k-1} = (J - \lambda I)^{k-1} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \ddots & & & 0 \\ & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

E in questo caso si ha la relazione con i vettori della base:

$$\begin{cases} N^{k-1} \underline{e}_i = \underline{0} \quad \forall i = 1, \dots, k-1 \\ \dots \\ N^{k-1} \underline{e}_k = \underline{e}_1 \end{cases}$$

Studiando l’immagine dell’applicazione associata ad N , essendo la base dell’immagine i vettori colonna l.i., si ha $\text{Im } N^{k-1} = \mathcal{L}(e_1)$.

Come già affermato dunque, è \underline{e}_k a determinare l’*intera* base di V tramite la moltiplicazione per N .

Come ultima osservazione fondamentale, notiamo inoltre che $N^k = O$, cioè N è una matrice **nilpotente** di ordine k .

DEFINIZIONE 10.2.1. Una matrice quadrata si dice in **forma di Jordan** se ha solo blocchi di Jordan lungo la diagonale, mentre altrove è nulla.

ESEMPIO. La seguente matrice 9×9 è in forma di Jordan, con blocchi $J_3(2), J_2(i), J_3(i)$ e $J_1(-4)$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & i & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & i & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

OSSERVAZIONE. Una matrice *diagonale* è in forma di Jordan, con un unico blocco di ordine 1 (cioè senza alcun 1 nell'elemento sopra).

OSSERVAZIONE. Se A è in forma di Jordan, sulla diagonale compaiono tutti gli autovalori con la loro *molteplicità*. Dunque, se λ è un autovalore, la somma delle *dimensioni* dei blocchi relativi a λ è uguale alla *molteplicità algebrica* m_λ di λ .

TEOREMA 10.2.0. Sia V uno spazio vettoriale complesso di $\dim n$ e f un endomorfismo di V . Allora esiste una base di V in cui la matrice di f è in forma di Jordan. Inoltre, la forma di Jordan è unica a meno dell'ordine dei blocchi.

In termini matriciali, ogni $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ è simile ad una matrice in forma di Jordan, unica a meno dell'ordine dei blocchi.

Per agevolare la dimostrazione, faremo uso di un lemma importante. Tuttavia, prima di dimostrarlo, facciamo alcune osservazioni per comprendere meglio ciò di cui parliamo.

V

APPENDICI

CAPITOLO 11

NOTE AGGIUNTIVE

“BEEP BOOP INSERIRE CITAZIONE QUA BEEP BOOP.”

NON UN ROBOT, UN UMANO IN CARNE ED OSSA BEEP BOOP.

Riportiamo alcune note e dimostrazioni aggiuntive che possono risultare utili al lettore.

11.1 CAPITOLO 6: SUCCESSIONI

La dimostrazione seguente sulla non prima-numerabilità del quoziente \mathbb{R}/\mathbb{Z} è adattata da Brian M. Scott [10] su Mathematics Stack Exchange.

DIMOSTRAZIONE. Si consideri la contrazione di \mathbb{Z} in \mathbb{R} ad un punto, cioè il quoziente \mathbb{R}/\mathbb{Z} e si definisca la classe di equivalenza degli interi come $[0]$.

Sia $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ una famiglia di intorni aperti di $[0]$; cerchiamo un intorno aperto di $[0]$ che non ne contiene nessuno come sottoinsieme, mostrano in tal modo che non formano un sistema fondamentale di intorni di $[0]$ e pertanto che \mathbb{R}/\mathbb{Z} non è primo-numerabile per $[0]$.

Sia π la mappa quoziente. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $k \in \mathbb{Z}$ esiste un $\varepsilon_{n,k} \in (0, 1)$ tale che:

$$U_n \supseteq \pi \left[\bigcap_{k \in \mathbb{Z}} (k - \varepsilon_{n,k}, k + \varepsilon_{n,k}) \right]$$

Per $k \in \mathbb{Z}$ sia $\delta_k = \frac{1}{2}\varepsilon_{k,k}$, e sia:

$$V = \pi \left[\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (k - \delta_k, k + \delta_k) \right]$$

Chiaramente V è un intorno aperto di $[0]$, e vogliamo dimostrare che $U_n \not\subseteq V$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Per mostrare ciò, fissiamo $n \in \mathbb{N}$; si ha $\delta_n < \varepsilon_{n,n}$, quindi possiamo scegliere un numero reale $x \in (n + \delta_n, n + \varepsilon_{n,n})$. Ma allora $\pi(x) \in U_n \setminus V$, e dunque $U_n \not\subseteq V$. \square

BIBLIOGRAFIA

- [1] A. Albano. *La forma canonica di Jordan*. 2017. URL: https://math.i-learn.unito.it/pluginfile.php/102113/mod_resource/content/1/FormaDiJordan_v2.pdf.
- [2] Dennis S. Bernstein. *Matrix Mathematics: Theory, Facts, and Formulas (Second Edition)*. Princeton University Press, 2009. ISBN: 9780691140391. URL: <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7t833>.
- [3] R. Fortuna E., Frigerio e R. Pardini. *Geometria proiettiva: Problemi risolti e richiami di teoria*. UNITEXT. Springer Milan, 2011. ISBN: 9788847017467. URL: <https://www.springer.com/gp/book/9788847017467>.
- [4] B. Grossmann. *Finding the determinant of a block diagonal matrix*. Mathematics Stack Exchange. eprint: <https://math.stackexchange.com/q/2026141>. URL: <https://math.stackexchange.com/q/2026141>.
- [5] C. Kosniowski e M. Pittalupa. *Introduzione alla topologia algebrica*. Collana di matematica. Testi e manuali. Zanichelli, 1988. ISBN: 9788808064400. URL: <https://books.google.it/books?id=mIdrAAAACAAJ>.
- [6] S.G. Krantz. *A Guide to Topology*. A Guide to Topology. Mathematical Association of America, 2009. ISBN: 9780883853467. URL: <https://books.google.it/books?id=03tyezxgv28C>.
- [7] M. Manetti. *Topologia*. UNITEXT. Springer Milan, 2014. ISBN: 9788847056626. URL: <https://www.springer.com/gp/book/9788847056619>.
- [8] Jean Marie. *Proofs of Determinants of Block matrices*. Mathematics Stack Exchange. eprint: <https://math.stackexchange.com/q/1905707>. URL: <https://math.stackexchange.com/q/1905707>.
- [9] Console S. e Fino A. *Note di Geometria 2*. 2012.
- [10] B. M. Scott. *Why is \mathbb{R}/\sim not first countable at [0], where $x \sim y \Leftrightarrow x = y$ or $x, y \in \mathbb{Z}$?* Mathematics Stack Exchange. eprint: <https://math.stackexchange.com/q/1417425>. URL: <https://math.stackexchange.com/q/1417425>.