Chloroquine Syrup

Composition:

Each 5ml contains:

Chloroquine Phosphate BP.....80mg

1. Properties:

Chloroquine phosphate is an anti-immune agent (AIA). Therefore, it inhibits the release or activity of cytokines involved in maintaining the inflammatory process. Chloroquine is better preferred than other AIAs as it is less toxic and better tolerated and more useful in milder forms of the disease.

2. Indications:

Chloroquine is a 4-aminoquinoline used in treatment of Hepatic Amoebiasis, Lupus Erythematosus and Photosensitivity.

In Rheumatoid Arthritis, response to treatment may not be apparent for up to 6months, but if there is no improvement by then treatment should be discontinued. The usual dose is the equivalent of chloroquine base 150mg daily (maximum 2.5mg/kg daily or up to 3mg/kg daily in children).

In discord and System Lupus Erythematosus, chloroquine is used in a dose equivalent to 150mg (maximum 2.5mg/kg) of dose daily. Children are given a dose of up to 3mg/kg daily.

3. Administration and Dosage of Chloroquine Syrup

Ailment	Age	Recommended Dose	Duration
Hepatic Amoebiasis	1 – 5 years	15ml daily	2 weeks
	6 – 12 years	30ml daily	2 weeks
Lupus Erythematosus And Photosensitivity	1 – 5 years	7.5ml daily	1 week
	6 – 12 years	15ml daily	1 week
Juvenile arthritis	3mg of Chloroquine base /kg daily		
Malaria	Less than a year	75mg Chloroquine base (7.5ml) daily	3 days
	1 – 6 years	150mg Chloroquine base (15ml) daily	3 days
	6 – 12 years	300mg Chloroquine base (30ml) daily	3 days

4. Contra-indication:

Chloroquine syrup is contraindicated in patients who have shown previous intolerance to the drug and patients with impaired liver or renal function or with porphyria or psoriasis.

5. Interaction:

There is increased risk of inducing ventricular arrhythmias if chloroquine is used with halofantine or other arrhythmogenic drugs such as amiodaron and moxifloxacin. There is increased risk of convulsion when chloroquine is given with mefloquine. Absorption of chloroquine can be reduced by antacid or kaolin; dosing should be separated by at least 4 hours. Metabolism of chloroquine may be inhibited by cimetidine.

6. Precaution:

Excessive doses of chloroquine are associated with retinal or visual field changes and precaution to be taken in order to minimize such toxicity.

7. Antidote in event of Overdosage:

In the event of over dosage of Chloroquine Syrup, the stomach should be emptied by emesis or by aspiration and lavage. Intravenous fluids and vasopressors may be given for hypotension.

8. Patient Advice:

- Patient Allergic to chloroquine are advised to take antihistamine prior to the use of Chloroquine Syrup.
- Chloroquine Syrup is to be taken under medical supervision in the doses stated above.

Chloroquine syrup should be taken with food, amongst other benefits; presence of food improves absorption of Chloroquine.

9. Storage:

Store at temperature not more than 30°C.

10. Warning:

Keep away from children.

11. Presentation:

60ml syrup in amber coloured PET bottle.

Manufactured by:

Biomedical Limited
1, Ohimege Road, Gaa-Imam, Industrial Estate,
Ilorin, Kwara State, Nigeria.

Sirop de chloroquine

Composition:

Chaque 5ml contient:

Phosphate de Chloroquine BP 80mg

1. Propriétés:

Le phosphate de chloroquine est un agent antiimmunitaire (AIA). Par conséquent, il inhibe la libération ou l'activité des cytokines impliquées dans le maintien du processus inflammatoire. La chloroquine est préférable aux autres AIA, car elle est moins toxique et mieux tolérée et plus utile dans les formes plus douces de la maladie.

2. Les Indications:

Chloroquine est un 4-aminoquinoline utilisé dans le traitement de l'amoebiase hépatique,Lupus, érythémateux et la photosensibilité. Dans la polyarthrite rhumatoide, la réponse au traitement peut ne pas être apparente jusqu'à 6 mois, mais s'il n'y a pas d'amélioration d'ici là le traitement doit être interrompu.

La dose habituelle est l'équivalent de base de chloroquine 150mg par jour (maximum de 2,5mg/kg par jour ou jusqu'à 3mg/kg par jour chez les enfants).

Dans la discorde et le lupus érythémateux du système, la chloroquine est utilisée à une dose équivalant à 150mg (maximum de 2,5mg/kg) par jour. Les enfants reçoivent une dose allant jusqu'à 3mg/kg par jour.

3. Administration et posologie du sirop de chloroquine:

Ailment	Age	Recommended Dose	Duration
l'amoebiase hépatique	1 – 5 ans	15ml pendant	2 semaines
	6 – 12 ans	30ml pendant	2 semaines
Lupus érythémateux et la photosensibilité	1 – 5 ans	7.5ml pendant	1 semaine
	6 – 12 ans	15ml pendant	1 semaine
l'arthrite juvénile	3mg de chloroquine base/kg par jour		
Malaria	Enfants de moins d'un an	75mg de chloroquine base (7.5ml) par jour pendant	3 jours
	1 – 6 ans	150mg de chloroquine base (15ml) par jour pendant	3 jours
	6 – 12 ans	300mg de chloroquine base (30ml) par jour pendant	3 jours

4. Contre-indication:

Le sirop de chloroquine est contre-indiqué chez les patients qui ont déjà manifesté une intolérance au médicament et chez les patients dont le foie ou la function rénale sont altérés ou qui ont une porphyrie ou un psoriasis.

5. Interaction:

Il existe un risque accru d'arythmie ventriculaire si la chloroquine est utilisée avec de l'halofantrine ou des médicaments arythmogènes comme l'amiodaron et la moxifloxacine.

Il existe un risque accru de convulsions lorsque la chloroquine est administrée avec de la méfloquine. L'absorption de la chloroquine peut être réduite par l'antiacide ou le kaolin, le dosage doit être séparé par au moins 4 heures. Le métabolisme de la chloroquine peut être inhibé par la cimetidine.

6. Précaution:

Des doses excessives de chloroquine sont associées à des modifications du champ rétinien ou visuel et des précautions à prendre afin de minimiser cette toxicité.

7. Antidote en cas de surdosage:

En cas de surdosage de sirop de chloroquine, l'estomac doit être vidé par des vomissements ou par aspiration et lavage. Des liquides intraveineux et des vasopresseurs peuvent être administrés en cas d'hypotension.

8. Conseils aux patients:

Il est Conseillé aux patients allergique à la chloroquine de prendre un l'antihistaminique avant d'utiliser le sirop de chloroquine. Le sirop de chloroquine doit être pris sous surveillance médicale aux doses indiquées ci-dessus.

Le sirop de chloroquine doit être pris avec des la nourriture, entre autres avantages; la présence d'aliments améliore l'absorption de la chloroquine.

9. Espace de rangement:

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

10. Avertissement: Garder loin des enfants.

11. Présentation: 60ml de sirop en bouteille PET de ambrée.

Fabriqué par:

Biomedical Limited
1, Route d'Ohimege, Zone Industrielle de Gaa-Imam,
Ilorin, Kwara State, Nigeria.