PARATON SYRUP

Composition:
Each 5ml contains:
Paracetamol BP……..120mg
Ascorbic Acid BP……..40mg
Chlorpheniramine Maleate BP……2mg

1. What is Paraton Syrup and what it does?

Paraton Syrup is a combination medicine used to relief symptoms caused by allergies, flu and common cold. These symptoms include headache, shivers, aches and pains, blocked nose and painful sinuses, catarrh, sneezing and sore throat.
Chlorpheniramine is an antihistamine and helps relieve congestion symptoms.
Paracetamol is a painkiller and an antipyretic. Ascorbic acid is a common ingredient in cold and flu products, which helps replace Vitamin C lost at the initial stages of colds and flu.

2. What to know before taking Paraton Syrup?

Do not take this syrup if you are allergic to Paracetamol, Chlorpheniramine maleate, Ascorbic Acid, any other ingredients contained within, have diabetes, overactive thyroid, enlarged prostate, glaucoma, pheochromocytoma or if you are on tricyclic antidepressants, blood thinner, beta blockers or MAOIs, or an underlying health condition.

3. How to take Paraton syrup:

Ages	Dose	Maximum
Over 12 years	10ml, every 4-6 hours	60ml daily
6- 12 years	5ml every 4-6 hours	30ml daily
2-5 years	2.5ml, every 4-6 hours	15ml
1-2 years	2.5ml, twice a day	5ml
Under 1 year	Not recommended	

Talk to your doctor for prescription. Contact your physician when too much of the syrup is taken. If you forget to take the syrup, take a dose as soon as you remember, unless it is nearly time to take the next dose. Never take two doses together.

4. Possible Side Effects:

Like all medicines, Paraton Syrup can cause side effects, but not everybody gets them. Stop taking this medication If you experience any side effect.
Possible side effects include rash, itching, mouth ulcer, visual disturbances, fast or irregular heartbeat and loss of appetite.

5. How do I store Paraton Syrup?

Protect the syrup from light, and store in dry areas below 30°C. Do not use the medicine after expiry and after a month of opening the syrup. Keep out of sight and reach of children.

6. Further Information:

Paraton Syrup description: an orange syrupy liquid with orange flavor in a 100ml amber PET bottle with a pilfer proof cap and a graduated measuring cap.

Manufactured by:
Biomedical Limited
1, Ohimege Road, Gaa-Imam, Industrial Estate,
Ilorin, Kwara State, Nigeria.

PARATON SIROP

Composition:
Chaque 5ml contient:
Paracétamol BP……..120mg
Acide ascorbique BP……..40mg
Maléate de chlorphéniramine BP……2mg

1. Qu'est-ce que le sirop de Paraton et à quoi sert-il?

Le sirop de Paraton est un médicament combiné utilisé pour soulager les symptômes causés par les allergies, la grippe, le rhume et d'autres maladies respiratoires. ces symptômes comprennent des maux de tête, des frissons, des courbatures, un nez bouché et des sinus douloureux, un catarrhe, des éternuements et des maux de gorge.
La chlorphéniramine est un antihistaminique et aide à soulager les symptômes de congestion. Le paracétamol est un analgésique et un antipyrétique L'acide ascorbique est un ingrédient courant dans les produits contre le rhune et la grippe, qui aide à remplacer la vitamine C perdue aux premiers stades du rhume et de la grippe.

2. Ce qu'il faut savoir avant de prendre Paraton Sirop?

Ne prenez pas ce sirop si vous êtes allergique au paracétamol, au maléate de chlorphéniramine, à l'acide ascorbique, à tout autre ingrédient qu'il contient, si vous souffrez de diabète, d'hyperthyroïdie, d'hypertrophie de la prostate, de glaucome, de phéochromocytome ou si vous prenez des antidépresseurs tricycliques, des anticoagulants, des bêta-bloquants ou IMAO, ou un problème de santé sous-jacent.

3. Comment prendre le sirop Paraton:

Âges	Dose	Maximum
Plus de 12 ans	10ml, toutes les 4 à 6 heures	60ml du quotidien
6 à 12 ans	5ml, toutes les 4 à 6 heures	30ml du quotidien
2 à 5 ans	2.5ml, toutes les 4 à 6 heures	15ml
1 à 2 ans	2.5ml, deux fois par jour	5ml
Under 1 ans	Non recommandé	

Parlez-en à votre médecin pour la prescription. Contactez votre médecin lorsque trop de sirop est pris. Si vous oubliez de prendre le sirop, prenez une dose dès que vous vous en souvenez, à moins qu'il ne soit presque l'heure de prendre la dose suivante. Ne prenez jamais deux doses ensemble.

4. Effets secondaires possibles:

Comme tous les médicaments,Paraton Sirop peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Arrêtez de prendre ce médicament si vous ressentez un effet secondaire. Les effets secondaires possibles incluent une éruption cutanée. des démangeaisons, un ulcère buccal, des troubles visuels, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier et une perte d'appétit.

5. Comment conserver le sirop Paraton?

Protégez le sirop de la lumière et conservez-le dans des endroits secs en dessous de 30 °C Ne pas utiliser le médicament après expiration et après un mois d'ouverture du sirop. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

6. Informations complémentaires:

Description du sirop Paraton: un liquide sirupeux à l'orange au goût d'orange dans une bouteille PET ambrée de 100ml avec un bouchon antivol et un bouchon doseur gradué au sommet.

Fabriqué Par:
Biomedical Limited,
1, Rue Ohimege, Zone Industrielle Gaa-Imam,
Ilorin, État de Kwara, Nigeria.