Biogyl[R]

Paediatric Metronidazole Suspension

Composition:
Each teaspoonful (5ml) contains:
Metronidazole Benzoate BP
equivalent to
Metronidazole BP.....200mg

Indications:
Biogyl suspension has anti-protozoa and antibacterial action and is effective against Trichomonas vaginalis and other protozoa including Entamoeba histolistica and Girdialambia and against anaerobic bacteria.

Dosage:
As directed by the physician

RECOMMENDED DOSAGE

INDICATIONS	1 to 3 years	3 to 7 years	7 to 10 years	Duration of Dosage in Days
Acute Ulcerative Gingivitis	2.5ml (100mg). once daily	2.5ml (100mg). twice daily	2.5ml (100mg). thrice daily	3
Amoebiasis (a) Invasive intestinal disease in susceptible subjects	5mL, three times daily	5mL, four times daily	10mL, three times daily	5
(b) Intestinal disease in susceptible subjects	2.5mL, three times daily	2.5mL, four times daily	5mL, three times daily	5 - 10
(c) Symptomless cyst passers	2.5mL, three times daily	2.5 - 5mL, four times daily	5 - 10mL, three times daily	5
Uro-genital trichomoniasis where re-infection is likely, the consort should receive a similar course of treatment concurrently	1.2mL, three times daily	2.5mL, two times daily	2.5mL, three times daily	7 or 2
Giardiasis	10mL, once daily	15mL, once daily	25mL, once daily	3

Undesirable effects:
Common undesirable effects include unpleasant taste, nausea, vomiting and gastrointestinal upset, while rare undesirable effects include skin rashes and uticaria.

Patient Advice:
To be taken 1 hour before meal.

Storage:
Store at temperature not more than 30°C

Warning:
Keep all medicines out of the reach of children.

Presentation:
60ml of syrup in amber coloured PET bottle

Manufactured by:
Biomedical Limited
1, Ohimege Road, Gaa-Imam, Industrial Estate,
Ilorin, Kwara State, Nigeria.

Biogyl[R]

Suspension de Métronidazole Pédiatrique

Composition:
Chaque cuillèrèè à thé (5ml) contient:
Metronidazolé Benzoate BP
équivalent
Métronidazole BP.....200mg

Les indications:
La suspension Biogyl a une action anti-protozaire et antibactérienne et est efficace contre Trichomonas vaginalis et d'autres protozoaires, y compris Entamoeba histolistica et Girdia lambia, et contre les bactéries anaérobies.

Dosage:
Selon les directives du médecin

DOSAGE RECOMMANDÉ

INDICATIONS	1 à 3 ans	3 à 7 ans	7 à 10 ans	Durée de la posologi eenjours
Gingivite Ulcéreuse aigue	2.5mL, (100mg) une fois par jour	2.5mL, (100mg) deux fois par jour	2.5mL, (100mg) trois fois par jour	3
Amibiase (a) Maladie intestinale invasive chez les sujets sensibles	5 mL, trios fois par jour	5 mL, quatre fois par jour	10mL, trois fois par jour	5
(b) Maladie intestinal chez les sujets sensibles	2.5mL, trois fois par jour	2.5mL, quatre fois par jour	5mL, trois fois par jour	5 - 10
(c)Passants à kyste asymptomatique	2.5mL, trois fois par jour	2.5 - 5mL, quatre fois par jour	5 - 10mL, trois fois par jour	5
Trichomonase uro-génitale ou une reinfection est probable, le conjoint devrait recevoir un traitment similaire simultanément	1.2mL, trois fois par jour	2.5mL, deux fois par jour	2.5mL, trois fois par jour	7 or 2
Giardiase	10mL, une fois par jour	15mL, une fois par jour	25mL, une fois par jour	3

Effets indésirables:
Les effets indésirables courants comprennent un gout desagréable, des nausées, des vomissements, des troubles gastro-intestinaux, tandis que les effets indésirables rares comprennent des éruptions cutanées, des uticaires.

Conseil aux patients:
à prendre 1 heure avant le repas

Espace de rangement:
Conserver à une température ne dépassant pas 30°C

Avertissement:
Conservez tous les médicaments hors de la portée des enfants.

Présentation:
60ml de sirop en flacon d'ambre PET

Fabriqué par:
Biomedical Limited
1, Route d'Ohimege, Zone Industrielle de Gaa-Imam,
llorin, Kwara State, Nigeria.