BASATON SYRUP

Composition:
Each 5ml contains:
Chlorpheniramine Maleate BP 2mg

1. What is Basaton Syrup and what it does:

Basaton Syrup contains Chlorpheniramine maleate, an antihistamine, which is used for the treatment of allergic symptoms of hayfever and other allergies. The symptoms include itchiness, redness, swelling, tenderness and irritation from rash, hives, dermatitis and food reactions.

2. What you need to know before you take Basaton syrup:

Do not take this medicine if you are hypersensitive to antihistamines, taking antidepressants containing Monoamine Oxidase Inhibitor, suffers from drowsiness/ dizziness or sensitive to ingredients contained within or taking other medicines containing antihistamines, phenytoin (for epilepsy), including products for the relief of colds, coughs and anxiety. If you are unsure, consult your doctor/pharmacist before taking Basaton Syrup. Do not drink alcohol or drive/use machinery as you may feel drowsy after taking the medicine.

3. How to take Basaton Syrup:

The recommended dose is:

Ages	Dosage	Maximum in 24 hours
1 - 2 years	2.5ml, twice daily	5ml
2 - 6 years	2.5ml, twice daily	5ml
6 - 12 years	5ml, every 4 - 6 hours	30ml
Over 12 years	10ml, every 4 - 6 hours	60ml

Do not take more than the stated dose. Contact your physician when too much of the syrup is taken, and do not drive on this occasion. If you forget to take the syrup, take a dose as soon as you remember, unless it is nearly time to take the next dose. Never take two doses together.

4. Possible side effects:

Like all medicines, Basaton Syrup can cause side effects, but not everybody gets them. Possible side effects include raised and itchy rash, swelling, dizziness, blurred vision, headache, disorientation, excitation and fatigue.

5. How to store Basaton Syrup:

Protect the syrup from light, and store below 30°C. Do not use the medicine after expiry and after a month of opening the syrup. Keep out of sight and reach of children.

6. Content of the pack:

Basaton Syrup description: A clear light red syrupy liquid with strawberry flavor in a 100ml amber PET bottle with a pilfer proof cap and a graduated measuring cup atop.

Manufactured by:

Biomedical Limited
1, Ohimege Road, Gaa-Imam, Industrial Estate,
Ilorin, Kwara State, Nigeria.

SIROP DE BASATON

Composition:
Chaque 5ml contient:
Maléate de Chlorphéniramine BP.....2mg

1. Qu'est-ce que le sirop Basaton et à quoi sert-il.

Basaton Syrup contient du maléate de chlorphéniramine, un antihistaminique, qui est utilisé pour le traitement des symptômes allergiques du rhume des foins et d'autres allergies. Les symptômes comprennent des démangeaisons, des rougeurs, un gonflement, une sensibilité et une irritation causées par une éruption cutanée, de l'urticaire, une dermatite et des réactions alimentaires.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre le sirop Basaton.

Ne prenez pas ce médicament si vous êtes hypersensible aux antihistaminiques, si vous prenez des antidépresseurs contenant un inhibiteur de la monoamine oxydase, si vous souffrez de somnolence/de vertiges ou si vous êtes sensible aux ingrédients contenus dans ou si vous prenez d'autres médicaments contenant des antihistaminiques, de la phénytoine (pour l'épilepsie), y compris des produits pour le soulagement du rhume, toux et anxiété. En cas de doute, consultez votre médecin/pharmacien avant de prendre Basaton Sirop. Ne buvez pas d'alcool et ne conduisez pas/utilisez des machines car vous pourriez vous sentir somnolent après avoir pris le médicament. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ne prenez pas le sirop.

3. Comment prendre le sirop de Basaton.

La dose recommandée est :

Âge	Dosage	Max en 24 heures
1 - 2 ans	2.5ml, deux fois par jour	5ml
2 - 6 ans	2.5ml, deux fois par jour	5ml
6 - 12 ans	5ml, toutes les 4 à 6 heures	30ml
Over 12 ans	10ml, toutes les 4 à 6 heures	60ml

Parlez-en à votre médecin/pharmacien pour les prescriptions. Contactez votre médecin lorsque vous prenez trop de sirop et ne conduisez pas à cette occasion. Si vous oubliez de prendre le sirop, prenez une dose dès que vous vous en souvenez, à moins qu'il ne soit presque l'heure de prendre la dose suivante. Ne prenez jamais deux doses ensemble.

4. Effets secondaires possible.

Comme tous les médicaments, Basaton Syrup est susceptible d'avoir des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets secondaires possibles comprennent une éruption cutanée surélevée et des démangeaisons, un gonflement, des étourdissements, une vision trouble, des maux de tête, une désorientation, une excitation et une fatigue.

5. Comment conserver le sirop Basaton.

Protéger le sirop de la lumière, et conserver en dessous de 30°C. Ne pas utiliser le médicament après expiration et après un mois d'ouverture du sirop. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

6. Contenu du pack.

Description du sirop Basaton : Un liquide sirupeux rouge clair clair au goût de fraise dans une bouteille PET ambrée avec un bouchon antivol et un bouchon doseur gradué au sommet.

Fabriqué par:

Biomedical Limited
1,Route d'Ohimege, Zone Industrielle de Gaa-Imam,
Ilorin, Kwara State, Nigeria.