פרוטוקול טיפולי בפצעים (סל חבישות מתקדמות מתעדכן אחת לשנה מעודכן 12/2025)

פצעי לחץ

תאור/סוג החבישה	שם המוצר		דרגה ותיאור הפצע :	תדירות החלפת חבישה	צורך בחבישה משנית
חבישות ספוג=FOAM (להפרשות מרובות)	Permafoam		2,3,4	פעם ב 3-2 ימים לפי כמות ההפרשות	לא
	Tielle		2,3,4	פעם ב 3-2 ימים לפי כמות ההפרשות	לא
	Hydrotac		2,3,4	פעם ב 3-2 ימים לפי כמות ההפרשות	לא
חבישות שאינן נדבקות - Low Adherent	Gaza Vazeline (חבישת גזה מצופה בוזלין)		1,2	פעם ביום	כן
	Paranet (חבישת גזה מצופה בשמן פאראפין)		1,2	פעם ביום	כן
	Actilite [חבישת גזה מצופה בדבש ושמן מנוקה]		1,2	פעם ב 3-2 ימים	כן
	Inadine (חבישת גזה מצופה ביוד)		2,3	לפחות פעם ביום לפי שינוי צבע החבישה המבהירה	
חבישות שקופות - FILM	Op –site		1,2	פעם ב 3-1 ימים לפי כמות ההפרשה	לא
	Tegaderm		1,2	פעם ב 3-2 ימים	לא
	Biofilm		1,2	פעם ב 3-2 ימים	לא
חבישות - Hydrocolocoids	Hydrocoll		2,3	פעם ב- 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	לא
	Granouflex		4,5,6	פעם ב- 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	לא
חבישות אצות ים = Alginate	Sorbalgon		2,3	פעם ב- 2 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	כן
	Silvercel Ag (אצות ים עם יוני כסף)		2,3,4	פעם ב - 1 עד 4 ימים לפי כמות ההפרשה	כן
	Flaminal Hydro (אלגינוג'ל)		2,3,4,5	פעם ב- 1 עד 4 ימים בהתאם לצורך	כן
	Flaminal Forte (אלגינוג'ל)		2,3,4,5	פעם ב- 1 עד 4 ימים	כן
חבישות למניעת ריח (עם פחם פעיל)	Actisorb		3,4	פעם ב-2 עד3 ימים	כן

תאור/סוג החבישה	שם המוצר		דרגה ותיאור הפצע :	תדירות החלפת חבישה	צורך בחבישה משנית
חבישות וחומרים אנטי-מיקרוביאלים	Silverol (אנטי פטריתי מקבוצת סולפונאמידים)		2,3,4	פעם ב - 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה . אין להשתמש בפנים ורגישים ל-G6PD	כן
	Aquacel Ag (מבילה כסף)*		2,3,4	פעם ב 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	כן
	Mafenide Acetate 8.5%		2,3,4,5	פעם ביום	כן
	" K SEPT (troclosene sod) 1000mg בדור ל 1 ליטר מים "		2,3,4,5	"פעמיים ביום (2) Tablet in 1 L. water provides 1000ppm LAC (Latent (Available Chlorine Good for use for 48 "hours	כן
חבישה הידרופילית (עם אבץ + ויטמינים A ו-B6)	Dermagran B		1,2	פעם ביום	כן
חבישת - הידרוג'ל (עם אבץ וויטמין B)	Dermagran Gel		2,3,4,5	פעם ביום	כן
חבישות קולגן	*Promogran		2,3,4,5	עד להפיכה לג'ל במגע עם הפרשות	כן
נוזל אידוטוני	Sol Hartman		2,3,4,5	עד 3 פעמיים ביום	כן
	Sol Nacl 0.9%		2,3,4,5	עד 3 פעמיים ביום	כן
חבישת הגנה	Biafine		1,2,3,4,5	בזמן חבישה מסביב לפצע	כן
	Zincod				
	Inotiol				
קומפרסים	Magnocare 33%		לבצקות	עד 3 פעמים ביום למשך 20 דקות	כן
חבישה ביולוגית	דבק ביולוגי		דרגה 1	לפי שיקול מיקצועי	לא
	Dermaden		2,3,4,5	עד 3 פעמים ביום	כן

פצע טראומטי

תאור/סוג החבישה	שם המוצר		דרגה ותיאור הפצע :	תדירות החלפת חבישה	צורך בחבישה משנית
חבישות טכנולוגיות מתקדמות	VAC - טופס 17 של הקופה		החלפה בתדירות הנקבעת על ידי נציג החברה המספקת את הטכנולוגיה		לא
הטרייה בירורגית	פעולה המורשת לביצוע: רופא, אחות מומחית קלינית פצע וסטומה (חוזר מינהל הסיעוד 203/2023)		3,4,5,6	לפי שיקול מיקצועי	
חבישות שאינן נדבקות - Low Adherent	Gaza Vazeline (חבישת גזה מצופה בוזלין)		1,2,3	פעם ביום	
	Paranet (חבישת גזה מצופה בשמן פאראפין)		1,2,3	פעם ביום	כן
	Actilite [חבישת גזה מצופה בדבש ושמן מנוקה]		1,2,3	פעם ב- 2 עד 3 ימים	כן
	Inadine (חבישת גזה מצופה ביוד)		1,2,3	לפחות פעם ביום לפי שינוי צבע החבישה המבהירה	כן
חבישות וחומרים אנטי-מיקרוביאלים (הידרופייבר)	Aquacel Ag (מבילה כסף)		דרגה 2+3	פעם ב- 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	
חבישות ספוג=FOAM (להפרשות מרובות)	Permafoam		דרגה 2+3	פעם ב- 2 עד 3 ימים	לא
	Tielle		דרגה 2+3	פעם ב- 2 עד 3 ימים	לא
	Hydrotac		דרגה 2+3	פעם ב- 2 עד 3 ימים	לא
חבישת -הידרוג'ל (עם אבץ וויטמין B)	Dermagran Gel		דרגה 2+3	פעם ביום	כן
חבישות - Hydrocolocoids	Hydrocoll		דרגה 3	פעם ב - 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	לא
	Granouflex		דרגה 3	פעם ב- 1 עד 3 ימים לפי כמות ההפרשה	לא

מקראה
דירוג הפצעים:

דרגה 1

NONBLANCHABLE ERYTHEMA / אדמומיות לא ניתנת להלבנה לאחר לחיצה.

דרגה 2

PARTIAL THICKNESS. אובדן עובי חלקי של דרמיס. מתבטא בשפשוף, שלפוחית או פצע שטחי עם גבולות יבש או מפריש. פצע עם גרנולציה ואפיתליזציה בשלב "האדום". אדום וחום מקומי

דרגה 3

FULL THICKNESS SKIN LOSS / אובדן עובי מלא של רקמות. מתבטא בפצע נמק (נקרוטי) ויבש, בשלב "צהוב" ומפריש, מדיף ריח רע או אחרי הטריה בשלב גרנולציה ואפיתליזציה, פצע בשלב היפרגרנולציה (שגשוג יתר).

דרגה 4



/ FULL THICKNESS TISSUE LOSS אובדן רקמות בעובי מלא עם עצם, גיד או שריר חשופים

5

UNSTAGEABLE /UNCLASSIFIED: full-thickness skin or tissue loss-depth unknown. אובדן עובי מלא של עור או רקמות - עומק אינו ידוע. מתבטא בפצע המכוסה גלד בצבע שחור.

6

SUSPECTED DEEP TISSUE INJURY-depth unknown / חשד לפגיעה ברקמות עמוקות. מתבטא בפצע עם רקמת עור בצבע כחול/סגול/אפור קהה ונוקשה.

מאיה שקולניק גזית -
מר"ג בית הדר באשדוד. 2025.

איך מציגים פצע לייעוץ?

תמונה ברורה, מוארת ובפוקוס של הפצע
- אחרי ניקוי
- תמונה של הפצע כשליש מהפריים ושל האיבר ההיקפי
- במה מטופל ומשך הטיפול

רקע כללי ומצב תפקודי
- גיל, מין, מסגרת מטפלת, סטאטוס תפקודי, אלרגיות.
- ממצאי מבחן נורטון, ניידות ומעברים.
- מצב הכרה, מצב נפשי ויכולת לטיפול עצמי ושיתוף פעולה.
- פצע לחץ בעבר.
- פצע ללא שיפור למשך זמן 2-4 שבועות.

אמצעים למניעת פצע
- משטחי תמיכה, שינויי תנוחה, טיפוח עור, תוספי תזונה.
- אמצעי מניעת פצעי לחץ בעקב, ממכשור, חבלה, בריחת שתן וצואה.

גורמי סיכון חיצוניים
- מכאניים-כוחות לחץ, חיכוך, גזירה ורטיבות.
- סביבתי.

גורמי סיכון פנימיים
- מחלות סיסטמיות: סכרת, מחלת כלי דם פריפרית.
- טיפולים המדכאים מערכת החיסון: סטרואידים, כימותרפיה, קרינה וכדומה.
- תרופות, הידרציה ותזונה.
- ערכי מעבדה כימיה וספירה לא תקינים.

מיטת הפצע
T - רקמה שחורה - אינה חיונית יבש ונמקי - הטרייה והרטבה
I - פצע צהוב - זיהום או דלקת - נקה אותו
M - פצע מפריש - איזון הפרשות ושמירה על לחות
E - פצע אדום - שוליים ואפיתליזציה - הגן עליו והסר לחץ

חתימת מנהל/ת רפואי/ת :

[redacted]

חתימת מנהל/ת שרותי האחיות :

[redacted]

[redacted] [redacted]