

Numerisches Programmieren, Übungen

Musterlösung 9. Übungsblatt: Gewöhnliche Differentialgleichungen (ODE)

1) Kondition von Anfangswertproblemen

- a) Berechnen Sie die analytische Lösung $y(t)$ der beiden folgenden gewöhnlichen Differentialgleichungen (ODE) mithilfe der Separation der Variablen:

i) $\dot{y}(t) = 2y(t)$

ii) $\dot{y}(t) = -2y(t)$

- b) Gegeben seien folgende Anfangswertbedingungen für die jeweiligen ODEs aus a). Berechnen Sie nun die analytische Lösung der daraus resultierenden Anfangswertprobleme (AWP):

i) $\dot{y}(t) = 2y(t), y(0) = 3, t \geq 0$

ii) $\dot{y}(t) = -2y(t), y(0) = y_0, t \geq 0.$

- c) Diskutieren Sie jeweils die Kondition der beiden AWP aus b).

Lösung:

- a) i) Die Lösung des ODEs bestimmen wir mittels Separation der Variablen:

$$\frac{dy}{dt} = 2y$$

$$\frac{dy}{2y} = dt$$

$$\int_{y_0}^y \frac{1}{2\eta} d\eta = \int_{t_0}^t d\tau$$

$$\frac{1}{2}(\ln |y| - \ln |y_0|) = t - t_0$$

$$\left| \frac{y(t)}{y_0} \right| = e^{2(t-t_0)}$$

$$y(t) = \pm y_0 \cdot e^{2(t-t_0)}$$

- ii) Analog zum ODE (a) ergibt sich hier die Lösung

$$y(t) = \pm y_0 \cdot e^{-2(t-t_0)}.$$

- b) i) Da für $t = 0 = t_0$ als Anfangswert $y(t = 0) = 3$ gegeben ist, muss für die AWP Lösung

$$y(t) = 3 \cdot e^{2t}$$

gelten.

ii) Analog zu i) ergibt sich mit $t_0 =$ und $y(0) = y_0$:

$$y(t) = y_0 \cdot e^{-2t}.$$

c) Wenden wir uns nun der Betrachtung der (absoluten) Kondition zu:

i) Im Fall von gestörten Anfangswerten

$$y_\varepsilon(0) = y_0 + \varepsilon$$

erhalten wir als Lösung des gestörten AWP

$$y_\varepsilon(t) = (y_0 + \varepsilon) \cdot e^{2t}.$$

Der Fehler nimmt folglich mit fortschreitender Zeit t zu:

$$|y_\varepsilon(t) - y(t)| = |\varepsilon| \cdot e^{2t} \rightarrow \infty \text{ für } t \rightarrow \infty$$

\Rightarrow schlecht-konditioniertes Problem!

ii) $y(t) = y_0 \cdot e^{-2t}$.

Wir erhalten als Lösung des gestörten AWP

$$y_\varepsilon(t) = (y_0 + \varepsilon) \cdot e^{-2t}.$$

Der Fehler wird gedämpft:

$$|y_\varepsilon(t) - y(t)| = |\varepsilon| \cdot e^{-2t} \rightarrow 0 \text{ für } t \rightarrow \infty$$

\Rightarrow gut-konditioniertes Problem!

2) Einschrittverfahren

Gegeben sei das folgende Anfangswertproblem:

$$\dot{y}(t) = t \cdot y(t), \quad y(0) = 1, \quad t \geq 0.$$

- a) Berechnen Sie die analytische Lösung $y(t)$ des AWP mit Hilfe der Separation der Variablen!
- b) Berechnen Sie im Intervall $[0; 4]$ numerische Lösungswerte y_k , welche die Lösung $y(t)$ in den Stellen t_k approximieren, d.h. $y_k \approx y(t_k)$. Rechnen Sie mit Schrittweite $t_{k+1} - t_k = \delta t = 1$ und verwenden Sie die folgenden Verfahren:

i) **Explizites Euler-Verfahren:**

Bei diesem Verfahren wird lediglich die Steigung im aktuellen Punkt t_k zur Berechnung der numerischen Lösung betrachtet:

$$\begin{aligned} t_k &= t_0 + k \cdot \delta t; \\ y_{k+1} &= y_k + \delta t \cdot f(t_k, y_k); \end{aligned}$$

ii) **Verfahren von Heun:**

Analog zur Trapezregel bei der Quadratur wird bei diesem Verfahren im Vergleich zum Euler-Verfahren ein zweiter f -Wert zur numerischen Berechnung der Steigung hinzugezogen:

$$\begin{aligned} t_k &= t_0 + k \cdot \delta t; \\ y_{k+1} &= y_k + \frac{\delta t}{2} \cdot (f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_k + \delta t \cdot f(t_k, y_k))); \end{aligned}$$

iii) **Klassisches Runge-Kutta-Verfahren** (Zusatz):

Analog zur Fassregel werden hier Zwischenwerte T_i für die Näherung der Steigung berechnet und mit $1/6$ gewichtet:

$$\begin{aligned} t_k &= t_0 + k \cdot \delta t; \\ T_1 &= f(t_k, y_k); \\ T_2 &= f\left(t_k + \frac{\delta t}{2}, y_k + \frac{\delta t}{2} T_1\right); \\ T_3 &= f\left(t_k + \frac{\delta t}{2}, y_k + \frac{\delta t}{2} T_2\right); \\ T_4 &= f(t_{k+1}, y_k + \delta t T_3); \\ y_{k+1} &= y_k + \frac{\delta t}{6} \cdot (T_1 + 2T_2 + 2T_3 + T_4); \end{aligned}$$

Vergleichen Sie die Ergebnisse der einzelnen Verfahren mit der analytischen Lösung. Was stellen Sie fest und wie lässt sich dies deuten?

Lösung:

- a) Wir berechnen die Separation (Trennung) der Variablen für $\dot{y}(t) = t \cdot y(t) = F(t) \cdot G(y)$ mit $F(t) = t$ und $G(y) = y$:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= F(t) \cdot G(y) \\ \frac{dy}{G(y)} &= F(t) dt \\ \int_{y(0)}^y \frac{1}{G(\eta)} d\eta &= \int_0^t F(\tau) d\tau \\ \int_{y(0)}^y \frac{1}{\eta} d\eta &= \int_0^t \tau d\tau \\ \ln|y| - \underbrace{\ln|y(0)|}_{=0} &= \frac{t^2}{2} \\ |y(t)| &= e^{\frac{t^2}{2}}, \quad t \in [0; b] \\ y(t) &= \pm e^{\frac{t^2}{2}}, \quad t \in [0; b] \end{aligned}$$

Wegen $y(0) = 1 > 0$ gilt $y(t) = +e^{\frac{t^2}{2}}$, $t > 0$.

- b) Wir berechnen im Intervall $[a; b] = [0; 4]$ zu den äquidistanten Zeitpunkten $t_k = t_0 + k \cdot \delta t$, $k = 1, 2, 3, 4$ eine numerische Approximation.

i) **Explizites Euler-Verfahren:**

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + \delta t \cdot f(t_0, y_0) = 1 + 1 \cdot 0 \cdot 1 = 1, \\ y_2 &= y_1 + \delta t \cdot f(t_1, y_1) = 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 = 2, \\ y_3 &= y_2 + \delta t \cdot f(t_2, y_2) = 2 + 1 \cdot 2 \cdot 2 = 6, \\ y_4 &= y_3 + \delta t \cdot f(t_3, y_3) = 6 + 1 \cdot 3 \cdot 6 = 24. \end{aligned}$$

Die Werte der analytischen Lösung $y(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$ betragen dagegen

$$\begin{aligned}y(t_1) &= e^{\frac{1}{2}} = 1.6487\dots, \\y(t_2) &= e^{\frac{4}{2}} = 7.3890\dots, \\y(t_3) &= e^{\frac{9}{2}} = 90.017\dots, \\y(t_4) &= e^{\frac{16}{2}} = 2980.9\dots\end{aligned}$$

ii) **Verfahren von Heun:**

$$\begin{aligned}y_1 &= y_0 + \frac{\delta t}{2} \cdot (t_0 \cdot y_0 + f(t_1, y_0 + \delta t \cdot t_0 \cdot y_0)) = 1 + \frac{1}{2} \cdot (1 \cdot 1) = \frac{3}{2}, \\y_2 &= y_1 + \frac{\delta t}{2} \cdot (t_1 \cdot y_1 + f(t_2, y_1 + \delta t \cdot t_1 \cdot y_1)) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2} + 2 \cdot \left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\right)\right) \\&= \frac{21}{4} = 5.25, \\y_3 &= y_2 + \frac{\delta t}{2} \cdot (t_2 \cdot y_2 + f(t_3, y_2 + \delta t \cdot t_2 \cdot y_2)) = \frac{21}{4} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{21}{2} + 3 \cdot \left(\frac{21}{4} + \frac{42}{4}\right)\right) \\&= \frac{21}{4} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{189}{4} + \frac{42}{4}\right) = \frac{273}{8} = 34.125, \\y_4 &= y_3 + \frac{\delta t}{2} \cdot (t_3 \cdot y_3 + f(t_4, y_3 + \delta t \cdot t_3 \cdot y_3)) \\&= \frac{273}{8} + \frac{1}{2} \cdot \left(3 \cdot \frac{273}{8} + 4 \cdot \left(\frac{273}{8} + 3 \cdot \frac{273}{8}\right)\right) \\&= \frac{273}{8} + \frac{1}{2} \cdot \left(3 \cdot \frac{273}{8} + 2 \cdot 273\right) = \frac{21}{16} \cdot 273 = 358,3\dots\end{aligned}$$

Im Vergleich zu den Werten der analytischen Lösung erkennt man, dass das Verfahren von Heun für diese (relativ großen) Zeitschritte durchaus noch einen nicht unerheblichen Fehler im Vergleich zur analytischen Lösung $y(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$ macht, aber schon besser ist als das explizite Euler-Verfahren.

iii) **Klassisches Runge-Kutta-Verfahren:**

Um einen globalen Runge-Kutta-Schritt zu machen, sind jeweils vier Subschritte T_1, \dots, T_4 auszuführen:

$k = 0$:

$$\begin{aligned}T_1 &= f(t_0, y_0) = t_0 \cdot y_0 = 0, \\T_2 &= f\left(t_0 + \frac{\delta t}{2}, y_0 + \frac{\delta t}{2} \cdot T_1\right) = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}, \\T_3 &= f\left(t_0 + \frac{\delta t}{2}, y_0 + \frac{\delta t}{2} \cdot T_2\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{4} = \frac{5}{8}, \\T_4 &= f\left(t_1, y_0 + \delta t \cdot T_3\right) = 1 \cdot \frac{13}{8} = \frac{13}{8}.\end{aligned}$$

Damit ergibt sich für den ersten Gesamtschritt:

$$\begin{aligned}y_1 &= y_0 + \frac{\delta t}{6} (T_1 + 2T_2 + 2T_3 + T_4) = 1 + \frac{1}{6} \cdot \left(0 + 1 + \frac{5}{4} + \frac{13}{8}\right) \\&= 1 + \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{31}{8}\right) = \frac{79}{48} = 1,645\dots\end{aligned}$$

$k = 1$:

$$\begin{aligned}T_1 &= f(t_1, y_1) = t_1 \cdot y_1 = \frac{79}{48}, \\T_2 &= f\left(t_1 + \frac{\delta t}{2}, y_1 + \frac{\delta t}{2} \cdot T_1\right) = \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{79}{48} + \frac{79}{2 \cdot 48}\right) = \frac{9}{4} \cdot \frac{79}{48} = \frac{711}{192} = \frac{237}{64}, \\T_3 &= f\left(t_1 + \frac{\delta t}{2}, y_1 + \frac{\delta t}{2} \cdot T_2\right) = \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{79}{48} \cdot \frac{4}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{711}{192}\right) \\&= \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{2 \cdot 4 \cdot 79 + 711}{2 \cdot 192}\right) = \frac{3 \cdot 1343}{4 \cdot 192}, \\T_4 &= f(t_2, y_1 + \delta t \cdot T_3) = 2 \cdot \left(\frac{79}{48} + \frac{3 \cdot 1343}{4 \cdot 192}\right) = 2 \cdot \left(\frac{16 \cdot 79 + 3 \cdot 1343}{4 \cdot 192}\right) = \frac{5293}{2 \cdot 192}.\end{aligned}$$

Damit ergibt sich für den zweiten Gesamtschritt:

$$\begin{aligned}y_2 &= y_1 + \frac{\delta t}{6}(T_1 + 2T_2 + 2T_3 + T_4) = \frac{79}{48} + \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{79}{48} + \frac{711}{2 \cdot 48} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1343}{192} + \frac{5293}{2 \cdot 192}\right) \\&= \frac{79}{48} + \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{8 \cdot 79 + 4 \cdot 711 + 3 \cdot 1343 + 5293}{2 \cdot 192}\right) \\&= \frac{79}{48} + \frac{12798}{2304} = \frac{16590}{48 \cdot 48} = 7,200 \dots\end{aligned}$$

Weitere Gesamtschritte ersparen wir uns in Anbetracht der relativ unschönen Brüche und überlassen diesem dem Computer (z.B. kurzes Matlab-Programm schreiben). Wir erhalten dann als Ergebnis

$$y_3 = 77.70 \dots,$$

$$y_4 = 1856.8 \dots$$

Das Klassische Runge-Kutta-Verfahren approximiert die analytischen Werte also noch etwas besser als das explizite Euler-Verfahren und das Verfahren von Heun.

Je größer die Ordnung des Verfahrens (Euler: 1, Heun: 2, kl. Runge-Kutta: 4), desto besser die numerischen Ergebnisse.

3) Zusatzaufgabe: Euler-Verfahren und Zinsberechnung

Die Verzinsung eines Guthabens, das am Anfang den Wert y_0 habe und pro Jahr $p\%$ Zinsen erhält, kann man als Anwendung des expliziten Euler-Verfahrens auf ein Anfangswertproblem $\dot{y} = f(y)$ interpretieren.

- Wiederholung: Wie sieht die Berechnungsvorschrift des expliziten Euler-Verfahrens mit Schrittweite δt für das AWP $\dot{y} = f(y)$ aus?
- Die Diga-Bank schüttet Zinsen immer zum Jahresende aus. Geben Sie die rechte Seite $f(y)$ an, so dass das Eulerverfahren mit $\delta t=1$ (Jahr) gerade diese Verzinsung beschreibt.
- Berechnen Sie die analytische Lösung des AWP!
- Nun macht die Spaßkasse das Angebot, Zinsausschüttungen vierteljährlich statt nur am Ende des Jahres durchzuführen. Geben Sie die Euler-Formel für diese neue Schrittweite an und berechnen Sie daraus eine explizite Vorschrift, um direkt den Wert des Guthabens nach einem vollen Jahr (y_{end}) zu ermitteln.
- Vergleichen Sie für den konkreten Fall eines Startguthabens von $y_0 = 100000$ Euro und einer Verzinsung von $p = 2$ Prozent p.a. die verschiedenen Guthaben y_{end} nach einem Jahr bei der Diga-Bank, der Spaßkasse und einer virtuellen Bank mit Verzinsung nach der analytischen Lösung des AWP! Was stellen Sie fest?

Lösung:

- Explizites Euler-Verfahren für das angegebene AWP:

$$y_{k+1} = y_k + \delta t \cdot f(y_k) .$$

- Ausgehend vom Startkapital y_0 soll mit $\delta t = 1$ das Startkapital plus Zinsen bei y_1 herauskommen. Die Zinsen für den Zeitraum eines Jahres sind $\delta t \cdot p/100 \cdot y_0$. Damit ergibt sich insgesamt:

$$y_1 = y_0 + \delta t \cdot p/100 \cdot y_0 ,$$

und die Funktion f der rechten Seite ist $f(y) = p/100 \cdot y$.

- Die analytische Lösung des AWP lautet $y(t) = y_0 e^{\frac{pt}{100}}$. Das erkennt man entweder schon direkt aus dem AWP oder rechnet es beispielsweise mit der Separation der Variablen nach ($\dot{y}(t) = p/100 \cdot y(t) = F(t) \cdot G(y)$ mit $F(t) = p/100$ und $G(y) = y$, sowie $t_0=0$):

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= F(t) \cdot G(y) \\ \frac{dy}{G(y)} &= F(t) dt \\ \int_{y_0}^y \frac{1}{G(\eta)} d\eta &= \int_{t_0}^t F(\tau) d\tau \\ \int_{y_0}^y \frac{1}{\eta} d\eta &= \int_{t_0}^t \frac{p}{100} d\tau \\ \ln(y) - \ln(y_0) &= \frac{p}{100} \cdot t \\ y(t) &= y_0 \cdot e^{\frac{pt}{100}}, \quad t \in [0; b]. \end{aligned}$$

- d) Wir verwenden nun 4 Schritte des Euler-Verfahrens zur kleineren Schrittweite $\delta t = 1/4$ (Jahr). Die Berechnungsvorschrift für y_{k+1} lautet dann:

$$y_{k+1} = y_k + \delta t \cdot \frac{p}{100} \cdot y_k = \left(1 + \frac{\delta t \cdot p}{100}\right) \cdot y_k.$$

Wenn wir diese Definition rekursiv einsetzen, so erhalten wir die explizite Formel zur direkten Berechnung von y_{k+1} aus y_0 :

$$y_{k+1} = \left(1 + \frac{\delta t \cdot p}{100}\right) \cdot y_k = \left(1 + \frac{\delta t \cdot p}{100}\right)^2 \cdot y_{k-1} = \dots = \left(1 + \frac{\delta t \cdot p}{100}\right)^{k+1} \cdot y_0.$$

- e) Für die konkreten Werte $y_0=100000$ Euro und $p = 2$ erhalten wir folgende Gesamtguthabenswerte y_{end} nach einem Jahr ($b = 1$):

$$\text{Diga-Bank : } y_{\text{end}} = 10^5 + 1 \cdot 2/100 \cdot 10^5 = 102000,00 ,$$

$$\text{Spaßkasse : } y_{\text{end}} = y_4 = \left(1 + \frac{\frac{1}{4} \cdot 2}{100}\right)^4 \cdot 10^5 = 102015,05 ,$$

$$\text{Anal. Lsg. : } y_{\text{end}} = 10^5 \cdot e^{\frac{2}{100}} = 102020,13 .$$

Man erkennt, dass mit ca. 15 Euro (0,015%) ein nicht unerheblicher Unterschied im Endkapital zwischen Diga und Spaßkasse vorliegt. Die Differenz der Spaßkasse zur analytischen Lösung beträgt nur etwa 5 Euro.