
A
Forward MR signals passing full54 FDR
INL to Early AMD | IVW
OPL to Early AMD | IVW
OPL to Early AMD | corrected
GCL to Dry AMD | IVW
0.172 (0.098 to 0.247)
0.116 (0.055 to 0.178)
0.095 (0.037 to 0.152)
0.213 (0.084 to 0.343)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Beta (95% CI)
FDR: INL 0.00133; OPL 0.00941; GCL 0.0374. Corrected OPL estimate excludes rs3138142.


B
Reverse MR across nine layer traits
FDR
OCT layer
RNFL
GCC
GCL
IPL
INL
OPL
PS
RPE
CSI
0.146
0.234
0.323
0.802
0.606
0.311
2.9e-04
0.146
0.323
−0.30
−0.25
−0.20
−0.15
−0.10
−0.05
0.00
0.05
Early AMD liability to layer thickness, beta (95% CI)


C
Three-exposure multivariable MR and influence sensitivity
IVW full model
MVMR-Median
IVW without rs10737680
INL (conditional F=29.5)
OPL (conditional F=39.3)
RPE (conditional F=15.2)
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
Multivariable beta (95% CI)