## Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

### Febrinol, 500 mg, tabletki

Paracetamolum

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

**Spis treści ulotki**


1. Co to jest lek Febrinol i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Febrinol
3. Jak stosować lek Febrinol
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Febrinol
6. Zawartość opakowania i inne informacje


### 1. Co to jest lek Febrinol i w jakim celu się go stosuje

Febrinol zawiera paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Lek stosuje się w bólach głowy, zębów, mięśni i stawów, w bolesnym miesiączkowaniu oraz w gorączce.

### 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Febrinol

***Kiedy nie stosować leku Febrinol***

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w ciężkiej niewydolności wątroby;
- u dzieci o masie ciała poniżej 33 kg.

***Ostrzeżenia i środki ostrożności***

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub nerek, jest niedożywiony lub regularnie pije alkohol.

Nie należy stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol, ponieważ może to doprowadzić do przedawkowania. Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu.

***Febrinol a inne leki***

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, w szczególności o lekach przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna, oraz o lekach stosowanych w padaczce.

***Ciąża i karmienie piersią***

W razie konieczności lek może być stosowany w okresie ciąży, w najmniejszej skutecznej dawce i przez możliwie najkrótszy czas. Paracetamol przenika do mleka kobiecego w ilościach nieistotnych klinicznie.

***Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn***

Febrinol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

### 3. Jak stosować lek Febrinol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

| Pacjenci | Dawka jednorazowa | Odstęp między dawkami | Maksymalna dawka dobowa |
|---|---|---|---|
| Dorośli i młodzież powyżej 12 lat o masie ciała powyżej 50 kg | 1–2 tabletki (500–1000 mg) | co najmniej 4 godziny | 8 tabletek (4 g) |
| Młodzież o masie ciała od 33 do 50 kg | 1 tabletka (500 mg) | co najmniej 4 godziny | 6 tabletek (3 g) |
| Dzieci o masie ciała poniżej 33 kg | nie stosować | – | – |

Tabletki należy połykać, popijając wodą. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

***Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku***

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze. W razie przedawkowania należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

***Pominięcie zastosowania leku***

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### 4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

***Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób)***

- wysypka, świąd, pokrzywka;
- zaburzenia czynności wątroby.

***Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób)***

- ciężkie reakcje skórne;
- zmniejszenie liczby płytek krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do urzędu nadzorującego obrót produktami leczniczymi.

### 5. Jak przechowywać lek Febrinol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

### 6. Zawartość opakowania i inne informacje

| | |
|---|---|
| **Substancja czynna** | paracetamol 500 mg w jednej tabletce |
| **Pozostałe składniki** | skrobia kukurydziana, powidon, kwas stearynowy, talk |
| **Wygląd** | białe, podłużne tabletki z linią podziału |
| **Opakowania** | 10 lub 20 tabletek w blistrach |

Podmiot odpowiedzialny: Wistula Pharma Sp. z o.o., ul. Lipowa 18, 20-020 Lublin

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2026