نشرة العبوة: معلومات للمريض

تيمارول 500 ملغ أقراص مغلفة – باراسيتامول

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك. احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.

1. ما هو تيمارول وما هي دواعي استعماله

يحتوي تيمارول على المادة الفعالة باراسيتامول، وهي مسكن للألم وخافض للحرارة. يستعمل تيمارول لتخفيف الآلام الخفيفة إلى المتوسطة مثل الصداع وآلام الأسنان وآلام الدورة الشهرية، ولخفض الحمى.

2. ما يجب معرفته قبل تناول تيمارول

لا تتناول تيمارول في الحالات التالية:

- إذا كانت لديك حساسية من الباراسيتامول أو من أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.
- إذا كنت تعاني من مرض شديد في الكبد.
- إذا كنت تتناول دواءً آخر يحتوي على الباراسيتامول.

تحذيرات واحتياطات

استشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول تيمارول إذا كنت تعاني من قصور في وظائف الكلى أو إذا كنت تتناول الكحول بانتظام. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها، فتناول جرعة زائدة قد يسبب ضرراً خطيراً للكبد.

الحمل والرضاعة

يمكن استعمال تيمارول أثناء الحمل والرضاعة عند الضرورة، بأقل جرعة فعالة ولأقصر مدة ممكنة.

3. كيفية تناول تيمارول

تناول هذا الدواء دائماً كما هو موصوف في هذه النشرة أو كما أخبرك الطبيب. يبلع القرص مع كوب من الماء، ويجب ترك أربع ساعات على الأقل بين جرعتين.

جدول الجرعات حسب العمر والوزن

الفئة العمرية	الوزن	الجرعة الواحدة	الحد الأقصى خلال 24 ساعة
البالغون	أكثر من 50 كغ	قرص أو قرصان	8 أقراص (4 غرامات)
المراهقون من 12 إلى 15 سنة	من 41 إلى 50 كغ	قرص واحد	6 أقراص (3 غرامات)
الأطفال من 9 إلى 12 سنة	من 30 إلى 40 كغ	قرص واحد	4 أقراص (غرامان)
الأطفال دون 9 سنوات	غير مناسب – يستعمل شكل صيدلاني آخر		

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، ولكنها لا تصيب كل من يتناوله. توقف عن تناول تيمارول واتصل بالطبيب فوراً إذا ظهرت لديك إحدى العلامات التالية:

- طفح جلدي أو احمرار أو حكة شديدة.
- تورم في الوجه أو الشفتين أو الحلق مع صعوبة في التنفس.
- اصفرار الجلد أو بياض العينين.

من الآثار النادرة جداً انخفاض عدد الصفائح الدموية، وقد يظهر ذلك على شكل كدمات غير معتادة.

5. كيفية تخزين تيمارول

- يحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال وأنظارهم.
- يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية، في العبوة الأصلية.
- لا تستعمل الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العلبة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

يحتوي كل قرص على 500 ملغ من الباراسيتامول. المكونات الأخرى هي النشا والبوفيدون وستيارات المغنيسيوم وثاني أكسيد التيتانيوم.

تتوفر العبوة في علب كرتونية تحتوي على 20 قرصاً في شريطين.

صاحب رخصة التسويق والمصنع: مختبرات الواحة للأدوية، المنطقة الصناعية الثانية، صفاقس.

تمت مراجعة هذه النشرة آخر مرة في سبتمبر 2026.