

HAZLO HOY, EN TU CASA, EN 5 MINUTOS

TEST DE MOVILIDAD DE 5 MINUTOS

4 pruebas que uso con todos mis clientes antes de ponerles una barra encima. Sin equipo, sin calentar, sin excusas. Cada una te dice algo distinto de tu cuerpo.

01 PALMS UP

HOMBRO

02 90/90

CADERA · ROTACIÓN

03 THOMAS TEST

CADERA · EXTENSIÓN

04 KNEE TO WALL

TOBILLO

01 PALMS UP

HOMBRO · MOVILIDAD GLOBAL

Qué mide: si tu hombro puede flexionar por encima de la cabeza manteniendo rotación externa. Es la prueba global: si fallas aquí, algo en la cadena (columna torácica, escápula o rotación) está cobrando factura.

CÓMO HACERLO

- 1** De pie, brazos al frente con las palmas mirando al techo.
- 2** Sube los brazos lo más alto que puedas SIN que las palmas dejen de mirar al techo.
- 3** Hazlo frente a un espejo o grábate de lado.

PASAS SI

Mantienes las palmas arriba claramente por encima de la altura de tu cara, sin trucos.

FALLAS SI

El meñique se dobla (tu bíceps hace trampa) o arqueas la espalda y abres las costillas para "llegar".

Si lo pasas: tu hombro tiene luz verde para press sobre cabeza y dominadas con carga.

Si lo fallas: la causa vive en uno de 4 componentes (columna torácica, escápula o rotación externa) y se corrige con 2-3 drills dirigidos en cuestión de semanas. Lo que cambia todo es identificar CUÁL es tu componente. Eso se ve en un video de 10 segundos.

02 90/90

CADERA · ROTACIÓN INTERNA

Qué mide: la rotación interna de tu cadera, lado por lado. Es el rango que nadie entrena y el que más problemas silenciosos genera.

CÓMO HACERLO

- 1** Siéntate en el piso: pierna delantera doblada a 90°, pierna trasera doblada a 90°.
- 2** Pon el torso erguido SIN apoyar las manos en el piso.
- 3** Cambia de lado y compara. La comparación es el dato.

PASAS SI

Torso erguido sin manos, en ambos lados, sin que la pelvis se vaya de lado.

FALLAS SI

Necesitas las manos, te desplomas hacia atrás, o un lado es claramente peor que el otro.

Si lo pasas: tu cadera rota lo suficiente para sentadilla profunda y desplantas sin pelearte con tu propio cuerpo.

Si lo fallas: ojo, el déficit en un solo lado es uno de los **predictores más fuertes de dolor lumbar** (Cibulka, 1988). La buena noticia: es de lo más agradecido de corregir cuando atacas el plano correcto de los 3 que tiene la cadera. Saber cuál es el tuyo, ese es el diagnóstico.

03 THOMAS TEST

CADERA · EXTENSIÓN

Qué mide: si tu cadera puede extenderse con la pelvis neutra, o si vives con el flexor acortado de tanto estar sentado.

CÓMO HACERLO

- 1** Siéntate al borde de una cama o banca alta.
- 2** Acuéstate llevando UNA rodilla al pecho con ambas manos. Aplana la espalda baja (costillas abajo).
- 3** Deja que la otra pierna cuelgue libre, sin forzarla. Grábate de lado.

PASAS SI

La rodilla colgante cae por debajo de la línea de tu cadera, y el talón cae por detrás de la rodilla.

FALLAS SI

La pierna queda flotando en el aire o se estira hacia el frente como resorte.

Si lo pasas: tu cadera extiende sin robarle rango a la lumbar. Peso muerto, caminatas largas y sprints sin pasarle la factura a la espalda.

Si lo fallas: no estás roto, estás adaptado a la silla. El flexor cede en semanas con el estímulo correcto; el error común es estirar donde no es y por eso "nunca mejora". Dónde sí, depende de cómo falles.

04 KNEE TO WALL

TOBILLO · DORSIFLEXIÓN

Qué mide: el rango de tu tobillo hacia adelante. Es la base de toda tu sentadilla: si el tobillo no da, alguien más arriba paga.

CÓMO HACERLO

- 1** Descalzo, pon la punta del pie a un puño de distancia (~10 cm) de la pared.
- 2** Lleva la rodilla al frente hasta tocar la pared, SIN despegar el talón del piso.
- 3** Prueba ambos lados.

PASAS SI

La rodilla toca la pared con el talón plantado, en ambos lados.

FALLAS SI

El talón se despegas, o un lado llega y el otro no.

Si lo pasas: tu tobillo sostiene la sentadilla profunda sin que la rodilla o la lumbar pongan el rango que falta.

Si lo fallas: es la articulación que más rápido responde de todo el cuerpo: semanas de trabajo constante, no meses. Y mientras tanto hay ajustes simples para seguir entrenando pierna pesado sin agravar. No es "más técnica", es empezar aquí.

PASAR LAS 4 SIGNIFICA UNA COSA

Que tu cuerpo está listo para cargar y tu límite ya no es movilidad: es programación. La pregunta pasa a ser si tu rutina está progresando con criterio o solo acumulando fatiga.

¿Y SI FALLÉ ALGUNA? MEJOR

Fallar un test no es una sentencia, es información: ahora sabes exactamente qué está frenando tu progreso, cosa que el 95% del gym nunca averigua. Y corregirlo no es complicado: **son 2-3 drills bien elegidos, unos minutos antes de entrenar, semanas y no meses.**

La palabra clave es "bien elegidos". Dos personas fallan el mismo test por razones distintas, y el drill que a uno lo arregla al otro le hace perder el tiempo. Esa lectura es mi trabajo.

¿FALLASTE ALGUNA Y QUIERES SABER POR QUÉ?

Mándame un video de tu test por DM y te digo qué está fallando en TU caso y por dónde empezar. Sin costo, sin compromiso. Si quieres ir a fondo, agendamos una llamada de 15 minutos.

IG: @mazobastidas_ ·

mazothecoach.github.io/mazothecoach

Este material es educativo y no sustituye una evaluación profesional individual. Si alguna prueba genera dolor (no incomodidad: dolor), detente y consúltalo.