

PARTE 2 · DESPUÉS DEL TEST DE MOVILIDAD

¿FALLASTE? AQUÍ ESTÁ EL PLAN

El protocolo exacto para cada prueba que no pasaste. No son estiramientos al azar: cada drill ataca el componente que está fallando.

LAS 4 REGLAS DEL PROTOCOLO

- 1** Solo trabaja lo que fallaste. Si pasaste un test, no le inviertas tiempo.
- 2** Antes de entrenar, no después. 5-8 minutos como parte del calentamiento, 4-5 días por semana.
- 3** Re-test cada semana. El test es gratis y tarda 1 minuto. Lo que se mide, se mejora.
- 4** Movilidad activa, no solo estirar. Ganar rango sin controlarlo es rentarlo, no comprarlo.

01 FALLASTE PALMS UP

HOMBRO · PLAN DE 4 COMPONENTES

Tu rango sobre cabeza es la suma de 4 piezas. Este protocolo toca las 4, porque atacar solo una (lo que hace todo el mundo: estirar el hombro) casi nunca resuelve.

EL PROTOCOLO · ANTES DE ENTRENAR TORSO

1 EXTENSIONES TORÁCICAS SOBRE RODILLO

Rodillo a media espalda, extiende SOLO la torácica, costillas abajo. Componente: columna torácica.

2x8

2 OPEN BOOKS

De lado, rodillas dobladas, abre el brazo de arriba siguiendo la mano con la mirada. Componente: rotación torácica.

2x6/lado

3 PUSH-UP PLUS + WALL SLIDES

Al final de la lagartija, empuja el piso "de más" separando las escápulas. Componente: serrato y escápula.

2x10

4 ROTACIÓN EXTERNA EN CABLE O BANDA

Codo pegado, rota hacia afuera con control. Termina con 5 palms-up lentos para integrar. Componente: fuerza en rotación externa.

2x12

Mientras tanto en el gym: cambia press militar estricto por landmine press o press en ángulo alto. Le das estímulo al hombro en un rango que SÍ controla, mientras ganas el que te falta. No es retroceder, es no pagar intereses.

02 FALLASTE 90/90

CADERA · ROTACIÓN INTERNA

La cadera se trabaja en sus 3 planos. La rotación interna es el plano que nadie entrena, así que el protocolo sesga hacia ahí pero toca los tres.

EL PROTOCOLO · ANTES DE ENTRENAR PIERNA

1 90/90 SWITCHES

En la posición del test, cambia de lado con control y SIN manos cuando puedas. El test es también el ejercicio.

2x6/lado

Plano: transverso.

2 PIGEON STRETCH ACTIVO

Posición de paloma, 5 respiraciones largas, luego empuja la espinilla contra el piso 5 seg y relaja. Plano: transverso.

45s/lado

3 FROG POSE CON RESPIRACIÓN

Rodillas abiertas, cadera atrás, exhala completo en la posición. Plano: frontal.

45s

4 HALF-KNEELING CON TILT PÉLVICO

Una rodilla abajo, costillas sobre pelvis, aprieta el glúteo de la pierna de atrás. Ganaste rango: ahora contrólo.

2x5 resp/lado

Mientras tanto en el gym: sentadilla con stance un poco más abierto o goblet squat, y mete trabajo unilateral corto (split squat, B-stance). El déficit unilateral de rotación interna predice dolor lumbar: no lo entierres debajo de más kilos.

03 FALLASTE THOMAS

CADERA · EXTENSIÓN

Tu flexor de cadera vive acortado (gracias, silla). El plan: abrir el rango en sagital y enseñarle a tu pelvis a quedarse neutra mientras la cadera extiende.

EL PROTOCOLO · DIARIO SI PUEDES

1 FOAM ROLL DE RECTO FEMORAL

Rueda el frente del muslo 45-60 seg por pierna, lento, pausando donde reclame.

60s/lado

2 COUCH STRETCH

Rodilla contra la pared o sillón, glúteo apretado, costillas abajo. Si arqueas la lumbar, no estás estirando nada: estás compensando.

45-60s/lado

3 HALF-KNEELING HIP SHIFT

Una rodilla abajo, aprieta glúteo trasero y desplaza la cadera al frente SIN arquear. Pequeño y controlado gana.

2x8/lado

4 GLUTE BRIDGE CON EXHALACIÓN

Sube exhalando completo, costillas abajo, aprieta arriba 2 seg. Extensión de cadera con pelvis neutra: exactamente lo que el test pide.

2x10

Mientras tanto en el gym: RDL y peso muerto con rango honesto (hasta donde la pelvis aguante neutra), hip thrust como ejercicio principal de extensión. Y levántate de la silla cada 45 min: el couch stretch no le gana a 9 horas sentado.

04 FALLASTE KNEE TO WALL

TOBILLO · DORSIFLEXIÓN

El tobillo es la articulación más agradecida: responde rápido si la trabajas seguido. Y el drill principal es el test mismo.

EL PROTOCOLO · ANTES DE PIERNA Y EN DÍAS LIBRES

1 KNEE-TO-WALL ROCKS

En la posición del test, lleva la rodilla a la pared y regresa, talón siempre plantado. Acércate 1 cm cuando se vuelva fácil.

2x10/lado

2 ESTIRAMIENTO DE SÓLEO

Como estirar pantorrilla contra pared, pero con la rodilla DOBLADA. El sóleo es el que suele frenar la sentadilla, no el gemelo.

45s/lado

3 ELEVACIONES DE TALÓN EN DÉFICIT

En un escalón, baja lento hasta el fondo del rango y sube. Fuerza en el rango nuevo para que se quede.

2x12

Mientras tanto en el gym: sentadilla con cuñas o discos bajo los talones (sin culpa: es una herramienta, no una trampa) y hack squat. Le quitas la demanda al tobillo mientras la construyes aparte. Cuando pases el test, las cuñas se van solas.

LA PARTE QUE NADIE TE DICE .

Estos drills funcionan. Pero genéricos al fin: atacan el promedio de los casos, no TU caso. Dos personas fallan el mismo test por razones distintas, y la diferencia entre 3 semanas y 3 meses de progreso está en saber cuál es la tuya.

Eso es exactamente lo que hago en el diagnóstico inicial con cada cliente: leer TU cuerpo, no el del promedio.

HICISTE EL PROTOCOLO 2 SEMANAS Y EL RE-TEST NO MEJORA

Mándame video de tu test y tu drill por DM. Te digo qué estás compensando sin darte cuenta. Y si quieres el plan completo a tu medida, agendamos 15 minutos.

IG: @mazobastidas_ ·
mazothecoach.github.io/mazothecoach

Este material es educativo y no sustituye una evaluación profesional individual. Si algún drill genera dolor (no incomodidad: dolor), detente y consúltalo.