Analysis I Zusammenfassung

613348

Inhaltsverzeichnis

1 Beweise **3**
- 1.1 Beweise Mengenlehre . . . 6
- 1.2 Beweise Funktionen . . . 8

2 Komplexe Zahlen **9**

3 Konvergenz und Divergenz **10**
- 3.1 Folgen . . . 11
  - 3.1.1 Konvergenz von Folgen . . . 11
- 3.2 Reihen . . . 14
  - 3.2.1 Konvergenz von Reihen . . . 14
  - 3.2.2 Konvergenzradius . . . 16
  - 3.2.3 Grenzwert von Reihen . . . 17
- 3.3 Reelle Funktionen . . . 18
  - 3.3.1 Konvergenz reeller Funktionen . . . 18

4 Ableitungen **24**
- 4.1 Kurvendiskussion . . . 30
- 4.2 Tangentengleichung . . . 32

5 Integration **33**
- 5.1 Rechentechniken Integration . . . 36

6 Taylor-Reihe **37**

7 Stichwortverzeichnis **40**

Übersicht

Die eindimensionale Analysis beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Konvergenzverhalten Folgen, Reihen und reellen Funktionen sowie der Integral- und Differentialrechnung.
Sie beginnt dabei mit der Aussagenlogik und führt weiter

1 Beweise

Die grundlegenden Beweismethoden sind:

- **Wahrheitstafel**
  Die Wahrheitstafel definiert die Symbole $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ und kann dazu genutzt werden einfache logische Aussagen, darunter einige der nachfolgenden Beweismethoden, zu zeigen:

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	$\perp$
w	f	f	f	w	f	f	f
f	w	w	f	w	w	f	f
w	w	f	w	w	w	w	f
f	f	w	f	f	w	w	f

- **Beidseitige Implikation**
  Die logische Äquivalenz ist definiert als Relation zweier Aussagen, die dieselben Einträge in der Wahrheitstabelle haben. Es gilt die folgende, sehr nützliche Beziehung, mit der eine Äquivalenz durch zwei Implikationen gezeigt werden kann.

$$(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \tag{1}$$

- **Widerspruchsbeweis**
  Die Implikation $A \Rightarrow B$ kann gezeigt werden, indem A und die Verneinung von B (meist kreativ) über logische Schritte auf einen Widerspruch geführt werden

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow ((A \wedge \neg B) \Rightarrow \perp) \tag{2}$$

- **Kontraposition**
  Die folgenden Aussagen sind äquivalent, d.h. $\neg B \Rightarrow \neg A$ zu zeigen, zeigt $A \Rightarrow B$, was unter Umständen leichter zu beweisen ist.

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A) \tag{3}$$

- **Vollständige Induktion**
  Die Aussage $A(n)$ (**Induktionsvoraussetzung**) gilt für alle $n \geq n_0$ (wobei $n \in \mathbb{N}$), wenn gezeigt wird, dass

  1. $A(n_0)$ ist wahr (**Induktionsanfang**)
  2. Für ein beliebiges n folgt, dass $A(n+1)$ richtig ist, wenn $A(n)$ richtig ist (**Induktionsschritt**)

Beispiel vollständige Induktion

zz: $A(n) : \sum_{i=1}^{n} i = \frac{1}{2}n(n+1)$ gilt für alle $n \geq 1$

1. Induktionsanfang

Zeige, dass A($n_0 = 1$) gilt. Setze dafür auf beiden Seiten des zu zeigenden Ausdrucks $n_0 = 1$ ein.

$$\sum_{i=1}^{1} i = 1 \overset{!}{=} \frac{1}{2}(2) = 1 \qquad \checkmark$$

2. Induktionsschritt

Zeige nun unter der Annahme, dass $A(n)$ gilt, dass $A(n+1)$ ebenfalls gilt.
Formuliere dafür $A(n+1)$ (IB)

$$\sum_{i=1}^{n+1} i \overset{!}{=} \frac{1}{2}(n+1)(n+2)$$

Beginne nun einer auf Seite (bei Beweisen mit Summen typischerweise auf der Seite mit der Summe), separiere diese, s.d. die Induktionsvoraussetzung $A(n)$ eingesetzt werden kann und forme die Terme so um, dass die andere Seite des Induktionsschrittes herauskommt:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n+1} i &= (n+1) + \sum_{i=1}^{n} i = \\
&\overset{\text{IV}}{=} (n+1) + \frac{1}{2}n(n+1) = \\
&\overset{1}{=} \frac{2}{2} \cdot (n+1) + \frac{1}{2}n(n+1) =
\end{aligned}$$

Es ist oft zweckmäßig von der anderen Seite entgegenzukommen. In diesem Fall kann bspw. sowohl der aktuelle Ausdruck, als auch der gewünschte Zielausdruck ausmultipliziert werden. Ein Vergleich zeigt dann die Gleichheit:

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}(2n+2) + \frac{1}{2}n(n+1) = \\
&= \frac{1}{2}\left(2n+2+n(n+1)\right) = \\
&= \frac{1}{2}\left(2n+2+n^2+n\right) = \\
&= \frac{1}{2}\left(n^2+3n+2\right) =
\end{aligned}$$

Der gewünschte Zielausdruck ist $\frac{1}{2}(n+1)(n+2) = \frac{1}{2}(n^2+2n+n+2) = \frac{1}{2}(n^2+3n+2)$.
Dies ist identisch zum aktuellen Ausdruck, weshalb gilt:

$$= \frac{1}{2}(n+1)(n+2) \qquad \checkmark$$

Somit wurde der Induktionsschritt bewiesen.

Da sowohl Induktionsanfang als auch Induktionsschritt bewiesen wurde, gilt die zu zeigende Aussage. ■

Herleitung

zz: $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ (beidseitige Implikation)

A	B	$A \Leftrightarrow B$	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
w	f	f	f	w	f
f	w	f	w	f	f
w	w	w	w	w	w
f	f	w	w	w	w

Da $A \Leftrightarrow B$ und $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ dieselbe Struktur in der Wahrheitstafel haben, wurde gezeigt, dass diese äquivalente Aussagen sind. ■

Herleitung

zz: $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow ((A \wedge \neg B) \Rightarrow \perp)$ (Widerspruchsbeweis)

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg B$	$A \wedge \neg B$	$\perp$	$A \wedge \neg B \Rightarrow \perp$
w	f	w	w	w	f	f
f	w	w	f	f	f	w
w	w	w	f	f	f	w
f	f	f	w	f	f	w

Da $A \Rightarrow B$ und $(A \wedge \neg B \Rightarrow \perp)$ dieselbe Struktur in der Wahrheitstafel haben, wurde gezeigt, dass diese äquivalente Aussagen sind. ■

Herleitung

zz: $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$ (Kontraposition)

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg B \Rightarrow \neg A$
w	f	f	f	w	f
f	w	w	w	f	w
w	w	w	f	f	w
f	f	w	w	w	w

Da $A \Rightarrow B$ und $(\neg B \Rightarrow \neg A)$ dieselbe Struktur in der Wahrheitstafel haben, wurde gezeigt, dass diese äquivalente Aussagen sind. ■

1.1 Beweise Mengenlehre

Eine **Menge** $A = \{a_1, a_2, ...\}$ ist ein abstraktes Objekt, bestehend aus einzelnen Objekten, genannt **Elemente**, a_i.

Wichtige Definitionen sind:

- **Teilmenge**
  A ist eine Teilmenge von B, falls

$$(A \subseteq B) :\Leftrightarrow (\forall x \in A \Rightarrow x \in B) \tag{4}$$

- **Gleichheit** zweier Mengen
  Zwei Mengen A, B sind gleich, falls

$$(A = B) :\Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \tag{5}$$

Für Beweise mit Mengen ist es oft zweckmäßig, die Mengennotationen, z.B. für das Komplement, Schnitt, Vereinigung, etc. auszuformulieren und erst dann den Beweis zu führen.

Tabelle 1: Ausformulierungen der Mengennotation

Mengennotation	Ausformuliert
$x \in A$	$x \in A$
$x \in A^c$	$x \notin A$
$x \in (A \cup B)$	$x \in A$ oder $x \in B$
$x \in (A \cap B)$	$x \in A$ und $x \in B$
$x \in (A \setminus B)$	$x \in A$ und $x \notin B$
$\neg(x \in ...)$	$x \notin ...$
$(x, y) \in (A \times B)$	$x \in A$ und $y \in B$
$(x, y) \notin (A \times B)$	$x \notin A$ oder $y \notin B$

$\boxed{\text{Beispiel}}$
zz: $A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Leftrightarrow ((A \cup B) \subseteq C)$

$\boxed{\Rightarrow}$ Es gelte $A \subseteq C \wedge B \subseteq C$.
Sei $x \in A \cup B$ beliebig. Dann ist entweder $x \in A \vee x \in B$.
Aus der Annahme der linken Seite folgt: $A \subseteq C \Rightarrow (x \in A \Rightarrow x \in C)$ und $B \subseteq C \Rightarrow (x \in B \Rightarrow x \in C)$.
Daher folgt $(x \in A \vee x \in B) \Rightarrow x \in C$, weil in beiden Fällen das Element in C liegt.
Zurück in Mengennotation wurde gezeigt, dass $A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Rightarrow ((A \cup B) \subseteq C)$ ✓

$\boxed{\Leftarrow}$ Es gelte $(A \cup B) \subseteq C$.
Sei $a \in A$ beliebig.
Eingesetzt in die linke Annahme folgt dann: $a \in A \cup B$ und somit $a \in C$.
Analog für $b \in B$. $b \in A \cup B$ und somit $b \in C$.
Es gilt also $a \in A \Rightarrow a \in C$ und $b \in B \Rightarrow b \in C$.
Zurück in Mengennotation wurde gezeigt, dass $A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Leftarrow ((A \cup B) \subseteq C)$ ✓

Es wurde also gezeigt, dass $A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Leftrightarrow ((A \cup B) \subseteq C)$ ■

$\boxed{\text{Beispiel}}$
zz: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (eine De Morgan'sche Regel)

$\boxed{\subseteq}$ Zeige, dass $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$

$$x \in (A \cup B)^c \Rightarrow x \notin (A \cup B) \Rightarrow x \notin A \wedge x \notin B \Rightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \Rightarrow x \in A^c \cap B^c$$

Es wurde gezeigt, dass $x \in (A \cup B)^c \Rightarrow x \in A^c \cap B^c \Leftrightarrow (A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$ ✓.

$\boxed{\supseteq}$ Zeige, dass $(A \cup B)^c \supseteq A^c \cap B^c$.
Es kann derselbe Weg aus $\boxed{\subset}$, nur rückwärts genommen werden. In diesem Fall werden die Folgepfeile zu Äquivalenzpfeilen umgeschrieben und der Beweis ist vollendet. ■

$\boxed{\text{Beispiel}}$
zz: $(A \subseteq B) \Leftrightarrow (B^c \subseteq A^c)$

$\boxed{\subseteq}$ Zeige $(A \subseteq B) \Rightarrow (B \subseteq A^c)$

$$(x \in A \Rightarrow x \in B) \overset{\text{Kontraposition}}{\Rightarrow} (\neg(x \in B) \Rightarrow \neg(x \in A)) \Rightarrow (x \notin B \Rightarrow x \notin A) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow (x \in B^c \Rightarrow x \in A^c)$$

Zurück in Mengennotation: $(A \subseteq B) \Rightarrow (B^c \subseteq A^c)$ ✓.

$\boxed{\supseteq}$ Zeige $\subseteq$ Rückwärts. ■

1.2 Beweise Funktionen

Eine **Abbildung/Funktion** $f : A \to B$ ist ein mathematisches Objekt, das jedem Element einer Menge A, genannt **Startmenge**, eindeutig ein Element der Menge B, genannt **Zielmenge**, zuordnet.

Wichtige Definitionen sind:

- **Surjektiv**, **Injektiv**, **Bijektiv**
  f ist surjektiv, wenn jedes Element der Zielmenge B <u>mindestens</u> einmal getroffen wird.
  $$\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b \tag{6}$$
  f ist injektiv, wenn jedes Element der Zielmenge B <u>höchstens</u> einmal getroffen wird.
  $$\forall a, a' \in A : f(a) = f(a') \Rightarrow a = a' \tag{7}$$
  f ist bijektiv, wenn jedes Element der Zielmenge B <u>genau</u> einmal getroffen wird.
  Alt.: f ist surjektiv und injektiv.
  $$\forall b \in B \exists! a \in A : f(a) = b \tag{8}$$
  In Beweisen wird das $\forall b$ bzw. $\forall a, a'$ dadurch gewährleistet, dass $b \in B$ bzw. $a, a' \in A$ beliebig gewählt wird.
  Für den Injektivitätsbeweis wird $f(a) = f(a')$ als wahr angenommen und die Implikation $a = a'$ gezeigt.

- **Bild**
  Nutze die Definition. Liegt ein Element im Bild $y \in f(M)$, dann folgt aus der Definition von f, dass
  $$\exists x \in M : f(x) = y \tag{9}$$
  Ist M z.B. ein Schnitt oder eine Vereinigung, können dann wie in Mengenbeweisen üblich logische Operationen durchgeführt werden.

- **Urbild**
  Nutze die Definition des Urbildes. Analog zum Bild folgt aus der Definition des Urbilds.
  $$x \in f^{-1}(M) \Leftrightarrow f(x) \in M \tag{10}$$

Beispiel

geg: A, B, C Mengen, $i : A \to B, s : B \to C$ Funktionen
zz: s, i sind injektiv $\Rightarrow s \circ i$ ist injektiv

Es gelte s, i sind injektiv.
Zeige, dass $\forall a, a' \in A : (s \circ i)(a) = (s \circ i)(a') \Rightarrow a = a'$.
Sei $a, a' \in A$ beliebig.
Es gelte $(s \circ i)(a) = (s \circ i)(a') \Leftrightarrow s(i(a)) = s(i(a')) \Rightarrow i(a) = i(a') \Rightarrow a = a'$.
Da $a, a' \in A$ beliebig, wurde gezeigt, dass s, i inj. $\Rightarrow \forall a, a' \in A : (s \circ i)(a) = (s \circ i)(a') \Rightarrow a = a'$ ■

---

2 Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen sind Tupel $z = (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, für die die Addition und Multiplikation als

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) := (a_1 + a_2, b_1 + b_2) \tag{11}$$

$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2, a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1). \tag{12}$$

Wichtige Definitionen sind die **imaginäre Einheit**, **Betrag**, **komplexe Konjugation** sowie die komplexe Exponentialfunktion

$$i := (0, 1) \tag{13}$$

$$|z| := \sqrt{a^2 + b^2} \tag{14}$$

$$z^\star := (a, -b) \tag{15}$$

$$\exp(z) := (e^a \cdot \cos(b), e^a \cdot \sin(b)). \tag{16}$$

Nützliche Rechenregeln sind:

$$\Im z = \frac{z - z^\star}{2i} \tag{17}$$

$$\Re z = \frac{z + z^\star}{2} \tag{18}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{z^\star}{|z|^2} = \left(\frac{a}{|z|^2}, -\frac{b}{|z|^2}\right). \tag{19}$$

Mögliche Darstellungsformen der komplexen Zahlen sind:

- **Algebraische Form**
  Um eine komplexe Zahl in Bruchform in die algebraische Form

  $$z = a + ib \tag{20}$$

  zu bringen, erweitere mit dem komplex konjugierten des Nenners.
  Bei komplexen Zahlen mit Potenz lohnt es sich zunächst das Innere darzustellen und dann erst die Potenz anzuwenden. Im letzten Schritt hilft der binomische Lehrsatz.

- **Trigonometrische-/Polardarstellung**
  Um eine komplexe Zahl in die trigonometrische- bzw. Polardarstellung

  $$z = |z| \cdot (\cos\theta + i \sin\theta) \tag{21}$$

  $$z = |z| \cdot e^{i\theta} \tag{22}$$

  zu bringen, müssen Betrag $|z|$ und Argument θ über die bzw. eine der folgenden Gleichungen berechnet werden.

  $$|z| = \sqrt{z \cdot z^\star} \tag{23}$$

  $$\cos\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin\theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \tan\theta = \frac{b}{a} \tag{24}$$

3 Konvergenz und Divergenz

Eine Funktion $f(x) : I \to \mathbb{R}$ konvegiert gegen l bzw. divergiert, falls

$$\lim_{x\to a} f(x) = l \quad :\Leftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 \text{ s.d. } \forall x \in \mathbb{R} : |x-a| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon \tag{25}$$

$$\lim_{x\to \infty} f(x) = l \quad :\Leftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0\ \exists x_0 > 0 \text{ s.d. } \forall x \in \mathbb{R}\ x \geq x_0 : |f(x) - l| \leq \varepsilon \tag{26}$$

$$\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty \quad :\Leftrightarrow \quad \forall M > 0\ \exists \delta \gtreqless 0 \text{ s.d. } \forall x \in \mathbb{R} : |x-a| \leq \delta \Rightarrow f(x) \gtreqless M \tag{27}$$

$$\lim_{x\to \infty} f(x) = \pm\infty \quad :\Leftrightarrow \quad \forall M > 0\ \exists x_0 \gtreqless 0 \text{ s.d. } \forall x \in \mathbb{R}\ x \overset{\geq}{\leq} x_0 : f(x) \gtreqless M. \tag{28}$$



Abbildung 1: Grafische Darstellung der Definitionen; oben links: ϵ-δ-, oben rechts: ε-x_0-, unten links: M-δ-, unten rechts: M-x_0-Kriterium

3.1 Folgen

Eine **Folge** ist eine Funktion $a : I \to \mathbb{K}$, dessen Definitionsbereich I eine Teilmenge der natürlichen und dessen Zielbereich die reellen oder komplexen Zahlen sind

$$(a_n)_{n \in I}. \tag{29}$$

3.1.1 Konvergenz von Folgen

Es gelten die Grenzwertsätze

$$\lim_{n\to\infty}(u_n + v_n) = \lim_{n\to\infty} u_n + \lim_{n\to\infty} v_n \tag{30}$$

$$\lim_{n\to\infty}(u_n \cdot v_n) = \lim_{n\to\infty} u_n \cdot \lim_{n\to\infty} v_n \tag{31}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} u_n}{\lim_{n\to\infty} v_n} \qquad \text{falls } \lim_{n\to\infty} v_n \neq 0 \tag{32}$$

$$\lim_{n\to\infty} e^{u_n} = \exp(\lim_{n\to\infty} u_n) \tag{33}$$

$$\lim_{n\to\infty} \ln(u_n) = \ln(\lim_{n\to\infty} u_n) \qquad \text{falls } \lim_{n\to\infty} u_n > 0 \tag{34}$$

Um das Konvergenzverhalten bzw. den Grenzwert einer Folge zu bestimmen, können folgende Techniken angewendet werden:

- **Elementare Folgen**
  Die Grenzwerte folgender elementarer Folgen sind bekannt:
  Sei $a, \alpha \in \mathbb{R}_{>0}$, dann gilt:

$$\lim_{n\to\infty} n! = +\infty$$

$$\lim_{n\to\infty} a^n = \begin{cases} 0, & a \in (0,1) \\ +\infty, & a > 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty} n^\alpha = +\infty$$

$$\lim_{n\to\infty} n^{-\alpha} = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \ln(n) = +\infty$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{bn} = e^{ab}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{(n!)^{1/n}} = e$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = \infty$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$$

- **Brüche/Wurzelterme/Induktionsformel**
  - Bei Brüchen ist es sinnvoll Potenzen von n auszuklammern, um vor allem Nullfolgen zu erkennen

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^4+3n^2+3n+1}{6n^4+3} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^4}{n^4} \frac{1+\frac{2}{n^2}+\frac{3}{n^3}+\frac{1}{n^4}}{6+\frac{3}{n^4}} = \frac{1+0+0+0}{6+0} = \frac{1}{6}$$

  - Bei einer Summe von mehreren Wurzeltermen kann es sinnvoll sein mit dem Term (aber umgekehrten Vorzeichen) zu erweitern und dann wie mit Brüchen zu verfahren.

$$\sqrt{n^2+2}-\sqrt{n^2+3n} = \sqrt{n^2+2}-\sqrt{n^2+3n}\cdot\frac{\sqrt{n^2+2}+\sqrt{n^2+3n}}{\sqrt{n^2+2}+\sqrt{n^2+3n}} = ... = \frac{\frac{2}{n}-3}{\sqrt{1+\frac{2}{n^2}}+\sqrt{1+\frac{3}{n}}}$$

  - Lässt sich das Folgenglied über eine Summe beschreiben, ist es sinnvoll, eine mittels Induktion gezeigte Formel einzusetzen.

$$\frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{n^3}\cdot\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

- **Einschnürungssatz**
  Seien $(x_n)_n, (y_n)_n, (w_n)_n$ Folgen, es gelte $x_n \leq w_n \leq y_n$ und $(x_n)_n, (y_n)_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} a$. Dann ist der Grenzwert von w_n auch a.

- **Vergleich** mit kleinerer/größerer Folge

$$u_n \leq v_n \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} u_n \leq \lim_{n\to\infty} v_n \tag{35}$$

  Dann insbesondere:

$$\lim_{n\to\infty} u_n = +\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} v_n = +\infty \tag{36}$$

$$\lim_{n\to\infty} v_n = -\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} u_n = -\infty \tag{37}$$

- Zeige **Divergenz durch Teilfolgen Beispiele**
  Wenn <u>nicht</u> alle Teilfolgen gegen a konv., konv. die Folge $(u_n)_n$ nicht gegen a.
  Kontraposition von: $(u_n)_n$ konv. gegen a gdw. alle TF gegen a konv.

- **Definition** (ε-n_0 bzw. M-n_0-Kriterium)
  Verwende die Definitionen der Grenzwerte aus Kapitel 3.

Beispiel

zz: $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2+4} = 0$

Nebenrechnung

$$\left|\frac{1}{n^2+4} - 0\right| = \frac{1}{n^2+4} \leq \frac{1}{n^2} \overset{!}{\leq} \varepsilon$$

Stelle die Ungl. nach n um. Dieses wird im Beweis als n_0 gewählt.

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$$

Beweis

Sei $\varepsilon > 0$. Gemäß dem archimedischem Axiom kann ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gewählt werden s.d. $n_0 \geq \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$. Dann folgt $\forall n \geq n_0$

$$\left|\frac{1}{n^2+4} - 0\right| = \frac{1}{n^2+4} \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n_0^2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right)^2} = \varepsilon \qquad \blacksquare$$

Somit wurde gezeigt, dass $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 > 0$ (nämlich $n_0 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$): $\forall n \in \mathbb{N}\ n \geq n_0 : |\frac{1}{n^2+4} - 0| \leq \varepsilon$.

Komplexe Folgen

Komplexe Folgen konvergieren dann, wenn Realteil und Imaginärteil konvergieren. Der Grenzwert der Folge ergibt sich dann aus der algebraischen Form

$$\lim_{n\to\infty} z_n = \lim_{n\to\infty} \Re(z_n) + i \lim_{n\to\infty} \Im(z_n). \tag{38}$$

Dargestellt in der trigonometrischen Form lässt sich direkt der Betrag des Folgenglieds ablesen und einen Schluss auf z.B. Nullfolgen- oder Divergenzverhalten zu.

3.2 Reihen

Eine **Reihe** ist eine Folge der Form

$$(a_n)_{n\in I} = \sum_{i=0}^{n} b_i, \tag{39}$$

wobei $(b_i)_i$ ebenfalls eine Folge ist.

3.2.1 Konvergenz von Reihen

Um festzustellen, ob eine Reihe konvergiert oder divergiert, können die folgenden Kriterien angewendet werden:

- **Elementare Reihen**
  Die Grenzwerte bzw. Konvergenzverhalten der geometrischen, harmonischen und Teleskopreihe sind bekannt:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a^k \begin{cases} = \frac{1}{1-a}, & \text{falls } |a| < 1 \\ \text{divergiert}, & \text{sonst} \end{cases} \tag{40}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} \begin{cases} \text{konvergiert}, & \text{falls } s > 1 \\ \text{divergiert}, & \text{sonst} \end{cases} \tag{41}$$

$$\sum_{k=0}^{n} a_k - a_{k+1} = a_0 - a_{n+1} \tag{42}$$

- **Divergenz falls keine Nullfolge**

$$\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{k\geq n_0}^{\infty} u_k = +\infty \tag{43}$$

- **Quotientenkriterium (QK)**

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \begin{cases} < 1, & \text{absolut konvergent} \\ > 1, & \text{divergent} \\ = 1, & \text{keine Aussage} \end{cases} \tag{44}$$

  Nützlich bei Fakultäten.

- **Wurzelkriterium (WK)**

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|u_n|} \begin{cases} < 1, & \text{konvergent} \\ > 1, & \text{divergent} \\ = 1, & \text{keine Aussage} \end{cases} \tag{45}$$

- **Satz der alternierenden Reihen (Leibniz-Kriterium)**
  Wird eine alternierende Reihe $\sum_{k\geq n_0}(-1)^k a_k$ untersucht, gilt das Kriterium

$$a_k \quad \text{positive Nullfolge} \quad \Rightarrow \quad \sum_{k\geq n_0} (-1)^k a_k \quad \text{konvergent} \tag{46}$$

- **Verdichtungskriterium**
  Sei $(u_n)_n$ eine positive fallende Folge, dann gilt

$$\sum_{n\geq n_0} u_n \quad \text{konvergiert} \quad \Rightarrow \quad \sum_{n\geq n_0} 2^k u_{2^k} \quad \text{konvergiert} \tag{47}$$

- **Majorantenkriterium (Maj.)**
  Konvergiert eine größere Reihe, so konvergiert auch die zu untersuchende Reihe.
  Sei $|a_n| \leq b_n$, so folgt

$$\sum_{n=1} b_n \quad \text{konvergent} \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1} a_n \quad \text{absolut konvergent} \tag{48}$$

- **Minorantenkriterium (Min.)**
  Divergiert eine kleinere Reihe, so divert auch die zu untersuchende Reihe.
  Sei $a_n \geq b_n$, so folgt

$$\sum_{n=1} b_n \quad \text{divergent} \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1} a_n \quad \text{divergent} \tag{49}$$

- **Absolute Konvergenz**
  Eine Reihe $(a_n)_n$ konvergiert absolut (und ist somit konvergent), wenn

$$\sum_{n=1} |a_n| \quad \text{konv.} \tag{50}$$

  Nützlich für z.B. sin, da dieser im Betrag mit ≤ 1 weggenähert werden kann.

Beispiel Quotientenkriterium

geg: $\sum_{k=2} \frac{k+2}{4^k}$

$$\left|\frac{(k+1)+2}{4^{k+1}} \cdot \frac{4^k}{k+2}\right| = \frac{k+3}{4} \cdot \frac{1}{k+2} = \frac{k}{k}\frac{(1+\frac{3}{k})}{4(1+\frac{2}{k})} \xrightarrow{k\to\infty} \frac{1}{4} < 1 \quad \text{konvergiert}$$

Beispiel Wurzelkriterium

geg: $\sum_{k=0} \frac{k}{2^k}$

$$\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{\left|\frac{k}{2^k}\right|} = \lim_{k\to\infty} \frac{\sqrt[k]{k}}{2} = \frac{\lim\limits_{k\to\infty} \sqrt[k]{k}}{\lim\limits_{n\to\infty} 2} = \frac{1}{2} < 1 \quad \text{konvergiert}$$

Beispiel Majorantenkriterium

geg: $\sum_{n=1} \frac{n+1+\sqrt{n}}{2n^3-n}$

$$\sum_{n=1} \frac{n+1+\sqrt{n}}{2n^3-n} \leq \sum_{n=1} \frac{n+n+n}{2n^3-n^3} = \sum_{n=1} \frac{3n}{n^3} = 3\sum_{n=1} \frac{1}{n^2} \qquad \text{konvergiert}$$

3.2.2 Konvergenzradius

Der **Konvergenzradius** KR ist das größte z, für das eine Potenzreihe $\sum_k a_k z^k$ absolut konvergiert:

$$\sum_{k \geq n_0} a_k \cdot z^k \begin{cases} \text{absolut konvergent,} & |z| < \text{KR} \\ \text{divergiert,} & |z| > \text{KR} \end{cases} \tag{51}$$

z^k kann dabei auch die Form $(z - z_0)^k$ annehmen.

- Bestimmung über **Hadamand-Formel**

$$\frac{1}{\text{KR}} = \lim_{n \to \infty} |a_n|^{1/n} \in [0, +\infty] \tag{52}$$

- Bestimmung über **QK für Potenzreihen**
  Seien $(a_n)_{n \geq n_0}$ s.d. $a_n \neq 0$ für n groß genug.

$$\frac{1}{\text{KR}} = \lim_{n \to \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \in [0, +\infty] \tag{53}$$

Beispiel Quotientenkriterium

ges: KR von $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot z^n$

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \left| \frac{(-1)^{n+1-1}}{n+1} \right| \cdot \left| \frac{n}{(-1)^n} \right| = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \to \infty} 1$$

$$\Rightarrow \text{KR} = \frac{1}{1} = 1$$

Beispiel Hadamand-Formel

ges: KR von $\sum_{n=1}^{\infty} n^4 \cdot 4^n \cdot (z-1)^n$

$$\sqrt[n]{|a_n|} = (\sqrt[n]{n})^4 \cdot 4 \xrightarrow{n \to \infty} 4$$

$$\Rightarrow \text{KR} = \frac{1}{4}$$

3.2.3 Grenzwert von Reihen

Der Grenzwert einer Reihe

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k\geq n_0}^{n} a_k \equiv \sum_{k\geq n_0}^{\infty} a_k \tag{54}$$

bestimmt sich dadurch, dass die zu untersuchende Reihe in eine der elementaren Reihen umgeformt wird, dessen Grenzwert bereits bekannt ist.

Wichtige Techniken dabei sind:

- **Aufspalten der Summe**

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{n+1}{n} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$$

- **Indexverschiebung**
  Was im Folgengliedindex addiert wird, wird in Start und Endwert der Summe subtrahiert.

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{(n-2)!} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n-2} \frac{1}{n!}$$

Beispiel

ges: $\lim\limits_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$

ERGÄNZEN

3.3 Reelle Funktionen

Eine reelle Funktion ist eine Abbildung $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die von einer Teilmenge der reellen Zahlen in die reellen Zahlen abbildet.

3.3.1 Konvergenz reeller Funktionen

Es gelten die Grenzwertsätze

$$\lim_{x\to\infty}(f+g) = \lim_{x\to\infty} f + \lim_{x\to\infty} g \tag{55}$$

$$\lim_{x\to\infty}(f\cdot g) = \lim_{x\to\infty} f \cdot \lim_{x\to\infty} g \tag{56}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f}{g} = \frac{\lim_{x\to\infty} f}{\lim_{x\to\infty} g} \qquad \text{falls } \lim_{x\to\infty} g \neq 0 \tag{57}$$

Um den Grenzwert einer reellen Funktion zu bestimmen, können folgende Techniken angewendet werden:

- **Einsetzen**

$$\lim_{x\to 1}(3x^2+4) = 3\cdot 1^2 + 4 = 7$$

  Außerdem gilt:

$$\frac{b}{\pm\infty} = 0,\ e^{\infty} = \infty,\ e^{-\infty} = 0,\ \ln(\infty) = \infty,\ \ln(0) = -\infty \tag{58}$$

  Wichtige Umstelltricks für das Einsetzen sind

  - **Faktorisieren**

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8}{x-2} = \lim_{x\to 2}\frac{\cancel{(x-2)}(x^2+2x+4)}{\cancel{(x-2)}} = 12$$

  - **Rationalisierung des Zählers** für Wurzeln

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x+5}-3}{x-4} \overset{1}{=} \lim_{x\to 4}\left(\frac{\sqrt{x+5}-3}{x-4}\cdot\frac{\sqrt{x+5}+3}{\sqrt{x+5}+3}\right) = \lim_{x\to 4}\frac{\cancel{x+5-9}}{\cancel{(x-4)}\sqrt{x+5}+3} = \frac{1}{6}$$

  - **Doppelbrüche mittels Hauptnenner lösen**

$$\lim_{x\to 3}\frac{\frac{x}{x+2}-\frac{3}{5}}{x-3} \overset{1}{=} \lim_{x\to 3}\frac{\frac{x}{x+2}-\frac{3}{5}}{x-3}\cdot\frac{5(x+2)}{5(x+2)} = \lim_{x\to 3}\frac{5x-3(x+2)}{5(x-3)(x+2)} = \lim_{x\to 3}\frac{2\cancel{(x-3)}}{5\cancel{(x-3)}(x+2)} = \frac{2}{25}$$

- **Einschnürungssatz**
  Wenn $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, dann folgt aus

$$\lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x) = l \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to a} f(x) = l \tag{59}$$

- **L'Hopital**
  De l'Hopitals Regel kann in den Fällen $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{-\infty}{\infty}$, $\frac{\infty}{-\infty}$ angewendet werden. Dann gilt

$$\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)} = l \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = l \tag{60}$$

  wobei a auch $\pm\infty$ sein kann.

Beispiel

ges: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x}}{1+x(1-x)^{1/4}}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x}}{1+x(1-x)^{1/4}} \overset{\text{Typ "0/0"}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sqrt{2+x}}+\frac{1}{\sqrt{2-x}}}{1+\frac{1}{4}(1-x)^{-3/4}} = \frac{2\sqrt{2}}{5}$$

Die anderen pathologischen Fälle lassen sich wie folgt auf die L'Hopital Fälle umformen.

  - "$0\cdot\infty$"
    Falls bereits ein Bruch vorhanden, können die Faktoren einfach "zusammengeschoben" werden:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{x}\cdot\ln(x)\right) \overset{"0\cdot\infty"}{=} \lim_{x\to\infty}\left(\frac{\ln(x)}{x}\right) \overset{"\frac{\infty}{\infty}"}{=} \ldots$$

    Falls kein Bruch vorhanden, erzeuge einen Doppelbruch:

$$\lim_{x\to 0^+}(x\cdot\ln(x)) \overset{"0\cdot\infty"}{=} \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} \overset{"\frac{\infty}{\infty}"}{=} \ldots$$

  - "0^0", "∞^0", "1^∞"
    Diese Pathologien werden mittels des exp-ln-Tricks in "$0\cdot\infty$" umgeformt

$$\lim_{x\to 0^+} x^{2x} \overset{"0^0"}{=} \lim_{x\to 0^+} e^{\ln\left(x^{2x}\right)} = \lim_{x\to 0^+} e^{2x\cdot\ln(x)} = \exp\left(\lim_{x\to 0^+}(2x\cdot\ln(x))\right) \overset{"0\cdot\infty"}{=} \ldots$$

  - "$\infty-\infty$"

$$\lim_{x\to 1^+}\left(\frac{1}{1-x}-\ln(x)\right) \overset{"\infty-\infty"}{=} \lim_{x\to 1^+}\frac{\ln(x)-(1-x)}{(1-x)\ln(x)} \overset{"\frac{0}{0}"}{=} \ldots$$

- **Beidseitiger-Grenzwert-Kriterium**
  f ist stetig im Punkt a, wenn

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a) \tag{61}$$

  d.h. $f(a)$ existiert, $\lim\limits_{x\to\pm a} f(x)$ existieren und sind gleich.

Beispiel

geg: $f(x) = \begin{cases} 3x^2 \sin(1/x) - x\cos(1/x), & x \neq 0 \\ 0, x = 0 \end{cases}$ ges: Stetigkeit in $x = 0$

$$f(0) = 0 \overset{!}{=} \lim_{x\to 0} \left(3x^2 \sin(1/x) - x\cos(1/x)\right) = 0 - 0 = 0 \checkmark$$

- **Potenzreihe**
  Teile der Funktion können durch ihre Potenzreihen genähert werden (z.B. bis Grad 3).

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + ... \quad \text{KR} = \infty \tag{62}$$

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + ... \quad \text{KR} = \infty \tag{63}$$

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + ... \quad \text{KR} = \infty \tag{64}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + ... \quad \text{KR} = 1 \tag{65}$$

$$\sqrt{1+x} = = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + ... \quad \text{KR} = 1 \tag{66}$$

Beispiel

ges: $\lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}{x^2}$ mit Näherungen bis Grad 3 um $x = 0$

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{6} \quad \Rightarrow \frac{\sin x}{x} \approx 1 - \frac{x^2}{6}$$

$$\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \quad \Rightarrow \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) \approx \ln\left(1 + (-\frac{x^2}{6})\right) \approx -\frac{x^2}{6}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}{x^2} \approx \lim_{x\to 0} \frac{-x^2/6}{x^2} = -\frac{1}{6}$$

- **Definition** (ε-δ-, ε-x_0-, M-δ- und M-x_0-Kriterium)
  Verwende die Definitionen der Grenzwerte aus Kapitel 3.

Beispiel 1 ε-δ-Kriterium

zz: x^2 stetig in $\mathbb{R}$

Zeige $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \forall x \in \mathbb{R} : |x - a| \leq \delta \Rightarrow \left|x^2 - a^2\right| \leq \varepsilon$

Nebenrechnung

$$\begin{aligned}
|x^2 - a^2| &= |(x+a)\cdot(x-a)| = |x+a|\cdot|x-a| \leq |x+a|\cdot\delta = |x-a+2a|\cdot\delta \\
&\leq (|x-a| + |2a|)\cdot\delta \leq (\delta + |2a|)\cdot\delta \overset{\delta\leq 1}{\leq} (1+|2a|)\cdot\delta \leq \varepsilon \\
&\Rightarrow \left(\delta \leq \frac{\varepsilon}{1+|2a|} \wedge \delta \leq 1\right) \Leftrightarrow \delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{1+|2a|}\right)
\end{aligned}$$

Beweis

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{1+|2a|}\right)$.

Sei $a \in \mathbb{R}$ beliebig. Sei $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - a| \leq \delta$.

$$|x^2 - a^2| = ... \leq (1+|2a|)\cdot\delta \leq (1+|2a|)\cdot\frac{\varepsilon}{1+|2a|} = \varepsilon \qquad \blacksquare$$

Beispiel 2 ε-δ-Kriterium

zz: $\lim\limits_{x\to 3} \frac{x}{x-2} = 3$

Zeige $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$ s.d. $\forall x \in \mathbb{R} : |x - 3| \leq \delta \Rightarrow |\frac{x}{x-2} - 3| \leq \varepsilon$

$$\left|\frac{x}{x-2} - 3\right| = \left|\frac{x-(3x-2)}{x-2}\right| = \frac{|-2||x-3|}{|x-2|} = 2\delta\frac{1}{|x-2|}$$

Wähle $\delta \leq \frac{1}{2}$ (Nicht $\delta = 1$, da der linke äußere Rand des δ-Schlachs dort eine Def.lücke hat: $3 - \delta = 3 - 1 = 2$, $f(2)$ undefiniert).

$$|x-3| \leq \delta \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} \leq x - 3 \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \leq x - 2 \leq \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{1}{|x-2|} \leq 2$$

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $\delta = \min\{\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{4}\}$. $\forall x \in \mathbb{R}$ folgt

$$\left|\frac{x}{x-2} - 3\right| = \left|\frac{x-(3x-2)}{x-2}\right| = \frac{|-2||x-3|}{|x-2|} = 2\delta\frac{1}{|x-2|} \leq 4\delta \leq 4\frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon \qquad \blacksquare$$

Beispiel ε-x_0-Beweis

zz: $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^2}{3x^2+1} = \frac{1}{3}$

Zeige $\forall\varepsilon > 0\ \exists x_0 > 0$ s.d. $\forall x \in \mathbb{R}\ x \geq x_0 : |\frac{x^2}{3x^2+1} - \frac{1}{3}| \leq \varepsilon$

$$\left|\frac{x^2}{3x+1} - \frac{1}{3}\right| = \left|\frac{3x^2 - (3x^2+1)}{3(3x^2+1)}\right| = \frac{|-1|}{9x^2+1} \leq \frac{1}{9x^2} \leq \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{x_0^2} \overset{!}{\leq} \varepsilon$$

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $x_0 \geq \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$. $\forall x \in \mathbb{R}$ mit $x \geq x_0$ folgt

$$\left|\frac{x^2}{3x+1} - \frac{1}{3}\right| = \left|\frac{3x^2 - (3x^2+1)}{3(3x^2+1)}\right| = \frac{|-1|}{9x^2+1} \leq \frac{1}{9x^2} \leq \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{x_0^2} \leq \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} = \varepsilon \quad \blacksquare$$

Beispiel M-δ-Beweis

zz: $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x}{2x-2} = \infty$

Zeige $\forall M > 0\ \exists\delta > 0$ s.d. $\forall x \in \mathbb{R} : |x-1| \leq \delta \Rightarrow \frac{x}{2x-2} > M$
Da $x \to 1^+$, ist $x > 1$ und somit $|x-1| = x-1 \leq \delta$.

$$\frac{x}{2x-2} = \frac{x}{2(x-1)} \geq \frac{x}{2\delta} \geq \frac{1}{2\delta} \overset{!}{>} M$$

Sei $M > 0$. Wähle $\delta < \frac{1}{2M}$. $\forall x \in \mathbb{R}$ folgt

$$\frac{x}{2x-2} = \frac{x}{2(x-1)} \geq \frac{x}{2\delta} \geq \frac{1}{2\delta} > \frac{1}{2\frac{1}{2M}} = M \quad \blacksquare$$

Beispiel M-x_0-Beweis

zz: $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^2}{x+1} = \infty$

Zeige $\forall\varepsilon > 0\ \exists x_0 > 0$ s.d. $\forall x \in \mathbb{R}\ x \geq x_0 : \frac{x^2}{x+1} > M$

$$\frac{x^2}{x+1} \overset{x\geq x_0\geq 1}{\geq} \frac{x^2}{x+x} = \frac{x^2}{2x} = \frac{x}{2} \geq \frac{x_0}{2} \overset{!}{>} M \quad \Rightarrow \quad x_0 > 2M$$

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $x_0 = \max(1, 2M)$. $\forall x \in \mathbb{R}$ mit $x \geq x_0$ gilt:

$$\frac{x^2}{x+1} \overset{x\geq x_0\geq 1}{\geq} \frac{x^2}{x+x} = \frac{x^2}{2x} = \frac{x}{2} \geq \frac{x_0}{2} \geq \frac{2M}{2} = M \quad \blacksquare$$

- Um z.B. $|x+2|$ abzuschätzen, wähle δ kleiner einer Zahl (typisch: 1) und stelle die Ungl. um.

$$|x-2| \leq \delta \leq 1 \quad \Rightarrow \quad -1 \leq x-2 \leq 1 \quad \Rightarrow \quad 3 \leq x+2 \leq 5 \quad \Rightarrow \quad |x+2| \leq 5$$

Schreibe dann $\delta = \min\{1, ...\}$ wobei ... eine weitere Bedingung für δ ist, die i.d.R. später gefunden wird.
- Für z.B. $x \to 1^+$ folgt die Bedingung $x > 1$, da es sich von rechts annähert.
- Für mehrere Abschätzungen z.B. $x_0 \geq 1,\ x_0 \geq ...$, schreibe $x_0 = \max(1, ...)$

- **Folgenkriterium**
  $\forall (u_n)_n \in A$ mit $\lim\limits_{n\to\infty} = a$, gilt:
  $$\lim_{n\to\infty} f(u_n) = f(a) \tag{67}$$

$\boxed{\text{Beispiel 1}}$
zz: x^2 stetig in $a = 2$

Sei $\forall (u_n)_n$: $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 2$.

$$\lim_{n\to\infty} f(u_n) = \lim_{n\to\infty} (u_n)^2 = \lim_{n\to\infty} = (u_n \cdot u_n) = \lim_{n\to\infty} u_n \cdot \lim_{n\to\infty} u_n = 2 \cdot 2 = 4$$
$$f(a) = f(2) = 2^2 = 4$$
$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(u_n) = f(a) \qquad \blacksquare$$

$\boxed{\text{Beispiel 2}}$
zz: f(x) $= \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ ist unstetig in 0.

Betrachte die Folge $(u_n)_n = (1/n)_n$

$$\lim_{n\to\infty} f(1/n) = \lim_{n\to\infty} 1 = 1 \neq f(0) = 0 \qquad \blacksquare$$

---

4 Ableitungen

Eine Funktion f ist am Punkt a **differenzierbar**, wenn der Grenzwert des Differenzenquotients, genannt **Ableitung**, existiert.

$$f'(a) := \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{68}$$

Eine Funktion f ist **stetig differenzierbar**, wenn ihre Ableitung $f'(x)$ stetig ist.

Beispiel

zz: $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ diff.bar, stetig diff.bar

Untersuche die Differenzierbarkeit.
f ist für $x \neq 0$ als Verkettung und Produkt von diff.baren Funktionen diff.bar.
Es bleibt zu zeigen, dass f in 0 diff.bar ist.

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0} \frac{x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \to 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Denn $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \quad \Rightarrow \quad -x^2 \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$ und dann Einschnürungssatz.

Untersuche stetige Diff.barkeit.
Stetig Diff.bar bedeutet, dass die Ableitung f' stetig ist.

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - x \cos\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

f' ist als Verkettung, Summe und Produkt von stetigen Fktn. stetig. Es bleibt zu zeigen, dass f' in 0 stetig ist. Dazu muss gelten:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} f'(x)$$
$$f'(0) = 0 \overset{!}{=} \lim_{x \to 0} \left[3x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - x \cos\left(\frac{1}{x}\right)\right] = 0 - 0 = 0 \qquad \checkmark$$

Für zwei differenzierbare Funktionen f, g gelten die folgenden Rechenregeln:

- **Additionsregel**
$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x) \tag{69}$$
- **Produktregel**
$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \tag{70}$$
- **Quotientenregel** Für $g \neq 0$ gilt
$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)} \tag{71}$$
- **Potenzregel**
$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1} \tag{72}$$
mit $n \in \mathbb{Z}$.
- **Kettenregel**
$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot f'(x) \tag{73}$$
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y} \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \tag{74}$$
mit $z = g(y),\ y = f(x)$.

Beispiel Kettenregel

ges: $\left(\ln\left(\sin^2\left(\frac{x}{e^{x^5+4}}\right) + \frac{1}{\cos^2(x^2)}\right)\right)'$

Strategie: Substituiere alle auftauchenden Funktionen abgesehen von solchen, die über die 4 Grundrechenarten verbunden sind.
Berechne anschließend alle Ableitung mittels Additions,- Produkt-, Quotienten- und Kettenregel Schritt für Schritt. Hierbei bietet es sich an, die Leibniz-Notation zu verwenden.
Berechne anschließend in einer Nebenrechnung alle vorkommenden Ableitungen der Substitutionen und setze diese ein.

$$\left(\ln\left(\sin^2\left(\frac{x}{e^{x^5+4}}\right) + \frac{1}{\cos^2(x^2)}\right)\right)' = \left(w\left(u_4\left(u_3\left(\frac{x}{u_2(u_1(x))}\right)\right) + \frac{1}{v_2(v_1(x))}\right)\right)' = (\star)$$

Dabei wurden die folgenden Substitutionen vorgenommen:

- $u_1(x) = x^5 + 4$
- $u_2(u_1) = e^{u_1}$
- $u_3\left(x/u_2\right) = \sin\left(x/u_2\right)$
- $u_4(u_3) = u_3^2$
- $v_1(x) = x^2$
- $v_2(v_1) = \cos(v_1)$
- $w\left(u_4 + 1/v_2\right) = \ln\left(u_4 + 1/v_2\right)$

$$(\star) = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}w\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)}{\mathrm{d}\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)} \cdot \frac{\mathrm{d}\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}w\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)}{\mathrm{d}\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)} \cdot \left[\frac{\mathrm{d}u_4}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{v_2}\right)}{\mathrm{d}x}\right] =$$

$$= \frac{\mathrm{d}w\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)}{\mathrm{d}\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)} \cdot \left[\frac{\mathrm{d}u_4}{\mathrm{d}u_3} \cdot \frac{\mathrm{d}u_3\left(\frac{x}{u_2}\right)}{\mathrm{d}\left(\frac{x}{u_2}\right)} \cdot \frac{\mathrm{d}\left(\frac{x}{u_2}\right)}{\mathrm{d}x} + \frac{0 - \frac{\mathrm{d}v_2}{\mathrm{d}x}}{v_2^2}\right] =$$

$$= \frac{\mathrm{d}w\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)}{\mathrm{d}\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)} \cdot \left[\frac{\mathrm{d}u_4}{\mathrm{d}u_3} \cdot \frac{\mathrm{d}u_3\left(\frac{x}{u_2}\right)}{\mathrm{d}\left(\frac{x}{u_2}\right)} \cdot \frac{u_2 - x \cdot \frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}u_1} \cdot \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}}{u_2^2} + \frac{-\frac{\mathrm{d}v_2}{\mathrm{d}v_1} \cdot \frac{\mathrm{d}v_1}{\mathrm{d}x}}{v_2^2}\right] = (\star)$$

Berechne nun alle auftretenden Ableitungen.
Setze nach dieser Berechnung jeweils alle Substitutionen wieder ein, s.d. die Terme wieder von x abhängen:

- $\frac{\mathrm{d}w\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)}{\mathrm{d}\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)} = \frac{\mathrm{d}\ln\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)}{\mathrm{d}\left(u_4 + \frac{1}{v_2}\right)} = \frac{1}{u_4 + \frac{1}{v_2}} = \frac{1}{\sin^2\left(\frac{x}{e^{x^5+4}}\right) + \frac{1}{\cos(x^2)}}$
  - $\frac{\mathrm{d}u_4}{\mathrm{d}u_3} = \frac{u_3^2}{\mathrm{d}u_3} = 2u_3 = 2\sin\left(\frac{x}{e^{x^5+4}}\right)$
  - $\frac{\mathrm{d}u_3\left(\frac{x}{u_2}\right)}{\mathrm{d}\left(\frac{x}{u_2}\right)} = \frac{\mathrm{d}\sin\left(\frac{x}{u_2}\right)}{\mathrm{d}\left(\frac{x}{u_2}\right)} = \cos\left(\frac{x}{u_2}\right) = \cos\left(\frac{x}{e^{x^5+4}}\right)$
    - $\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}u_1} = \frac{\mathrm{d}e^{u_1}}{\mathrm{d}u_1} = e^{u_1} = e^{x^5+4}$
    - $\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}(x^5+4)}{\mathrm{d}x} = 5x^4$
    - $\frac{\mathrm{d}v_2}{\mathrm{d}v_1} = \frac{\mathrm{d}\cos(v_1)}{\mathrm{d}v_1} = -\sin(v_1) = -\sin(x^2)$
    - $\frac{\mathrm{d}v_1}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}x} = 2x$

Einsetzen in den zuvor gefundenen Ausdruck ergibt:

$$(\star) = \frac{1}{\sin^2\left(\frac{x}{e^{x^5+4}}\right) + \frac{1}{\cos(x^2)}} \cdot \left[2\sin\left(\frac{x}{e^{x^5+4}}\right) \cdot \cos\left(\frac{x}{e^{x^5+4}}\right) \cdot \frac{e^{x^5+4} - x \cdot e^{x^5+4} \cdot 5x^4}{\left(e^{x^5+4}\right)^2} - \right.$$

$$\left. - \frac{1}{\cos^2(x^2)} \cdot \left(-\sin(x^2)\right) \cdot 2x\right] =$$

$$= \frac{1}{\sin^2\left(\frac{x}{e^{x^5+4}}\right) + \sec(x^2)} \cdot \left[2\sin\left(\frac{x}{e^{x^5+4}}\right) \cdot \cos\left(\frac{x}{e^{x^5+4}}\right) \cdot \frac{1 - 5x^5}{e^{x^5+4}} + \frac{\tan(x^2)}{\cos(x^2)} \cdot 2x\right]$$

$\boxed{\text{Herleitung}}$

zz: $(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$

$$\begin{aligned}
(f(x)+g(x))' &= \lim_{h\to 0} \frac{(f(x+h)+g(x+h))-(f(x)+g(x))}{h} = \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)+g(x+h)-g(x)}{h} = \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} \equiv \\
&\equiv f'(x)+g'(x) \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

zz: $(f(x)\cdot g(x))' = f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x)$

Der entscheidende Schritt im Beweis, ist das Einfügen der Null $0 = f(x+h)\cdot g(x) - f(x+h)\cdot g(x)$, gefolgt von der Separation in zwei Terme unter Verwendung der Grenzwertsätze für reelle Funktionen:

$$\begin{aligned}
(f(x)\cdot g(x))' &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\cdot g(x+h) - f(x)\cdot g(x)}{h} = \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\cdot g(x+h) - f(x)\cdot g(x) + f(x+h)\cdot g(x) - f(x+h)\cdot g(x)}{h} = \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)(g(x+h)-g(x)) + g(x)(f(x+h)-f(x))}{h} = \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)(g(x+h)-g(x))}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{g(x)(f(x+h)-f(x))}{h} = \\
&= \lim_{h\to 0} f(x+h)\cdot \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} + \lim_{h\to 0} g(x)\cdot \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \equiv \\
&\equiv f(x)\cdot g'(x) + g(x)\cdot f'(x) \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

zz: $(x^n)' = n\cdot x^{n-1}$ für $n \in \mathbb{Z}$

IA $n=0$:

$$(x^0)' = 1' = 0 = 0\cdot x^{0-1} = 0 \qquad \checkmark$$

IV: $(x^n)' = n\cdot x^{n-1}$
IS: $(x^{n+1})' = (n+1)\cdot x^n$

$$\begin{aligned}
(x^{n+1})' &= (x^n\cdot x)' \overset{\text{Produktregel}}{=} (x^n)'\cdot x + x^n\cdot 1 = \\
&= n\cdot x^{n-1}\cdot x + x^n = \\
&= n\cdot x^n + x^n = (n+1)\cdot x^n \qquad \checkmark
\end{aligned}$$

Zeige analog $(x^{-n})' = -n\cdot x^{-n-1}$. $\blacksquare$

zz: $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g'(x)}{g^2(x)}$ für $g(x) \neq 0$

Der entscheidende Schritt dieses Beweises ist das Einfügen der Null $0 = f(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g(x)$:

$$\begin{aligned}
\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h} = \\
&= \lim_{h\to 0} \left[\frac{1}{h}\cdot\left(\frac{f(x+h)\cdot g(x) - f(x)\cdot g(x+h)}{g(x+h)\cdot g(x)}\right)\right] = \\
&= \lim_{h\to 0} \left[\frac{1}{h}\cdot\frac{f(x+h)\cdot g(x) - f(x)\cdot g(x+h) + f(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g(x)}{g(x+h)\cdot g(x)}\right] = \\
&= \lim_{h\to 0} \left[\frac{1}{h}\cdot\frac{g(x)\left[f(x+h) - f(x)\right] - f(x)\left[g(x+h) - g(x)\right]}{g(x+h)\cdot g(x)}\right] = \\
&= \lim_{h\to 0} \left[\frac{g(x)\cdot\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - f(x)\cdot\frac{g(x+h)-g(x)}{h}}{g(x+h)\cdot g(x)}\right] \equiv \\
&\equiv \lim_{h\to 0} \frac{g(x)\cdot f'(x) - f(x)\cdot g'(x)}{g(x+h)\cdot g(x)} = \\
&= \frac{\lim_{h\to 0}\left[g(x)\cdot f'(x) - f(x)\cdot g'(x)\right]}{\lim_{h\to 0}\left[g(x+h)\cdot g(x)\right]} = \\
&= \frac{f'(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g'(x)}{g^2(x)} \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

zz: $(f(g(x)))' = f'(g(x))\cdot g'(x)$

Der entscheidende Schritt ist das Multiplizieren mit der Eins $1 = \ :$

$$\begin{aligned}
(f(g(x)))' &= \lim_{h\to 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \\
&= \lim_{h\to 0} \left[\frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)}\cdot\frac{g(x+h) - g(x)}{h}\right] = \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)}\cdot\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h) - g(x)}{h} =
\end{aligned}$$

Führe die Variablen $t = x + h$ und $u = g(x)$ ein, um im ersten Term die Ableitung zu erkennen. Dazu muss noch der Grenzwert $\lim_{h\to 0}$ angepasst werden. Da $\lim_{h\to 0}\left(f(g(x+h)) - f(g(x))\right) = 0$, ist das Äquivalent $\lim_{t\to u}\left(f(t) - g(u)\right)$. Analog für den Nenner:

$$\begin{aligned}
&= \lim_{t\to u}\frac{f(t) - f(u)}{t - u}\cdot g'(x) = \\
&\equiv f'(u)\cdot g'(x) \equiv f'(g(x))\cdot g'(x) \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

Elementare Ableitungen sind:

$$(e^x)' = e^x \tag{75}$$
$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \tag{76}$$
$$(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1} \qquad \text{mit } \alpha \in \mathbb{R} \tag{77}$$
$$\sin' = \cos \tag{78}$$
$$\cos' = -\sin \tag{79}$$
$$\tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2} \equiv \sec^2(x) \tag{80}$$
$$\cot' = -\frac{1}{\sin^2} \equiv -\csc^2(x) = -1 - \cot^2 \tag{81}$$
$$\sec' = \sec x \cdot \tan x \tag{82}$$
$$\csc' = -\cot x \cdot \csc x \tag{83}$$
$$\arccos' = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \tag{84}$$
$$\arcsin' = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \tag{85}$$
$$\arctan' = \frac{1}{1+y^2} \tag{86}$$
$$\operatorname{arccot}' = -\frac{1}{1+y^2} \tag{87}$$
$$\sinh' = \cosh \tag{88}$$
$$\cosh' = \sinh \tag{89}$$
$$\tanh' = \frac{1}{\cosh^2} = 1 - \tanh^2 \tag{90}$$
$$\coth' = -\frac{1}{\sinh^2} = 1 - \coth^2 \tag{91}$$
$$\operatorname{arcsinh}' = \frac{1}{\sqrt{y^2+1}} \tag{92}$$
$$\operatorname{arccosh}' = \frac{1}{\sqrt{y^2-1}} \tag{93}$$

Herleitung

Die Ableitungen der Umkehrfunktionen stammen aus dem Satz der diff.baren Umkehrfunktionen, der unter gewissen Voraussetzungen besagt: $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{(f' \circ f^{-1})(x)}$.

$$\begin{aligned}(\sin^{-1})'(x) \equiv (\arcsin)'(x) &= \frac{1}{((\sin)' \circ \arcsin)(x)} = \frac{1}{(\cos \circ \arcsin)(x)} = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\end{aligned}$$

4.1 Kurvendiskussion

Die kritischen Punkte einer Funktion f sind die Nullstellen ihrer Ableitung f'.

$$f'(x_0) = 0 \tag{94}$$

mit einem kritischen Punkt x_0.

Handelt es sich bei $f(x_0)$ um ein lokales Extremum, gilt

$$f''(x_0) \begin{cases} < 0, & \text{lokales Maximum} \\ > 0, & \text{lokales Minimum} \end{cases}. \tag{95}$$

Sind alle Punkte $\leq$ bzw. $\geq$ des Funktionswerts des lokalen Maximums (Minimums), handelt es sich um ein **globales** Maximum (Minimum).

Die Funktion ist **monoton wachsend** falls $f'(x) \geq 0$ (streng: $>$) bzw. **monoton fallend** falls $f'(x) \leq 0$ (streng: $<$) und **konstant** falls $f'(x) = 0$.

Beispiel

geg: $f(x) = \frac{\ln^2(x)}{x^2}$
ges: lokale und globale Minima bzw. Maxima, Definitionsbereich, Grenzwerte am Rand des Definitionsbereichs

Bestimme zunächst die kritischen Punkte der Funktion, d.h. die Nullstellen von $f'(x)$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\ln^2(x)}{x^2} = -2\frac{\ln^2(x)}{x^3} + \frac{1}{x^2}\cdot 2\ln(x)\cdot\frac{1}{x} = \\ &= -2\frac{\ln^2(x)}{x^3} + 2\frac{\ln(x)}{x^3} = \frac{2\ln(x)}{x^3}(1-\ln(x)) \overset{!}{=} 0 \end{aligned}$$

Dies ist erfüllt, falls entweder $\ln(x) = 0$ oder $1 - \ln(x) = 0$ wird. Umstellen dieser Bedingungen ergibt die kritischen Punkte:

$$\begin{aligned} &\bullet\ \ln(x) = 0 \\ \overset{e^{()}}{\Leftrightarrow}\ & e^{\ln(x)} = x = e^0 = 1 \\ &\bullet\ 1 - \ln(x) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \ln(x) = 1 \\ \overset{e^{()}}{\Leftrightarrow}\ & e^{\ln(x)} = x = e^1 = e \end{aligned}$$

Somit sind die kritischen Punkte $x_1 = 1$ und $x_2 = 2$.

Bestimme die zweite Ableitung, um herauszufinden, ob es sich dabei um lokale Maxima oder Minima handelt:

$$f''(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{2\ln(x)}{x^3}(1-\ln(x)) = \left(-3\frac{2\ln(x)}{x^4} + \frac{2}{x^4}\right)(1-\ln(x)) + \frac{2\ln(x)}{x^3}\left(-\frac{1}{x}\right)$$

Werte nun die zweite Ableitung an den kritischen Punkten aus:

$$f''(1) = \left(-3\frac{2\ln(1)}{1^4} + \frac{2}{1^4}\right)(1-\ln(1)) + \frac{2\ln(1)}{1^3}\left(1-\frac{1}{1}\right) =$$
$$= 2$$
$$f''(e) = \left(-3\frac{2\ln(e)}{e^4} + \frac{2}{e^4}\right)\left(\underbrace{1-\ln(e)}_{=0}\right) + \frac{2\ln(e)}{e^3}\left(-\frac{1}{e}\right) =$$
$$= -\frac{2}{e^4}$$

Somit ist $x_1 = 1$ ein lokales Minimum und $x_2 = e$ ein lokales Maximum.

Untersuche nun den Definitionsbereich der Funktion $f(x)$.
Da der Logarithmus auftaucht, der lediglich für $\mathbb{R}_> \setminus \{0\}$ definiert ist, ist dies der Definitionsbereich.

Untersuche nun den Grenzwert am Rand des Definitionsbereich, d.h. $\lim_{x\to 0} f(x)$ und $\lim_{x\to\infty}$

- $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln^2(x)}{x^2} = \frac{\infty}{0} = \infty$
- $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln^2(x)}{x^2} \overset{\text{"}\infty/\infty\text{", L'H.}}{=} \lim\limits_{x\to\infty} \frac{2\ln(x)\cdot\frac{1}{x}}{2x} = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} \overset{\text{"}\infty/\infty\text{", L'H.}}{=} \lim\limits_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{2x} = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x^2} = 0$

Somit wird auch deutlich, dass es sich bei $x_1 = 1$ um ein globales Minimum handelt. Denn für $x \in (0, 1]$ kommt die Funktion aus dem Unendlichen, erreicht bei $x = 1$ das Minimum, steigt auf dem Intervall $[1, e]$ wieder an und erreicht anschließend auf $[e, +\infty)$ nie den Wert null, sondern konvergiert nur dagegen.



Abbildung 2: Darstellung der diskutierten Funktion $f(x) = \frac{\ln^2(x)}{x^2}$ und dessen Ableitung

4.2 Tangentengleichung

Die Tangentengleichung beschreibt eine Tangente $t(x)$, die eine Funktion $f(x)$ am Punkt x_0 schneidet

$$t_{f,x_0}(x) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0). \tag{96}$$

Beispiel

ges: Tangentengleichung für $f(x) = x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ am Punkt $x_0 = \frac{1}{\pi}$

Bestimme zunächst die Ableitung der Funktion f:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \\ &= 2x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

Werte die Funktion sowie dessen Ableitung am interessierenden Punkt x_0 aus.

$$\begin{aligned} f(x_0) &= \left(\frac{1}{\pi}\right)^2 \underbrace{\sin(\pi)}_{=0} = 0 \\ f'(x_0 = \frac{1}{\pi}) &= \frac{2}{\pi} \cdot \underbrace{\sin(\pi)}_{=0} - \underbrace{\cos(\pi)}_{=-1} = 1 \end{aligned}$$

Somit lautet die Tangentengleichung:

$$t_{f,1/\pi}(x) = 1 \cdot (x - \frac{1}{\pi}) + 0 = x - \frac{1}{\pi}$$



Abbildung 3: Darstellung der Funktion $f(x) = x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{\pi}\right)$ und der Tangente $t(x)$, die sich am Punkt $x_0 = \frac{1}{\pi}$ der Funktion $f(x)$ anschmiegt

5 Integration

Das eindimensinoale Integral ist wie folgt über die Riemann-Summe definiert

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right). \tag{97}$$

Beispiel

ges: $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{3}{n} \sum_{k=0}^{n} \sqrt{1+\frac{3k}{n}}$

Am Faktor vor der Summe liest man ab, dass $b-a=3$. Aus dem Argument der Wurzel folgt, dass $a=1$ ist. Somit ist $b=4$. Die Wurzel ist die Funktion f.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3}{n} \sum_{k=0}^{n} \sqrt{1+\frac{3k}{n}} = \int_1^4 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}x^{3/2}\Big|_1^4 = \frac{14}{3}$$

Für die Integration gelten die Rechenregeln:

- **Faktorregel**
$$\int c \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = c \cdot \int f(x)\,\mathrm{d}x \tag{98}$$
- **Potenzgesetz**
$$\int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \tag{99}$$
- **Summenregel**
$$\int (f(x)+g(x))\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x \tag{100}$$
- **Vertauschungsregel**
$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x \tag{101}$$
- **Intervallregel**
$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x \tag{102}$$
- **Gleichheit der Grenzen**
$$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0 \tag{103}$$

Herleitung

Die Faktorregel, Summenregel, Vertauschungsregel und Gleichheit der Grenzen folgen unmittelbar aus der Definition des Integrals über die Riemann-Summe:

- $$\begin{aligned}\int c \cdot f(x)\,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} c \cdot f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) = \\ &= c \cdot \left(\lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right)\right) \equiv \\ &\equiv c \cdot \int f(x)\,\mathrm{d}x \qquad \blacksquare\end{aligned}$$
- $$\begin{aligned}\int (f(x) + g(x))\,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} \left[f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) + g\left(a + \frac{b-a}{n}k\right)\right] = \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) + \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} g\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) \equiv \\ &\equiv \int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x \qquad \blacksquare\end{aligned}$$
- $$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) = \\ &= \lim_{n\to\infty} -\frac{a-b}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) = \\ &= -\left(\lim_{n\to\infty} \frac{a-b}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right)\right) \equiv \\ &\equiv -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x \qquad \blacksquare\end{aligned}$$
- $$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \cancel{\frac{a-a}{n}} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{a-a}{n}k\right) = 0 \qquad \blacksquare$$

zz: $\int_a^b x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$

Das Potenzgesetz folgt aus dem Fundamentalsatz der Analysis , der besagt, dass $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$, wobei die Stammfunktion $F(x)$ durch die Eigenschaft $f(x) = F'(x)$ definiert ist. Somit folgt durch

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{n+1} \cdot x^{n+1} + C\right) = x^n = f(x) \qquad \blacksquare$$

zz: $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$

Der Punkt, an dem die Integration separiert wird, sei $\tilde{n}$ $\frac{b-a}{n}$ Intervalle über dem Punkt a, d.h.

$$c := a + \frac{b-a}{n}\tilde{n}$$

Der entscheidende Punkt der Herleitung ist die Aufspaltung der Summe am Indexpunkt $\tilde{n}$:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) = \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{\tilde{n}} f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) + \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=\tilde{n}+1}^{n} f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right)\end{aligned}$$

Ziel ist es nun die Riemann-Summe in beiden Termen zu erkennen.
Formuliere für den ersten Term das Wegstück $\frac{b-a}{n}$ in Abhängigkeit von $\tilde{n}$. Dies folgt aus der Definition von c:

$$\begin{aligned} c &= a + \frac{b-a}{n}\tilde{n} \\ \Leftrightarrow \frac{b-a}{n} &= \frac{c-a}{\tilde{n}}\end{aligned}$$

Da $n \propto \tilde{n}$, folgt $\lim_{n\to\infty} = \lim_{\tilde{n}\to\infty}$.

Im zweiten Term wird die Indexverschiebung $k \to k + \tilde{n}$ vorgenommen, woraus $n \to n + \tilde{n} \equiv m$ folgt. Drücke nun $\frac{b-a}{n}$ in Abhängigkeit von m aus:

$$\begin{aligned} c &= a + \frac{b-a}{n}\tilde{n} \\ \Leftrightarrow \frac{\tilde{n}}{n} &= \frac{c-a}{b-a} \\ \frac{b-a}{n} &= \frac{b-a}{n} \cdot \frac{n-\tilde{n}}{n-\tilde{n}} = \frac{(b-a)\cdot\left(1-\frac{\tilde{n}}{n}\right)}{n-\tilde{n}} \overset{\frac{\tilde{n}}{n}}{=} \frac{(b-a)\cdot\left(1-\frac{c-a}{b-a}\right)}{n-\tilde{n}} = \\ &= \frac{b-a-(c-a)}{n-\tilde{n}} \equiv \frac{b-c}{m}\end{aligned}$$

Erneut, da $n \propto m$, folgt $\lim_{n\to\infty} = \lim_{m\to\infty}$.

Einsetzen in das Integral liefert:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x &= \lim_{\tilde{n}\to\infty} \frac{c-a}{\tilde{n}} \sum_{k=1}^{\tilde{n}} f\left(a + \frac{c-a}{\tilde{n}}k\right) + \lim_{m\to\infty} \frac{b-c}{m} \sum_{k=1}^{m} f\left(\underbrace{a + \frac{b-c}{m}(k+\tilde{n})}_{=c+\frac{b-c}{m}k}\right) \equiv \\ &\equiv \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

5.1 Rechentechniken Integration

- **Partielle Integration**

$$\int^x f(x) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x = f(x) \cdot g(x) - \int^x f'(x) \cdot g(x)\,\mathrm{d}x \tag{104}$$

Vor allem bei ln und dann $f(x) = \ln(...)$.

- **Variablentransformation**

$$\int^y f(y)\,\mathrm{d}y \overset{y=\psi(x)}{=} \int^{x=\psi^{-1}(y)} f(\psi(x)) \cdot \psi'(x)\,\mathrm{d}x \tag{105}$$

- **Trigonometrische Funktionen**, um den Integrand zu vereinfachen

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \tag{106}$$

$$\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) \tag{107}$$

$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x) \tag{108}$$

- **Linearisierung** von trig. Fktn. , um den Integrand zu vereinfachen

$$\cos^n(x) = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} e^{i(2k-n)x} \tag{109}$$

$$\sin^n(x) = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^n = \frac{1}{(2i)^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} e^{ixk} \cdot (-e^{ix})^{n-k} \tag{110}$$

- **Substitutionen für trig./hyperb. Fktn. mit Symmetrien**

Tabelle 2: Trigonometrische Funktionen $f(x) = R(\cos x, \sin x)$

f ungerade	$u = \cos x \Rightarrow \mathrm{d}u = -\sin x\,\mathrm{d}x$
$f(x) = -f(-\pi - x)$	$u = \sin x \Rightarrow \mathrm{d}u = \cos x\,\mathrm{d}x$
$f(x) = f(x + \pi)$	$u = \tan x \Rightarrow \mathrm{d}u = 1 + \tan^2 x = (1 + u^2)\,\mathrm{d}u$
keine Symmetrie	$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2} = \mathrm{d}x$ $\Rightarrow \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2},\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2},\ \tan x = \frac{2t}{1-t^2}$

Tabelle 3: Hyperbelfunktionen $f(x) = R(\cosh x, \sinh x)$

Im Allgemeinen	$u = e^x \Rightarrow \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}t}{e^x} = \frac{\mathrm{d}t}{u}$
$f(x) = -f(-x)$	$u = \cosh x$
$f(x) = -f(i\pi - x)$	$u = \sinh x$
$f(x) = f(i\pi + x)$	$u = \tanh x$
keine Symmetrie	$t = \tanh\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2} = \mathrm{d}x$ $\Rightarrow \cosh x = \frac{1+t^2}{1-t^2},\ \sinh x = \frac{2t}{1-t^2},\ \tanh x = \frac{2t}{1+t^2}$

6 Taylor-Reihe

Die Taylor-Reihe ist die Darstellung einer Funktion $f(x)$ durch die Potenzreihe

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \tag{111}$$

mit dem Entwicklungspunkt x_0.

Oft ist es in guter Näherung ausreichend, die Taylor-Reihe nach einem bestimmten Term abzubrechen. Das verbleibende Polynom heißt **Taylor-Polynom** n-ter Ordnung

$$T_{f,x_0,n}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k. \tag{112}$$

Beispiel

ges: Taylor-Entwicklung von $f(x) = e^x \sin(x)$ bis zur 4. Ordnung

$$\begin{aligned} T_{f,x_0,0}(x) &= \sum_{k=0}^{3} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}(x - 0)^k = \\ &= f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{f''(0)}{2} \cdot x^2 + \frac{f'''(0)}{6} \cdot x^3 \end{aligned}$$

Berechne die in dem Polynom auftauchenden Ableitungen separat:

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x \cdot \sin(x) \\ f'(x) &= e^x \cdot \sin(x) + e^x \cdot \cos(x) = \\ &= e^x(\sin(x) + \cos(x)) \\ f''(x) &= e^x(\cancel{\sin(x)} + \cos(x)) + e^x(\cos(x) - \cancel{\sin(x)}) = \\ &= 2e^x \cdot \cos(x) \\ f'''(x) &= 2\left(e^x \cdot \cos(x) - e^x \cdot \sin(x)\right) = \\ &= 2e^x\left(\cos(x) - \sin(x)\right) \end{aligned}$$

Werte nun diese Ableitungen am Entwicklungspunkt $x = x_0 = 0$ aus:

- $f(0) = e^0 \cdot \sin(0) = 0$
- $f'(0) = e^0\left(\sin(0) + \cos(0)\right) = 1 \cdot (0 + 1) = 1$
- $f''(0) = 2e^0 \cdot \cos(0) = 2$
- $f'''(0) = 2e^0\left(\cos(0) - \sin(0)\right) = 2$

Einsetzen in das Taylor-Polynom ergibt:

$$\begin{aligned} T_{f,0,3}(x) &= 0 + 1 \cdot x + \frac{2}{2} \cdot x^2 + \frac{2}{6} \cdot x^3 = \\ &= x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 \end{aligned}$$



Abbildung 4: Darstellung der Funktion $f(x) = e^x \sin(x)$ und das dazugehörige Taylorpolynom bis inklusive der 3. Ordnung $T_{f,0,3}(x)$, entwickelt um $x_0 = 0$

Anhang

Einige elementare Summenformeln, die mittels vollständiger Induktion bewiesen werden können, sind:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \tag{113}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \tag{114}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 \tag{115}$$

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \qquad \text{mit } x \in \mathbb{R} \tag{116}$$

Betrag und Dreiecksungleichung

Um Ungleichungen mit Beträgen zu zeigen, nutze die Dreiecksungleichung

$$|x+y| \leq |x| + |y| \tag{117}$$

$$\Big||x| - |y|\Big| \leq |x-y| \tag{118}$$

Binomischer Lehrsatz

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \tag{119}$$

Die **Binomialkoeffizienten** lassen sich am Pascal'schen Dreieck ablesen (Zeile $\hat{=}$ $n = 0, 1, 2, ...$, Diagonale von links nach rechts $\hat{=}$ $k = 0, 1, 2, ...$). ERGÄNZEN: Pascal'sches Dreieck Sie sind dabei die Anzahl der k-elementigen Teilmengen, die man aus einer n-elementigen Menge bilden kann, wobei $0 < k \leq n$ gilt. Dabei gilt Ziehen ohne Zurücklegen.

$$\binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot ... \cdot (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{120}$$

mit $\binom{n}{0} := 1$.

7 Stichwortverzeichnis

Begriff	Erklärung
Abgeschlossen	Eine Menge A ist abgeschlossen, wenn ihr Komplement A^c offen ist. Bsp: $\{a\}, [a, b,], [a, +\infty), (-\infty, a]$
Abschluss	
Äquivalenz	Tautologie der Form $A \Leftrightarrow B$
Ausdehnung (stetige Ergänzung)	Erweiterung einer Funktion $f : A \to \mathbb{K}$ an einer unstetigen Stelle a mit $f(a) := \lim_{x \to a} f(x)$, wodurch die Funktion dort stetig wird.
Axiom	Aussage, der man den Wahrheitswert "wahr" zuordnet
Beschränkt	Eine Menge M ist beschränkt, wenn eine obere und untere Schranke existieren.
Bild	Das Bild einer Teilmenge A ist die Menge aller Funktionswerte $f(a)$.
Cauchy-Folge	Eine Folge ist eine Cauchy-Folge, wenn für alle Abstände $\varepsilon > 0$ ein Folgenglied u_{n_0} gefunden werden kann, s.d. für alle Folgenglieder danach gilt, dass der Abstand zweier beliebiger Folgenglieder kleiner ε ist. $\varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq n_0 : \lvert u_m - u_n \rvert \leq \varepsilon$
Charaktersisierung von abgeschl. Mengen durch Folgen	A ist abgeschlossen $\Leftrightarrow$ Alle konv. Folgen $(u_n)_n$, deren Folgenglieder in A liegen, haben auch einen Grenzwert in A.
Differentiationsklasse C^k	Die Differntiationsklasse, genauer das k, gibt an, wie oft die Funktion, die dieser Klasse angehört, stetig diff.bar ist. C^0 ist eine stetige, nicht diff.bare Fkt., C^∞ eine **glatte**, also unendlich oft stetig differenzierbare Funktion
differenzierbar im Punkt c	f ist differenzierbar in c, wenn die **Ableitung**, also der Grenzwert der Steigungsrate $$\lim_{x \to a,\ x \neq a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}$$ in diesem Punkt existiert und f auf $[a, b]$ stetig und auf $[a, b] \setminus \{c\}$ diff.bar ist.
Elemente	Objekte, aus der eine Menge besteht

Fundamentalsatz der Analysis	Seien $a, b \in \mathbb{R}$ s.d. $a < b$ und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig. Wenn F eine Stammfunktion von f ist, gilt $$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) \equiv [F]_a^b$$ Für $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ stetig und int.bar und $a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\},\ b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ s.d $a < b$ $$[F]_a^b = \left(\lim_{x \to b} F(x)\right) - \left(\lim_{x \to a} F(x)\right)$$
Funktion	Beziehung zwischen 2 Mengen, die jedem Element der 1. Menge genau einem Element in der 2. Menge zuordnet.
globales Extremum	Globales Maximum oder gloables Minimum
globales Maximum	Im Punkt c existiert ein globales Maximum, wenn $$\forall x \in A : f(x) \leq f(c)$$
globales Minimum	Im Punkt c existiert ein globales Maximum, wenn $$\forall x \in A : f(x) \geq f(c)$$
Graph	Menge aller geordneten Paare $(x, f(x))$ aus den Elementen x der Definitionsmenge und den zugehörigen Funktionswerten $f(x)$.
Häufungspunkt	Grenzwert einer konvergenten Teilfolge
"In der Nähe von a"	In einer gewissen Umgebung von a. D.h. $(a-\varepsilon, a+\varepsilon) \cap A$ für ein bestimmtes $\varepsilon > 0$.
Infimum	Größte untere Schranke $\forall y \in Y : y \geq \sup(Y)$
integrierbar	Seien $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ und $f : (a, b) \to \mathbb{C}$. Dann ist f integrierbar falls $$\int_a^b \lvert f(x) \rvert\,\mathrm{d}x < +\infty$$
in der Nähe eines Punkts integrierbar	Eine Funktion f ist in der Nähe des Punktes a int.bar, wenn $\exists c \in (a, b)$ s.d. f auf $(a, c]$ int.bar (Analog für b).
Kompaktum bzw. A ist kompakt	A ist ein Kompaktum, wenn A abgeschlossen und beschränkt ist.

Konvergenz (Folge)	Eine Folge ist konvergent, wenn für alle Abstände $\varepsilon > 0$ um den Grenzwert a ein bestimmtes Folgenglied u_{n_0} gefunden werden kann, s.d. alle Folgenglieder danach im ε-Bereich um den Grenzwert a liegen. $\forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \lvert u_n - a \rvert < \varepsilon \quad \Leftrightarrow: \quad \lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ 
Konvergenz (Reihe) mittels Integrabilität	Sei $n_0 \in \mathbb{N}$ und $f : [n_0, +\infty) \to \mathbb{R}_>$ eine stetige, fallende Fkt., dann konvergiert die Reihe $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ gdw. f in der Nähe von $+\infty$ int.bar ist.
konkav	Eine Funktion ist konkav, wenn • ihr Graph <u>oberhalb</u> einer beliebigen Verbindungslinie zweier Funktionspunkte liegt. $\forall x, y \in I : \forall t \in [0,1] f((1-t)x + t \cdot y) \geq (1-t)f(x) + t \cdot f(y)$ Falls f (2mal) diff.bar: • f' fallend ist • $\forall x \in I$ der Graph von f <u>unterhalb</u> seiner <u>Tangente</u> in x liegt. $\forall x, y \in I : f(y) \leq f(x) + (y - x)f'(x)$ • $f''(x) \leq 0$ ist
Konvergenzradius	Grenze für das z in einer Potenzreihe, s.d. diese mit $\lvert z \rvert <$ KR absolut konvergenz und mit $\lvert z \rvert >$ KR divergiert.
konvex	Eine Funktion f ist konvex, wenn • ihr Graph <u>unterhalb</u> einer beliebigen Verbindungslinie zweier Funktionspunkte liegt. $\forall x, y \in I : \forall t \in [0,1] f((1-t)x + t \cdot y) \leq (1-t)f(x) + t \cdot f(y)$ Falls f (2mal) diff.bar: • f' steigend ist • $\forall x \in I$ der Graph von f <u>oberhalb</u> seiner <u>Tangente</u> in x liegt. $\forall x, y \in I : f(y) \geq f(x) + (y - x)f'(x)$ • $f''(x) \geq 0$ ist

kritischer Punkt	Ein kritischer Punkt einer diff.baren Fkt. f ist eine NS von f'.
Landau-Symbole	f ist von g in der Nähe von a **dominiert**. $$f(x) \overset{x\to a}{=} O(g(x)) \quad \Leftrightarrow \quad \limsup_{x\to a} \left\lvert \frac{f(x)}{g(x)} \right\rvert < \infty$$ f ist in der Nähe von a **vernachlässigbar** gegenüber g. $$f(x) \overset{x\to a}{=} o(g(x)) \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x\to\infty} \left\lvert \frac{f(x)}{g(x)} \right\rvert = 0$$ f ist in der Nähe von a **äquivalent** zu g. $$f(x) \overset{x\to a}{\sim} g(x) \quad \Leftrightarrow \quad f(x) - g(x) \overset{x\to a}{=} o(g(x)) \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$
Länge eines Graphen	Sei $f : I = [a, b] \to \mathbb{R}$ und $x_i = \frac{(b-a)i}{n}$ $$\lim_{n\to\infty} L_n,\ L_n = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2}$$
Limes inferior	$\liminf_{n\to\infty} u_n := \lim_{n\to\infty} (\inf_{k\geq n} u_k)$
Limes superior	Grenzwert der Folge $\sup_{k\geq n} u_k$. Ein Folgenglied dieser Folge $\sup_{k\geq n} u_k$ ist dabei das Maximum aller Glieder u_k mit $k \geq n$. Die Glieder davor werden ignoriert.  $$\limsup_{n\to\infty} u_n := \lim_{n\to\infty} (\sup_{k\geq n} u_k)$$
lokales Extremum	Lokales Maximum oder lokales Minimum
lokales Maximum	Im Punkt c existiert ein lokales Maximum, wenn $$\exists \varepsilon > 0 : f(x) \leq f(c)\ \forall x \in A \cap (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$$

lokales Minimum	Im Punkt c existiert ein lokales Minimum, wenn $$\exists \varepsilon > 0 : f(x) \geq f(c)\ \forall x \in A \cap (c-\varepsilon, c+\varepsilon)$$
Maximum	Größter Wert einer Menge Alternativ: Obere Schranke, die zu der Menge gehört
Menge	Abstraktes Objekt bestehend aus einer Anzahl einzelner Objekte
Minimum	Kleinster Wert einer Menge Alternativ: Untere Schranke, die zu der Menge gehört
Mittel (arithmetisch, geometrisch, harmonisch)	$$\frac{x_1 + ... + x_n}{n} \geq (x_1 \cdot ... \cdot x_n)^{1/n} \geq \frac{n}{\frac{1}{x_1} + ... + \frac{1}{x_n}}$$
Mittelwertsatz	Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig mit $a < b$, dann existiert <u>mindestens</u> ein $c \in (a,b)$, s.d. die Ableitung an diesem c der Sekantensteigung entspricht $$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$
Obere Schranke der Menge M	Wert in einer Menge $X \supseteq M$, für den gilt, dass alle Werte in der Teilmenge M <u>kleiner gleich</u> als er sind.
offen	Ein Menge A ist offen, wenn für jedes Element der Menge eine offene Kreisscheibe existiert, die wieder in der Menge liegt. $\boxed{A \subseteq \mathbb{R}}$ $\forall a \in A\ \exists \eta > 0 : (a-\eta, a+\eta) \subseteq A$ $\boxed{A \subseteq \mathbb{C}}$ $\forall a \in A\ \exists \eta > 0 : D(a,\eta) \subseteq A$ Bsp: $(a,b), (a,+\infty), (-\infty,a)$
offen (abg.) in B	A ist offen (abg.) in B, wenn $A = B \cup \Omega$ mit Ω offene (abg.) Menge.
Partielle Integration	$$\int^x f(x) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x = f(x) \cdot g(x) - \int^x f'(x) \cdot g(x)\,\mathrm{d}x$$
Polstelle	Definitionslücke mit der Eigentschaft $\lim\limits_{x \to a} \lvert f(x) \rvert = +\infty$
Potenzmenge	Menge aller Teilmengen einer Grundmenge A. Dabei sind $\emptyset := \{\}$ und A immer Elemente der Potenzmenge. Bsp: Sei $A = \{1,2\}$ $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, A\}$

Potenzreihe	Reihe der Form $\sum_{k \geq n_0} a_k \cdot z^k$, wobei $(a_k)_k$ eine Folge ist.
Prädikat	Aussage, die von einer Variablen abhängt
Regel von De l'Hopital	
Satz der differenzierbaren Umkehrfunktionen	Ist die Funktion $f : A \to B$ diff.bar und ihre Ableitung f' in A stetig und ohne NS, so gilt für die Ableitung ihrer Umkehrfkt. f^{-1} $$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$
Satz der Riemann'schen Integrale	Seien $a, b \in \mathbb{R}$ s.d. $a < b$ und $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ stetig, dann gilt $$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + (b-a)\frac{k}{n}\right) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$
Satz von Bolzano-Weierstraß	Ist eine Folge beschränkt, existiert eine konvergente Teilfolge
Satz von Rolle	Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und diff.bar auf (a, b) und $f(a) = f(b)$, dann $\exists x_0 \in [a, b]$ s.d. $$f'(x_0) = 0$$
stetig im Punkt a	Eine Funktion f ist **stetig im Punkt** a, falls eines der Kriterien gilt: • ε-δ-Kriterium $\forall \varepsilon > 0\, \exists \eta > 0 : \forall x \in \mathbb{A} : \lvert x - a \rvert \leq \eta \Rightarrow \lvert f(x) - f(a) \rvert \leq \varepsilon$ • Grenzwert-Kriterium $$f(a) = \lim_{x \to a} f(x)$$ • Folgenkriterium $\forall (u_n)_n \in A$, die gegen a konv. gilt: $$\lim_{n \to a} f(u_n) = f(a)$$
stetig in A	Eine Funktion f ist **stetig in einer Menge** A, falls eine der Bedingungen S1, S2, S3, S4 (siehe VL) gilt

streng konvex (konkav)	Ungl. wie bei konvex (konkav), jedoch mit $t \in (0,1)$ in den Ungl. und streng steigend statt nur steigend und $>$ statt $\geq$.
Supremum	Kleinste obere Schranke $\forall y \in Y : y \leq \sup(Y)$
Stammfunktion	Sei $A \subseteq \mathbb{R}$. Eine Stammfunktion von $f : A \to \mathbb{R}$ ist eine diff.bare Funktion $F : A \to \mathbb{R}$ s.d. $f = F'$.
Tautologie	Aussage, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist und immer wahr ist, unabhängig von dem Wahrheitswert ihrer Bestandteile. Bsp: $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$
Teilfolge	Folge der Form $v_n = u_{\varphi(n)}$ wobei $\varphi(n)$ eine steigende Funktion ist
Tupel	
Umgebung von a in A	Offene Menge $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap A$ mit $\varepsilon > 0$.
Untere Schranke der Menge M	Wert in einer Menge $X \supseteq M$, für den gilt, dass alle Werte in der Teilmenge M <u>größer gleich</u> als er sind.
Urbild	
Variablentransformation (Integration)	$$\int^{y} f(y)\,\mathrm{d}y \overset{y=\psi(x)}{=} \int^{\psi^{-1}(y)} f(\psi(x)) \cdot \psi'(x)\,\mathrm{d}x$$
Zwischenwertsatz	Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig, dann nimmt f jeden beliebigen Wert zwischen $f(a), f(b)$ an mindestens einer Stelle $c \in [a,b]$ an.