

energia korelacji - scisla

$$\langle \psi^\dagger(x) \psi(x') \rangle = \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{\psi}^\dagger(x) \hat{\psi}(x')) = \frac{1}{Z} \sum_{\{n_k\}} \langle \{n_k\} | e^{-\beta \sum_k \epsilon_k n_k} \hat{\psi}^\dagger(x) \hat{\psi}(x') | \{n_k\} \rangle$$

To jest obliczenie

$$\hat{\psi}(x) = \sum_q \frac{1}{\sqrt{L}} e^{iqx} \hat{a}_q$$

← Sama po wszystkich obszarach poziomów energii, że $\sum_k n_k = N$

$$\frac{1}{Z} \sum_{\{n_k\}} \langle \{n_k\} | \frac{1}{L} e^{-\beta \sum_k \epsilon_k n_k} \sum_{q, q'} e^{i(qx' - qx)} \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_{q'} | \{n_k\} \rangle =$$

$$= \frac{1}{Z} \sum_{\{n_k\}} \frac{1}{L} \sum_{q, q'} e^{i(qx' - qx)} e^{-\beta \sum_k \epsilon_k n_k} \langle \{n_k\} | \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_{q'} | \{n_k\} \rangle =$$

$$= \frac{1}{Z} \sum_{\{n_k\}} \sum_q \frac{1}{L} e^{iq(x' - x)} e^{-\beta \sum_k \epsilon_k n_k} n_q = \sum_q \frac{1}{L} \langle n_q \rangle e^{iq(x' - x)}$$

$$= \frac{1}{Z} \sum_{n_1=0}^{\infty} \dots \sum_{n_N=0}^{\infty} \frac{1}{L} \sum_q e^{iq(x' - x)} e^{-\beta \sum_k \epsilon_k n_k} n_q \delta_{N, \sum_k n_k} =$$

Korzystamy z $\delta_{N, \sum_k n_k} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\zeta e^{i\zeta(N - \sum_k n_k)}$ i mamy

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{L} \sum_q e^{iq(x' - x)} \int_0^{2\pi} d\zeta e^{i\zeta N} \sum_{n_1=0}^{\infty} \dots \sum_{n_N=0}^{\infty} n_q \prod_k e^{-(i\zeta + \beta \epsilon_k) n_k} =$$

Wszystkie sumy, oprócz q-tej, to sumy geometryczne.

Dla q-tej sumy mamy sumę typu $\sum_{n=0}^{\infty} n q^n = \frac{q}{(1-q)^2}$.

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{L} \sum_q e^{iq(x' - x)} \int_0^{2\pi} d\zeta e^{i\zeta N} \prod_{k \neq q} \frac{1}{(1 - e^{-(i\zeta + \beta \epsilon_k)})} \cdot \frac{e^{-(i\zeta + \beta \epsilon_q)}}{(1 - e^{-(i\zeta + \beta \epsilon_q)})^2} =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{L} \sum_q e^{iq(x' - x)} |q|, \text{ gdzie}$$

$$|q| = \int_0^{2\pi} d\zeta e^{i\zeta N} \prod_{k \neq q} \frac{1}{(1 - e^{-(i\zeta + \beta \epsilon_k)})} \frac{e^{-(i\zeta + \beta \epsilon_q)}}{(1 - e^{-(i\zeta + \beta \epsilon_q)})^2}$$

Obliczanie cca 1,

zmienną zmienną $z = z^i$ i dostajemy

$$q = \frac{1}{i} \oint_{C(1)} dz z^N \prod_{k \neq q} \frac{z}{z - e^{i p k}} \frac{e^{-i p q}}{(z - e^{i p q})^2}$$

definiujemy funkcję $f(z) = z^N \frac{e^{-i p q}}{(z - e^{i p q})^2} \prod_{k \neq q} \frac{z}{z - e^{i p k}}$ po drodze jednostkowym.

$q=0$ Wszystkie bieguny są drugiego rzędu. Funkcję f zapisujemy jako

$$f(z) = z^N \frac{e^{-i p \varepsilon_0}}{(z - e^{-i p \varepsilon_0})^2} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{i p k})^2}$$

Residua obliczamy z wzoru

$$\text{Res}_{z=e^{-i p \varepsilon_p}} f = \lim_{z \rightarrow e^{-i p \varepsilon_p}} \frac{d}{dz} (z - e^{-i p \varepsilon_p})^2 f(z)$$

Dla $p=0$ musimy różniczkować wyrażenie

$$z^N e^{-i p \varepsilon_0} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{i p k})^2}$$

Korzystamy z wzoru na pochodną iloczynu $\frac{d}{dx} \prod_{j=1}^{\infty} g_j(x) = \prod_{j=1}^{\infty} g_j(x) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{g'_k(x)}{g_k(x)}$ i

po różniczkowaniu dostajemy

$$N z^{N-1} e^{-i p \varepsilon_0} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{i p k})^2} + z^N e^{-i p \varepsilon_0} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{i p k})^2} \left(-\frac{2}{z} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{-i p k}}{(z - e^{i p k})} \right)$$

Wobec czego

$$\text{Res}_{z=e^{-i p \varepsilon_0}} f = e^{-i p N \varepsilon_0} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{i p (k - \varepsilon_0)})^2} \left[N + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - e^{i p (k - \varepsilon_0)}} \right]$$

Natomiast dla $p \neq 0$ różniczkujemy

$p > 0$

$$z^{N+2} \frac{e^{-i p \varepsilon_0}}{(z - e^{-i p \varepsilon_0})^2} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq p}}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{i p k})^2}$$

Po zróżniczkowaniu mamy

$$e^{-i p \varepsilon_0} \frac{z^{N+1} (Nz - e^{-i p \varepsilon_0} (N+2))}{(z - e^{-i p \varepsilon_0})^3} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq p}}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{i p k})^2} + z^{N+2} \frac{e^{-i p \varepsilon_0}}{(z - e^{-i p \varepsilon_0})^2} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq p}}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{i p k})^2} \left(-\frac{2}{z} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq p}}^{\infty} \frac{e^{-i p k}}{z - e^{i p k}} \right)$$

Wobec czego

$$\text{Res}_{z=e^{-i p \varepsilon_p}} f = e^{-i p N \varepsilon_p} \frac{e^{i p (\varepsilon_0 - \varepsilon_p)}}{(1 - e^{i p (\varepsilon_0 - \varepsilon_p)})^2} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq p}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{i p (k - \varepsilon_p)})^2} \left[N + 2 \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq p}}^{\infty} \frac{1}{1 - e^{i p (\varepsilon_p - \varepsilon_k)}} \right]$$

(5) Całkę I_0 obliczamy z tw. o residuach $I_0 = 2\pi i \sum \text{Res}$

$$I_0 = 2\pi \left\{ e^{-pNz_0} \prod_{u=1}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{p(z_0 - z_u)})^2} \left[N + 2 \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{1 - e^{p(z_0 - z_l)}} \right] + \right. \\ \left. + \sum_{p=1}^{\infty} e^{-pNz_p} \frac{e^{-p(z_0 - z_p)}}{(1 - e^{p(z_0 - z_p)})^2} \prod_{\substack{u=1 \\ u \neq p}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{p(z_u - z_p)})^2} \left[N + 2 \sum_{\substack{l=0 \\ l \neq p}}^{\infty} \frac{1}{1 - e^{p(z_p - z_l)}} \right] \right\} = \\ = 2\pi \sum_{p=0}^{\infty} e^{-pNz_p} e^{-p(z_0 - z_p)} \prod_{\substack{u=0 \\ u \neq p}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{p(z_u - z_p)})^2} \left[N + 2 \sum_{\substack{l=0 \\ l \neq p}}^{\infty} \frac{1}{1 - e^{p(z_p - z_l)}} \right]$$

q ≠ 0 Mamy bierze 1 rząd, 3 rząd a reszta jest 23 rząd

Zapiszemy funkcję f jako

$$f(z) = z^N \frac{e^{-pz_q}}{(z - e^{-pz_q})^2} \frac{z}{(z - e^{-pz_0})} \prod_{\substack{u=1 \\ u \neq q}}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{-pz_u})^2} \frac{z}{z - e^{-pz_0}} =$$

$$= z^N e^{-pz_q} \frac{1}{(z - e^{-pz_q})(z - e^{-pz_0})} \prod_{u=1}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{-pz_u})^2} = \quad (*)$$

$$= z^{N+2} e^{-pz_q} \frac{1}{(z - e^{-pz_q})^3} \frac{1}{z - e^{-pz_0}} \prod_{\substack{u=1 \\ u \neq q}}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{-pz_u})^2} \quad (**)$$

Bierzemy 1 rząd p=0 Wyprowadzamy z przedstawienia (**)

$$\text{Res}_{z=e^{-pz_0}} f = e^{-pNz_0} \cdot e^{-p(z_q - z_0)} \frac{1}{(1 - e^{p(z_q - z_0)})^3} \prod_{\substack{u=1 \\ u \neq q}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{p(z_u - z_0)})^2}$$

Bierzemy 2 rząd p ≠ 0 i p ≠ q . Użyjemy przedstawienia (*)

Musimy różniczkować wyrażenie

$$z^{N+2} e^{-pz_q} \frac{1}{(z - e^{-pz_q})(z - e^{-pz_0})} \prod_{\substack{u=1 \\ u \neq p}}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{-pz_u})^2}$$

$$\text{Dostajemy} \\ e^{-pz_q} \cdot \frac{z^{N+1} (e^{p(z_0 + z_q)} (N+2) - z(N+1) (e^{-pz_0} + e^{-pz_q}) + N z^2)}{(z - e^{-pz_q})^2 (z - e^{-pz_0})^2} \prod_{\substack{u=1 \\ u \neq p}}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{-pz_u})^2} +$$

$$+ e^{-pz_q} \frac{z^{N+2}}{(z - e^{-pz_q})(z - e^{-pz_0})} \prod_{\substack{u=1 \\ u \neq p}}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{-pz_u})^2} \left(-\frac{2}{z} \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq p}}^{\infty} \frac{e^{-pz_l}}{z - e^{-pz_l}} \right)$$

+) Otrzymujemy

$$\text{Res}_{z=e^{-\beta\epsilon_p}} f = e^{-\beta N \epsilon_p} e^{-\beta(\epsilon_q - \epsilon_p)} \frac{1}{(1 - e^{-\beta(\epsilon_q - \epsilon_p)})(1 - e^{-\beta(\epsilon_0 - \epsilon_p)})} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq p}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{-\beta(\epsilon_k - \epsilon_p)})^2} \left[N + \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_p - \epsilon_q)}} + \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_p - \epsilon_0)}} + 2 \sum_{\substack{\lambda=1 \\ \lambda \neq p}}^{\infty} \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_p - \epsilon_\lambda)}} \right]$$

Pozostał błąd 3 rzędu. Obliczemy go ze wzoru

$$\text{Res}_{z=e^{-\beta\epsilon_q}} f = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow e^{-\beta\epsilon_q}} \frac{d^2}{dz^2} (z - e^{-\beta\epsilon_q})^3 f$$

Dyktujemy przedstawienie (**). Musimy dwukrotnie różniczkować

$$z^{N+2} e^{-\beta\epsilon_q} \frac{1}{z - e^{-\beta\epsilon_0}} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq q}}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{-\beta\epsilon_k})^2}$$

Drugą pochodną iloczynu

$$(\prod_j f_j)'' = (\prod_j f_j) \left[\sum_{j \neq j'} \frac{f_j' f_{j'}'}{f_j f_{j'}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f_k''}{f_k} \right]$$

Ostaje

$$e^{-\beta\epsilon_q} \frac{z^N (e^{-2\beta\epsilon_0} (N+1)(N+2) - 2 e^{-\beta\epsilon_0} N(N+2) z + N(N+1) z^2)}{(z - e^{-\beta\epsilon_0})^3} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq q}}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{-\beta\epsilon_k})^2} +$$

$$+ 2 e^{-\beta\epsilon_q} \frac{z^{N+1} (z(N+1) - e^{-\beta\epsilon_0} (N+2))}{(z - e^{-\beta\epsilon_0})^2} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq q}}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{-\beta\epsilon_k})^2} \left(-\frac{2}{z} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq q}}^{\infty} \frac{e^{-\beta\epsilon_k}}{z - e^{-\beta\epsilon_k}} \right) +$$

$$+ e^{-\beta\epsilon_q} \frac{z^{N+2}}{z - e^{-\beta\epsilon_0}} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq q}}^{\infty} \frac{z^2}{(z - e^{-\beta\epsilon_k})^2} \left[\frac{4}{z^2} \sum_{\substack{l, l'=1 \\ l \neq l' \\ l \neq q \\ l' \neq q}}^{\infty} \frac{e^{-\beta(\epsilon_l + \epsilon_{l'})}}{(z - e^{-\beta\epsilon_l})(z - e^{-\beta\epsilon_{l'}})} + \frac{2}{z^2} \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq q}}^{\infty} \frac{e^{-\beta\epsilon_l} (e^{-\beta\epsilon_l} + z)}{(z - e^{-\beta\epsilon_l})^2} \right]$$

Stąd

$$\text{Res}_{z=e^{-\beta\epsilon_q}} f = e^{-\beta N \epsilon_q} \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_0 - \epsilon_q)}} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq q}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{-\beta(\epsilon_k - \epsilon_q)})^2} \left\{ \frac{N(N+1)}{2} + N \frac{1}{(1 - e^{-\beta(\epsilon_q - \epsilon_0)})^2} + 2 \left(N + 1 + \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_q - \epsilon_0)}} \right) \sum_{\substack{\lambda=1 \\ \lambda \neq q}}^{\infty} \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_q - \epsilon_\lambda)}} + \sum_{\substack{L=0 \\ L \neq q}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{-\beta(\epsilon_q - \epsilon_L)})^2} + 2 \sum_{\substack{l, l'=1 \\ l, l' \neq q \\ l \neq l'}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{-\beta(\epsilon_q - \epsilon_l)})(1 - e^{-\beta(\epsilon_q - \epsilon_{l'})})} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{\lambda=1 \\ \lambda \neq q}}^{\infty} \frac{1}{\text{sh}^2(\frac{1}{2}\beta(\epsilon_q - \epsilon_\lambda))} - \frac{N}{4} \frac{1}{\text{sh}^2(\frac{1}{2}\beta(\epsilon_q - \epsilon_0))} \right\}$$

⑤ 2 Lw. o residual $l_q = 2\pi i \int \text{Res}$

$$l_q = 2\pi \int e^{-\beta N \varepsilon_0} e^{-\beta (\varepsilon_q - \varepsilon_0)} \frac{1}{(1 - e^{-\beta (\varepsilon_q - \varepsilon_0)})^3} \prod_{\substack{l=1 \\ l \neq q}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{-\beta (\varepsilon_l - \varepsilon_0)})^2} +$$

$$+ \sum_{\substack{p=1 \\ p \neq q}}^{\infty} e^{-\beta N \varepsilon_p} e^{-\beta (\varepsilon_q - \varepsilon_p)} \frac{1}{(1 - e^{-\beta (\varepsilon_q - \varepsilon_p)}) (1 - e^{-\beta (\varepsilon_q - \varepsilon_0)})} \prod_{\substack{l=1 \\ l \neq p}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{-\beta (\varepsilon_l - \varepsilon_p)})^2} \left[\right.$$

$$N + \frac{1}{1 - e^{-\beta (\varepsilon_p - \varepsilon_q)}} + \frac{1}{1 - e^{-\beta (\varepsilon_p - \varepsilon_0)}} + 2 \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq p}}^{\infty} \frac{1}{1 - e^{-\beta (\varepsilon_p - \varepsilon_l)}} \left. \right] + e^{-\beta N \varepsilon_q} \frac{1}{1 - e^{-\beta (\varepsilon_0 - \varepsilon_q)}} \prod_{\substack{l=1 \\ l \neq q}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{-\beta (\varepsilon_l - \varepsilon_q)})^2} \left[\frac{N(N+1)}{2} + N \frac{1}{(1 - e^{-\beta (\varepsilon_q - \varepsilon_0)})^2} + 2 \left(N+1 + \frac{1}{1 - e^{-\beta (\varepsilon_q - \varepsilon_0)}} \right) \right.$$

$$\sum_{\substack{l=1 \\ l \neq q}}^{\infty} \frac{1}{1 - e^{-\beta (\varepsilon_q - \varepsilon_l)}} + \sum_{\substack{l=0 \\ l \neq q}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{-\beta (\varepsilon_q - \varepsilon_l)})^2} + 2 \sum_{\substack{l, l'=1 \\ l, l' \neq q \\ l \neq l'}}^{\infty} \frac{1}{(1 - e^{-\beta (\varepsilon_q - \varepsilon_l)}) (1 - e^{-\beta (\varepsilon_q - \varepsilon_{l'})})} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq q}}^{\infty} \frac{1}{\sinh^2(\frac{1}{2} \beta (\varepsilon_q - \varepsilon_l))} - \frac{N}{4} \frac{1}{\sinh^2(\frac{1}{2} \beta (\varepsilon_q - \varepsilon_0))} \left. \right]$$

Quadratic

$$\langle \hat{\psi}^{\dagger}(x) \hat{\psi}(x') \rangle = \frac{1}{2} \frac{1}{2} \left(\frac{l_0}{2\pi} + 2 \sum_{q=1}^{\infty} \frac{l_q}{2\pi} \cos(q(x' - x)) \right)$$