



# ARRÊT DE TRAVAIL

## Conisation du col de l'utérus

Décembre  
2011

 après avis de la HAS<sup>[1]</sup>

Pour vous aider dans votre prescription d'arrêt de travail et faciliter le dialogue avec votre patiente, des durées de référence vous sont proposées. Elles sont indicatives et, bien sûr, à adapter en fonction de la situation de chaque patiente.

Type d'emploi		Durée de référence*
Travail sédentaire		3 jours
Travail physique léger	Charge ponctuelle < 10 kg ou Charge répétée < 5 kg	
Travail physique modéré	Charge ponctuelle < 20 kg ou Charge répétée < 10 kg	5 jours
Travail physique lourd	Charge < 25 kg	

\* Durée à l'issue de laquelle la majorité des patientes est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités de la patiente.

### La durée de l'arrêt est à adapter selon :

- la pathologie sous jacente,
- les complications éventuelles,
- la nécessité d'un traitement complémentaire.

### La reprise des activités professionnelles, sportives et de loisir :

En dehors d'éventuelles complications et après la cicatrisation, les activités professionnelles, sportives et de loisir peuvent être reprises sans restriction.

#### Sources :

Guide d'utilisation des arrêts de travail, Espagne, 2<sup>ème</sup> édition.  
Official Disability Guidelines, 14<sup>th</sup> Edition, 2009.  
Medical Disability Advisor, Reed group, 5<sup>th</sup> Edition, 2005.

<sup>[1]</sup> [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)