

Un Curso de Álgebra Lineal

con notación asociativa

Edición curso 2020/2021

Versión: 1.13.1

Marcos Bujosa



Licencia: Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional

Copyright © 2008–2021 Marcos Bujosa

Puede encontrar la última versión de este libro en: <https://github.com/mbujosab/CursoDeAlgebraLineal>

Este libro ha sido escrito con L^AT_EX.

Copyright © 2008–2021 Marcos Bujosa

Licencia: Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional



Algunos derechos reservados. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Nunca hubiera podido escribir este libro sin la ayuda de mi hermano Andrés.

Prefacio

Aunque muchos perciben las matemáticas como una batería de procedimientos mecánicos para resolver problemas tipo, en realidad las matemáticas son un lenguaje. La principal intención de este curso es que el estudiante lo perciba y juegue con las reglas de dicho lenguaje.

También es frecuente escuchar que “*las matemáticas están en todas las cosas*”. Yo discrepo. Creo que las matemáticas son algo al margen de la realidad material del mundo, y comparto la frase de Eduardo Sáenz de Cabezón de que “*las matemáticas son el lenguaje en el que nosotros leemos el mundo*” (en su charla “*Las matemáticas nos hacen más libres y menos manipulables*”; minuto 6:40). Es decir, son el lenguaje que usamos para describir la realidad. A las descripciones matemáticas del mundo las llamamos *modelos*...y cuando nos “ponemos estupendos” incluso las denominamos *modelos científicos*. Las matemáticas nos sirven para expresar ideas y describir relaciones, pero no necesariamente relacionadas con el mundo real. Por eso considero que las matemáticas son algo distinto al mundo material que denominamos “realidad”.

Las matemáticas son un *lenguaje formal*. Consisten en un conjunto de símbolos y unas reglas para su manipulación. Así es como entiendo la cita de Charles F. Van Loan “Notation is everything”. Las matemáticas son notación. No obstante, solemos dar una interpretación subjetiva a dicha notación. Las interpretaciones nos dotan de un esquema mental que nos ayuda a pensar, y por eso son importantes. Pero las interpretaciones corresponden a un nivel distinto. De hecho, una misma notación puede tener interpretaciones alternativas. Por ejemplo, utilizamos el Teorema de Pitágoras cuando trabajamos con distancias euclídeas, con números complejos, al deducir algunas identidades trigonométricas, al analizar señales o series temporales, para tener una interpretación geométrica de la esperanza y la varianza, etc... y en todos estos ejemplos el formalismo del Teorema de Pitágoras es el mismo. El formalismo es el pilar sobre el que se apoyan las distintas interpretaciones. Así pues, las matemáticas son un conjunto de símbolos y unas reglas de uso para dichos símbolos. *En matemáticas LA NOTACIÓN LO ES TODO.*

Fiel a este espíritu, este texto presta una especial importancia a la notación y todo es un juego de manipulación de símbolos. Por supuesto que también mostraremos algunas interpretaciones, como la representación gráfica de un vector o la proyección sobre un subespacio de \mathbb{R}^n , pero el peso recaerá en la manipulación de los símbolos, y no en la interpretación. Así pues, he tenido un especial cuidado en elegir una notación que evite la ambigüedad¹ y que facilite operar con ella (por ejemplo, explotando la asociatividad logramos expresiones más simples).

Para mostrar la potencia que la notación tiene como lenguaje, la he implementado en una librería de Python.

¡Qué mejor muestra de que las matemáticas son un lenguaje, que usar dicho lenguaje con un PC para “enseñar” al PC a resolver problemas matemáticos y que todo funcione como se espera!

El código es una implementación literal de la notación empleada en el libro. Así se puede verificar que siguiendo las reglas de escritura podemos lograr que el ordenador sea capaz de operar con vectores, matrices, resolver sistemas de ecuaciones, diagonalizar matrices, calcular determinantes, etc.

¹por ejemplo, hay una clara distinción entre vectores y matrices,...aquí no encontrara ¡la “transpuesta” de ningún vector!

La librería se instala ejecutando² `pip install nacal`. También puede descargar el código fuente y la documentación desde

<https://github.com/mbujosab/nacallib>

Pero incluso sin instalar nada, puede usar la librería si abre los Notebooks de **Jupyter** en su navegador:

<https://mybinder.org/v2/gh/mbujosab/nacal-Jupyter-Notebooks/master>

Aprenderá mucho si experimenta con el ordenador. No se desanime si le cuesta un poco al principio.

Otros aspectos del libro

Todos los resultados están demostrados (salvo el *Teorema Fundamental del Álgebra*³). No obstante, la mayoría de las demostraciones son tan sencillas que están propuestas como ejercicios (aunque con frecuencia se ofrecen pistas que indican los pasos necesarios en la demostración). Así que muchas de las demostraciones aparecen en la sección de soluciones a los ejercicios. El propósito es doble: por una parte se aligera el texto. Y por otra permite al estudiante demostrar la veracidad de los resultados por su cuenta (sin tener la solución a la vista).

El curso gira en torno al Método de Eliminación y las transformaciones elementales. Hay numerosos libros de texto y manuales que siguen este modelo; por ejemplo Cullen (1972); Larson et al. (2004); Lay (2007); Poole (2004); Strang (2007, 2003), o el libro de problemas Arvesú Carballo et al. (2005). Sin embargo este texto también presenta una diferencia operativa respecto a los manuales indicados más arriba. Por ejemplo, aunque el Profesor Strang indica que “*el sistema de ecuaciones $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ tiene solución si el vector \mathbf{b} es una combinación lineal de las columnas de \mathbf{A}* ”, aplica el método de eliminación gaussiana operando con las *filas*, por lo que realmente acaba resolviendo un sistema distinto aunque equivalente a $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Y así es como se hace en casi todos los manuales de Álgebra Lineal. Sin embargo, aquí emplearé el método de eliminación de Gauss por columnas, operando siempre en el espacio columna de \mathbf{A} para encontrar las combinaciones de las columnas que son iguales a \mathbf{b} . Es más, con básicamente un único algoritmo (la eliminación por columnas y sin necesidad de la sustitución hacia atrás) calcularemos casi todo lo necesario (la inversa de una matriz, el conjunto de soluciones a un sistema de ecuaciones lineales, realizaremos operaciones con subespacios de \mathbb{R}^n , calcularemos determinantes, etc.). Solo al diagonalizar matrices necesitaremos tanto la eliminación por filas como por columnas (¡ambas!).

Mi experiencia es que los estudiantes de economía no suelen tener una especial afinidad por las matemáticas. Y en aquellos casos en que se sienten a gusto con ellas, es porque conocen una serie de algoritmos que les dan seguridad, pues es reconfortante saber que si se siguen los pasos correctamente se llega a la solución de ciertos problemas. Apoyándome en esto, la exposición de este libro es fundamentalmente algorítmica.⁴ Tirando del hilo de los algoritmos irán surgiendo distintas estructuras conceptuales, cuya generalización permitirá reconsiderar lo ya visto, pero con un mayor grado de abstracción. No obstante, si uno analiza las demostraciones con perspectiva, se evidencia que de nuevo todo acaba reduciéndose a unas reglas precisas en la manipulación de unos símbolos (“*La notación lo es todo*”).

Instrucciones para mis alumnos

Antes y durante las clases en el aula. Este libro está dividido en lecciones. Para poder aprovechar adecuadamente las clases recibidas en el aula es IMPRESCINDIBLE leer con antelación la lección correspondiente. El profesor dará por supuesto que usted así lo ha hecho.

En clase se dará una exposición general de lo que aparece en este libro. Por tanto, los detalles de cada lección deben ser preparados por el alumno estudiando las secciones correspondientes.

Recuerde que usted debe haber leído las secciones de referencia correspondientes antes de cada clase.

²Previamente debe tener instalado `python3` en su ordenador

³cuya demostración está fuera del alcance de este curso

⁴el desarrollo en paralelo de la librería NACAL para Python me ha ayudado en este sentido.

Para ayudar a tener una idea general de cada lección, hay un resumen por lección en el Apéndice **A**. (**por hacer**). También hay unas transparencias que sirven de apoyo al profesor en sus clases (junto con un resumen previo de cada lección (**por hacer**). Le puede venir bien llevarlas a clase para no tomar tantos apuntes.

El tiempo dedicado a resolver problemas en clase es un buen momento para resolver dudas con su profesor.

También me gustaría acompañar las lecciones con vídeos (**por hacer**)...aunque no creo que nunca puedan ser tan buenos como los de Grant Sanderson de su canal **3blue1brown**.

Al estudiar Recuerde que el esfuerzo y estudio individual (o en tándem) son imprescindibles; limitarse a atender las explicaciones en clase no es en modo alguno suficiente.

Al final del libro encontrará las soluciones a los problemas, pero no debe miraras hasta que haya dado con “su” solución. Consultar la solución de otro sin haber resuelto el ejercicio por cuenta propia sirve de muy poco cuando se estudia. **Recuerde que el aprendizaje es una tarea activa, es decir, usted debe encontrar la solución activamente, y no consultar la solución de otro** (la mía en particular).

Instrucciones para los profesores

Este libro se acompaña de unas transparencias para proyectar en clase. Son las que yo uso, y las acompaño de un resumen para orientar a quien quiera usarlas en clase (**añadir dirección de fichero con las transparencias**)

I	Álgebra matricial	1
1.	Operaciones con vectores y operaciones con matrices	3
1.1.	Vectores	3
1.1.1.	Definiciones de algunos vectores especiales	5
1.2.	Sumas de vectores y productos de vectores por escalares	6
1.2.1.	Propiedades	8
1.3.	Vectores como representación de datos	10
1.4.	Matrices	10
1.4.1.	Filas de una matriz	12
1.4.2.	Columnas de una matriz	13
1.4.3.	Resumen de la notación para seleccionar componentes, filas y columnas	14
1.4.4.	Extensión de la notación vectorial y reglas de reescritura.	15
1.4.5.	La transposición	16
1.4.6.	Definiciones de algunas matrices especiales	17
1.5.	Suma de matrices y producto de matrices por escalares	19
1.5.1.	Propiedades	19
1.5.2.	Operaciones componente a componente	20
1.5.3.	La transposición es un operador lineal	20
1.5.4.	Operaciones fila a fila	20
1.6.	Extensión de la notación matricial y las reglas de reescritura	21
2.	Combinaciones lineales	23
2.1.	Producto punto	23
2.2.	Matriz por vector	24
2.2.1.	Combinación lineal de vectores	24
2.2.2.	Producto de una matriz por un vector	24
2.2.3.	Propiedades del producto matriz por vector	26
2.3.	Vector por matriz	27
2.3.1.	Propiedades del producto de un vector por una matriz	28
3.	Multiplicación matricial	29
3.1.	Producto de matrices	29
3.1.1.	Otras dos formas de calcular el producto de matrices	31
	Cálculo del producto de matrices componente a componente (filas por columnas) . . .	31
	Cálculo del producto de matrices operando con las filas	31
3.1.2.	Nuevas reglas de reescritura.	32
	Transpuesta de un producto	32
	Apendices	33
3.A.	Submatrices mediante selección de una lista de índices	33

3.B. Matrices particionadas	34
3.B.1. Suma de matrices particionadas.	35
3.B.2. Producto de matrices particionadas	35
3.C. Producto matricial como suma de productos de submatrices	36
3.C.1. Producto como suma de matrices de rango uno (o menor que uno)	39
3.C.2. Submatriz de un producto como suma de productos de submatrices	39
II Transformaciones elementales, métodos de eliminación y matriz inversa	41
4. Transformaciones elementales y métodos de eliminación	43
4.1. Transformaciones y matrices elementales	43
4.1.1. Transformaciones y matrices elementales de Tipo I	43
4.1.2. Transformaciones y matrices elementales de Tipo II	45
4.1.3. Transformaciones de las columnas	46
4.2. Secuencias de transformaciones elementales. Parte I	48
4.2.1. Intercambios	49
4.3. Permutaciones	50
4.4. Eliminación por columnas	51
4.4.1. Método de eliminación (o eliminación de “Izquierda a derecha”)	51
4.4.2. Método de eliminación Gaussiano	52
4.4.3. Método de eliminación Gauss-Jordan	53
4.5. Nota sobre las transformaciones elementales de las filas.	54
5. Matrices inversas	57
5.1. Matrices invertibles	57
5.1.1. Inversa de las matrices (transformaciones) elementales.	58
5.1.2. Matrices pre-escalonadas con inversa.	60
5.1.3. Matrices invertibles	61
5.2. Secuencias de transformaciones elementales. Parte II	64
5.3. Inversa de una matriz triangular	66
5.4. Rango de una matriz	67
5.4.1. Algunas propiedades del rango de una matriz	68
III Subespacios y resolución de sistemas de ecuaciones lineales	71
6. Introducción a subespacios y funciones lineales	73
6.1. Espacios vectoriales y subespacios vectoriales	73
6.1.1. Algunas propiedades	75
6.1.2. Subespacios	76
Intersección de subespacios	77
6.2. Espacios vectoriales de productos cartesianos	77
6.3. Funciones lineales	78
6.3.1. Ejemplos de funciones lineales que ya hemos usado	79
6.3.2. Algunas propiedades de las funciones lineales	79
6.4. Espacios vectoriales de funciones	80
Ejemplos con los que probablemente se encontrará en futuras asignaturas...	81
6.4.1. Subespacios de funciones lineales	81
Apendices	81
6.A. Funciones	81
6.A.1. Notación	82
6.A.2. Invertibilidad	83

6.A.3. Composición de funciones	84
7. Resolviendo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$	85
7.1. Ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales	85
7.1.1. Sistemas de ecuaciones lineales	85
7.1.2. Notación matricial	86
7.2. Sistemas de ecuaciones homogéneos	86
7.2.1. Espacio nulo de una matriz $\mathcal{N}(\mathbf{A})$	87
7.2.2. Resolución de un Sistema Homogéneo por eliminación	87
7.3. Generalizaciones o visiones alternativas de resultados previos	91
8. Resolviendo $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$	93
8.1. Eliminación sobre la matriz ampliada	93
8.1.1. El Teorema de de Rouché-Frobenius	97
8.2. Espacio columna de una matriz	98
El espacio columna y la eliminación	99
8.3. Generalizaciones o visiones alternativas de resultados previos	99
9. Independencia, base y dimensión	101
9.1. Combinaciones lineales de vectores de \mathcal{V}	101
9.1.1. Extendiendo la notación matricial a los espacios vectoriales	101
Producto de un sistema de n vectores de \mathcal{V} por un vector de \mathbb{R}^n	101
Sistema de n vectores de \mathcal{V} por una matriz de $\mathbb{R}^{n \times p}$	102
9.2. Sistemas generadores	103
9.3. Transformaciones elementales sobre sistemas de vectores	105
Sistemas equivalentes	105
9.4. Sistemas linealmente dependientes	106
9.5. Bases y dimensión	106
9.5.1. Eliminación “de izquierda a derecha” y sistemas “acoplados” de vectores	107
Encontrando una base de $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ entre las columnas de \mathbf{A}	109
9.6. Generalizaciones o visiones alternativas de resultados previos	110
Sistemas linealmente independientes y coordenadas	112
10. Los cuatro subespacios fundamentales de una matriz \mathbf{A}	113
El espacio nulo por la izquierda de \mathbf{A}	113
El espacio fila de \mathbf{A}	114
10.1. Encontrando bases para los espacios $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ y $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$	114
Encontrando una base para el espacio fila.	115
Encontrando una base para el espacio nulo por la izquierda.	115
10.2. Suma e intersección de subespacios	118
IV Ortogonalidad (Espacio Euclideo)	123
11. Vectores ortogonales. Subespacios ortogonales	125
11.1. Producto punto (producto escalar usual en \mathbb{R}^n)	125
Propiedades del producto escalar usual	125
Vectores perpendiculares	126
11.2. Ortogonalidad de los 4 subespacios	127
El método de eliminación como generador de bases del complemento ortogonal	128
11.2.1. Ecuaciones implícitas (o cartesianas) y ecuaciones paramétricas	128
El camino que hemos recorrido hasta ahora: de las ecuaciones cartesianas (o implícitas) a las paramétricas	128

Recorriendo el camino inverso: de las ecuaciones paramétricas a las cartesianas (o implícitas)	129
Puntos, rectas, planos e hiper-planos de \mathbb{R}^n . Espacios afines	130
11.3. Definición geométrica del producto escalar usual de \mathbb{R}^n	131
12. Proyecciones sobre subespacios	133
12.1. Proyecciones sobre subespacios	133
13. Mínimos cuadrados	135
 V Determinantes	 137
14. Propiedades de los determinantes	139
14.1. Función determinante y función volumen	139
14.1.1. Tres propiedades de la función volumen de un paralelogramo	139
14.1.2. Las tres primeras propiedades (P-1 to P-3)	140
La relación entre la función <i>Volumen</i> y la función <i>Determinante</i>	141
14.2. Resto de propiedades (P-4 a P-9)	141
14.2.1. Determinante de una matriz con una columna de ceros	141
14.2.2. Determinantes de matrices elementales	142
14.2.3. Sucesión de transformaciones elementales por columnas	142
14.2.4. Propiedad antisimétrica. Determinante de una matriz singular, de la inversa y del producto de matrices	142
Permutación (o intercambio) de columnas. Propiedad antisimétrica	142
Matrices singulares. Matrices inversas	143
Determinante del producto.	143
14.2.5. Determinante de la matriz transpuesta.	144
15. Cofactores y fórmulas para el cálculo del determinante	145
15.1. Determinante matrices triangulares	145
15.2. Cálculo del determinante por eliminación Gaussiana	146
15.3. Determinante de matrices diagonales por bloques	146
15.4. Fórmulas sencillas para matrices de orden menor que 4	147
15.5. No hay fórmulas sencillas para matrices de orden mayor a 3	148
15.6. Expansión de Laplace (desarrollo por cofactores).	149
15.6.1. Propiedad multilineal	149
15.6.2. Menores y cofactores	150
Nueva notación y definición de menores y cofactores	150
15.6.3. Desarrollo del determinante por cofactores (Expansión de Laplace).	151
15.7. Aplicación de los determinantes	152
15.7.1. Regla de Cramer para la resolución de un sistema de ecuaciones	152
15.7.2. Cálculo de la inversa de una matriz	153
 VI Autovalores y autovectores. Diagonalización y formas cuadráticas	 155
16. Autovalores y autovectores	159
16.0.1. Cálculo de los autovalores y los autovectores	159
17. Matrices semejantes y diagonalización por bloques triangulares	163
17.1. Transformación elemental “ <i>espejo</i> ” de otra transformación	163
17.2. Diagonalización por bloques triangulares	164

17.2.1. Matrices semejantes	164
Propiedades compartidas por dos matrices semejantes	165
17.2.2. Diagonalización por bloques triangulares	166
17.2.3. Autovalores, determinante y traza	173
17.2.4. Autovectores	173
17.3. Matrices diagonalizables	174
18. Diagonalización de matrices simétricas	175
18.1. Método de Gram-Schmidt	175
18.2. Matrices ortogonales	176
18.3. Nota sobre la conjugación de números complejos	177
18.4. Diagonalización de matrices simétricas	177
19. Formas cuadráticas	181
19.1. Formas cuadráticas y matrices definidas positivas	181
19.1.1. Formas cuadráticas reales	181
19.1.2. Matrices definidas positivas	181
19.2. Diagonalización de matrices simétricas por congruencia	182
19.3. Algunos tipos de formas cuadráticas	185
19.4. Completar el cuadrado para clasificar las formas cuadráticas	186
A. Resumen de los temas por lecciones	189
A.1. Resumen del Tema 1	189
Soluciones a los ejercicios	195
Soluciones a los Ejercicios	195
Bibliografía	219
Glosario	221
Símbolos	223
Índice analítico	225

Parte I

Álgebra Matricial

Operaciones con vectores y operaciones con matrices

En matemáticas los objetos tienen definiciones muy precisas. Comencemos con una que usaremos mucho:

Definición 1.1. *Un sistema es una lista **ordenada** de objetos¹.*

Dos sistemas son distintos si las listas son diferentes, así los siguientes sistemas de números son diferentes:

$$[1; 2; 1] \neq [1; 2] \neq [2; 1] \neq [2; 1; 2] \neq [2; 1; 1] \neq [2; 1; 1; 1; 1; 2].$$

Fíjese que un sistema no es un conjunto (o colección de objetos). En un conjunto no hay orden en la disposición de sus elementos, además si todo elemento del conjunto A está en el conjunto B , y todo elemento del conjunto B está en el conjunto A , se dice que los conjuntos A y B son iguales; por tanto los siguientes conjuntos son iguales:

$$\{1, 2, 1\} = \{1, 2\} = \{2, 1\} = \{2, 1, 2\} = \{2, 1, 1\} = \{2, 1, 1, 1, 1, 2\}.$$

Distinguimos conjuntos y sistemas del siguiente modo: por una parte encerramos los elementos de un conjunto entre llaves, separados por comas; mientras que los elementos de la lista correspondiente a un sistema genérico se encierran entre corchetes, y se separan con el símbolo de “punto y coma”.

En este curso trataremos con dos importantes tipos de sistemas (listas ordenadas): los vectores de \mathbb{R}^n (sistemas de números) y las matrices (sistemas de vectores).

1.1. Vectores de \mathbb{R}^n

Denotamos por \mathbb{R} al conjunto de números reales (por ejemplo los números 7, $\frac{-3}{11}$, $\sqrt{2}$, ó $-\pi$). A los números reales también los llamaremos *escalares*.

Definición 1.2. *Llamamos **vector** de \mathbb{R}^n a un sistema (o lista **ordenada**) de n números reales.*

El símbolo “ \mathbb{R} ” nos indica que el sistema está compuesto por números *reales*, y el superíndice “ n ” nos indica la cantidad de componentes que hay en la lista.

Recuerde que los sistemas están **ordenados** y que las componentes se identifican por su posición: hay una primera componente, una segunda componente, etc. La forma de escribir la lista no es importante siempre que el orden de las componentes quede claro (es decir, siempre que quede claro quien es la primera componente, quien la segunda, etc.). Por eso podemos escribir el *mismo* vector tanto en horizontal como en vertical:

$$(\pi, -1, 0, 1) \quad \text{ó} \quad \begin{pmatrix} \pi \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas son representaciones del vector de \mathbb{R}^4 cuya primera componente es π , la segunda -1 , la tercera 0 y la cuarta 1.

¹con “objeto” siempre nos referiremos a *objetos matemáticos*, es decir, números, funciones, ecuaciones, variables, etc.

Notación. Aunque los vectores de \mathbb{R}^n son sistemas, nosotros usaremos una notación específica con ellos²: siempre escribiremos un vector como una lista entre *paréntesis* (y con sus *elementos separados por comas* cuando lo escribamos en horizontal).

Además, denotaremos los vectores de \mathbb{R}^n con letras minúsculas en negrita cursiva: ***a***, ***b***, ***c*** etc. Y nos referiremos a los componentes genéricos de un vector con la misma letra con la que denotamos al vector completo (pero en cursiva y con un subíndice que indica la posición del componente dentro del vector). Por ejemplo:

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6);$$

es un vector de 6 componentes, y cuyo tercer componente es a_3 ; y para indicar que el segundo componente de $\mathbf{b} = (0, 4, 6)$ es un cuatro, escribimos $b_2 = 4$.

Decimos que dos vectores ***x*** e ***y*** de \mathbb{R}^n son iguales si lo son sus correspondientes listas ordenadas de componentes, es decir, si y solo si: $x_i = y_i$ para $i = 1 : n$ (i.e. si son iguales componente a componente).³

Por ejemplo, con los números 5, 10, 15 y 20, podemos denotar dos vectores *distintos* del siguiente modo:

$$\mathbf{x} = (20, 10, 15, 5) \quad \text{y} \quad \mathbf{z} = (5, 20, 15, 10).$$

Tenga en cuenta que dos vectores son iguales solo cuando lo son las listas correspondientes a ambos vectores. Por eso los vectores ***x*** y ***z*** NO son iguales.

El operador selector de componentes “|”. Para homogeneizar la notación que emplearemos con vectores y matrices, también denotaremos la *iésima* componente de ***a*** añadiendo un subíndice en el que aparece el símbolo “|” junto al índice de la componente: $\mathbf{a}_{|i}$. De esta manera indicamos que el operador selector “|” *actúa* sobre el vector que está a su izquierda para seleccionar la componente *iésima*. Así, las siguientes son formas equivalentes de denotar la tercera componente de ***b***:

$$\mathbf{b}_{|3} \equiv b_3.$$



Durante el curso usaremos la librería **NAL** para Python. Así podremos experimentar en el ordenador con los objetos y procedimientos que vayamos viendo a lo largo de este curso de Álgebra Lineal. La librería es una transcripción literal de los objetos y procedimientos que veremos en el libro.

Uso de **NAL**

Para usar la librería, el primer paso es importar la librería en memoria

```
from nal import * # importamos la librería en memoria
```

Librería **NAL** para Python

Una vez importada la librería, tecleando `Vector([0, 4, 6])` en un terminal obtenemos:

terminal de Python

```
>>> from nal import *
>>> b = Vector( [0, 4, 6] ) # Vector b cuya lista de componentes es 0, 4 y 6
>>> b
Vector([0, 4, 6])
```

²si usáramos la notación genérica de *sistema*, deberíamos escribir $[\pi; -1; 0; 1]$ (una lista entre corchetes con sus elementos separados por punto y coma como en los ejemplos dados tras la Definición 1.1)

³Si $n \leq m \in \mathbb{N}$ denotamos con “ $n : m$ ” la secuencia $n, n+1, \dots, m$, es decir, la lista ordenada de números naturales que van de n a m : $\{k \in \mathbb{N} | n \leq k \leq m\}$. Así, con $i = 1 : n$ indicamos que el índice i recorre la sucesión de enteros que va de 1 a n , es decir 1, 2, \dots , n . Cuando el primer índice (n) sea mayor que el segundo (m) entenderemos que ($n : m$) es una lista vacía.

donde el resultado aparece en gris en el anterior recuadro de **terminal** de **Python**; y si ejecutamos el código en un Notebook de Jupyter obtenemos:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Para obtener el tercer componente de **b** tecleamos:

```
b[3]
```

Librería NAcAL para Python

de manera que tanto en un terminal de Python como en un Notebook de Jupyter obtenemos el número 6:



Hemos definido un vector de \mathbb{R}^n como un sistema de n números reales. Al encerrar una lista de números entre paréntesis denotamos un vector (cuyas componentes son los números encerrados en el orden en el que aparecen en la lista dentro del paréntesis). Por ejemplo

$$\mathbf{a} = (1, 4, 9, 2).$$

Para seleccionar una componente de la lista usamos el operador “[]” y el índice de la componente que queremos seleccionar. Por ejemplo, la tercera componente de **a** es:

$$\mathbf{a}_{[3]} = a_3 = 9.$$

1.1.1. Definiciones de algunos vectores especiales

Definición 1.3. Llamamos **vector nulo** (o **vector cero**) de \mathbb{R}^n al vector cuyas n componentes son cero, y lo denotamos con **0**. Por ejemplo, los vectores nulos de \mathbb{R}^1 , \mathbb{R}^2 , de \mathbb{R}^3 y de \mathbb{R}^5 son respectivamente:

$$(0), \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad (0, 0, 0, 0, 0).$$

¡Nótese que estos tres vectores nulos **no son iguales**, pues no tienen el mismo número de componentes (y por tanto sus correspondientes listas ordenadas no son iguales)!

```
V0( 3 )
```

```
# vector nulo de tres componentes
```

Librería NAcAL para Python

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Definición 1.4. Sea el vector **a**. Llamamos **vector opuesto** de **a** al vector $-\mathbf{a}$, que es el vector cuyos componentes son los opuestos de los de **a**; es decir $(-\mathbf{a})_{[i]} = -(\mathbf{a}_{[i]})$. Por ejemplo:

$$\text{si } \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \text{ entonces } -\mathbf{a} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ \vdots \\ -a_n \end{pmatrix}; \text{ y si } \mathbf{c} = (1, -3\pi, \sqrt{2}), \text{ entonces } -\mathbf{c} = (-1, 3\pi, -\sqrt{2}).$$

$-\mathbf{b}$
 $\# \text{ vector opuesto a } \mathbf{b}$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

1.2. Sumas de vectores y productos de vectores por escalares

Definición 1.5 (suma de vectores). La suma, $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, de dos vectores \mathbf{a} y \mathbf{b} de \mathbb{R}^n , es el vector de \mathbb{R}^n en el que cada componente i ésima es la suma de las componentes $\mathbf{a}_{|i}$ y $\mathbf{b}_{|i}$. Es decir, sumamos componente a componente:

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b})_{|i} = \mathbf{a}_{|i} + \mathbf{b}_{|i} \quad \text{para } i = 1 : n.$$

Por tanto:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix};$$

suma que también podríamos haber escrito de manera horizontal: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = ((a_1 + b_1), \dots, (a_n + b_n))$.

Observación. Nótese que el operador “ $|i$ ” es distributivo para la suma: $(\mathbf{a} + \mathbf{b})_{|i} = \mathbf{a}_{|i} + \mathbf{b}_{|i}$.

Definición 1.6 (producto de un vector por un escalar). El producto, $\lambda \mathbf{b}$, de un vector \mathbf{b} de \mathbb{R}^n por un escalar λ es el vector de \mathbb{R}^n en el que cada componente i ésima es el producto de λ por $\mathbf{b}_{|i}$. Es decir, multiplicamos cada componente de \mathbf{b} por λ :

$$(\lambda \mathbf{b})_{|i} = \lambda(\mathbf{b}_{|i}) \quad \text{para } i = 1 : n.$$

Al vector $\lambda \mathbf{b}$ lo denominamos múltiplo (o múltiplo escalar) de \mathbf{b} .

Por tanto

$$\lambda \mathbf{b} = \lambda \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda b_1 \\ \vdots \\ \lambda b_n \end{pmatrix};$$

múltiplo que también podríamos haber escrito horizontalmente: $\lambda \mathbf{b} = \lambda (b_1, \dots, b_n) = (\lambda b_1, \dots, \lambda b_n)$.

Observación. El operador “ $|$ ” es asociativo para el producto por escalares: $(\lambda \mathbf{b})_{|i} = \lambda(\mathbf{b}_{|i})$. Fíjese como la región cubierta por el paréntesis se desplaza...en un lado de la igualdad “ λ ” está dentro del paréntesis e “ $|i$ ” fuera, pero en el otro lado ocurre lo contrario⁴. Por tanto el producto por escalares se puede escribir sencillamente como: $\lambda \mathbf{b}_{|i}$.

Definición 1.7 (Operador lineal). Un operador distributivo respecto de la suma y asociativo respecto al producto por escalares se dice que es lineal.

Así pues, el operador “ $|i$ ” (que selecciona el componente i ésimo de un vector) es un operador lineal.

⁴de manera similar a la propiedad asociativa del producto de escalares: $(ab)c = a(bc)$.



La definición de las operaciones de suma de vectores y producto de un vector por un escalar convierten al operador “ $|_i$ ” en un **operador lineal**; es decir, *distributivo* respecto a la suma:

$$(a + b)|_i = a|_i + b|_i$$

y *asociativo* respecto al producto por escalares:

$$(\lambda b)|_i = \lambda(b|_i).$$

Observación. La expresión $2b$ significa multiplicar el vector por 2, es decir

$$2b \equiv 2 \cdot b$$

donde “ \cdot ” indica la operación producto. Estamos acostumbrados a omitir el símbolo de la operación producto (con ello logramos expresiones más compactas), y no nos genera ningún problema la ausencia del símbolo de la operación producto. Sin embargo Python no funciona como un humano. El intérprete de Python requiere “explícitamente” el símbolo de la operación producto (en su caso el asterísco “ $*$ ”):

Librería NAcAL para Python

`2*b` *# multiplica el Vector b por 2 (también podemos escribir b*2)*

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ 12 \end{pmatrix}$$

A la operación de multiplicar un vector por un número también se la denomina “escalar el vector” (...es decir, cambiarlo de escala: piense que si tiene un vector con datos de salarios en miles de euros, expresar esos datos en euros es escalar los datos, y se logra multiplicando por 1000).

Observación. El intérprete de Python tiene establecidas una serie de precedencias entre operadores. En el siguiente cuadro de operadores, los de arriba preceden a los de abajo:

Precedencia en las operaciones

Símbolo en Python	Operación asociada en NAcAL
<code>()</code> , <code>[]</code> , <code>{}</code>	
<code>**</code>	exponenciación
<code>~A</code>	transposición
<code>*</code> , <code>/</code>	multiplicación, división,
<code>+</code> , <code>-</code>	suma, resta
<code>&</code>	transformación elemental
<code> </code>	selector

Cuadro 1.1: Precedencia de operadores en Python (más detalles en [aquí](#), en las secciones 6.16. Orden de evaluación y 6.17. Prioridad de operador)

Como la precedencia no es fácil de recordar, por claridad en el código y para asegurar que realizamos las operaciones en el orden deseado, es recomendable usar paréntesis en Python.

EJERCICIO 1. ¿Cómo evalúa la librería NAcAL las siguientes expresiones: $(3*b)|_2$; $3*(b|_2)$ y $3*b|_2$?

EJERCICIO 2. ¿Qué falla en la expresión $b+b|_2$?

1.2.1. Propiedades de la suma y del producto por un escalar



Explotando las propiedades de la notación (junto con algunas propiedades de los *números reales*) demostraremos ocho propiedades que verifican la *suma de vectores* y el *producto de un vector por un escalar* (Proposición 1.2.1). (ocho propiedades que nos permitirán definir el *espacio vectorial* \mathbb{R}^n en el Tema 2).

Para empezar recordemos algunas propiedades (¡no todas!) de los números reales que seguro que conoce y que usted ha manejado desde la escuela...

Recordatorio de algunas propiedades del conjunto de números reales

Sean a , b y c números reales. Entonces:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. $a + b = b + a$. | 5. $ab = ba$. |
| 2. $a + (b + c) = (a + b) + c$. | 6. $a(b + c) = ab + ac$. |
| 3. $a + 0 = a$. | 7. $a(bc) = (ab)c$. |
| 4. $a + (-a) = 0$. | 8. $1a = a$. |

La cuestión que queremos abordar ahora es: ¿también se verificarán estas propiedades cuando operamos con vectores? En concreto, hagámonos las siguientes ocho preguntas (puede investigar con la librería **NAL**):

1. ¿Es verdad que

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}?$$

¿Es cierto solo para los números del ejemplo? o ¿es una regla general para cualquier par de vectores?

2. ¿Es verdad que

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \left(\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \right) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}?$$

El paréntesis significa que primero hay que hacer la suma dentro del paréntesis, y al vector resultante sumarle el vector de fuera.

¿Es cierto solo para los números del ejemplo? o ¿es una regla general para cualquier trío de vectores?

3. ¿Es verdad que

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}?$$

¿Es cierto solo para los vectores del ejemplo? o ¿es una regla general para cualquier par de vectores?

4. ¿Es verdad que

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ -5 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}?$$

¿Es cierto solo para los vectores del ejemplo? o ¿es una regla general para cualquier par de vectores?

5. ¿Es verdad que

$$2 \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \right) = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}?$$

(recuerde que primero se realizan las operaciones de dentro del paréntesis) ¿Es una regla general para cualquier par de vectores? ¿Y si cambiamos el escalar 2 por otro número?

6. ¿Es verdad que

$$(2+3) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}?$$

(recuerde que primero se realizan las operaciones de dentro del paréntesis) ¿Es una regla general para cualquier par de vectores? ¿y si cambiamos los escalares 2 y 3 por otros números?

7. ¿Es verdad que

$$2 \left(3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = (2 \cdot 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}?$$

(recuerde, primero las operaciones dentro de los paréntesis). Hágase las mismas preguntas de más arriba.

8. ¿Es verdad que si $a = 1$

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}?$$

¿Es cierto solo para el escalar $a = 1$?

En el EJERCICIO 3 se le pide que demuestre las ocho propiedades que acabamos de revisar⁵. Su solución aparece al final de este documento ¡pero usted debe resolverlo por su cuenta y sin mirar! Si “cotillea” previamente la solución, el ejercicio le servirá de muy poco.

Para resolver el ejercicio únicamente necesita aplicar las reglas de notación vistas más arriba (definiciones de *suma* y *producto por escalares* de la Página 6); y cuando tenga que operar con los componentes de los vectores (que son números reales) aplique la propiedad de las operaciones entre números reales que necesite (de entre las del [recordatorio](#) de la Página 8).

EJERCICIO 3. Demuestre las propiedades de la siguiente proposición:

Proposición 1.2.1 (Propiedades de las operaciones entre vectores). *Para cualesquiera vectores \mathbf{a} , \mathbf{b} y \mathbf{c} con el mismo número de componentes, y para cualesquiera escalares (números) λ y η , se verifican las siguientes ocho propiedades:*

1. $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$.

5. $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$.

2. $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$.

6. $(\lambda + \eta)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \eta\mathbf{a}$.

3. $\mathbf{0} + \mathbf{a} = \mathbf{a}$.

7. $\lambda(\eta\mathbf{a}) = (\lambda\eta)\mathbf{a}$.

4. $\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.

8. $1\mathbf{a} = \mathbf{a}$.

Pista. Dispone de dos estrategias. La primera se asemeja a la forma de operar mostrada en las ocho preguntas de más arriba (por ello es posible que le parezca más sencilla). La segunda estrategia explota las propiedades de *linealidad* del operador “[]. Es importante que se familiarice con este segundo modo de trabajar: es más abstracto pero mucho más eficiente.

⁵Se le propone como ejercicio una ¡demostración! Las demostraciones son imprescindibles en matemáticas. Es IMPOSIBLE que adquiriera una buena formación matemática si no realiza las demostraciones. Solo se adquiere una verdadera comprensión al realizar las demostraciones. Las que se le propondrán en el curso o son muy sencillas (como las de este primer ejercicio) o son “casi” una repetición de otras ya vistas, o las pistas que se le dan describen los pasos necesarios para dar con la demostración.

Aunque las demostraciones son sencillas es posible que le cuesten (quizá sea la primera vez que intenta demostrar algo...y la primera vez suele resultar difícil). No se desanime; *es importante lograr demostrar proposiciones sencillas* (cuando acabe el curso se dará cuenta de que ha aprendido mucho con ello).

- **Estrategia 1.** Como estas propiedades provienen de los escalares (los números reales), la estrategia es operar con las componentes dentro de los vectores. Puede escribir sus vectores o como filas o como columnas (en ambos casos la demostración es idéntica).

Estrategia 2. Recuerde que dos vectores \mathbf{v} y \mathbf{w} son iguales si son idénticos componente a componente: $\mathbf{v}_{|i} = \mathbf{w}_{|i}$. Use las propiedades del operador “ $|i$ ” siempre que pueda; es decir, tenga en cuenta que son intercambiables las expresiones:

- $(\mathbf{a} + \mathbf{b})_{|i}$ y $\mathbf{a}_{|i} + \mathbf{b}_{|i}$ (propiedad distributiva de “ $|i$ ”).
- $(a\mathbf{a})_{|i}$ y $a(\mathbf{a}_{|i})$ (propiedad asociativa de “ $|i$ ”).

Además recuerde que $\mathbf{a}_{|i}$, $\mathbf{b}_{|i}$ y $\mathbf{c}_{|i}$ son números reales; por tanto, puede usar las **propiedades de las operaciones entre números reales** del mismo modo que en la primera estrategia.

Nota 1. Estas ocho propiedades nos permitirán definir el espacio vectorial \mathbb{R}^n en el Tema 2.

1.3. Vectores como representación de datos

Como los vectores son un *un sistema* de números, podemos interpretar cada componente en función de la posición que ocupa. Por ejemplo, imagine que tiene datos del año 2003 sobre la tasa de crecimiento interanual del PIB de cinco países: España (1), Francia (2), Alemania (3), R. Unido (4) y EEUU (5); entonces podemos interpretar los distintos componentes del siguiente vector en función de su posición en la lista:

$$\mathbf{datos}(2003) = \begin{pmatrix} 2.9 \\ 0.9 \\ -0.2 \\ 2.5 \\ 1.8 \end{pmatrix}.$$

Puesto que el número 1.8 está en la quinta posición, sabemos que corresponde al quinto país, y por tanto sabemos que EEUU creció a una tasa del 1.8% en el año 2003⁶. ¿Qué país no creció en el año 2003?

En algunos manuales verá una interpretación de los vectores como segmentos con norma y dirección. Ésta es una interpretación frecuente en aplicaciones físicas, pero poco natural para los economistas. Para un economista la interpretación más natural es que los componentes de los vectores de \mathbb{R}^n son datos (precios, cantidades, número de parados, tasa de inflación, etc.) y la posición de cada componente indica a quien corresponde el dato (como en el ejemplo anterior). Ésta será la interpretación que use en la asignatura de Econometría dentro de un par de cursos.

✎ Ahora pasamos a definir las matrices como un sistema de n vectores de \mathbb{R}^m (es decir, una lista ordenada de n vectores de \mathbb{R}^m). La siguiente introducción así lo ilustra.

1.4. Matrices de $\mathbb{R}^{m \times n}$

Imagine que además tiene datos anuales de los cinco países de arriba durante el periodo: 2003 a 2006.

$$\mathbf{datos}(2003) = \begin{pmatrix} 2.9 \\ 0.9 \\ -0.2 \\ 2.5 \\ 1.8 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{datos}(2004) = \begin{pmatrix} 3.1 \\ 2.0 \\ 1.1 \\ 3.2 \\ 3.1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{datos}(2005) = \begin{pmatrix} 3.3 \\ 1.6 \\ 0.7 \\ 1.9 \\ 3.7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{datos}(2006) = \begin{pmatrix} 3.3 \\ 2.0 \\ 0.9 \\ 1.5 \\ 3.5 \end{pmatrix}.$$

⁶fuentes: Informe ICAE sobre la economía española (Octubre 2006), publicado por el Instituto Complutense de Análisis Económico

Podemos escribir todos los datos juntos y dar al resultado el nombre de **PIB**. Así tendremos recogidos en **PIB** los datos de crecimiento del PIB de los cinco países en los años 2003–2006. Esto se hace construyendo una *matriz*.

Llamamos *matriz* a una lista ordenada de vectores *con el mismo número de componentes* (... es decir... ¡un vector de vectores!). De esta manera podremos definir la matriz **PIB** como una *sistema* de vectores con los datos de los cinco años disponibles:

$$[\text{datos}(2003); \text{datos}(2004); \text{datos}(2005); \text{datos}(2006)].$$

Ahora bien, como los vectores se pueden escribir tanto en vertical como en horizontal, esta escritura puede arrojar una lista muy larga y visualmente difícil de leer:

$$[(2.9, 0.9, -0.2, 2.5, 1.8); (3.1, 2.0, 1.1, 3.2, 3.1); (3.3, 1.6, 0.7, 1.9, 3.7); (3.3, 2.0, 0.9, 1.5, 3.5)].$$

Sabemos que las cuartas componentes de cada uno de los vectores dentro de la matriz corresponden al Reino Unido...pero esta disposición de los datos no es fácil de leer⁷. Para facilitar la lectura dispondremos los datos según el siguiente convenio: disponemos los datos referidos al año 2003 en una primera columna, los del año 2004 en la segunda, los del año 2005 en la tercera y los del año 2006 en la cuarta. De ese modo se obtiene el siguiente arreglo rectangular de los datos:

$$\mathbf{PIB} = \begin{bmatrix} 2.9 & 3.1 & 3.3 & 3.3 \\ 0.9 & 2.0 & 1.6 & 2.0 \\ -0.2 & 1.1 & 0.7 & 0.9 \\ 2.5 & 3.2 & 1.9 & 1.5 \\ 1.8 & 3.1 & 3.7 & 3.5 \end{bmatrix}.$$

Ahora cada columna corresponde a un año distinto, y cada fila a un país distinto... ¡Mucho más fácil de leer!

Definición 1.8. Llamamos *matriz* de $\mathbb{R}^{m \times n}$ a un sistema de n vectores de \mathbb{R}^m .

$$[\mathbf{a}; \mathbf{b}; \dots \mathbf{v}] \quad \text{donde } \mathbf{a}, \mathbf{b}, \dots \mathbf{v} \text{ son } n \text{ vectores de } \mathbb{R}^m.$$

Cada uno de los vectores del sistema es una *columna* de la matriz.

Tampoco con las matrices usaremos la representación genérica de los *sistemas* ya que, aunque mantendremos los corchetes, omitiremos los puntos y comas que separan las columnas, escribiendo sencillamente:

$$[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \dots \ \mathbf{v}].$$

Por tanto, seguiremos el siguiente convenio de notación: encerrando un vector entre corchetes escribimos una matriz con una única columna (*matriz columna*). Por ejemplo, si $\mathbf{x} = (1, \ 5, \ 9)$, entonces

$$[\mathbf{x}] = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

Y encerrando entre corchetes una lista de vectores (todos con el mismo número de componentes), escribimos la matriz cuyas columnas son los vectores de la lista y en el mismo orden en el que aparecen en la lista. Por ejemplo, si:

$$\mathbf{a} = (1, \ 0, \ 3, \ 0), \quad \mathbf{b} = (2, \ 2, \ 2, \ 2) \quad \text{y} \quad \mathbf{0} = (0, \ 0, \ 0, \ 0),$$

y encerramos “entre corchetes” algunos de estos vectores, creamos matrices cuyas columnas son los vectores de la lista escritos en vertical; por ejemplo,

$$[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{0} \ \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}; \quad [\mathbf{0} \ \mathbf{0}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

⁷aunque un ordenador no tiene ningún problema con esta representación, los humanos si lo tenemos... ¡imagine una lista de 12 vectores con 20 componentes cada uno. Algo similar ocurre si escribimos varios vectores en columna, unos debajo de otros.

Definición 1.9. El **orden** de la matriz indica su número de filas y columnas, y está compuesto por dos números: el primero corresponde al número de filas (m) y el segundo al número de columnas (n). El orden se suele expresar cómo “ $m \times n$ ” (y se lee “ m por n ”).

En el ejemplo con datos económicos, el orden de la matriz **PIB** es 5 por 4. Nótese que siempre *se indica primero el número de filas y luego el de columnas*. Frecuentemente expresaremos el orden de la matriz debajo de su nombre; por ejemplo: **PIB**_{5×4}.

A cada número dentro de la matriz lo denominamos **componente** (o elemento), y al igual que en el caso de los vectores, identificamos los componentes de la matriz por la posición que ocupan. De esta manera podemos decir que el componente de **PIB** ubicado en la primera fila y segunda columna es 3.1.

Notación. Denotamos las matrices de $\mathbb{R}^{m \times n}$ con letras mayúsculas y en negrita: **A**, **B**, **C**; y a los componentes genéricos de la matriz con la misma letra con la que denotamos a la matriz completa, pero en minúscula cursiva y con dos subíndices que indican la posición que ocupa el componente dentro de la matriz, comenzando siempre por la fila, y luego por la columna (por tanto el componente a_{ij} de **A** se encuentra en la fila i ésima y columna j ésima). Otras formas que usaremos para denotar dicho componente son:

$$a_{ij} \equiv \text{elem}_{ij}(\mathbf{A}) \equiv {}_i|\mathbf{A}|_j.$$

Por ejemplo, escribimos una matriz genérica **A** de orden 2 por 3 como:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}.$$

Y de la matriz

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

podemos afirmar que su orden es 2×3 y que su componente b_{21} es cero, y su componente ${}_2|\mathbf{B}|_2$ es -1 .

terminal de Python

```
>>> a = Vector( [1, 0] )
>>> b = Vector( [2,-1] )
>>> c = Vector( [3, 1] )
>>> B = Matrix( [a, b, c] ) # Matrix cuya lista de vectores es a, b, c
>>> {}|B|{} # elemento de B situado en la segunda fila, segunda columna
-1
```

Nótese que usamos un solo índice para identificar las componentes de un vector \mathbf{x} , pero que necesitamos *dos* índices para identificar las componentes de una matriz **A**. Así, cuando nos queremos referir a la componente i ésima del vector \mathbf{x} escribimos:

$$x_i \quad \text{ó} \quad \mathbf{x}_i;$$

y cuando queremos referirnos al componente situado en la fila i ésima y columna j ésima de la matriz **A**:

$$\text{elem}_{ij}(\mathbf{A}), \quad \text{ó} \quad a_{ij}, \quad \text{ó} \quad {}_i|\mathbf{A}|_j.$$

Pero ¿qué pasa si nos queremos referir a toda la fila i ésima o toda la columna j ésima de **A**?

1.4.1. Filas de una matriz

La fila i ésima de **A** (de orden $m \times n$) es el vector de \mathbb{R}^n cuyos componentes son a_{ik} , donde el índice k recorre todas las columnas ($k = 1 : n$) y que denotamos como:

$$\text{fila}_i(\mathbf{A}) \equiv {}_i|\mathbf{A} = (a_{i1}, \dots, a_{in}) \in \mathbb{R}^n$$

(que por ser un vector de \mathbb{R}^n se puede escribir tanto en horizontal como en vertical).

El operador selector de filas: “ $i|$ ”. Al escribir “ $i|$ ” como subíndice a la *izquierda* de la matriz seleccionamos la *fila* i ésima de la matriz.

Por ejemplo, si $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$; entonces $_{1|}\mathbf{B} = (1, 2, 3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

<code>1 B</code>	<code># primera fila de B</code>	Librería NAcAL para Python
$(1, 2, 3)$		

1.4.2. Columnas de una matriz

La columna j ésima de \mathbf{A} (de orden $m \times n$) es el vector de \mathbb{R}^m con componentes a_{kj} , donde el índice k recorre todas las filas ($k = 1 : m$). Denotaremos dicha columna como $\text{col}_j(\mathbf{A})$ o bien como $\mathbf{A}_{|j}$:

$$\text{col}_j(\mathbf{A}) \equiv \mathbf{A}_{|j} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} = (a_{1j}, \dots, a_{mj}) \in \mathbb{R}^m,$$

(puesto que, por ser un vector de \mathbb{R}^m , se puede escribir tanto en horizontal como en vertical).

El operador selector de columnas: “ $|j$ ”. Al escribir “ $|j$ ” como subíndice a la *derecha* de la matriz, seleccionamos la *columna* j ésima de la matriz.

Así, si $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$; entonces $\mathbf{B}_{|2} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

<code>B 2</code>	<code># segunda columna de B</code>	Librería NAcAL para Python
------------------	-------------------------------------	----------------------------

¿Y cómo escribir la submatriz de \mathbf{B} de orden $m \times 1$ cuya única columna es la j ésima de \mathbf{B} ? Basta encerrar entre “corchetes” dicha columna:

$$[\mathbf{B}_{|2}] = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

<code>Matrix([B 2])</code>	<code># Matriz cuya única columna es la segunda columna de B</code>	Librería NAcAL para Python
$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$		

Nótese que $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ es un *vector* (cuya lista contiene dos números que se puede escribir en vertical u horizontal), pero que $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ es una *matriz* cuya lista contiene una única *columna*. Por tanto son objetos matemáticos distintos (lista de números *vs* lista de vectores), y su escritura es fácil de distinguir: los vectores se encierran entre “paréntesis” y matrices entre “corchetes”.

Así $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ es un vector y $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ es una matriz (y por tanto **son objetos distintos**).⁸

Con la notación que hemos establecido podemos describir una matriz mediante sus columnas:

$$\mathbf{A}_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{|1} & \mathbf{A}_{|2} & \cdots & \mathbf{A}_{|n} \end{bmatrix}}_{\text{lista de columnas}}; \text{ donde } \mathbf{A}_{|j} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}.$$

Diremos que **dos matrices** del mismo orden **son iguales** si y solo si lo son sus correspondientes sistemas de vectores, es decir: $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ si y solo si $\mathbf{A}_{|j} = \mathbf{B}_{|j}$ para $j = 1 : n$ (i.e. si son iguales columna a columna).

1.4.3. Resumen de la notación para seleccionar componentes, filas y columnas

Disponemos de varias alternativas para denotar tanto los componentes, como las filas y columnas de $\mathbf{A}_{n \times m}$.

Notaciones alternativas		
Componente ij (escalar)	Fila i ésima (vector de \mathbb{R}^n)	Columna j ésima (vector de \mathbb{R}^m)
a_{ij} $i \mathbf{A} j$ $\text{elem}_{ij}(\mathbf{A})$	$i \mathbf{A}$ $\text{fila}_i(\mathbf{A})$	$\mathbf{A}_{ j}$ $\text{col}_j(\mathbf{A})$

En el ejemplo con datos económicos, $_{1|}\mathbf{PIB}$ corresponde a los datos de España y $_{5|}\mathbf{PIB}$ a los de EEUU; y por otra parte, $\mathbf{PIB}_{|3}$ corresponde a los datos del año 2005.

⁸Nota para profesores de matemáticas y/o lectores “puntilleros”. Tradicionalmente se sigue el siguiente convenio

$$\begin{cases} \mathbb{R} = & \mathbb{R}^1 \\ \mathbb{R}^{n+1} = & \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \end{cases}.$$

Sin embargo, aquí sigo un convenio alternativo acorde con el funcionamiento interno de Python:

$$\begin{cases} \mathbb{R}^0 = & \{\emptyset\} \\ \mathbb{R}^{n+1} = & \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \end{cases};$$

(donde \emptyset denota al conjunto vacío). De tal manera que $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R} \times \{\emptyset\} = \{(\alpha, \emptyset) | \alpha \in \mathbb{R}\}$. Así pasa en Python, y por ello una tupla con un único elemento se escribe con $(\mathbf{a},)$. Nótese la coma detrás de la \mathbf{a} (que se puede entender que separa el primer elemento, \mathbf{a} , del último, que es vacío). De este modo, la selección de los elementos sigue la siguiente función recursiva: si $\mathbf{v} = (v_1, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^n$, donde $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^{n-1}$ entonces

$$\begin{cases} (v_1, \mathbf{w})_{|1} = & v_1 \\ (v_1, \mathbf{w})_{|k+1} = & \mathbf{w}_{|k} \end{cases}.$$

Por tanto, $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ es un sistema de tres *números* de \mathbb{R} , y $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ es un sistema de tres *vectores* de \mathbb{R}^1 , a saber $(1,)$, $(2,)$ y $(3,)$.



La notación de las matrices tiene paralelismos con la de los vectores; **pero con importantes diferencias**.

Una lista de vectores encerrada entre *corchetes* denota una matriz, cuyas *columnas* son los vectores de la lista en el orden en el que aparecen en la lista dentro del corchete. Por ejemplo

$$\mathbf{a} = (1, 2), \quad \mathbf{b} = (1, 0), \quad \mathbf{c} = (9, 2); \quad \mathbf{A} = [\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 9 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Con las matrices **NO hay la libertad** para escribir horizontal o verticalmente la lista que hemos encerrado (es una importante diferencia con los vectores).

Los subíndices “ i ” (por la izquierda) y “ j ” (por la derecha) operan sobre la matriz, pero su comportamiento es distinto. El subíndice “ i ” **a la izquierda de la matriz selecciona la fila** i ésima y el subíndice “ j ” **a la derecha selecciona la columna** j ésima (tanto las filas como las columnas son *vectores*):

$$\mathbf{A}_{|3} = (9, \ 2), \quad {}_2\mathbf{A} = (2, \ 0, \ 2).$$

Así, $\mathbf{A}_{|3}$ es un *vector* formado por las componentes de la tercera columna de \mathbf{A} ; pero, $[\mathbf{A}_{|3}]$ es una *matriz columna* cuya única columna es igual que la tercera columna de \mathbf{A} .

$$\mathbf{A}_{|3} = (9 \ 2) = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \end{pmatrix} \neq [\mathbf{A}_{|3}] = \begin{bmatrix} 9 \\ 2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 9 & 2 \end{bmatrix}.$$

Cuando se emplean dos subíndices (uno por cada lado) se selecciona la *componente* situada en la fila i ésima (indicada por el índice de la izquierda) y columna j ésima (indicada por el índice de la derecha)

$${}_1\mathbf{A}_{|3} = a_{13} = 9.$$

1.4.4. Extensión de la notación vectorial y reglas de reescritura.

Nótese que ${}_i\mathbf{A}_{|j}$ es la componente j ésima de la fila i , es decir $({}_i\mathbf{A})_{|j}$, pero también es la componente i ésima de la columna j , por lo que sería conveniente poder escribir ${}_i({}_j\mathbf{A})$, de manera que

$${}_i\mathbf{A}_{|j} = {}_i({}_j\mathbf{A}) = ({}_i\mathbf{A})_{|j}.$$

Para ello aceptaremos que el operador “ $|$ ” también pueda operar por la izquierda de un *vector*. Así

$${}_i\mathbf{a} = \mathbf{a}_{|i} = a_i.$$

Con esta flexibilización de la notación, y puesto que tanto las filas como las columnas de una matriz son vectores, cuando seleccionemos las *componentes* de \mathbf{A} , nos dará igual operar dos veces por el mismo lado o una vez por cada lado (ambas operaciones arrojan necesariamente el mismo resultado). Así

$${}_i({}_j\mathbf{A}) = (\mathbf{A}_{|j})_{|i} \quad \text{y} \quad ({}_i\mathbf{A})_{|j} = {}_j({}_i\mathbf{A}).$$

Para no perder la *asociatividad* de la notación cuando “ $|$ ” opera por la izquierda de los *vectores*, también aceptaremos que los escalares aparezcan multiplicando por la derecha.⁹ Es decir, $\lambda\mathbf{b} = \mathbf{b}\lambda$. Esto da lugar a dos nuevas reglas de reescritura:

⁹Como en estas notas propongo una notación propia, aquí aceptaremos una expresión como “ $\mathbf{a}2$ ”...[expresión que nunca aparece en los textos! **El modo habitual de escribir dicho producto es “ $2\mathbf{a}$ ” con “el coeficiente primero”**. Aquí lo aceptaremos para mantener la asociatividad por la izquierda, pero tenga en cuenta que no es una forma empleada habitualmente.



Primera. - “*podemos desplazar los paréntesis*” para sacar un símbolo por un lado e introducir otro por el otro lado:

$$(\lambda \mathbf{b})_{|i} = \lambda(\mathbf{b}_{|i}) = ({}_i|\mathbf{b})\lambda = {}_i|(\mathbf{b}\lambda).$$

Segunda. - “*podemos intercambiar las posiciones del escalar y el selector*” sacando uno de ellos fuera del paréntesis y metiendo el otro:

$$(\mathbf{b}_{|i})\lambda = (\mathbf{b}\lambda)_{|i} \quad \text{y} \quad \lambda({}_i|\mathbf{b}) = {}_i|(\lambda\mathbf{b}).$$

De hecho, puesto que las ocho expresiones de más arriba arrojan el mismo resultado (aunque el orden de ejecución de las operaciones difiera entre ellas) podemos omitir el paréntesis y escribir sencillamente $\lambda\mathbf{b}_{|i}$ o también cualquiera de las siguientes reordenaciones $\lambda\mathbf{b}_{|i} = \lambda{}_i|\mathbf{b} = \mathbf{b}_{|i}\lambda = {}_i|\mathbf{b}\lambda$.

No obstante a lo anterior, en las demostraciones siempre usaré expresiones con paréntesis (aunque sea innecesario), ya que ayuda a identificar la propiedad empleada en cada paso de la demostración.

Recuerde que en Python también es conveniente usar paréntesis para evitar errores y sorpresas.

EJERCICIO 4. ¿Cómo evalúa la librería NAcAL las siguientes expresiones? (Revise la Tabla 1.2 en la página 7)

- (a) $3*\mathbf{b}|1$
- (b) $3*1|\mathbf{b}$
- (c) $3*1|\mathbf{b}$
- (d) $1|\mathbf{b}*3$

1.4.5. La transposición

Encerrando \mathbf{a} entre corchetes denotamos una matriz con una única columna; para denotar una matriz cuya única fila es \mathbf{a} necesitamos una operación adicional: la *transposición*, (\top),...

Definición 1.10 (Matriz transpuesta). *Considere la matriz \mathbf{A} de orden m por n , su matriz transpuesta, que denotamos como \mathbf{A}^\top , es la matriz de orden $n \times m$ cuyas m columnas iguales a las m filas de \mathbf{A} :*

$$(\mathbf{A}^\top)_{|i} = {}_i|\mathbf{A}; \quad i = 1 : m.$$

Por tanto, la transpuesta de \mathbf{A} es la matriz n por m cuyas columnas son las filas de \mathbf{A} escritas en vertical, es decir,

$$\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} {}_1|\mathbf{A} & \dots & {}_m|\mathbf{A} \end{bmatrix}.$$

$$\text{Ejemplo: } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{B}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

~B

Transpuesta de la matriz B

Librería NAcAL para Python

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Escribimos las *matrices columna* (matrices con una única columna) poniendo un vector entre corchetes; ahora podemos escribir *matrices fila* (matrices con una única fila) trasponiendo matrices columna.

Así $[i|\mathbf{A}]^\top$ es una matriz cuya única fila es igual a la fila i ésima de \mathbf{A} ; y si

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}; \quad \text{entonces} \quad \begin{cases} [1|\mathbf{B}]^\top = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \\ [\mathbf{B}|3]^\top = \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} \end{cases}.$$

Librería NAcAL para Python

```
~Matrix( [1|B] )    # Matriz cuya única fila es la primera fila de B
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Librería NAcAL para Python

```
~Matrix( [B|3] )    # Matriz cuya única fila es la tercera columna de B
```

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}$$

EJERCICIO 5. Demuestre las siguientes propiedades elementales de la transposición:

- (a) La transposición intercambia los índices de las componentes de la matriz: $_{k|}(\mathbf{A}^\top)_{|j} = _j|\mathbf{A}|_k$.
- (b) Si \mathbf{A} entonces $(\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}$.
- (c) Si \mathbf{A} y $1 \leq i \leq n$ entonces $\mathbf{A}_{|i} = _i|(\mathbf{A}^\top)$.



Pese a que las expresiones $_{i|}(\mathbf{A}^\top)$, $(\mathbf{A}^\top)_{|j}$ y $_{i|}(\mathbf{A}^\top)_{|j}$ solo tienen una interpretación posible incluso si se quitaran los paréntesis (puesto que *la transposición es una operación sobre matrices* y no sobre vectores) siempre escribiré el paréntesis. Así la notación es más clara.

Fíjese además en las reglas de reescritura: “*puedo transponer (o quitar la transpuesta) solo si además cambio de lado los subíndices*” (fíjese en su aplicación en las demostraciones de las propiedades anteriores).

1.4.6. Definiciones de algunas matrices especiales



Al igual que hicimos con los vectores, añadiremos algunas definiciones relativas a las matrices. *Preste atención al uso de la notación.*

Definición 1.11. Llamamos *matriz nula* (o *matriz cero*) de orden $m \times n$, $\mathbf{0}$, a la matriz cuyas n columnas son vectores nulos de \mathbb{R}^m : $\mathbf{0}_{|j} = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^m$ para $j = 1 : n$.

Librería NAcAL para Python

```
M0(2,4)    # matriz nula de orden 2 por 4
```

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Definición 1.12. Sea la matriz \mathbf{A} . Llamamos *matriz opuesta* de \mathbf{A} a la matriz $-\mathbf{A}$, del mismo orden que \mathbf{A} y cuyas columnas son las de \mathbf{A} multiplicadas por -1 , es decir, $(-\mathbf{A})_{|j} = -(\mathbf{A}_{|j})$.

-B

matriz opuesta de B

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

También daremos nombre a ciertas matrices en función de la disposición de sus componentes:

Definición 1.13. Decimos que una matriz es *cuadrada* cuando tiene el mismo número de filas que de columnas. Es decir, una matriz cuadrada es de orden $n \times n$.

Cuando tenemos una matriz cuadrada de orden n por n abreviamos y decimos sencillamente que es de *orden n* . Así, si decimos que una matriz es *de orden n* (y nada más) estamos indicando que es cuadrada.

Definición 1.14. A las matrices que no son cuadradas las denominamos *rectangulares*.

Recuerde: al expresar el orden de matrices rectangulares es necesario indicar el número de filas y columnas.

Definición 1.15 (Matriz simétrica). Decimos que la matriz \mathbf{A} es *simétrica* cuando $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$.

Así, $\mathbf{A}_{|j} = (\mathbf{A}^\top)_{|j} = {}_j\mathbf{A}$. Por tanto, toda matriz simétrica es necesariamente cuadrada. Y puesto que la “columna” j ésima es igual a la “fila” j ésima, sus componentes i ésimas son iguales: ${}_i\mathbf{A}_{|j} = {}_j\mathbf{A}_{|i}$.

Definición 1.16. Decimos que una matriz es *diagonal* cuando todos los componentes fuera de la diagonal principal son nulos, es decir, si $d_{ij} = 0$ cuando $i \neq j$.

Por ejemplo

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_{mm} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} f_{11} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & f_{22} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f_{mp} & 0 \end{bmatrix}; \quad \text{y} \quad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & g_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & g_{nn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

Fíjese que de las tres matrices diagonales, solo \mathbf{D} es cuadrada. Tenga en cuenta además, que los componentes de la diagonal principal pueden tomar cualquier valor. Así pues, ¡toda matriz nula $\mathbf{0}$ es diagonal! Además, toda matriz diagonal y cuadrada es simétrica, ya que por una parte

$${}_i\mathbf{D}_{|j} = \begin{cases} 0 & (i \neq j) \\ d_{ii} & (i = j) \end{cases}, \quad \text{y por otra} \quad {}_i(\mathbf{D}^\top)_{|j} = {}_j\mathbf{D}_{|i} = \begin{cases} 0 & (i \neq j) \\ d_{ii} & (i = j) \end{cases}; \quad \text{por tanto} \quad \mathbf{D}^\top = \mathbf{D}.$$

Definición 1.17. Llamamos matriz *identidad* (y la denotamos con \mathbf{I}) a la matriz cuadrada y diagonal cuyas componentes en la diagonal principal son unos y el resto de componentes son cero, es decir

$${}_i\mathbf{I}_{|j} = \begin{cases} 0 & (i \neq j) \\ 1 & (i = j) \end{cases}.$$

Por ejemplo, las matrices identidad de órdenes 2 y 1 son: $\mathbf{I}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{I}_{1 \times 1} = [1]$.

I(2)

matriz identidad de orden 2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nótese que las matrices identidad son simétricas (pues son cuadradas y diagonales).

1.5. Suma de matrices y producto de matrices por escalares

Definición 1.18 (suma de matrices). Definimos la suma de dos matrices \mathbf{A} y \mathbf{B} , de orden $m \times n$, como la matriz, del mismo orden, cuya columna j ésima es la suma de la columna j ésima de \mathbf{A} y la j ésima de \mathbf{B} :

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|j} = \mathbf{A}_{|j} + \mathbf{B}_{|j} \quad \text{para } j = 1 : n,$$

es decir, $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} (\mathbf{A}_{|1} + \mathbf{B}_{|1}) & \dots & (\mathbf{A}_{|n} + \mathbf{B}_{|n}) \end{bmatrix}$.

Definición 1.19 (producto de una matriz por un escalar). Definimos el producto de una matriz \mathbf{A} por un escalar λ como la matriz resultante de multiplicar las columnas de \mathbf{A} por el escalar λ :

$$(\lambda \mathbf{A})_{|j} = \lambda(\mathbf{A}_{|j}) \quad \text{para } j = 1 : n,$$

es decir, $\lambda \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda(\mathbf{A}_{|1}) & \dots & \lambda(\mathbf{A}_{|n}) \end{bmatrix}$.

Definición 1.20. Para cualquier λ decimos que $\lambda \mathbf{A}$ es un múltiplo de \mathbf{A} .



De nuevo la definición de las operaciones de suma y producto por un escalar convierten al operador “ $|j$ ” en un **operador lineal**; es decir, *distributivo* respecto a la suma de matrices

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|j} = \mathbf{A}_{|j} + \mathbf{B}_{|j}$$

y *asociativo* respecto al producto de una matriz por un escalar

$$(\lambda \mathbf{A})_{|j} = \lambda(\mathbf{A}_{|j}).$$

1.5.1. Propiedades de la suma de matrices y del producto por un escalar

La suma de matrices y producto de matrices por escalares verifican propiedades análogas a las de la Proposición 1.2.1; y su demostración es idéntica a la del Ejercicio 3...

EJERCICIO 6. Demuestre las propiedades de la siguiente proposición.

Proposición 1.5.1 (Propiedades de las operaciones entre matrices). Para cualesquiera matrices \mathbf{A} , \mathbf{B} y \mathbf{C} de idéntico orden y para cualesquiera escalares λ y η , se verifica que:

1. $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$.
2. $\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$.
3. $\mathbf{0} + \mathbf{A} = \mathbf{A}$.
4. $\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}$.
5. $\lambda(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \lambda \mathbf{A} + \lambda \mathbf{B}$.
6. $(\lambda + \eta)\mathbf{A} = \lambda \mathbf{A} + \eta \mathbf{A}$.
7. $\lambda(\eta \mathbf{A}) = (\lambda \eta)\mathbf{A}$.
8. $1\mathbf{A} = \mathbf{A}$.

Pista. Explote que el operador “ $|j$ ” es distributivo para la suma de matrices y asociativo para el producto por escalares. Use las *propiedades de las operaciones con vectores* de la Proposición 1.2.1, pues $\mathbf{A}_{|j}$, $\mathbf{B}_{|j}$ y $\mathbf{C}_{|j}$ son vectores de \mathbb{R}^n .

Nota 2. Estas ocho propiedades (de manera similar a las ocho propiedades de las operaciones con vectores de la Proposición 1.2.1) nos permitirán definir en el Tema 2 el espacio vectorial de matrices $\mathbb{R}^{m \times n}$.

1.5.2. Operaciones componente a componente

La mayoría de manuales definen la suma y el producto por escalares componente a componente:

“la suma de dos matrices \mathbf{A} y \mathbf{B} , del mismo orden, es la matriz que resulta de sumar los componentes de \mathbf{A} a los componentes de \mathbf{B} ”.

y

“el producto de una matriz \mathbf{A} por un escalar λ : es la matriz resultante de multiplicar los componentes de \mathbf{A} por el escalar λ ”.

EJERCICIO 7. Demuestre que las definiciones 1.18 y 1.19 implican que las operaciones de suma y producto por escalares se pueden calcular componente a componente:

$${}_i(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|j} = {}_i\mathbf{A}_{|j} + {}_i\mathbf{B}_{|j}, \quad \text{y} \quad {}_i(\lambda\mathbf{A})_{|j} = \lambda({}_i\mathbf{A}_{|j}); \quad \text{con } i = 1 : m, \quad \text{y} \quad j = 1 : n.$$

Es decir,

$$\begin{aligned} \mathbf{A} + \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (a_{11} + b_{11}) & (a_{12} + b_{12}) & \cdots & (a_{1n} + b_{1n}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_{m1} + b_{m1}) & (a_{m2} + b_{m2}) & \cdots & (a_{mn} + b_{mn}) \end{bmatrix}; \end{aligned}$$

y

$$\lambda\mathbf{A} = \lambda \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda(a_{11}) & \lambda(a_{12}) & \cdots & \lambda(a_{1n}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda(a_{m1}) & \lambda(a_{m2}) & \cdots & \lambda(a_{mn}) \end{bmatrix}.$$

1.5.3. La transposición es un operador lineal

Antes de operar por filas necesitamos demostrar las propiedades de linealidad de la transpuesta.¹⁰

EJERCICIO 8. Demuestre las siguientes proposiciones.

(a) **Proposición 1.5.2** (Transpuesta de un múltiplo). Sea \mathbf{A} entonces $(\lambda\mathbf{A})^\top = \lambda(\mathbf{A}^\top)$.

(b) **Proposición 1.5.3** (Transpuesta de una suma). Sean \mathbf{A} y \mathbf{B} entonces $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$.



Así pues, el operador transposición es un operador lineal.

1.5.4. Operaciones fila a fila

Y ahora veamos las operaciones por filas:

EJERCICIO 9. Demuestre que las definiciones 1.18 y 1.19 implican que se puede operar “por filas”, es decir:

$${}_i(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = {}_i\mathbf{A} + {}_i\mathbf{B}, \quad \text{y} \quad {}_i(\mathbf{A}\lambda) = ({}_i\mathbf{A})\lambda; \quad \text{donde } \mathbf{A} \text{ y donde } i = 1 : m.$$

¹⁰De la transposición ya solo nos falta demostrar que $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top\mathbf{A}^\top$, pero para ello antes tenemos que ver las definiciones de producto de un vector por una matriz \mathbf{aB} y producto de matrices \mathbf{AB} .



Por tanto el operador selector de *filas*, “ $i|$ ”, es **lineal**; es decir, *distributivo* respecto a la suma de matrices

$$i|(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = i|\mathbf{A} + i|\mathbf{B}$$

y *asociativo* respecto al producto de una matriz por un escalar

$$i|(\lambda \mathbf{A}) = \lambda(i|\mathbf{A}).$$

1.6. Extensión de la notación matricial y las reglas de reescritura

Si de nuevo aceptamos el producto de un escalar por el lado derecho, $\mathbf{A}\lambda = \lambda\mathbf{A}$; entonces logramos unas *reglas de reescritura* similares a las que obtuvimos en el caso de los vectores.



Reglas de re-escritura: como el operador selector de filas es lineal, podemos

- “*distribuir el operador*” entre sumandos

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|j} = \mathbf{A}_{|j} + \mathbf{B}_{|j} \quad \text{y} \quad i|(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = i|\mathbf{A} + i|\mathbf{B};$$

- “*desplazar los paréntesis*” para sacar un símbolo por un lado e introducir otro por el otro lado:

$$(\lambda \mathbf{A})_{|j} = \lambda(\mathbf{A}_{|j}) \quad \text{y} \quad (i|\mathbf{A})\lambda = i|(\mathbf{A}\lambda).$$

Y además también podemos

- “*intercambiar las posiciones del escalar y el selector*” dentro y fuera del paréntesis:

$$(\mathbf{A}_{|j})\lambda = (\mathbf{A}\lambda)_{|j} \quad \text{y} \quad i|(\lambda \mathbf{A}) = \lambda(i|\mathbf{A}).$$

Como las cuatro últimas expresiones de la mitad izquierda del anterior recuadro arrojan el mismo resultado (pese al distinto orden de ejecución de las operaciones) podemos omitir el paréntesis y escribir $\lambda\mathbf{A}_{|j}$. Y como las cuatro últimas expresiones de la mitad derecha del recuadro arrojan el mismo resultado (pese al distinto orden de ejecución de operaciones) también podemos omitir el paréntesis y escribir $\lambda i|\mathbf{A}$. Por motivos didácticos *en las demostraciones siempre usaré los paréntesis para aclarar qué regla o propiedad se aplica en cada paso*, pero lo más práctico es omitirlos si no son necesarios (*¡esa es la ventaja de la notación asociativa!*).¹¹

La Propiedad 1.5.2 sobre la “traspuesta de un múltiplo” (que volvemos a copiar como primer punto del recuadro de más abajo) junto a permitir multiplicar por la derecha, $\mathbf{A}\lambda = \lambda\mathbf{A}$; nos dota de otra regla de reescritura que nos permite intercambiar la posición entre el escalar y el símbolo de trasposición.

¹¹Pero recuerde que dada la precedencia establecida en la ejecución de las operaciones en Python, dicha ventaja desaparece en la librería NAcAL.



Reglas de re-escritura: podemos

- “*intercambiar las posiciones del escalar y el operador transposición*” dentro y fuera del paréntesis:

$$(\mathbf{A}^\top)\lambda = (\mathbf{A}\lambda)^\top.$$

Además, como **el operador transposición es lineal**, también podemos

- “*desplazar los paréntesis*” para sacar un símbolo por un lado e introducir otro por el otro lado:

$$(\lambda\mathbf{A})^\top = \lambda(\mathbf{A}^\top) \quad (\text{y que podemos escribir sencillamente como } \lambda\mathbf{A}^\top)$$

- “*distribuir el operador*” en una suma

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$$

Combinaciones lineales

2.1. Producto punto (o producto escalar usual en \mathbb{R}^n)

Antes de definir las combinaciones lineales, definamos el producto punto entre dos vectores de \mathbb{R}^n :

Definición 2.1. El *producto punto* $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ (o producto escalar usual en \mathbb{R}^n) de dos vectores \mathbf{a} y \mathbf{b} es

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + \cdots + a_nb_n = \sum_{i=1}^n a_ib_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{a}_{|i} \mathbf{b}_{|i}.$$

Este producto será muy importante en la segunda parte del curso para definir la ortogonalidad. Pero su introducción en este momento nos permitirá dotar de propiedades muy potentes a la notación del producto de matrices con vectores, además de lograr demostraciones mucho más “limpias” (pues en lugar de sumatorios podremos usar productos punto) y con pasos más sencillos (tan solo habrá que aplicar repetidamente la linealidad tanto del producto punto como del operador selector).

```
a = Vector( (1, 2, 3, 4) )
b = Vector( (1,-1, 1,-1) )
a * b          # producto punto entre los vectores a y b
```

Librería NAcAL para Python

−2

Propiedades del producto punto

El producto punto (o producto escalar usual de \mathbb{R}^n) satisface los siguientes axiomas para cualesquiera vectores \mathbf{x} , \mathbf{y} y \mathbf{z} de \mathbb{R}^n y para cualquier escalar a de \mathbb{R} .

EJERCICIO 10. Demuestre que el producto punto cumple con los siguientes axiomas:

- (a) **Simetría:** $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$
- (b) **Linealidad respecto al primer argumento:**
 - 1. $(a\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = a(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})$
 - 2. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{z} + \mathbf{y} \cdot \mathbf{z}$
- (c) **Positivo:** $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \geq 0$
- (d) **Definido:** $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = 0$.

Fíjese que como el producto punto es simétrico, también es lineal en el segundo argumento

$$\begin{aligned}\mathbf{x} \cdot (a\mathbf{y}) &= (a\mathbf{y}) \cdot \mathbf{x} = a(\mathbf{y} \cdot \mathbf{x}) = a(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}); \\ \mathbf{x} \cdot (\mathbf{y} + \mathbf{z}) &= (\mathbf{y} + \mathbf{z}) \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{z} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{z}\end{aligned}$$

y además se verifica que $\mathbf{x} \cdot (a\mathbf{y}) = (a\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y}$.

Caso especial 1 (Producto punto de un vector por una fila (o columna) de \mathbf{I}). Al multiplicar un vector de \mathbb{R}^n por la fila (o columna) i ésima de la matriz identidad de orden n , se *selecciona la componente i ésima del vector*, $({}_i\mathbf{I}) \cdot \mathbf{x} = {}_i\mathbf{x}$:

$$({}_i\mathbf{I}) \cdot \mathbf{x} = 0x_1 + 0x_2 + \cdots + 1x_i + \cdots + 0x_n = x_i = {}_i\mathbf{x}.$$

2.2. Producto de una matriz por un vector (a su derecha)

2.2.1. Combinación lineal de vectores

Hay una operación *muy importante* (¡la más importante de todas las que veamos en este curso!): la suma de múltiplos de vectores. Por ejemplo

$$3\mathbf{a} + \mathbf{b} - 7\mathbf{c} + 2\mathbf{d}$$

donde 3, 1, -7 y 2 son los coeficientes. Es una operación tan importante que tiene nombre propio:

Definición 2.2 (Combinación lineal de vectores de \mathbb{R}^n). Sean los vectores $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$. Llamamos *combinación lineal* a cualquier suma de múltiplos de dichos vectores:

$$a_1\mathbf{b}_1 + a_2\mathbf{b}_2 + \cdots + a_n\mathbf{b}_n$$

donde los números “ a_i ” son los *coeficientes* de la combinación lineal.

EJERCICIO 11. Sean los vectores

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{z} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Compruebe que la combinación lineal $2\mathbf{x} + 2\mathbf{y} + 2\mathbf{z}$ es el vector nulo.

Ejemplo 1. Nótese que todo vector \mathbf{a} de \mathbb{R}^n es combinación lineal de las columnas de $\mathbf{I}_{n \times n}$, pues

$$({}_1\mathbf{I}_1)a_1 + \cdots + ({}_n\mathbf{I}_1)a_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} a_1 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} a_2 + \cdots + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} a_n = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ a_2 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \mathbf{a}.$$

2.2.2. Producto de una matriz por un vector

El producto de una matriz por un vector a su derecha, $\mathbf{A}\mathbf{b}$, es una combinación lineal de las columnas de la matriz. Para recordarlo, *escribiremos el vector de la derecha en forma de columna*. Llamaremos a esta operación *combinación lineal de las columnas de \mathbf{A}* o *producto de una matriz por un vector a su derecha*.

Definición 2.3 (matriz por un vector a su derecha). El producto de $\mathbf{A}_{m \times n}$ por un vector $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ a su derecha es la *combinación lineal de las n columnas* de \mathbf{A} cuyos coeficientes son los componentes de \mathbf{b} :

$$\mathbf{A}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} b_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} b_2 + \cdots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} b_n. \quad (2.1)$$

O expresado de forma alternativa: $\mathbf{A}\mathbf{b} = ({}_1\mathbf{A}_1)b_1 + ({}_2\mathbf{A}_1)b_2 + \cdots + ({}_n\mathbf{A}_1)b_n$.

Fíjese que el número de columnas de la matriz \mathbf{A} *debe ser igual* al número de componentes del vector \mathbf{b} (¡una componente de \mathbf{b} por cada columna de \mathbf{A} para poder expresar la suma de múltiplos de las columnas!)

```
A = Matrix( [ Vector([1,1,1]), Vector([1,0,1]), Vector([-2,2,1]) ] )
b = Vector( [1,2,-3] )
A*b
```

$$\mathbf{A}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

EJERCICIO 12. Escriba como producto de una matriz por un vector la combinación lineal del ejercicio 11.

Y ahora veamos un par de casos especialmente sencillos:

Caso especial 2 (Producto de una matriz identidad por un vector). *Ahora podemos expresar el producto del Ejemplo 1 de manera mucho más compacta*

$$\mathbf{I}\mathbf{a} = \mathbf{a}.$$

(es decir, todo vector de \mathbb{R}^n es combinación lineal de las columnas de la matriz identidad de orden n)

Caso especial 3 (Producto de una matriz por una columna de \mathbf{I}). *Por otra parte, de la Definición 2.3 resulta evidente que*

$$\mathbf{A}(\mathbf{I}_{|j}) = \mathbf{A}_{|j}$$

es decir, multiplicar \mathbf{A} por la columna j ésima de la identidad es lo mismo que seleccionar su columna j ésima.

EJERCICIO 13. Demuestre que $\mathbf{A}(\mathbf{I}_{|j}) = \mathbf{A}_{|j}$.

Pues bien, hay una estrecha relación entre el producto $\mathbf{A}\mathbf{b}$ y los productos punto de \mathbf{b} y las filas de \mathbf{A} :

EJERCICIO 14. Demuestre que la componente i ésima del vector $\mathbf{A}\mathbf{b}$ es el producto punto $({}_i\mathbf{A}) \cdot \mathbf{b}$:

$${}_i(\mathbf{A}\mathbf{b}) = ({}_i\mathbf{A}) \cdot \mathbf{b} \quad \text{donde } i = 1 : m.$$

```
2 | (A*b) == (2|A)*b # ¿son iguales?
```

```
True
```



Hemos visto que la operación **MATRIZ** (de orden $m \times n$) por un **vector** (de n componentes) es un **vector** formado por una suma de múltiplos de las n columnas:

$$\mathbf{A}\mathbf{b} = (\mathbf{A}_{|1})b_1 + (\mathbf{A}_{|2})b_2 + \cdots + (\mathbf{A}_{|n})b_n \in \mathbb{R}^m.$$

A un vector que es suma de múltiplos de vectores se le llama **combinación lineal**. Por tanto $\mathbf{A}\mathbf{b}$ es una **combinación lineal de las columnas** de \mathbf{A} .

También hemos visto que ${}_i(\mathbf{A}\mathbf{b}) = ({}_i\mathbf{A}) \cdot \mathbf{b}$, que $\mathbf{I}\mathbf{a} = \mathbf{a}$ y que $\mathbf{A}(\mathbf{I}_{|j}) = \mathbf{A}_{|j}$.

2.2.3. Propiedades del producto de una matriz por un vector a su derecha

El producto de una matriz por un vector posee dos importantísimas propiedades: las *propiedades de linealidad*. La primera respecto a la suma de vectores, $\mathbf{A}(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{A}\mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{c}$, y la segunda respecto al producto por un escalar, $\mathbf{A}(\lambda\mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{b})$. Veámoslo.

EJERCICIO 15. Demuestre las siguientes proposiciones (inténtelo primero sin mirar las pistas).

(a) **Proposición 2.2.1.** Sea la matriz \mathbf{A} $m \times n$ y los vectores \mathbf{b} y \mathbf{c} de \mathbb{R}^n , entonces: $\mathbf{A}(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{A}\mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{c}$.

Pista. Demuestre que ambos vectores son iguales componente a componente, es decir, que $_{i1}(\mathbf{A}(\mathbf{b} + \mathbf{c}))$ es igual a $_{i1}(\mathbf{A}\mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{c})$. Para ello emplee que cada componente es un producto punto y que los productos escalares también son lineales en el segundo argumento. Use también que el operador selector es lineal.

(b) **Proposición 2.2.2.** Sea la matriz \mathbf{A} $m \times n$, el vector \mathbf{b} de \mathbb{R}^n y el escalar λ , entonces: $\mathbf{A}(\lambda\mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{b})$.

Pista. Siga la misma estrategia que en el apartado anterior.

El producto de una matriz por un vector es un **operador lineal**; es decir, *distributivo* respecto a la suma de vectores

$$\mathbf{A}(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{A}\mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{c}.$$

y *asociativo* respecto al producto de un vector por un escalar

$$\mathbf{A}(\lambda\mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{b}).$$

EJERCICIO 16. Demuestre el siguiente corolario (inténtelo primero sin mirar las pistas).

Corolario 2.2.3. Sea la matriz \mathbf{A} $p \times m$, la matriz \mathbf{B} $m \times n$, y el vector \mathbf{c} de \mathbb{R}^n , entonces:

$$\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{c}) = \begin{bmatrix} \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|1}), & \dots, & \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|n}) \end{bmatrix} \mathbf{c},$$

donde $\mathbf{B}_{|i}$ es la i ésima columna de \mathbf{B} .

Pista. Comience con la expresión de la izquierda. Expresé el producto dentro de paréntesis como una combinación lineal de columnas (Definición 2.3) y aplique las propiedades de linealidad (proposiciones 2.2.1 y 2.2.2) y de nuevo la Definición 2.3 para obtener la expresión de la derecha de la igualdad.

Para terminar la sección, añadamos dos proposiciones más...la primera se parece a la Proposición 2.2.2 pero no es igual (fíjese en la posición de los paréntesis del lado derecho de las igualdades).

EJERCICIO 17. Demuestre las siguientes proposiciones (inténtelo sin mirar las pistas).

(a) **Proposición 2.2.4.** Sea la matriz \mathbf{A} $m \times n$, el vector \mathbf{b} de \mathbb{R}^n y el escalar λ , entonces: $\mathbf{A}(\lambda\mathbf{b}) = (\lambda\mathbf{A})\mathbf{b}$.

Pista. Recuerde que el producto punto es lineal en el primer argumento: $\mathbf{x} \cdot (\lambda\mathbf{y}) = (\lambda\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y}$.

(b) **Proposición 2.2.5.** Sean las matrices \mathbf{A} $m \times n$ y \mathbf{B} $m \times n$ y el vector \mathbf{c} de \mathbb{R}^n entonces: $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{c} = \mathbf{A}\mathbf{c} + \mathbf{B}\mathbf{c}$.

Más reglas de reescritura.

De las proposiciones 2.2.2 y 2.2.4 se deduce que

$$(\lambda\mathbf{A})\mathbf{b} = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{b})$$

y por tanto no son necesarios los paréntesis. Así que sin ninguna ambigüedad podemos escribir:

$$\lambda\mathbf{A}\mathbf{b} = \mathbf{A}\lambda\mathbf{b}.$$

Observe además que (como aceptamos que el escalar multiplique a los vectores y matrices por la derecha) el escalar puede aparecer en cualquier lugar, lo único que se mantiene invariante es la posición relativa del vector respecto de la matriz, pues siempre está a su derecha): $\lambda \mathbf{A} \mathbf{b} = \mathbf{A} \lambda \mathbf{b} = \mathbf{A} \mathbf{b} \lambda$.



Hemos visto varias propiedades que cumple la operación **MATRIZ** por **vector**

Propiedades de linealidad

- $\mathbf{A}(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{A}\mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{c}$
- $\mathbf{A}(\lambda \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{b})$

Otras propiedades

- $\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{c}) = \left[\mathbf{A}(\mathbf{B}_{|1}), \dots, \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|n}) \right] \mathbf{c}$
- $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{c} = \mathbf{A}\mathbf{c} + \mathbf{B}\mathbf{c}$
- $(\lambda \mathbf{A})\mathbf{b} = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{b})$

2.3. Producto de un vector por una matriz (vector a la izquierda)



Hasta aquí hemos visto que matriz por vector ($\mathbf{A}\mathbf{b}$) es una **combinación lineal de las columnas de la matriz**.

A continuación veremos que vector por matriz ($\mathbf{a}\mathbf{B}$) es una **combinación lineal de las filas de la matriz** (con propiedades análogas).

Definición 2.4 (producto de un vector por una matriz). *El producto de un vector $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^m$ que multiplica por la izquierda a una matriz \mathbf{B} de m filas es la **combinación lineal de las m filas de \mathbf{B}** cuyos coeficientes son los componentes de \mathbf{a} :*

$$\mathbf{a}\mathbf{B} = (\mathbf{B}^\top) \mathbf{a}$$

Puesto que el producto $\mathbf{a}\mathbf{B}$ es una combinación lineal de las filas de \mathbf{B} , dicho producto es un vector de \mathbb{R}^n .

Para recordar que estamos operando con las filas de \mathbf{B} , escribiremos \mathbf{a} en forma de fila (en horizontal):

$$\mathbf{a}\mathbf{B} = (a_1, a_2, \dots, a_m) \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{bmatrix} = a_1(\mathbf{B}_{|1}) + \dots + a_m(\mathbf{B}_{|m}) \in \mathbb{R}^n.$$

```
print( b*A == (~A)*b )
b*A
```

True

(0, -2, -1)

Librería NAcAL para Python

Cada componente j ésima del vector $\mathbf{a}\mathbf{B}$ es el producto punto entre \mathbf{a} y la columna j ésima de \mathbf{B} :

$$(\mathbf{a}\mathbf{B})_{|j} = \left((\mathbf{B}^\top) \mathbf{a} \right)_{|j} = \left((\mathbf{B}^\top) \mathbf{a} \right) \cdot \mathbf{e}_j = (\mathbf{B}_{|j}^\top) \cdot \mathbf{a} = (\mathbf{B}_{|j}) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{B}_{|j}), \quad \text{donde } j = 1 : n.$$

```
print( (b*A)|3 == b*(A|3) )
b*(A|3)
```

True

-1

2.3.1. Propiedades del producto de un vector por una matriz

EJERCICIO 18. Demuestre las siguientes propiedades del producto \mathbf{aB} .

- (a) Sea el vector \mathbf{a} de m componentes y la matriz $\mathbf{I}_{m \times m}$, entonces: $\mathbf{aI} = \mathbf{a}$.

Pista. Recuerde que como \mathbf{I} es simétrica, $\mathbf{I}^T = \mathbf{I}$.

- (b) Sea $(_i\mathbf{I})$ la fila i -ésima de $\mathbf{I}_{m \times m}$ y la matriz $\mathbf{A}_{m \times n}$, entonces: $(_i\mathbf{I})\mathbf{A} = _i\mathbf{A}$.

Pista. Recuerde el caso especial 3 en la página 25 y que como \mathbf{I} es simétrica, $\mathbf{I}_{|i} = _i\mathbf{I}$.

- (c) Sean \mathbf{a} y \mathbf{b} vectores de \mathbb{R}^m y sea la matriz $\mathbf{C}_{m \times n}$, entonces: $(\mathbf{a} + \mathbf{b})\mathbf{C} = \mathbf{aC} + \mathbf{bC}$

Pista. (*) Recuerde la Proposición 2.2.1 y recuerde que $\mathbf{vA} = (\mathbf{A}^T)\mathbf{v}$.

- (d) Sea el escalar λ , el vector \mathbf{a} de \mathbb{R}^m y sea la matriz $\mathbf{B}_{m \times n}$, entonces: $(\lambda\mathbf{a})\mathbf{B} = \lambda(\mathbf{aB})$

Pista. (*) Recuerde la Proposición 2.2.2

- (e) Sean \mathbf{a} un vector de \mathbb{R}^m y λ un escalar; y sea la matriz $\mathbf{B}_{m \times n}$, entonces: $\mathbf{a}(\lambda\mathbf{B}) = (\lambda\mathbf{a})\mathbf{B}$.

Pista. (*) Recuerde la Proposición 2.2.4

- (f) Sean \mathbf{a} un vector de \mathbb{R}^m , y las matrices \mathbf{B} y \mathbf{C} de orden m por n , entonces: $\mathbf{a}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{aB} + \mathbf{aC}$.

Pista. (*) Recuerde la Proposición 2.2.5.



El producto de un **vector** (de m componentes) por una **MATRIZ** (de orden $m \times n$) es una **combinación lineal de las m filas** de \mathbf{B} :

$$\mathbf{aB} = a_1(_1\mathbf{B}) + \cdots + a_m(_m\mathbf{B}) \in \mathbb{R}^n.$$

Cada componente del vector \mathbf{aB} se puede expresar como un producto punto:

$$(\mathbf{aB})_{|j} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{B}_{|j}), \quad \text{donde } j = 1 : n.$$

El producto \mathbf{aB} tiene propiedades análogas a las del producto \mathbf{Ab} .

- $\mathbf{aI} = \mathbf{a}$
- $(_i\mathbf{I})\mathbf{A} = _i\mathbf{A}$;

Propiedades de linealidad

- $(\mathbf{a} + \mathbf{b})\mathbf{C} = \mathbf{aC} + \mathbf{bC}$
- $(\lambda\mathbf{a})\mathbf{B} = \lambda(\mathbf{aB})$

Otras propiedades

- $\mathbf{a}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{aB} + \mathbf{aC}$
- $\mathbf{a}(\lambda\mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{aB})$

Multiplicación matricial

3.1. Producto de matrices

Definición 3.1 (producto de matrices (por columnas)). Sean \mathbf{A} y \mathbf{B} , definimos la matriz producto (\mathbf{AB}) como aquella matriz cuya columna j -ésima es el producto de \mathbf{A} por la columna j -ésima de \mathbf{B} :

$$(\mathbf{AB})_{|j} = \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|j}).$$

Es decir, las columnas de \mathbf{AB} son combinaciones lineales de las columnas de \mathbf{A} (y los coeficientes de cada combinación son los componentes de cada una de las columnas de \mathbf{B}).

$$\mathbf{AB} \equiv [\mathbf{A}(\mathbf{B}_{|1}), \dots, \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|n})].$$

Ejemplo 2. Si $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ entonces

$$\mathbf{AB} = [\mathbf{A}(\mathbf{B}_{|1}); \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|2})] = \left[\begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -3 \end{pmatrix} \right] = \begin{bmatrix} -3 & 6 \\ -3 & -3 \\ 6 & -3 \end{bmatrix};$$

nótese que calculamos multiplicando \mathbf{A} por cada columna de \mathbf{B} .¹

Deduzcamos algunas propiedades que verifica el producto de matrices...

EJERCICIO 19. Demuestre las siguientes proposiciones.

(a) **Proposición 3.1.1.** Sean \mathbf{A} y \mathbf{B} , y un vector \mathbf{c} de \mathbb{R}^n , entonces $\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{c}) = (\mathbf{AB})\mathbf{c}$.

(b) **Proposición 3.1.2** (El producto de matrices es asociativo). Sean las matrices \mathbf{A} , \mathbf{B} y \mathbf{C} , entonces

$$\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}.$$

Nota importante respecto al operador “ $|j$ ”, el producto de matrices y la asociatividad: La definición de producto matricial mantiene la *asociatividad* del operador “ $|j$ ”, **POR LO QUE NO NECESITAMOS PARÉNTESIS**. Así, $\mathbf{AB}_{|j}$ se refiere indistintamente a la columna j -ésima del producto $(\mathbf{AB})_{|j}$, o al producto de \mathbf{A} por $\mathbf{B}_{|j}$ (i.e., la columna j -ésima), $\mathbf{A}(\mathbf{B}_{|j})$. Y puesto que $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$; también el producto de matrices es asociativo y por tanto podemos escribir sencillamente \mathbf{ABC} .

¹Si conoce otro método para calcular el producto, no lo emplee por el momento. AHORA ES MUY IMPORTANTE que se acostumbre a considerar las columnas de \mathbf{AB} como combinaciones de las columnas de \mathbf{A} .



Hemos definido producto (\mathbf{AB}) de las matrices \mathbf{A} y \mathbf{B} como aquella matriz cuya columna j ésima es el producto de \mathbf{A} por la columna j ésima de \mathbf{B}

$$(\mathbf{AB})_{|j} = \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|j}).$$

Por tanto las columnas de \mathbf{AB} son combinaciones lineales de las columnas de \mathbf{A} .

¡De nuevo nótese la asociatividad de la notación en la definición del producto!

El producto solo está definido si la primera matriz tiene tantas columnas como filas tiene la segunda.

EJERCICIO 20. Demuestre las siguientes proposiciones.

- (a) **Proposición 3.1.3.** Sean las matrices \mathbf{A} , \mathbf{B} y \mathbf{C} , entonces $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC}$.
- (b) **Proposición 3.1.4.** Sean las matrices \mathbf{A} , \mathbf{B} y \mathbf{C} , entonces $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$.
- (c) **Proposición 3.1.5.** Sean las matrices \mathbf{A} , \mathbf{B} y el escalar λ , entonces $\mathbf{A}(\lambda\mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{AB}) = (\lambda\mathbf{A})\mathbf{B}$.

Pista. Recuerde que $\mathbf{A}(\lambda\mathbf{b}) \begin{cases} = \lambda(\mathbf{Ab}) \\ = (\lambda\mathbf{A})\mathbf{b} \end{cases}$; (Proposiciones 2.2.2 y 2.2.4 de la Página 26).

- (d) **Proposición 3.1.6.** Sean la matriz identidad \mathbf{I} de orden m y la matriz \mathbf{A} , entonces $\mathbf{IA} = \mathbf{A}$.

Pista. Recuerde que $\mathbf{I}\mathbf{a} = \mathbf{a}$ (Caso Especial 2 en la página 25).

- (e) **Proposición 3.1.7.** Sean la matriz \mathbf{A} y la matriz identidad \mathbf{I} de orden n , entonces $\mathbf{AI} = \mathbf{A}$.

Pista. Recuerde que $\mathbf{A}(\mathbf{I}_{|j}) = \mathbf{A}_{|j}$ (Caso Especial 3 en la página 25).

Muy muy importante: hay que subrayar que no todas las propiedades de las matrices replican las propiedades de los números que usted conoce: por ejemplo, en general \mathbf{AB} es distinto de \mathbf{BA} .² Por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por otra parte: entre los escalares si $\lambda^2 = \lambda$ entonces λ es necesariamente 0 o 1; pero con las matrices $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ no implica que la matriz \mathbf{A} sea cero $\mathbf{0}$ o la identidad \mathbf{I} . Por ejemplo, si $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ entonces $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$.

En los escalares si $\lambda^2 = 0$ entonces λ es necesariamente 0, pero tampoco esto es cierto con las matrices. Por ejemplo, para $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{B}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

²para que ambos productos estén definidos es necesario que ambas matrices sean cuadradas y del mismo orden.



El producto de matrices verifica las siguientes propiedades:

- $\mathbf{A}(\mathbf{B}c) = (\mathbf{A}\mathbf{B})c$
- $\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{C}) = (\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C}$
- $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{C} + \mathbf{B}\mathbf{C}$
- $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A}\mathbf{B} + \mathbf{A}\mathbf{C}$
- $\mathbf{A}(\lambda\mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{B}) = (\lambda\mathbf{A})\mathbf{B}$
- $\mathbf{I}\mathbf{A} = \mathbf{A}$
- $\mathbf{A}\mathbf{I} = \mathbf{A}$

Pese a las dos últimas propiedades, en general $\mathbf{A}\mathbf{B} \neq \mathbf{B}\mathbf{A}$.

Por tanto...



El producto de matrices es un **operador lineal**; pues es *distributivo* respecto a la suma de matrices

$$\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A}\mathbf{B} + \mathbf{A}\mathbf{C}.$$

y *asociativo* respecto al producto de una matriz por un escalar

$$\mathbf{A}(\lambda\mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{B}).$$

Y también es lineal por la izquierda, pues

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{C} + \mathbf{B}\mathbf{C} \quad \text{y} \quad (\lambda\mathbf{A})\mathbf{B} = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{B}).$$

3.1.1. Otras dos formas de calcular el producto de matrices

Aplicando las propiedades que ya conocemos, es sencillo deducir otras formas de calcular el producto de matrices; y así completar la visión del producto de matrices (la primera forma de calcular el producto seguramente le resultará familiar...).

Cálculo del producto de matrices componente a componente (filas por columnas)

EJERCICIO 21. Demuestre la siguiente proposición:

Proposición 3.1.8 (Cálculo del producto componente a componente). Sean las matrices \mathbf{A} , \mathbf{B} , entonces:

$m \times p$ $p \times n$

$${}_i(\mathbf{A}\mathbf{B})_{|j} = ({}_i\mathbf{A}) \cdot (\mathbf{B}_{|j})$$

Verifíquelo con el producto del Ejemplo 2 en la página 29 (hágalo a mano y con la librería **NACAL**).

Pero hay más formas de calcular el producto...

Cálculo del producto de matrices operando con las filas

EJERCICIO 22. Demuestre la siguiente proposición:

Proposición 3.1.9. Sean \mathbf{A} y \mathbf{B} , entonces:

$m \times p$ $p \times n$

$${}_i(\mathbf{A}\mathbf{B}) = ({}_i\mathbf{A})\mathbf{B}.$$

Pista. Recuerde que $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{B}_{|j}) = (\mathbf{aB})_{|j}$, para $j = 1 : n$.

Verifíquelo con el producto del Ejemplo 2 en la página 29 (hágalo a mano y con la librería **NAL**).

Por tanto, las filas de \mathbf{AB} son combinaciones lineales de las filas de \mathbf{B} .



Explotando el producto punto hemos obtenido otras dos formas de calcular \mathbf{AB} .

La primera alternativa calcula el producto componente a componente usando el *producto punto*.

$$({}_{i|}(\mathbf{AB}))_{|j} = ({}_{i|}\mathbf{A}) \cdot (\mathbf{B}_{|j}).$$

La segunda alternativa calcula el producto fila a fila:

$$({}_{i|}(\mathbf{AB})) = ({}_{i|}\mathbf{A})\mathbf{B},$$

de manera que las filas de \mathbf{AB} son combinaciones lineales de las filas de \mathbf{B} .

3.1.2. Nuevas reglas de reescritura.

Realmente no es necesario escribir el “punto” en los productos

$$({}_{i|}\mathbf{A}) \cdot \mathbf{b}, \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{B}_{|j}), \quad ({}_{i|}\mathbf{A}) \cdot (\mathbf{B}_{|j})$$

(como tampoco lo es en el producto $2 \cdot \mathbf{x}$). Si omitimos el “punto”, recuperamos la asociatividad

$$({}_{i|}(\mathbf{Ab})) = ({}_{i|}\mathbf{A})\mathbf{b}$$

$$(\mathbf{aB})_{|j} = \mathbf{a}(\mathbf{B}_{|j})$$

$$({}_{i|}(\mathbf{AB}))_{|j} = {}_{i|}((\mathbf{AB})_{|j}) = {}_{i|}(\mathbf{A}(\mathbf{B}_{|j})) = ({}_{i|}\mathbf{A})(\mathbf{B}_{|j}).$$

Por tanto podemos escribir sin ambigüedad las siguientes expresiones:

$${}_{i|}\mathbf{Ab} \quad ; \quad \mathbf{aB}_{|j} \quad ; \quad {}_{i|}\mathbf{AB}_{|j}$$

pues arrojan el mismo resultado si se interpretan como selección de un componente o como un producto punto.

Transpuesta de un producto

Para finalizar esta lección demuestre la siguiente propiedad de la transposición que usaremos a menudo:

EJERCICIO 23. Recordando que $(\mathbf{A}^\top)_{|j} = {}_{j|}\mathbf{A}$ y que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$; demuestre que

$$(\mathbf{AB})^\top = (\mathbf{B}^\top)(\mathbf{A}^\top).$$

Por tanto, para toda matriz \mathbf{A} se verifica que las matrices $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ y $\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top)$ son simétricas:

$$(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})^\top = \mathbf{A}^\top(\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}^\top\mathbf{A}; \quad \text{y} \quad (\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top))^\top = (\mathbf{A}^\top)^\top(\mathbf{A}^\top) = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top).$$



En próximas lecciones trabajaremos con matrices por bloques. De ello tratan los siguientes apéndices

pero por el momento puede saltarse las Secciones 3.A y 3.B

Apéndices a la lección

3.A. Submatrices mediante selección de una lista de índices

Sea \mathbf{I} de orden n y sea α una lista de índices menores o iguales a n , por ejemplo, $n \geq 4$ y $\alpha = (2, 3, 4)$. Definimos $\mathbf{I}_{|\alpha}$ como la matriz (de n filas y tantas columnas como el número de elementos de la lista) cuyas columnas son las columnas de \mathbf{I} (de orden n) indicadas en la lista. Por ejemplo

$$\mathbf{I}_{|(2,3,4)} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{|2} & \mathbf{I}_{|3} & \mathbf{I}_{|4} \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{|4} & \mathbf{I}_{|2} & \mathbf{I}_{|3} \end{bmatrix} = \mathbf{I}_{|(4,2,3)}.$$

Y definimos $\alpha|\mathbf{I}$ como: $\alpha|\mathbf{I} = (\mathbf{I}_{|\alpha})^\top$.

Selección de una submatriz por filas o por columnas Ahora con ayuda del producto de matrices podemos definir dos nuevas operaciones. Sea α una lista de índices, entonces podemos seleccionar una lista de columnas (o filas) de una matriz \mathbf{A} para construir una submatriz:

$$\mathbf{A}_{|\alpha} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{|\alpha}), \quad \text{y} \quad \alpha|\mathbf{A} = (\alpha|\mathbf{I})\mathbf{A}.$$

Consideremos de nuevo la matriz **PIB** de la Página 10. La submatriz con las filas de 2 a 4 de **PIB** (datos de Francia, Alemania y Reino Unido) o la submatriz con sus dos primeras columnas (años 2003 y 2004) son

$${}_{(2,3,4)}\mathbf{PIB} = \begin{bmatrix} 0.9 & 2.0 & 1.6 & 2.0 \\ -0.2 & 1.1 & 0.7 & 0.9 \\ 2.5 & 3.2 & 1.9 & 1.5 \end{bmatrix}; \quad \text{y} \quad \mathbf{PIB}_{|(1,2)} = \begin{bmatrix} 2.9 & 3.1 \\ 0.9 & 2.0 \\ -0.2 & 1.1 \\ 2.5 & 3.2 \\ 1.8 & 3.1 \end{bmatrix}.$$

Y podemos crear submatrices seleccionando simultáneamente filas y columnas; si β es otra lista de índices:

$$\alpha|(\mathbf{A}_{|\beta}) = (\alpha|\mathbf{I})\mathbf{A}(\mathbf{I}_{|\beta}) = (\alpha|\mathbf{A})_{|\beta},$$

que, aprovechando la asociatividad, podemos escribir sencillamente como: $\alpha|\mathbf{A}_{|\beta}$.

Así, la submatriz con los datos de Francia, Alemania y Reino Unido de los años 2003 y 2004 es

$${}_{(2,3,4)}\mathbf{PIB}_{|(1,2)} = \begin{bmatrix} 0.9 & 2.0 \\ -0.2 & 1.1 \\ 2.5 & 3.2 \end{bmatrix}.$$

Nótese que

$$(\alpha|\mathbf{A})(\mathbf{B}_{|\beta}) = (\alpha|\mathbf{I})\mathbf{A}\mathbf{B}(\mathbf{I}_{|\beta}) = \alpha|(\mathbf{AB})_{|\beta},$$

y en particular

$$(\mathbf{AB})_{|\beta} = \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|\beta}) \quad \text{y} \quad \alpha|(\mathbf{AB}) = (\alpha|\mathbf{A})\mathbf{B};$$

por lo que podemos escribir sencillamente: $\alpha|(\mathbf{AB})_{|\beta}$. Y también se verifica que

$$\alpha|(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|\beta} = \alpha|\mathbf{A}_{|\beta} + \alpha|\mathbf{B}_{|\beta} \quad \text{y} \quad \lambda(\alpha|\mathbf{A}_{|\beta}) = \alpha|(\lambda\mathbf{A})_{|\beta}. \quad (3.1)$$

3.B. Matrices particionadas

Recuerde que si $p \leq q \in \mathbb{N}$, entonces $(p : q)$ denota la secuencia $p, p+1, \dots, q$. Ahora considere la matriz

$$\mathbf{B} = \begin{matrix} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ 5 \times 6 & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 & 4 \end{bmatrix} & , \end{matrix}$$

junto con la siguiente partición de los índices de las filas: por una parte los índices correspondientes a las tres primeras filas, $(1 : 3)$, y por otra los correspondientes a las dos últimas, $(4 : 5)$. Considere además la siguiente partición de los índices de las columnas: los índices correspondientes a las cuatro primeras columnas por una parte, $(1 : 4)$, y los de las dos últimas por otra, $(5 : 6)$. Con dichas particiones de índices podemos partir la matriz en 4 bloques:

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ \hline 3 & 3 & 3 & 3 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 & 4 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} (1:3)|\mathbf{B}|(1:4) & (1:3)|\mathbf{B}|(5:6) \\ \hline (4:5)|\mathbf{B}|(1:4) & (4:5)|\mathbf{B}|(5:6) \end{array} \right];$$

donde

$$\begin{aligned} (1:3)|\mathbf{B}|(1:4) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, & (1:3)|\mathbf{B}|(5:6) &= \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \\ (4:5)|\mathbf{B}|(1:4) &= \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}, & (4:5)|\mathbf{B}|(5:6) &= \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Así, al cruzar una matriz con líneas que van de lado a lado o de arriba a abajo, delimitamos los bloques o particiones (i.e., submatrices dentro de una matriz). Denotaremos las *matrices particionadas* con: \mathcal{A} , \mathcal{B} , \mathcal{C} , etc. pues al ser objetos distintos necesitamos una grafía diferente para distinguirlas de las matrices.³

Nótese que dos bloques adyacentes, uno a la derecha del otro, comparten la misma lista de filas; y que dos bloques adyacentes, uno encima del otro, comparten la misma lista de columnas.

Una notación más compacta para particionar una matriz. Con un conjunto de índices vamos a indicar por debajo de qué filas pintamos una línea horizontal (si particionamos por filas), y a la derecha de qué columnas pintamos una línea vertical (si particionamos por columnas). De este modo, la matriz particionada del ejemplo de más arriba se puede expresar del siguiente modo:

$$\mathcal{B} = \{3\}|\mathbf{B}|\{4\} = \left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ \hline 3 & 3 & 3 & 3 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 & 4 \end{array} \right]$$

Librería NAcAL para Python

```
a = Vector( [1,1,1,3,3] )
b = Vector( [2,2,2,4,4] )
B = Matrix( [a,a,a,a,b,b] )
{3}|B|{4}
```

³de hecho, para distinguir una matriz particionada en un único bloque \mathcal{A} , de una matriz \mathbf{A} , la librería NAcAL dibuja un recuadro alrededor para indicar que la matriz está particionada: $\mathcal{A} = \boxed{\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}}$.

Una misma matriz admite distintas particiones. Y con esta notación es sencillo describirlas; por ejemplo:

$$\mathcal{B}' = {}_{\{1\}}\mathbf{B}_{|\{1,4\}} = \left[\begin{array}{c|cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 & 4 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c|c} {}_{(1,)}\mathbf{B}_{|(1,)} & {}_{(1,)}\mathbf{B}_{|(2:4)} & {}_{(1,)}\mathbf{B}_{|(5:6)} \\ \hline {}_{(2:5)}\mathbf{B}_{|(1,)} & {}_{(2:5)}\mathbf{B}_{|(2:4)} & {}_{(2:5)}\mathbf{B}_{|(5:6)} \end{array} \right],$$

donde ahora

$$\begin{aligned} {}_{(1,)}\mathbf{B}_{|(1,)} &= \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}, & {}_{(1,)}\mathbf{B}_{|(2:4)} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, & {}_{(1,)}\mathbf{B}_{|(5:6)} &= \begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix}, \\ {}_{(2:5)}\mathbf{B}_{|(1,)} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, & {}_{(2:5)}\mathbf{B}_{|(2:4)} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}, & {}_{(2:5)}\mathbf{B}_{|(5:6)} &= \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \\ 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

🔗 A continuación vamos a ver la suma ($\mathcal{A} + \mathcal{B}$) y el producto ($\mathcal{A}\mathcal{B}$) de matrices particionadas.

3.B.1. Suma de matrices particionadas.

Considere dos matrices del mismo orden, \mathbf{A} y \mathbf{B} , y las matrices particionadas \mathcal{A} y \mathcal{B} , obtenidas usando idénticas particiones para las filas y columnas de \mathbf{A} y \mathbf{B} . Por ejemplo

$$\mathcal{A} = {}_{\{h\}}\mathbf{A}_{|\{k\}} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \hline \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{array} \right]; \quad \mathcal{B} = {}_{\{h\}}\mathbf{B}_{|\{k\}} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \hline \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{array} \right],$$

entonces la suma se puede calcular sumando bloque a bloque (como en la parte izquierda de la Ecuación 3.1), donde \mathbf{A}_{ij} y \mathbf{B}_{ij} son las submatrices que constituyen cada uno de los bloques. Por ejemplo

$$\left[\begin{array}{c|c|c} 1 & 2 & 3 \\ \hline 3 & 2 & 1 \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c|c|c} -1 & 1 & 0 \\ \hline -1 & 1 & 0 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c|c} 0 & 3 & 3 \\ \hline 2 & 3 & 1 \end{array} \right].$$

Es decir, $\mathcal{A} + \mathcal{B} = {}_{\{h\}}\mathbf{A}_{|\{k\}} + {}_{\{h\}}\mathbf{B}_{|\{k\}} = {}_{\{h\}}(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|\{k\}}$.

3.B.2. Producto de matrices particionadas

Sean \mathcal{A} y \mathcal{B} tales que la partición $\{h_1, \dots, h_{s-1}\}$ de las columnas de \mathcal{A} es igual que la partición de las filas de \mathcal{B} :

$$\begin{aligned} \mathcal{A} = {}_{\{f_1, \dots, f_{m-1}\}}\mathbf{A}_{|\{h_1, \dots, h_{s-1}\}} &= \left[\begin{array}{c|c|c|c} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1s} \\ \hline \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline \mathbf{A}_{m1} & \mathbf{A}_{m2} & \cdots & \mathbf{A}_{ms} \end{array} \right] \\ \mathcal{B} = {}_{\{h_1, \dots, h_{s-1}\}}\mathbf{B}_{|\{c_1, \dots, c_{n-1}\}} &= \left[\begin{array}{c|c|c|c} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} & \cdots & \mathbf{B}_{1n} \\ \hline \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} & \cdots & \mathbf{B}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline \mathbf{B}_{s1} & \mathbf{B}_{s2} & \cdots & \mathbf{B}_{sn} \end{array} \right], \end{aligned}$$

entonces el bloque $(\mathbf{AB})_{ij}$ se puede calcular mediante el producto de la fila i ésima de bloques de \mathcal{A} por la columna j ésima de bloques de \mathcal{B} (de manera análoga al producto de las matrices). Por ejemplo:

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = ({}_{\{1\}}\mathbf{A}_{|\{2\}})({}_{\{2\}}\mathbf{B}_{|\{2\}}) = \left[\begin{array}{c|c|c} 2 & -1 & -1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c|c|c} 1 & 2 & 0 \\ \hline -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & -1 & 0 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c|c} 4 & 2 & -1 \\ \hline 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ \hline 2 & 1 & 0 \end{array} \right] = {}_{\{1\}}(\mathbf{AB})_{|\{2\}}.$$

donde el primer bloque se calcula del siguiente modo

$${}_1|(\mathcal{AB})|_1 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \end{bmatrix},$$

y donde he empleado la notación con selectores para seleccionar las filas y columnas de bloques en matrices particionadas. En general,

$${}_i|(\mathcal{AB})|_j = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{i1} & \mathbf{A}_{i2} & \cdots & \mathbf{A}_{is} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{1j} \\ \mathbf{B}_{2j} \\ \vdots \\ \mathbf{B}_{sj} \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^s \mathbf{A}_{ik} \mathbf{B}_{kj}. \quad (3.2)$$

De (3.2) se deduce que el producto de matrices particionadas también se puede calcular por columnas de bloques, de manera que la j ésima columna de bloques es:

$$(\mathcal{AB})|_j = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} \\ \mathbf{A}_{21} \\ \vdots \\ \mathbf{A}_{q1} \end{bmatrix} \mathbf{B}_{1j} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{22} \\ \vdots \\ \mathbf{A}_{q2} \end{bmatrix} \mathbf{B}_{2j} + \cdots + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{1s} \\ \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots \\ \mathbf{A}_{qs} \end{bmatrix} \mathbf{B}_{sj} = \sum_{k=1}^s ({}_i|\mathcal{A}|_k) ({}_k|\mathcal{B}|_j). \quad (3.3)$$

Si piensa en ello se dará cuenta de que también es posible calcular el producto por filas de bloques del siguiente modo: ${}_i|(\mathcal{AB}) = \sum_{k=1}^s ({}_i|\mathcal{A}|_k) ({}_k|\mathcal{B})$.

3.C. Producto matricial como suma de productos de submatrices

La justificación de por qué (3.2) funciona se asienta en una propiedad curiosa que, además, nos permitirá generalizar el producto de matrices particionadas y trabajar con otros tipos de submatrices. Así pues, comencemos viendo dicha propiedad.

Considere la lista $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_q)$ de q índices, y la submatriz ${}_{\boldsymbol{\alpha}}|\mathbf{I}$, de la matriz identidad \mathbf{I} de orden mayor o igual al mayor de los índices en $\boldsymbol{\alpha}$. Pues si α_j es la j ésima componente de la lista $\boldsymbol{\alpha}$, entonces la columna $({}_{\boldsymbol{\alpha}}|\mathbf{I})|_{\alpha_j}$ es igual $\mathbf{I}_{|j} \in \mathbb{R}^n$ (donde n es la longitud de la lista $\boldsymbol{\alpha}$):

$${}_{\boldsymbol{\alpha}}|\mathbf{I}|_k = ({}_{\alpha_1, \dots, \alpha_q})|\mathbf{I}|_k = ({}_{\alpha_1, \dots, \alpha_q})|(\mathbf{I}|_k) = \begin{cases} \mathbf{I}_{|j} \in \mathbb{R}^q & \text{si } k = \alpha_j \\ \mathbf{0} \in \mathbb{R}^q & \text{si } k \notin \boldsymbol{\alpha} \end{cases} \in \mathbb{R}^q, \quad (3.4)$$

pues si de $\mathbf{I}_{|k}$ (cuya única componente no nula es la k ésima) seleccionamos un subvector de q componentes que coloca su k ésima componente en la posición j , obtenemos $\mathbf{I}_{|j} \in \mathbb{R}^q$, y si seleccionamos un subvector que no toma su única componente no nula, obtenemos un subvector nulo: $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^q$.

Por ejemplo, consideremos la lista de 3 índices $\boldsymbol{\alpha} = (4, 1, 2)$ (cuyo mayor índice es el 4) y una matriz identidad de orden n mayor o igual que 4, por ejemplo $n = 4$. Entonces

$${}_{\boldsymbol{\alpha}}|\mathbf{I} = ({}_{4,1,2})|\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Y ahora fijémonos en las columnas de la anterior matriz:

- como 4 es el *primer* componente de la lista α , entonces la cuarta columna $((4,1,2)|\mathbf{I})|_4$ es igual a la *primera* columna de la identidad de orden 3 (pues 3 es la longitud de la lista):

$${}_{(4,1,2)}|\mathbf{I}|_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- como 1 es la *segunda* componente de la lista α , entonces la primera columna $((4,1,2)|\mathbf{I})|_1$ es igual a la *segunda* columna de la identidad:

$${}_{(4,1,2)}|\mathbf{I}|_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- como 2 es la *tercera* componente de la lista α , entonces la segunda columna $((4,1,2)|\mathbf{I})|_2$ es igual a la *tercera* columna de la identidad:

$${}_{(4,1,2)}|\mathbf{I}|_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- y como 3 no está en la lista α , entonces la tercera columna $((4,1,2)|\mathbf{I})|_3$ es nula

$${}_{(4,1,2)}|\mathbf{I}|_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Librería NAcAL para Python

```
(4,1,2)|I(5)|4      # Primera columna de la Matriz identidad de orden 3
(4,1,2)|I(5)|2      # Segunda columna de la Matriz identidad de orden 3
(4,1,2)|I(5)|1      # Tercera columna de la Matriz identidad de orden 3
(4,1,2)|I(5)|3      # Vector nulo de tres componentes (R3)
```

Considere las columnas del producto de matrices $(\mathbf{I}_{|\alpha})(\alpha|\mathbf{I})$. Usando (3.4) se deduce que

$$\left((\mathbf{I}_{|\alpha})(\alpha|\mathbf{I}) \right)_{|k} = (\mathbf{I}_{|\alpha})(\alpha|\mathbf{I}_{|k}) = \begin{cases} (\mathbf{I}_{|\alpha})\mathbf{I}_{|j} = (\mathbf{I}_{|\alpha})_{|j} = \mathbf{I}_{|k} & \text{si } k = \alpha_j \\ (\mathbf{I}_{|\alpha})\mathbf{0} = \mathbf{0} & \text{si } k \notin \alpha \end{cases}; \quad (3.5)$$

Así, para $\alpha = (4, 1, 2)$ y $\mathbf{I}_{4 \times 4}$

$$(\mathbf{I}_{|(4,1,2)})(\alpha|\mathbf{I}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

de manera que solo hay unos en las posiciones 1, 2 y 4 de la diagonal.

$(\mathbf{I}(4) | (4, 1, 2)) * ((4, 1, 2) | \mathbf{I}(4))$ # fíjese en la necesidad de los paréntesis

Ahora considere las matrices \mathbf{A} y \mathbf{B} ; y sean $\gamma_1, \dots, \gamma_h$ listas de índices tales que, cada índice $j = 1 : p$ está en una, y solo en una, de las listas γ_i .

Por ejemplo, si $p = 5$, y si las listas son $\gamma_1 = (3, 1)$, $\gamma_2 = (5,)$ y $\gamma_3 = (2, 4)$, entonces

$$\mathbf{A}_{|\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3} = \mathbf{A}_{|(3, 1, 5, 4, 2)};$$

es decir, $\mathbf{A}_{|\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3}$ es un reordenamiento (o permutación) de las columnas, pues todas ellas aparecen una, y solo una, vez.

Si empleamos las listas $\gamma_1, \dots, \gamma_h$ para reordenar tanto las columnas de \mathbf{A} y como las filas de \mathbf{B} , el producto de las matrices resultantes resulta ser igual al producto \mathbf{AB} :

$$(\mathbf{A}_{|\gamma_1, \dots, \gamma_h})(\gamma_1, \dots, \gamma_h | \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{|\gamma_1, \dots, \gamma_h})(\gamma_1, \dots, \gamma_h | \mathbf{I}) \mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{I} \mathbf{B} = \mathbf{AB},$$

pues como todos los índices están incluidos, por (3.5), sabemos que $(\mathbf{I}_{|\gamma_1, \dots, \gamma_h})(\gamma_1, \dots, \gamma_h | \mathbf{I}) = \mathbf{I}$.

Consecuentemente podemos calcular \mathbf{AB} mediante la suma de k productos de submatrices:

$$\sum_{k=1}^h (\mathbf{A}_{|\gamma_k})(\gamma_k | \mathbf{B}) = \sum_{k=1}^h (\mathbf{A}(\mathbf{I}_{|\gamma_k})(\gamma_k | \mathbf{I}) \mathbf{B}) = \mathbf{A} \left(\sum_{k=1}^h (\mathbf{I}_{|\gamma_k})(\gamma_k | \mathbf{I}) \right) \mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{I} \mathbf{B} = \mathbf{AB},$$

donde, por (3.5), cada sumando de $\sum_{k=1}^h (\mathbf{I}_{|\gamma_k})(\gamma_k | \mathbf{I})$ es una matriz cuadrada cuya j -ésima columna es $\mathbf{I}_{|j}$, cuando $j \in \gamma_k$, o $\mathbf{0}$, en caso contrario. Y como cada índice está incluido en una y solo una de las listas γ_k , la suma de dichas matrices es igual a la identidad.

Por ejemplo, si usamos las listas $\gamma_1 = (3, 1)$ y $\gamma_2 = (4, 2)$ con $\mathbf{I}_{4 \times 4}$, entonces

$$(\mathbf{I}_{|(3, 1)})(\gamma_1 | \mathbf{I}) + (\mathbf{I}_{|(4, 2)})(\gamma_2 | \mathbf{I}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{g1}=(3, 1,); \mathbf{g2}=(4, 2,)$
 $(\mathbf{I}(4) | \mathbf{g1}) * (\mathbf{g1} | \mathbf{I}(4)) + (\mathbf{I}(4) | \mathbf{g2}) * (\mathbf{g2} | \mathbf{I}(4))$

Así, si consideramos las matrices

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

y las listas $\gamma_1 = (3, 1,)$ y $\gamma_2 = (2,)$; tenemos que

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}_{|\gamma_1, \gamma_2})(\gamma_1, \gamma_2 | \mathbf{B}) &= (\mathbf{A}_{|(3, 1)})(\gamma_1 | \mathbf{B}) + (\mathbf{A}_{|(2,)})(\gamma_2 | \mathbf{B}) \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{AB}. \end{aligned}$$

```
A = Matrix([ [1,2,-1], [2,-2,0] ])
B = Matrix([ Vector([2,1,-1]), Vector([1,1,1]) ])
g1=(3,1); g2=(2,)
(A|g1)*(g1|B) + (A|g2)*(g2|B)
```

Fíjese en la coma tras el 2

Nota: las listas de un solo elemento se escriben en Python con una coma después del único elemento. Por ejemplo (2,) es la lista que solo contiene el 2. Así se distingue el *numero* 2 entre paréntesis de la *lista* que contiene al 2. Por claridad, y puesto que la distinción es importante, en todos estos ejemplos sigo el mismo criterio de notación: así, $\mathbf{A}_{|2}$ es una columna de \mathbf{A} (un vector) y $\mathbf{A}_{|(2,)}$ es una submatriz (una matriz columna).

3.C.1. Producto como suma de matrices de rango uno (o menor que uno)

Como caso particular, consideremos que cada lista k ésima contiene únicamente el índice k , es decir, $\gamma_k = (k,)$. Entonces el producto \mathbf{AB} queda descrito como una suma matrices de rango uno (como máximo):

$$\left(\mathbf{A} \right)_{m \times p} \left(\mathbf{B} \right)_{p \times n} = \sum_{k=1}^p (\mathbf{A}_{|(k,)})_{m \times 1} ((k,)|\mathbf{B})_{1 \times n},$$

donde cada sumando $(\mathbf{A}_{|(k,)})_{m \times 1} ((k,)|\mathbf{B})_{1 \times n}$ es una matriz de orden m por n de rango 1 (ó quizá 0). Ejemplo:

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = (\mathbf{A}_{|(1,)})_{(1,)|\mathbf{B}} + (\mathbf{A}_{|(2,)})_{(2,)|\mathbf{B}} + (\mathbf{A}_{|(3,)})_{(3,)|\mathbf{B}} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

```
(A|(1,)) * ((1,)|B) + (A|(2,)) * ((2,)|B) + (A|(3,)) * ((3,)|B)
```

3.C.2. Submatriz de un producto como suma de productos de submatrices

Y ahora vayamos con la generalización de este apéndice, expresa el producto matricial como una suma de submatrices.

Considere una lista de listas $\gamma_1, \dots, \gamma_h$, donde cada índice $j = 1 : p$ está incluido en una y solo una de las listas γ_k entonces:

$$\mathbf{AB} = \sum_{k=1}^h (\mathbf{A}_{|\gamma_k})_{m \times p} (\gamma_k|\mathbf{B})_{p \times n}, \quad (3.6)$$

Seleccionando algunas filas de \mathbf{A} y algunas columnas de \mathbf{B} , la submatriz $\alpha_{|}(\mathbf{AB})_{|\beta}$ resulta ser

$$\alpha_{|}(\mathbf{AB})_{|\beta} = \sum_{k=1}^h (\alpha_{|}\mathbf{A}_{|\gamma_k})_{m \times p} (\gamma_k|\mathbf{B}_{|\beta})_{p \times n},$$

que de alguna manera es una generalización de (3.2), pues aquí no se requiere que las submatrices estén formadas por vectores de índices consecutivos.

Parte II

Transformaciones elementales, métodos de eliminación y matriz inversa

Transformaciones elementales y métodos de eliminación

Como veremos a lo largo de este curso, hay un algoritmo que permite resolver gran cantidad de problemas: decidir si una matriz es invertible y si lo es, encontrar su inversa; decidir si un sistema de ecuaciones lineales es resoluble y, si lo es, resolverlo; encontrar una base del complemento ortogonal de un subespacio de \mathbb{R}^n ; pasar de las ecuaciones paramétricas a las cartesianas (y viceversa); calcular determinantes, etc. De hecho, prácticamente todos los problemas que veremos en este curso se puede resolver con un único algoritmo!

Este algoritmo se denomina *Método de Eliminación* y es sorprendentemente simple: *consiste en aplicar una secuencia de transformaciones elementales sobre las filas o columnas una matriz...* ¡y tan solo existen dos tipos de transformaciones elementales!¹

- *sumar* un múltiplo de un vector a *otro* vector (Tipo I)
- *multiplicar* un vector por un número *distinto de cero* (Tipo II)

Denotamos con “ τ ” al operador correspondiente a la transformación aplicada, y lo situamos como subíndice a la derecha de la matriz para indicar que opera sobre las columnas: \mathbf{A}_τ . Entre corchetes, por debajo de cada “ τ ”, indicaremos los detalles de cada transformación.

El resultado de aplicar una única transformación elemental sobre $\mathbf{I}_{n \times n}$ tiene un nombre especial:

Definición 4.1. Una *matriz elemental* \mathbf{I}_τ es cualquier matriz obtenida tras aplicar una sola transformación elemental sobre las columnas de una matriz identidad.

Usaremos las matrices elementales para relacionar las transformaciones elementales con productos entre matrices. Vayamos con los detalles.

4.1. Transformaciones y matrices elementales

4.1.1. Transformaciones y matrices elementales de Tipo I

Transformación elemental de Tipo I: $\tau_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}$ suma λ veces el vector \mathbf{i} ésimo al vector \mathbf{j} ésimo (con $\mathbf{j} \neq \mathbf{i}$).
(*modifica el vector cuyo índice aparece en última posición en el corchete*).

Librería NAcAL para Python

```
T( (8,2,3) ) # Suma ocho veces el segundo vector al tercero
```

$\tau_{[(8)\mathbf{2}+\mathbf{3}]}$

¹En muchos manuales consideran el intercambio como otra transformación elemental, pero aquí no lo haremos.

Matriz elemental de Tipo I. Cualquier matriz obtenida *tras aplicar una sola transformación elemental de Tipo I* sobre una matriz identidad:

$$\mathbf{I}_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}$$

Por ejemplo, si sobre las columnas de la matriz identidad de orden 3 aplicamos la transformación $\tau_{[(\lambda)\mathbf{2}+\mathbf{3}]}$ (que suma “ λ veces” la segunda columna a la tercera) obtenemos:

$$\mathbf{I}_{[(\lambda)\mathbf{2}+\mathbf{3}]} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \lambda \\ & & 1 \end{bmatrix};$$

que es como la matriz identidad de orden 3 salvo porque la segunda componente de su tercera columna ha cambiado y ahora es λ (en lugar de cero).

Fíjese que la notación $[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]$ indica que sumamos λ veces la \mathbf{i} ésima columna a la columna \mathbf{j} ésima; pero también describe la matriz elemental correspondiente: en **negrita** aparecen los índices (fila \mathbf{i} ésima, columna \mathbf{j} ésima) de la componente de la matriz \mathbf{I} que ha cambiado y entre paréntesis su nuevo valor (λ).

Librería NAcAL para Python

```
I(3) & T( (8,2,3) ) # Transf. de las columnas de la matriz identidad de orden 3
                  # (suma 8 veces la segunda columna a la tercera)
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

En general, si aplicamos $\tau_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}$ (que suma “ λ veces” la \mathbf{i} ésima columna a la \mathbf{j} ésima (con $j \neq i$)) sobre las columnas de \mathbf{I} (de orden n), cambiamos la \mathbf{j} ésima columna de manera las columnas de la nueva matriz son:

$$\left(\mathbf{I}_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}\right)_{|k} = \begin{cases} \text{Cuando } k = j : \left(\mathbf{I}_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}\right)_{|j} = \lambda \mathbf{I}_{|i} + \mathbf{I}_{|j} \text{ (nueva columna } j\text{ésima)} \\ \text{Cuando } k \neq j : \left(\mathbf{I}_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}\right)_{|k} = \mathbf{I}_{|k} \text{ (pero el resto de columnas no cambian)} \end{cases}$$

donde $k = 1 : n$.

Veamos qué pasa si aplicamos una transformación elemental Tipo I sobre una matriz \mathbf{A} .

Transformación de las columnas de una matriz \mathbf{A} : En general, si aplicamos $\tau_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}$ a las columnas de \mathbf{A} obtenemos una matriz cuyas columnas son:

$$\left(\mathbf{A}_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}\right)_{|k} = \begin{cases} \lambda \mathbf{A}_{|i} + \mathbf{A}_{|j} = \mathbf{A}(\lambda \mathbf{I}_{|i} + \mathbf{I}_{|j}) = \mathbf{A} \left(\mathbf{I}_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}\right)_{|j} & \text{para la columna } j\text{ésima } (k = j) \\ \mathbf{A}_{|k} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{|k}) = \mathbf{A} \left(\mathbf{I}_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}\right)_{|k} & \text{para resto de columnas } (k \neq j) \end{cases} = \mathbf{A} \left(\mathbf{I}_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}\right)_{|k},$$

donde $k = 1 : n$. Por tanto, aplicar la transformación $\tau_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}$ sobre las columnas de \mathbf{A} de orden $m \times n$ es equivalente a multiplicar \mathbf{A} por la correspondiente matriz elemental $\mathbf{I}_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}$ de orden n por la derecha,

$$\mathbf{A}_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]} = \mathbf{A} \left(\mathbf{I}_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}\right).$$

Por ejemplo, si $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c \\ 0 & b & c \\ a & b & c \end{bmatrix}$; al sumar “ λ veces” la segunda columna a la tercera obtenemos:

$$\mathbf{A}_{[(\lambda)\mathbf{2}+\mathbf{3}]}^{\tau} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & (\lambda 0 + c) \\ 0 & b & (\lambda b + c) \\ a & b & (\lambda b + c) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c \\ 0 & b & c \\ a & b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \lambda \\ & & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \left(\mathbf{I}_{[(\lambda)\mathbf{2}+\mathbf{3}]}^{\tau} \right).$$

4.1.2. Transformaciones y matrices elementales de Tipo II

Transformación elemental de Tipo II: $\tau_{[(\alpha)\mathbf{i}]}$ multiplica por α el i ésimo vector (con $\alpha \neq 0$).

(modifica el vector cuyo índice aparece en última posición en el corchete).

```
T( (5, 1) ) # multiplica por 5 el primer vector
```

Librería NAcAL para Python

$\tau_{[(5)\mathbf{1}]}$

Matriz elemental de Tipo II Cualquier matriz obtenida *tras aplicar una sola transformación elemental de Tipo II* sobre una matriz identidad:

$$\mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{i}]}^{\tau}$$

Si sobre las columnas de la matriz identidad de orden 3 aplicamos la transformación $\tau_{[(\alpha)\mathbf{2}]}$ (que multiplica la segunda columna por $\alpha \neq 0$) obtenemos:

$$\mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{2}]}^{\tau} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \alpha & \\ & & 1 \end{bmatrix};$$

que es como la matriz $\mathbf{I}_{3 \times 3}$ salvo porque la segunda componente de la diagonal es α .

```
I(3) & T( (5,1) ) # Transf. de las columnas de la matriz identidad de orden 3
# (multiplica por 5 la primera columna)
```

Librería NAcAL para Python

$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

En general, si aplicamos $\tau_{[(\alpha)\mathbf{i}]}$ (que multiplica la columna i ésima por $\alpha \neq 0$) sobre las columnas de \mathbf{I} (de orden n), modificamos su i ésima columna, de manera las columnas de la nueva matriz son:

$$\left(\mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{i}]}^{\tau} \right)_{|k} = \begin{cases} \text{Cuando } k = i : \left(\mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{i}]}^{\tau} \right)_{|i} = \alpha \mathbf{I}_{|i} \text{ (nueva columna } i\text{ésima)} \\ \text{Cuando } k \neq i : \left(\mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{i}]}^{\tau} \right)_{|k} = \mathbf{I}_{|k} \text{ (pero el resto de columnas no cambian)} \end{cases}, \text{ donde } k = 1 : n.$$

Las matrices elementales Tipo II son como la identidad salvo la i ésima componente de la diagonal, que es α .

Transformación de las columnas de una matriz \mathbf{A} : En general, si aplicamos $\tau_{[(\alpha)\mathbf{i}]}$ a las columnas de \mathbf{A} , de orden $m \times n$, obtenemos una matriz cuyas columnas son:

$$\left(\mathbf{A}_{\tau_{[(\alpha)\mathbf{i}]}}\right)_{|k} = \begin{cases} \alpha \mathbf{A}_{|k} = \mathbf{A}(\alpha \mathbf{I}_{|k}) & \text{si } k = i \\ \mathbf{A}_{|k} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{|k}) & \text{para el resto de columnas} \end{cases} = \mathbf{A} \left(\mathbf{I}_{\tau_{[(\alpha)\mathbf{i}]}}\right)_{|k}, \text{ donde } k = 1 : n.$$

De nuevo, aplicar una transformación elemental de *Tipo II* sobre la matriz \mathbf{A} (de n columnas) es equivalente a multiplicar dicha matriz \mathbf{A} por la correspondiente matriz elemental *Tipo II* de orden n por la derecha.

$$\mathbf{A}_{\tau_{[(\alpha)\mathbf{i}]}} = \mathbf{A} \left(\mathbf{I}_{\tau_{[(\alpha)\mathbf{i}]}}\right).$$

Por ejemplo, si $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c \\ 0 & b & c \\ a & b & c \end{bmatrix}$ entonces al multiplicar la segunda columna por α resulta que:

$$\mathbf{A}_{\tau_{[(\alpha)\mathbf{2}]}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c \\ 0 & \alpha b & c \\ a & \alpha b & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c \\ 0 & b & c \\ a & b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \alpha & \\ & & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \left(\mathbf{I}_{\tau_{[(\alpha)\mathbf{2}]}}\right).$$

4.1.3. Transformaciones de las columnas

Como al aplicar cualquier transformación elemental τ sobre las columnas de \mathbf{A} siempre se verifica que:

$$\mathbf{A}_{\tau} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau});$$

disponemos de una nueva regla de reescritura asociativa:

$$(\mathbf{AB})_{\tau} = \mathbf{AB}(\mathbf{I}_{\tau}) = \mathbf{A}(\mathbf{B}_{\tau}).$$

Por tanto no son necesarios los paréntesis y basta escribir: \mathbf{AB}_{τ}

Comentario. Fíjese que

- *multiplicar una columna por cero no es una transformación elemental; y restar una columna a ella misma tampoco lo es.*
- *la matriz identidad es simultáneamente una matriz elemental Tipo I y Tipo II:* $\mathbf{I}_{\tau_{[(0)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}} = \mathbf{I} = \mathbf{I}_{\tau_{[(1)\mathbf{i}]}}$.
- *la notación para denotar las matrices elementales las describe casi completamente (aunque no del todo, pues la notación no indica el orden de la matriz).*

Por ejemplo, $\mathbf{I}_{\tau_{[(-7)\mathbf{1}+\mathbf{2}]}}$ (de orden n), es como la matriz identidad (de orden n) pero la componente de la fila 1 y columna 2 es un “-7”, es decir

$$\mathbf{I}_{\tau_{[(-7)\mathbf{1}+\mathbf{3}]}} = \begin{bmatrix} 1 & -7 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ pero también } \mathbf{I}_{\tau_{[(-7)\mathbf{1}+\mathbf{3}]}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ ó } \mathbf{I}_{\tau_{[(-7)\mathbf{1}+\mathbf{3}]}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ ó...}$$

Por otra parte, $\mathbf{I}_{\tau_{[(3)1]}}$ indica que la primera componente de la diagonal es un 3; es decir,

$$\mathbf{I}_{\tau_{[(3)1]}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \text{pero también, } \mathbf{I}_{\tau_{[(3)1]}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad \text{ó } \mathbf{I}_{\tau_{[(3)1]}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{ó...}$$

- las matrices elementales (de orden n) se obtienen aplicando las correspondientes transformaciones elementales sobre la matriz identidad (de orden n)
- La transpuesta de una matriz elemental es otra matriz elemental. Las de Tipo II son simétricas y para las de Tipo I resulta evidente que $\left(\mathbf{I}_{\tau_{[(\lambda)i+j]}}\right)^T = \mathbf{I}_{\tau_{[(\lambda)j+i]}}$ es otra matriz elemental de Tipo I (la que suma λ veces la j ésima columna a la i ésima).



Solo hay dos tipos de transformaciones elementales

Tipo I. Suman a un vector un múltiplo de otro vector: $\tau_{[(\lambda)i+j]}$

Tipo II. Multiplican un vector por un número distinto de cero: $\tau_{[(\alpha)i]}$

Llamamos *matriz elemental* a la resultante de aplicar una sola transformación elemental a las columnas de la matriz identidad, \mathbf{I}_{τ} . Hay dos tipos:

Tipo I. $\mathbf{I}_{\tau_{[(\lambda)i+j]}}$, donde $j \neq i$

Tipo II. $\mathbf{I}_{\tau_{[(\alpha)i]}}$, donde $\alpha \neq 0$.

Al aplicar una transformación elemental τ sobre las columnas de \mathbf{A} , se verifica que:

$$\mathbf{A}_{\tau} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau}).$$

Consecuentemente tenemos una nueva propiedad asociativa:

$$(\mathbf{AB})_{\tau} = \mathbf{A}(\mathbf{B}_{\tau}) = \mathbf{AB}_{\tau}.$$

La transpuesta de una matriz elemental también es elemental (y del mismo tipo).

EJERCICIO 24. Escriba las siguientes matrices elementales de orden 4.

(a) $\mathbf{I}_{\tau_{[(-7)1+3]}}$

(b) $\mathbf{I}_{\tau_{[(1)1+4]}}$

(c) $\mathbf{I}_{\tau_{[(3)2+1]}}$

(d) $\mathbf{I}_{\tau_{[(-10)3]}}$

EJERCICIO 25. ¿Qué operaciones realizan las matrices anteriores si multiplican por la derecha a \mathbf{B} ?

EJERCICIO 26. Sea la matriz $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, exprese las siguientes transformaciones elementales de

\mathbf{A} como productos de \mathbf{A} por matrices elementales y escriba el resultado:

(a) Multiplicar la primera columna por 3.

(b) Restar la primera columna de la segunda.

4.2. Secuencias de transformaciones elementales. Parte I

Considere la aplicación de una secuencia de k transformaciones elementales sobre las columnas de \mathbf{A} :

$$\left(\dots \left((\mathbf{A}_{\tau_1})_{\tau_2} \dots \right)_{\tau_{(k-1)}} \right)_{\tau_k}$$

Denotamos la aplicación dicha secuencia con $\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}$. Es fácil ver que dicha aplicación es equivalente al producto de \mathbf{A} por una secuencia de k matrices elementales:

$$\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \left(\dots \left((\mathbf{A}_{\tau_1})_{\tau_2} \dots \right)_{\tau_{(k-1)}} \right)_{\tau_k} = \left(\dots \left((\mathbf{A} \mathbf{I}_{\tau_1}) \mathbf{I}_{\tau_2} \right) \dots \mathbf{I}_{\tau_{(k-1)}} \right) \mathbf{I}_{\tau_k} = \mathbf{A} (\mathbf{I}_{\tau_1}) \dots (\mathbf{I}_{\tau_k}).$$

En particular, si $\mathbf{A} = \mathbf{I}$ entonces

$$\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k} = (\mathbf{I}_{\tau_1}) \dots (\mathbf{I}_{\tau_k}) \quad (4.1)$$

es decir, *la matriz $(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k})$ es producto de matrices elementales*; y por tanto

$$\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \mathbf{A} (\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k})$$

EJERCICIO 27. Demuestre que la aplicación de una secuencia de transformaciones elementales de las columnas es un *operador lineal*.



Puesto que la aplicación de una secuencia de transformaciones elementales es un **producto de matrices**:

$$\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \mathbf{A} (\mathbf{I}_{\tau_1}) \dots (\mathbf{I}_{\tau_k}) = \mathbf{A} (\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k})$$

la aplicación de una secuencia de transformaciones elementales de las columnas es un **operador lineal**.

Notación Denotaremos una secuencia de k transformaciones de las *columnas* de \mathbf{A} con el siguiente esquema:

$$\mathbf{A} \xrightarrow{\tau_1} \mathbf{A}_{\tau_1} \xrightarrow{\tau_2} \mathbf{A}_{\tau_1 \tau_2} \xrightarrow{\tau_3} \dots \xrightarrow{\tau_k} \mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} \quad \text{o agregando varios pasos} \quad \mathbf{A} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \tau_1 \\ \vdots \\ \tau_p \end{smallmatrix}} \mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_p} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \tau_{p+1} \\ \vdots \\ \tau_k \end{smallmatrix}} \mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}.$$

Por ejemplo, la sucesión de transformaciones $\mathbf{A}_{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(3)2] [(2)1+2] \end{smallmatrix}}$ donde $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 7 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, se escribe como:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 7 & 0 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(3)2] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 7 & 0 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(2)1+2] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 7 & 14 & 4 \end{bmatrix}; \quad \text{o bien como} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 7 & 0 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(3)2] \\ [(2)1+2] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 7 & 14 & 4 \end{bmatrix}.$$

Alternativamente podemos expresar una secuencia de transformaciones elementales mediante productos de **matrices elementales**. Por ejemplo, para la secuencia anterior:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 7 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(3)2] \\ [(2)1+2] \end{smallmatrix}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 7 & 0 & 4 \end{bmatrix} (\mathbf{I}_{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(3)2] \end{smallmatrix}}) (\mathbf{I}_{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(2)1+2] \end{smallmatrix}}) = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 7 & 14 & 4 \end{bmatrix}.$$

T((2,3,4)) & T((-7,1)) & T((-1,3,1))

Librería NAcAL para Python

$$\begin{smallmatrix} \tau \\ [(2)3+4] \\ [(-7)1] \\ [(-1)3+1] \end{smallmatrix}$$

4.2.1. Intercambios

Aunque solo hemos considerado como transformaciones elementales las de *Tipo I* y *II*, la mayoría de manuales de Álgebra Lineal consideran como tercer tipo el *intercambio*:

Intercambio: $\tau_{[i \rightleftharpoons j]} \rightarrow$ intercambia los vectores i ésimo y j ésimo.

```
T( {1, 3} ) # intercambia los vectores primero y tercero
```

Librería NAcAL para Python

$$\tau_{[1 \rightleftharpoons 3]}$$

Definición 4.2 (Matriz de intercambio). *Cualquier matriz obtenida tras intercambiar las columnas p y q de la matriz identidad de orden n :* $\mathbf{I}_{\tau_{[p \rightleftharpoons q]}}$

Puesto que en $\mathbf{I}_{\tau_{[p \rightleftharpoons q]}}$ solo han cambiado las columnas p y q de \mathbf{I} , se deduce que $\mathbf{I}_{\tau_{[p \rightleftharpoons q]}}$ es simétrica:

$$\left(\mathbf{I}_{\tau_{[p \rightleftharpoons q]}} \right)_{|j} = \begin{cases} \mathbf{I}_{|q} & \text{si } j = p \\ \mathbf{I}_{|p} & \text{si } j = q \\ \mathbf{I}_{|j} & \text{si } j \neq p, q \end{cases} \implies \left(\mathbf{I}_{\tau_{[p \rightleftharpoons q]}} \right)_{|k} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = q \text{ y } j = p \\ 1 & \text{si } k = p \text{ y } j = q \\ 1 & \text{si } k = j \neq p, q \\ 0 & \text{en el resto de casos} \end{cases} = \left(\mathbf{I}_{\tau_{[p \rightleftharpoons q]}} \right)_{|k}^T$$

es decir, transponiendo (intercambiando los índices k y j) la matriz no cambia. Por tanto:

toda matriz intercambio $\mathbf{I}_{\tau_{[p \rightleftharpoons q]}}$ es simétrica.

Aquí no consideramos el intercambio como una transformación elemental puesto que en realidad el intercambio es una sucesión de transformaciones elementales de **Tipo I** más una transformación de **Tipo II** que multiplica una de las dos columnas intercambiadas por -1 . El siguiente ejercicio le pide que lo compruebe.

EJERCICIO 28.

- Mediante transformaciones elementales de Tipo I y II transforme $\mathbf{I}_{3 \times 3}$ en la matriz intercambio $\mathbf{I}_{\tau_{[1 \rightleftharpoons 2]}}$.
- Mediante el producto de las matrices elementales correspondientes a los pasos dados en el apartado anterior obtenga la matriz intercambio $\mathbf{I}_{\tau_{[i \rightleftharpoons j]}}$ de orden n .

```
i = 2; j = 4 # indicamos quienes son j e i
I(4) & T( [(-1,j),(-1,j,i),(1,i,j),(-1,j,i)] ) # aplicación de lista de transf. elem.
# I(4) & T( {i,j} ) # es más sencillo aplicar intercambio
```

Librería NAcAL para Python

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Cualquier matriz intercambio $\mathbf{I}_{\tau_{[i \rightleftharpoons j]}}$ se puede factorizar como producto de varias matrices **Tipo I** y una matriz **Tipo II**, que multiplica por -1 una de las columnas intercambiadas.

Intercambio de las columnas de \mathbf{A} :

$$\left(\mathbf{A}_{\tau}\right)_{[i \rightleftharpoons j]} = \begin{cases} \mathbf{A}_{|j} = \mathbf{A}|_j & \text{si } k = i \text{ (es decir, en la posición } i \text{ se coloca la columna } j) \\ \mathbf{A}_{|i} = \mathbf{A}|_i & \text{si } k = j \text{ (es decir, en la posición } j \text{ se coloca la columna } i) \\ \mathbf{A}_{|k} = \mathbf{A}|_k & \text{en el resto de casos (se mantienen las columnas en su sitio)} \end{cases} = \mathbf{A} \left(\mathbf{I}_{\tau}\right)_{[i \rightleftharpoons j]}.$$

Si $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ b & b & 0 \\ c & c & c \end{bmatrix}$, entonces $\mathbf{A}_{\tau_{[1 \rightleftharpoons 2]}} = \mathbf{A} \left(\mathbf{I}_{\tau_{[1 \rightleftharpoons 2]}}\right) = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ b & b & 0 \\ c & c & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ intercambia las columnas 1 y 2.

Librería NAcAL para Python

```
a, b, c, = sympy.symbols('a b c') # definimos variables simbólicas
A = Matrix([ [a,0,0], [a,b,0], [a,b,c] ]) # definimos Matrix fila a fila
A & T( {1,2} ) # intercambio de las dos primeras columnas
```

$$\begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ b & a & 0 \\ b & a & c \end{bmatrix}$$

4.3. Permutaciones

Mediante una sucesión intercambios se logra un reordenamiento de vectores. Llamaremos *permutación* a la operación de reordenar una lista.

Permutación: $\tau \rightarrow$ reordena una lista mediante una sucesión de intercambios.

Definición 4.3 (Matriz permutación). *Cualquier matriz obtenida tras realizar un número arbitrario de intercambios entre las columnas de la matriz identidad de orden n , \mathbf{I}_{τ} .*

Por definición, una matriz permutación se puede factorizar como producto de matrices intercambio. Aunque las matrices intercambio $\mathbf{I}_{\tau_{[p \rightleftharpoons q]}}$ son simétricas, las matrices permutación \mathbf{I}_{τ} no son simétricas en general:²

Librería NAcAL para Python

```
I(4) & T( [{1,3}, {4,2}, {3,2}] ) # ejemplo de matriz permutación
```

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Por definición, una matriz permutación se puede factorizar como producto de matrices intercambio. Aunque las matrices intercambio $\mathbf{I}_{\tau_{[p \rightleftharpoons q]}}$ son simétricas, las matrices permutación \mathbf{I}_{τ} no son simétricas en general:

$$\left(\mathbf{I}_{\tau_{[1 \rightleftharpoons 3]}}\right) \left(\mathbf{I}_{\tau_{[1 \rightleftharpoons 2]}}\right) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

²el producto de dos matrices simétricas es simétrico si y solo si dichas matrices conmutan, es decir $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$



El intercambio, $\tau_{[i \rightleftharpoons j]}$, es una secuencia de transformaciones *Tipo I* junto a una de *Tipo II* (que cambia el signo de uno de los vectores). Las matrices intercambio, $\mathbf{I}_{\tau_{[i \rightleftharpoons j]}}$, son simétricas y su cuadrado es la matriz identidad (“intercambiar dos veces los mismos vectores nos deja como al principio”).

Una secuencia de intercambios da lugar a un reordenamiento de los vectores. Llamamos matriz permutación al resultado de aplicar una sucesión de intercambios sobre las columnas de \mathbf{I} . En general las matrices permutación $\mathbf{I}_{\tau_{[\circ]}}$ no son simétricas.

4.4. Eliminación por columnas

Definición 4.4. Llamamos pivote de una columna no nula, a su primer componente no nulo, y posición de pivote al índice de la fila en la que está el pivote.

Definición 4.5. Una matriz \mathbf{K} es pre-escalonada si las componentes a la derecha de cada pivote son nulas.

Ejemplo 3.

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

El pivote de la primera columna es 3, el de la tercera es 1, y el de la cuarta 7. La posición de pivote de la primera columna es 4 (cuarta fila), la de la tercera es 5 (quinta fila) y a de la última es 2 (segunda fila).

4.4.1. Método de eliminación (o eliminación de “Izquierda a derecha”)

El método de eliminación consiste en *pre-escalonar* una matriz mediante transformaciones elementales, es decir, en lograr una matriz en la que todas las componentes a la derecha de cada pivote son nulas:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -8 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-1)2+3]} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & -6 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(2)1+2] \\ [(6)1+3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Toda matriz se puede *pre-escalonar* mediante transformaciones elementales. ¡El prácticamente resto del curso descansa sobre en este teorema! Lo demostraremos por inducción; es decir, demostrando que si es cierto para cualquier matriz de n columnas, también lo es para cualquier matriz de $n + 1$ columnas.

Teorema 4.4.1 (Eliminación). Para toda \mathbf{A} existe una secuencia $\tau_1 \dots \tau_k$ tal que $\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ es pre-escalonada.

Demostración. Por inducción sobre el número de filas de \mathbf{A} .

PASO DE INDUCCIÓN: Supongamos que \mathbf{A} tiene m filas y que el resultado es cierto para matrices de $(m - 1)$ filas. Es decir, que existe una sucesión $\tau_1 \dots \tau_k$ de transformaciones elementales de las columnas tal que

$$\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \begin{bmatrix} \mathbf{K} \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{bmatrix} = \mathbf{b}.$$

y donde la submatriz \mathbf{K} es pre-escalonada. Entonces $\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ ya está pre-escalonada si se da alguno de los siguientes supuestos en su última fila:

- *Supuesto 1.* La última fila es nula.
- *Supuesto 2.* Son nulos los componentes de la última fila que están bajo las columnas nulas de \mathbf{K} (como en el caso de la segunda columna del Ejemplo 3).

- **Supuesto 3.** De los componentes de la última fila situados bajo las columnas nulas de \mathbf{K} , solo uno es distinto de cero, y las componentes a su derecha son nulas (como en la última fila del Ejemplo 3, donde 1 es el primer componente no nulo de aquellos con una columna de ceros por encima).

Si no se da ninguno de estos supuestos, entonces necesariamente se da el siguiente caso:

1. Si b_{mr} es primer pivote de los situados en la última fila (i.e., si de aquellos componentes situados bajo las columnas nulas de \mathbf{K} , es el situado más a la izquierda); entonces podemos *eliminar* los componentes a su derecha restando de cada columna j ésima (con $j \geq r$) la columna r ésima multiplicada por $\left(\frac{b_{mj}}{b_{mr}}\right)$. Es decir, aplicando la secuencia de transformaciones ³

$$\left[\left(\frac{-b_{mj}}{b_{mr}}\right)r+j\right] \quad \text{para todo } j \geq r,$$

obtenemos una matriz que cumple el **Supuesto 3**.

BASE DE INDUCCIÓN: Se prueba igual que en el paso de inducción, pero sin \mathbf{K} , es decir con una matriz \mathbf{A} con una sola fila y donde $\mathbf{A}_{|r}$ es la primera columna no nula. \square

El método de eliminación está implementado en **NACAL**: si ejecuta las siguientes líneas en Jupyter

Librería NACAL para Python

```
A = Matrix( [ [0,2,2], [1,-2,-8], [1,1,1] ] ) # Mat. descrita como lista de filas
Elim(A,1) # Eliminación por columnas
```

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -8 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(1)2+3]} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & -6 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(2)1+2] \\ [(6)1+3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Pero es muy conveniente para usted saber aplicar el algoritmo con lápiz y papel (o en su defecto saber programarlo). Use la librería solo para verificar los resultados que usted ha obtenido previamente usando lápiz y papel.

4.4.2. Método de eliminación Gaussiano

Definición 4.6. Decimos que la matriz \mathbf{L} es escalonada, si toda columna que precede a una no nula $\mathbf{L}_{|k}$ es no nula y su posición de pivote es anterior a la posición de pivote de $\mathbf{L}_{|k}$.

Resumiendo: en una matriz escalonada primero aparecen las columnas no nulas y a continuación las nulas (o no hay columnas nulas o todas ellas están en el lado derecho de la matriz). Además, conforme nos movemos de izquierda a derecha, los pivotes aparecen cada vez más abajo, es decir, los pivotes describen una escalera descendente (de ahí el nombre de matriz “escalonada”).

Ejemplo 4.

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

El pivote de la primera columna es 7, el de la segunda es 3 y el de la tercera 1. La posición de pivote de la primera columna es 2 (segunda fila), la de la segunda es 4 (cuarta fila) y la de la tercera es 5.

³que no modifican \mathbf{K} puesto que por encima del pivote b_{mr} todo son ceros

Fíjese que aunque toda matriz *escalonada* es *pre-escalonada*, las matrices *pre-escalonadas* no suelen ser *escalonadas*. (Ejemplo 3 en la página 51).

Toda matriz se puede escalonar mediante transformaciones elementales tal como afirma el siguiente

Corolario 4.4.2 (Eliminación Gaussiana). *Para toda \mathbf{A} existe una secuencia $\tau_1 \dots \tau_k$ tal que $\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ es escalonada.*

Demostración. Basta pre-escalonar \mathbf{A} y reordenar sus columnas para que los pivotes describan una escalera descendente, dejando las columnas nulas a la derecha de las no nulas. \square

Dicho procedimiento se denomina *Método de Eliminación de Gaussiano*.

Librería NAcAL para Python

```
A = Matrix( [ [0,2,2], [1,-2,-8], [1,1,1] ] ) # Mat. descrita como lista de filas
L = ElimG(A,1)                               # Eliminación Gaussiana por columnas
```

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -8 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-1)\tau_2+3]} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & -6 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(2)\tau_1+2] \\ [(6)\tau_1+3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{[1\rightleftharpoons 2]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

4.4.3. Método de eliminación Gauss-Jordan

La eliminación gaussiana se puede llevar más lejos, obteniendo una *forma escalonada reducida*.

Definición 4.7. *Decimos que una matriz \mathbf{R} es escalonada reducida, si es escalonada, todos los pivotes son unos y los componentes situados a derecha e izquierda de los pivotes son cero.*

Ejemplo 5.

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{6}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Corolario 4.4.3 (Eliminación Gauss-Jordan). *Para toda \mathbf{A} existe una secuencia $\tau_1 \dots \tau_k$ tal que $\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ es escalonada reducida.*

Demostración. Basta escalonar la matriz, y con cada pivote eliminar el resto de componentes no nulos de su fila. Después se divide cada columna no nula por el valor de su pivote para lograr los “unos”. \square

Dicho procedimiento se denomina *Método de Eliminación Gauss-Jordan*.

Continuemos el ejemplo hasta lograr su forma escalonada reducida por columnas \mathbf{R} :

Librería NAcAL para Python

```
A = Matrix( [ [0,2,2], [1,-2,-8], [1,1,1] ] ) # Mat. descrita como lista de filas
R = ElimGJ(A,1)                               # Forma escalonada reducida
```

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -8 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-1)\tau_2+3]} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{[1\rightleftharpoons 2]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(2)\tau_1] \\ [(-1)\tau_3+1] \\ [(6)\tau_1] \\ [(-1)\tau_3+2] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(\frac{1}{4})\tau_1] \\ [(\frac{1}{6})\tau_2] \\ [(\frac{1}{6})\tau_3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Mediante transformaciones elementales se puede *pre-escalonar*, *escalonar*, o *escalonar y reducir* cualquier matriz.

- Una matriz \mathbf{K} es *pre-escalonada* si las componentes a la derecha de cada pivote son cero.
- Una matriz \mathbf{L} es *escalonada* si está pre-escalonada y los pivotes describen una escalera descendente (cada pivote está más bajo que el pivote de la columna anterior) y las columnas nulas (si las hubiere) están todas a la derecha de la matriz.
- Una matriz \mathbf{R} es *escalonada reducida* si es escalonada, cada pivote es un “1” y el resto de componentes de su fila son ceros (por ejemplo, la matriz identidad es escalonada reducida).

4.5. Nota sobre las transformaciones elementales de las filas.

QUE REALMENTE NO NECESITAREMOS HASTA EL CAPÍTULO VI (así que si lo prefiere puede dejar esta sección hasta entonces).

En casi todos los manuales de Álgebra Lineal se aplican las transformaciones elementales sobre las filas. Aquí usaremos dichas transformaciones para encontrar el espacio nulo por la izquierda de \mathbf{A} (Capítulo V) y para diagonalizar matrices (Capítulo VI). Vamos a comentar brevemente las transformaciones sobre las filas de una matriz y su relación con las transformaciones sobre las columnas.

- Podemos aplicar una transformación elemental a las filas de \mathbf{A} transformando las columnas de \mathbf{A}^\top , y transponiendo el resultado de nuevo. Y operando concluimos que

$$\left((\mathbf{A}^\top)_\tau\right)^\top = \left((\mathbf{A}^\top)\mathbf{l}_\tau\right)^\top = ((\mathbf{l}_\tau)^\top)(\mathbf{A}^\top)^\top = ((\mathbf{l}_\tau)^\top)\mathbf{A},$$

donde $(\mathbf{l}_\tau)^\top$ es una matriz elemental (por ser la transpuesta de una elemental).

- Por tanto, multiplicar por una matriz elemental *por la izquierda* transforma las filas de \mathbf{A} .
- Ello sugiere la notación: ${}_\tau\mathbf{A}$ para la transformación τ de las filas de \mathbf{A} ;

$${}_\tau\mathbf{A} = ((\mathbf{l}_\tau)^\top)\mathbf{A}$$

y consecuentemente: ${}_\tau\mathbf{I}$ para la transformación τ de las filas de \mathbf{I} ; es decir,

$${}_\tau\mathbf{I} = (\mathbf{l}_\tau)^\top.$$

(nuevamente la transposición supone cambiar de lado el subíndice). Así pues,

$${}_\tau\mathbf{A} = ({}_\tau\mathbf{I})\mathbf{A}.$$

¡No solo eso!...Puesto que $\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k} = (\mathbf{l}_{\tau_1}) \dots (\mathbf{l}_{\tau_k})$ y puesto que el producto de matrices es asociativo, deducimos que la transpuesta de $\mathbf{l}_{\tau_1 \tau_2 \dots \tau_k}$ es

$$(\mathbf{l}_{\tau_1 \tau_2 \dots \tau_k})^\top = \left((\mathbf{l}_{\tau_1}) \dots (\mathbf{l}_{\tau_k})\right)^\top = (\mathbf{l}_{\tau_k})^\top \dots (\mathbf{l}_{\tau_1})^\top = {}_{\tau_k}\mathbf{I} \dots {}_{\tau_1}\mathbf{I} = {}_{\tau_k \dots \tau_2 \tau_1}\mathbf{I}$$

Nótese cómo al transponer no solo cambiamos de lado los subíndices, sino también invertimos el orden de la secuencia de transformaciones (de manera similar a cuando se transpone un producto de matrices).

- Esto sugiere denotar a la operación de invertir el orden de las transformaciones como una transposición:

$$(\tau_1 \dots \tau_k)^\top = \tau_k \dots \tau_1;$$

- Fíjese que aunque la secuencia $\tau_1\tau_2\cdots\tau_k$ no es un producto de matrices... ¡casi se puede interpretar como tal!...Tan solo falta que las transformaciones actúen sobre una matriz para saber el orden n de las matrices elementales, y entonces sí actúan como un producto de matrices elementales.
- Así, $(\mathbf{A}_{(\tau_1\cdots\tau_k)})^\top = (\mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1\cdots\tau_k}))^\top = (\tau_k\cdots\tau_1)(\mathbf{A})^\top = (\tau_k\cdots\tau_1)(\mathbf{A})^\top = (\tau_1\cdots\tau_k)^\top(\mathbf{A})^\top$.

```
Tr = T( [(-7,1,2), {3,2}, (2,1,3), {1,2}], 'h' )
Tr
```

Librería NAcAL para Python

$$[(-7)1+2][2\rightleftharpoons 3][2(2)1+3][1\rightleftharpoons 2]$$

```
~Tr
```

Librería NAcAL para Python

$$\#Transposición invierte el orden$$

$$[1\rightleftharpoons 2][2(2)1+3][2\rightleftharpoons 3][(-7)1+2]$$

```
I(3) & Tr
```

Librería NAcAL para Python

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

```
(~Tr) & I(3)
```

Librería NAcAL para Python

$$\# transpuesta de la matriz anterior$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Para indicar que una secuencia de transformaciones actúa sobre las *filas* de una matriz, escribiremos las abreviaturas por debajo de las fechas:

```
A = Matrix([ [0,2,2], [1,-2,-8], [3,6,-6] ])
U = ElimGF(A,1)
```

Librería NAcAL para Python

$$\# Escalonamiento operando con las filas$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -8 \\ 3 & 6 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-3)\tau_2+3]} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -8 \\ 0 & 12 & 18 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-6)\tau_1+3] \atop [(1)\tau_1+2]} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{[1\rightleftharpoons 2]} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Definición 4.8. Una matriz está escalonada por filas si su transpuesta está escalonada por columnas.

La definición anterior sugiere otra para *pivote de una fila*; útil cuando se escalona operando por filas:

Definición 4.9. Llamamos pivote de una fila no nula, a su primer componente no nulo, y posición de pivote al índice de la columna en la que está el pivote.

- Sabemos que una secuencia de transformaciones sobre las columnas se puede expresar de varias formas:

$$\mathbf{B} \begin{smallmatrix} \tau \\ [1 \rightleftharpoons 2] [(-6)1+3] [(1)1+2] [(-3)2+3] \end{smallmatrix} = \mathbf{B} \begin{smallmatrix} \mathbf{I} \tau \\ [1 \rightleftharpoons 2] \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} \mathbf{I} \tau \\ [(-6)1+3] \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} \mathbf{I} \tau \\ [(1)1+2] \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} \mathbf{I} \tau \\ [(-3)2+3] \end{smallmatrix} = \mathbf{B} \begin{smallmatrix} \tau \\ [1 \rightleftharpoons 2] [(-6)1+3] [(1)1+2] [(-3)2+3] \end{smallmatrix}$$

También disponemos de representaciones alternativas al transformar las *filas* de \mathbf{A} :

$$\begin{smallmatrix} \tau \\ [1 \rightleftharpoons 2] [(-6)1+3] [(1)1+2] [(-3)2+3] \end{smallmatrix} \mathbf{A} = \begin{smallmatrix} \tau \mathbf{I} \\ [1 \rightleftharpoons 2] \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} \tau \mathbf{I} \\ [(-6)1+3] \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} \tau \mathbf{I} \\ [(1)1+2] \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} \tau \mathbf{I} \\ [(-3)2+3] \end{smallmatrix} \mathbf{A} = \begin{smallmatrix} \tau \mathbf{A} \\ [1 \rightleftharpoons 2] [(-6)1+3] [(1)1+2] [(-3)2+3] \end{smallmatrix}$$

- Al operar sobre las filas, **las primeras transformaciones en actuar** son las que quedan más **a la derecha** de $\begin{smallmatrix} \tau \\ [1 \rightleftharpoons 2] [(-6)1+3] [(1)1+2] [(-3)2+3] \end{smallmatrix}$ o **más abajo** de $\begin{smallmatrix} \tau \\ [1 \rightleftharpoons 2] [(-6)1+3] [(1)1+2] [(-3)2+3] \end{smallmatrix}$. Por tanto, el proceso de eliminación por filas

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -8 \\ 3 & 6 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-3)2+3]} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -8 \\ 0 & 12 & 18 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(-6)1+3] [(1)1+2] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{[1 \rightleftharpoons 2]} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

se puede representar de estas dos formas alternativas:

$$\begin{smallmatrix} \tau \\ [1 \rightleftharpoons 2] [(-6)1+3] [(1)1+2] [(-3)2+3] \end{smallmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -8 \\ 3 & 6 & -6 \end{bmatrix} = \begin{smallmatrix} \tau \\ [1 \rightleftharpoons 2] [(-6)1+3] [(1)1+2] [(-3)2+3] \end{smallmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -8 \\ 3 & 6 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}.$$

- La transpuesta de una matriz elemental es una matriz elemental del mismo tipo.
- Aunque las matrices elementales *Tipo II* son simétricas $\begin{smallmatrix} \tau \mathbf{I} \\ [(\alpha)\mathbf{i}] \end{smallmatrix} = \begin{smallmatrix} \mathbf{I} \tau \\ [(\alpha)\mathbf{i}] \end{smallmatrix}$, las matrices elementales *Tipo I* NO lo son (salvo para el caso $\lambda = 0$):

$$\begin{smallmatrix} \mathbf{I} \tau \\ [(\lambda)\mathbf{j}+\mathbf{i}] \end{smallmatrix} = \begin{smallmatrix} \tau \mathbf{I} \\ [(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}] \end{smallmatrix} \neq \begin{smallmatrix} \mathbf{I} \tau \\ [(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}] \end{smallmatrix} = \begin{smallmatrix} \tau \mathbf{I} \\ [(\lambda)\mathbf{j}+\mathbf{i}] \end{smallmatrix}.$$

- En general $\begin{smallmatrix} \tau_1 \dots \tau_k \mathbf{I} \end{smallmatrix} \neq \begin{smallmatrix} \mathbf{I} \tau_1 \dots \tau_k \end{smallmatrix}$ y $\begin{smallmatrix} \tau_k \dots \tau_1 \mathbf{I} \end{smallmatrix} \neq \begin{smallmatrix} \mathbf{I} \tau_1 \dots \tau_k \end{smallmatrix}$.
- Pero sin embargo $\begin{smallmatrix} \tau_k \dots \tau_1 \mathbf{I} \end{smallmatrix} = (\begin{smallmatrix} \tau_1 \dots \tau_k \end{smallmatrix})^\tau \mathbf{I} = (\begin{smallmatrix} \mathbf{I} \tau_1 \dots \tau_k \end{smallmatrix})^\tau$ (fíjese en el orden de los subíndices).

Librería NAcAL para Python

```
(Tr & I(3)) == (~(~Tr) & I(3)) == ~(I(3) & ~Tr))
```

```
True
```

- Incluso cuando operamos con las filas, la notación sigue siendo asociativa:

$$(\begin{smallmatrix} \tau \mathbf{A} \end{smallmatrix}) \mathbf{B} = \begin{smallmatrix} \tau \mathbf{AB} \end{smallmatrix}$$

Así que podemos escribir sencillamente $\begin{smallmatrix} \tau \mathbf{AB} \end{smallmatrix}$.

Matrices inversas

Matrices invertibles por un lado. Decimos que

- \mathbf{A} de orden m por n es *invertible por la derecha* si existe otra matriz \mathbf{B} de orden n por m tal que

$$\mathbf{AB} = \mathbf{I}$$

- \mathbf{A} de orden m por n es *invertible por la izquierda* si existe otra matriz \mathbf{B} de orden n por m tal que

$$\mathbf{BA} = \mathbf{I}.$$

Esta lección se centra en las matrices (cuadradas) e invertibles por ambos lados a la vez...

5.1. Matrices invertibles

Definición 5.1 (Matriz invertible). *Se dice que \mathbf{A} es invertible (o tiene inversa) si existe otra matriz \mathbf{B} del mismo orden tal que*

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}.$$

(nótese que $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ implica que \mathbf{A} y \mathbf{B} son necesariamente *cuadradas*).

Pues bien, si \mathbf{A} es invertible su *inversa es única*:

Proposición 5.1.1 (La inversa es única). *Si \mathbf{A} , \mathbf{B} y \mathbf{B}' verifican que*

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I} \quad \text{y que} \quad \mathbf{AB}' = \mathbf{B}'\mathbf{A} = \mathbf{I}$$

entonces \mathbf{B} y \mathbf{B}' son iguales.

Demostración. En efecto: $\mathbf{B} = \mathbf{BI} = \mathbf{B}(\underbrace{\mathbf{AB}'}_{\mathbf{I}=\mathbf{AB}'}) = (\underbrace{\mathbf{BA}}_{\mathbf{BA}=\mathbf{I}})\mathbf{B}' = \mathbf{IB}' = \mathbf{B}'.$ □

La unicidad nos permite dar una definición de “la” *matriz inversa de \mathbf{A}* :

Definición 5.2 (Matriz inversa). *Si \mathbf{A} es invertible, denotaremos con \mathbf{A}^{-1} a la única matriz tal que*

$$\mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1}) = (\mathbf{A}^{-1})\mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

Además diremos que \mathbf{A}^{-1} es la matriz inversa de \mathbf{A} .

Definición 5.3 (Matriz singular). *Si una matriz cuadrada no tiene inversa se dice que es singular.*

A continuación veremos varias propiedades de las matrices inversas. En particular, que el *producto de matrices invertibles* es invertible; que la transpuesta de una *matriz invertible* también es invertible; y que si una matriz tiene alguna fila o columna nula, entonces no es invertible.

EJERCICIO 29. Demuestre las siguientes proposiciones:

(a) **Proposición 5.1.2.** Si \mathbf{A} y \mathbf{B} (de orden n) tienen inversa entonces: $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

(b) **Proposición 5.1.3.** Si $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_k$ tienen inversa, entonces $(\mathbf{A}_1 \cdots \mathbf{A}_k)^{-1} = \mathbf{A}_k^{-1} \cdots \mathbf{A}_1^{-1}$.

Pista. $(\mathbf{A}_1 \cdots \mathbf{A}_k)^{-1} = (\mathbf{A}_1(\mathbf{A}_2 \cdots \mathbf{A}_k))^{-1} = (\mathbf{A}_2 \cdots \mathbf{A}_k)^{-1} \mathbf{A}_1^{-1}$.


(c) **Proposición 5.1.4.** Sea \mathbf{A} de orden n y sea \mathbf{B} invertible de orden n . Entonces \mathbf{AB} es invertible si y solo si \mathbf{A} es invertible.

(d) **Proposición 5.1.5.** Sea \mathbf{A} invertible de orden n y sea \mathbf{B} de orden n . Entonces \mathbf{AB} es invertible si y solo si \mathbf{B} es invertible.

(e) **Proposición 5.1.6.** Si \mathbf{A} de orden n tiene inversa entonces la inversa de \mathbf{A}^\top es: $(\mathbf{A}^\top)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^\top$.

Pista. Recuerde que $\mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top = (\mathbf{AB})^\top$ y aplíquelo a $\mathbf{A}^\top (\mathbf{A}^{-1})^\top$ y a $(\mathbf{A}^{-1})^\top \mathbf{A}^\top$.

(f) **Proposición 5.1.7.** Si alguna fila o columna de \mathbf{A} es nula entonces la matriz es singular.

 \mathbf{A} es invertible si existe \mathbf{B} tal que $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}$; su inversa es única y se denota con \mathbf{A}^{-1} .

- el producto de matrices invertibles es invertible: $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$
- la transpuesta de una matriz invertible es invertible: $(\mathbf{A}^\top)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^\top$.
- Si alguna fila o columna de \mathbf{A} es nula la matriz es *singular* (no tiene inversa).

5.1.1. Inversa de las matrices (transformaciones) elementales.

 ¡No todas las matrices cuadradas son invertibles!

¿Qué hace que una matriz cuadrada sea invertible?...Todo tiene que ver con las matrices elementales. Veamos primero que las transformaciones elementales (y las matrices elementales) son invertibles.

Las transformaciones elementales son reversibles. Por ejemplo, sumar el doble de la primera columna a la tercera, y luego restar el doble de la primera columna de la tercera, nos deja como al principio:

$$\mathbf{A}_{[(2)\mathbf{I}+3][(-2)\mathbf{I}+3]} = \mathbf{A}_{[(2)\mathbf{I}+3]} \left(\mathbf{I}_{[(2)\mathbf{I}+3]} \right) \left(\mathbf{I}_{[(-2)\mathbf{I}+3]} \right) = \mathbf{A} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A}.$$

Algo similar ocurre cuando multiplicamos y dividimos una columna por $\alpha \neq 0$:

$$\mathbf{A}_{[(5)2][(\frac{1}{5})2]} = \mathbf{A}_{[(5)2]} \left(\mathbf{I}_{[(5)2]} \right) \left(\mathbf{I}_{[(\frac{1}{5})2]} \right) = \mathbf{A} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A}$$

En general,

$$\mathbf{A}_{[(\lambda)\mathbf{i}+j][(-\lambda)\mathbf{i}+j]} = \mathbf{A}_{[(-\lambda)\mathbf{i}+j][(\lambda)\mathbf{i}+j]} = \mathbf{A} \quad \text{y} \quad \mathbf{A}_{[(\alpha)\mathbf{i}][(\frac{1}{\alpha})\mathbf{i}]} = \mathbf{A}_{[(\frac{1}{\alpha})\mathbf{i}][(\alpha)\mathbf{i}]} = \mathbf{A},$$

es decir, para toda transformación elemental τ existe otra, que denotamos τ^{-1} , tal que

$$\mathbf{A}_{(\tau^{-1})\tau} = \mathbf{A}_{\tau(\tau^{-1})} = \mathbf{A}. \quad (5.1)$$

Recordando que $\mathbf{A}_{\tau_1\tau_2} = (\mathbf{A}_{\tau_1})_{\tau_2} = (\mathbf{A}_{\tau_1})\mathbf{l}_{\tau_2}$ podemos expresar (5.1) como

$$(\mathbf{A}_{\tau^{-1}})\mathbf{l}_{\tau} = (\mathbf{A}_{\tau})\mathbf{l}_{\tau^{-1}} = \mathbf{A};$$

si en particular $\mathbf{A} = \mathbf{I}$ tenemos que $(\mathbf{l}_{\tau^{-1}})\mathbf{l}_{\tau} = (\mathbf{l}_{\tau})\mathbf{l}_{\tau^{-1}} = \mathbf{I} \implies (\mathbf{l}_{\tau^{-1}}) = (\mathbf{l}_{\tau})^{-1}$.

Así pues, llegamos al siguiente teorema:

Teorema 5.1.8. *Para toda matriz elemental \mathbf{l}_{τ} , existe otra matriz elemental $\mathbf{l}_{\tau^{-1}}$, tal que*

$$\mathbf{l}_{\tau}\mathbf{l}_{\tau^{-1}} = \mathbf{l}_{\tau^{-1}}\mathbf{l}_{\tau} = \mathbf{I}.$$

En la práctica:

$$\left(\mathbf{l}_{\left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (-\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j} \end{smallmatrix} \right]} \right) \left(\mathbf{l}_{\left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j} \end{smallmatrix} \right]} \right) = \left(\mathbf{l}_{\left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j} \end{smallmatrix} \right]} \right) \left(\mathbf{l}_{\left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (-\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j} \end{smallmatrix} \right]} \right) = \mathbf{I} \quad \text{y} \quad \left(\mathbf{l}_{\left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (\frac{1}{\alpha})\mathbf{i} \end{smallmatrix} \right]} \right) \left(\mathbf{l}_{\left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (\alpha)\mathbf{i} \end{smallmatrix} \right]} \right) = \left(\mathbf{l}_{\left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (\alpha)\mathbf{i} \end{smallmatrix} \right]} \right) \left(\mathbf{l}_{\left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (\frac{1}{\alpha})\mathbf{i} \end{smallmatrix} \right]} \right) = \mathbf{I}.$$

Como toda transformación elemental es invertible, también lo es cualquier sucesión de transformaciones elementales (por ejemplo un intercambio). Es decir, se verifica la siguiente

Proposición 5.1.9. *Si \mathbf{A} es producto de matrices elementales, entonces existe \mathbf{B} (también producto de matrices elementales) tal que $\mathbf{AB} = \mathbf{I} = \mathbf{BA}$ (es decir, si $\mathbf{A} = \mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ entonces es invertible).*

Pero hay que tener en cuenta que la última transformación realizada ha de ser la primera en ser invertida (como cuando uno se pone los calcetines y luego los zapatos...para descalzarse se empieza por los zapatos y se finaliza por los calcetines); así, si se realizan una serie de transformaciones elementales en determinado orden, se deshacen en el orden inverso —véase la Proposición 5.1.3.

☞ Cualquier matriz $\mathbf{E} = \mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ es invertible por ser producto de matrices elementales, en particular,

$$(\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k})(\mathbf{l}_{\tau_k^{-1} \dots \tau_1^{-1}}) = (\mathbf{l}_{\tau_1}) \cdots (\mathbf{l}_{\tau_k})(\mathbf{l}_{\tau_k^{-1}}) \cdots (\mathbf{l}_{\tau_1^{-1}}) = \mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k \tau_k^{-1} \dots \tau_1^{-1}} = \mathbf{I};$$

por lo que podemos denotar $\tau_k^{-1} \dots \tau_1^{-1}$ como $(\tau_1 \dots \tau_k)^{-1}$. Así pues, $\mathbf{E}^{-1} = \mathbf{l}_{\tau_k^{-1} \dots \tau_1^{-1}} = \mathbf{l}_{(\tau_1 \dots \tau_k)^{-1}}$.

Librería NAcAL para Python

```
Tr = T([ (3,2), (5,2,3), (10,1,2) ], 'h'); Tr # Secuencia de transformaciones
```

$$\left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (3)2 \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (5)2+3 \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (10)1+2 \end{smallmatrix} \right]$$

```
Tr**(-1)
```

Inversa de la secuencia de transf.

$$\left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (-10)1+2 \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (-5)2+3 \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} \tau \\ (\frac{1}{3})2 \end{smallmatrix} \right]$$

A	= I(3) & Tr	# A: producto de elementales
B	= I(3) & Tr**(-1)	# B es la inversa de A
A*B		# Comprobación de que son inversas

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5.1.2. Matrices pre-escaladas con inversa.

Como primer paso para encontrar un algoritmo que calcule la inversa, demostraremos que una matriz \mathbf{K} , de orden n , pre-escalada y *sin columnas nulas*, se puede transformar en la matriz identidad \mathbf{I} mediante una secuencia de transformaciones elementales

$$\mathbf{K}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \mathbf{K}(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = \mathbf{I} \quad (\text{Teorema 5.1.10}).$$

Consecuentemente, \mathbf{K}^{-1} es el producto de las correspondientes matrices elementales; $\mathbf{K}^{-1} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$.

Como toda matriz pre-escalada y *sin columnas nulas* tiene necesariamente pivotes en todas sus columnas, cualquier matriz *cuadrada*, pre-escalada y sin columnas nulas, tiene pivotes en todas sus *filas* (cada pivote ocupa una fila y columna distintas, y todas sus columnas tienen pivote).

Teorema 5.1.10. Si una matriz \mathbf{K} , de orden n , es pre-escalada y sin columnas nulas, existen k transformaciones elementales tales que $\mathbf{K}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \mathbf{I}$.

Demostración. Basta aplicar las k transformaciones τ_1, \dots, τ_k de la eliminación Gauss-Jordan (Corolario 4.4.3 en la página 53) que transforman \mathbf{K} en su forma escalonada reducida $\mathbf{K}_{\tau_1 \dots \tau_k}$; que en este caso resulta ser la matriz identidad de orden n (pues \mathbf{K} , de orden n , tiene n pivotes). \square

<pre>K = Matrix([[0,5,0], [2,0,0], [6,9,3]]) R = ElimGJ(K,1)</pre>	<div>Librería NAcAL para Python</div> # Forma Escalonada Reducida
----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & 9 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{[1 \leftrightarrow 2]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 6 & 9 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(-3)3+1] \\ [(-2)3+2] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(\frac{1}{5})1] \\ [(\frac{1}{5})2] \\ [(\frac{1}{3})3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Corolario 5.1.11. Si \mathbf{K} es *pre-escalada* y *cuadrada*, las siguientes propiedades son equivalentes

1. \mathbf{K} no tiene columnas nulas
2. \mathbf{K} es un producto de matrices elementales
3. \mathbf{K} tiene inversa

Demostración.

1. \Rightarrow 2. Si \mathbf{K} no tiene columnas nulas, existen transf. elementales $\tau_1 \cdots \tau_k$ tales que $\mathbf{K}_{\tau_1 \cdots \tau_k} = \mathbf{I}$; así que

$$\begin{aligned} \mathbf{I} &= \mathbf{K}_{\tau_1 \cdots \tau_k} = \mathbf{K}(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k}) \Rightarrow \\ \mathbf{I}(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k})^{-1} &= \mathbf{K}(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k})(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k})^{-1} \Rightarrow \\ (\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k})^{-1} &= \mathbf{K} \end{aligned}$$

donde $(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k})^{-1} = \mathbf{I}_{(\tau_1 \cdots \tau_k)^{-1}} = \mathbf{I}_{\tau_k^{-1} \cdots \tau_1^{-1}}$ es un producto de matrices elementales.

2. \Rightarrow 3. ¡Ya se sabe! Proposición 5.1.9 en la página 59.

3. \Rightarrow 1. ¡Ya se sabe!... si tuviera columnas nulas sería singular por la Proposición 5.1.7 en la página 58.

□

```
(R.TrC)**-1 # inversa de la secuencia de Transf. de las
              # Columnas en el proceso de eliminación K --> R
```

Librería NAcAL para Python

```
τ τ τ τ τ τ
[(3)3] [(2)2] [(5)1] [(2)3+2] [(3)3+1] [1=2]
```

(compare con la salida del bloque de código anterior y fíjese cómo la primera transformación inversa deshace la última del bloque anterior, la segunda deshace la penúltima, etc.)

```
I(K.n) & ( R.TrC )**-1 # al aplicar la inversa de las
                        #Transf. sobre la I(3) recuperamos K
```

Librería NAcAL para Python

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & 9 & 3 \end{bmatrix}$$

($\mathbf{K.n}$ es el número de columnas de \mathbf{K} , así que $\mathbf{I}(\mathbf{K.n})$ es la matriz identidad de orden 3)

5.1.3. Matrices invertibles

Corolario 5.1.12 (Caracterización de las matrices invertibles). *Dada \mathbf{A} de orden n , las siguientes propiedades son equivalentes*

1. Al (pre)escalonar \mathbf{A} se obtiene una matriz sin columnas nulas.
2. \mathbf{A} es producto de matrices elementales.
3. \mathbf{A} tiene inversa.

Demostración.

1. \Rightarrow 2. Por el Teorema 4.4.1 sabemos que existen $\tau_1 \cdots \tau_k$ tales que $\mathbf{A}_{\tau_1 \cdots \tau_k} = \mathbf{K}$ es pre-escalónada; y si \mathbf{K} no tiene columnas nulas, entonces es producto de p matrices elementales, $\mathbf{K} = \mathbf{I}_{\tau'_1 \cdots \tau'_p}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k}) &= (\mathbf{I}_{\tau'_1 \cdots \tau'_p}) \\ \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k})(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k})^{-1} &= (\mathbf{I}_{\tau'_1 \cdots \tau'_p})(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k})^{-1} \\ \mathbf{A} &= (\mathbf{I}_{(\tau'_1 \cdots \tau'_p)})(\mathbf{I}_{(\tau_1 \cdots \tau_k)^{-1}}) = \mathbf{I}_{\tau'_1 \cdots \tau'_p \tau_k^{-1} \cdots \tau_1^{-1}}, \end{aligned}$$

2. \Rightarrow 3. ¡Ya se sabe! Proposición 5.1.9 en la página 59

3. \Rightarrow 1. Sean $\tau_1 \cdots \tau_k$ tales que $\mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k}) = \mathbf{K}$ es pre-escalona. Entonces, puesto que $\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k}$ es invertible, \mathbf{A} es invertible si y solo si \mathbf{K} es invertible (Proposición 5.1.4 en la página 58).

□

```
A = Matrix( [ [2,-1,0], [-1,2,-1], [0,-1,2] ] )
K = Elim(A,1) # una forma pre-escalona de A
```

Librería NAcAL para Python

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(1)1+2]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(1)2+3]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

Como \mathbf{A} es cuadrada y la forma pre-escalona \mathbf{K} no tiene columnas nulas, \mathbf{A} es invertible.

Podemos ver las transformaciones que hemos aplicado para llegar a la forma pre-escalona \mathbf{K} con:

```
Tr = K.TrC # Transformaciones aplicadas a las columnas
T(Tr, 'h') # Las representaremos en 'h'horizontal
```

Librería NAcAL para Python

$$[(2)2] [(1)1+2] [(3)3] [(1)2+3]$$

Aplicado la inversa de dichas transformaciones sobre \mathbf{K} recuperamos la matriz original \mathbf{A} :

```
Matrix(K) & ( Tr**-1 ) # es A
```

Librería NAcAL para Python

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Es decir, $\mathbf{A} = (\mathbf{I}_{\tau'_1 \cdots \tau'_p})_{\tau_k^{-1} \cdots \tau_1^{-1}}$ donde $\mathbf{I}_{\tau'_1 \cdots \tau'_p} = \mathbf{K}$ es pre-escalona, como en la demostración anterior:

$$\mathbf{K}_{[(1)2+3] \left[\left(\frac{1}{3} \right) 3 \right] [(-1)1+2] \left[\left(\frac{1}{2} \right) 2 \right]} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}_{[(-1)2+3] \left[\left(\frac{1}{3} \right) 3 \right] [(-1)1+2] \left[\left(\frac{1}{2} \right) 2 \right]} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \mathbf{A}.$$



Las siguientes proposiciones para matrices cuadradas son muy importantes. Nos indican cuando es \mathbf{A} invertible y cuando no lo es.

(también nos indican que hemos de mirar a sus formas pre-escalonas):

- Si \mathbf{A} tiene columnas que son combinación lineal del resto, entonces es singular.
- \mathbf{A} es invertible si y solo si tiene alguna forma pre-escalona invertible.

EJERCICIO 30. Demuestre la siguiente proposición.

Proposición 5.1.13. Sea \mathbf{A} de orden n ; si alguna de sus columnas es combinación lineal del resto (o si alguna de sus filas es combinación lineal del resto), entonces \mathbf{A} es singular.



Y ahora veamos que si \mathbf{A} y \mathbf{B} son de orden n y $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$, entonces \mathbf{A} y \mathbf{B} son una la inversa de la otra.

Este resultado es de gran importancia, pues nos dice que [para comprobar que una matriz cuadrada es invertible, basta ver si existe inversa por uno cualquiera de sus lados](#).

Como nos apoyaremos en la eliminación para su demostración, no hemos podido ver antes este resultado.

Proposición 5.1.14. Para \mathbf{A} y \mathbf{B} de orden n se verifican las siguientes propiedades:

- Si \mathbf{B} es singular, entonces \mathbf{AB} es singular.
- Si \mathbf{A} es singular, entonces \mathbf{AB} es singular.
- Si $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$, entonces tanto \mathbf{A} como \mathbf{B} son invertibles y $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$.

Demostración. Vayamos punto por punto:

- Si \mathbf{B} es singular, la última columna de cualquiera de sus formas escalonadas es nula. Consecuentemente si \mathbf{E} es invertible y tal que \mathbf{BE} es escalonada, entonces la última columna de \mathbf{ABE} es nula. Y por tanto \mathbf{ABE} es singular, pero como \mathbf{E} es invertible, necesariamente \mathbf{AB} es singular.
- Como \mathbf{A} es singular su transpuesta también. Por tanto $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ es singular (punto anterior). Pero como $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = (\mathbf{AB})^T$ es singular, entonces su transpuesta \mathbf{AB} también.
- Como \mathbf{I} es invertible, por el punto anterior, \mathbf{A} tiene que ser invertible, es decir, existe \mathbf{A}^{-1} . Multiplicando ambos lados por \mathbf{A}^{-1} obtenemos el resultado deseado:

$$\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{AB}) = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{I} \Rightarrow \mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}.$$

□



¡Ya tenemos las piezas para diseñar un algoritmo que encuentre la inversa de una matriz!
(lo hace buscando la inversa por el lado derecho mediante eliminación por columnas).

La [eliminación](#) permite encontrar una forma pre-escalonada de toda matriz (Teorema 4.4.1 en la página 51)

$$\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_p} = \mathbf{K},$$

y si \mathbf{K} no tiene columnas nulas, aplicando Gauss-Jordan, se puede continuar con las transformaciones elementales hasta reducir \mathbf{K} hasta \mathbf{I} (Teorema 5.1.10 en la página 60)

$$\mathbf{K}_{\tau_{(p+1)} \dots \tau_k} = \mathbf{I}.$$

Por tanto, la sucesión de k transformaciones elementales $\tau_1 \dots \tau_p, \tau_{(p+1)} \dots \tau_k$ transforma \mathbf{A} en \mathbf{I}

$$\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = \mathbf{I};$$

es decir, si \mathbf{K} no tiene columnas nulas, entonces $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$; y si las tiene entonces \mathbf{A}^{-1} no existe.

```

a, b, c, d = sympy.symbols('a b c d') # definimos las variables simbólicas
A = Matrix([[a,b], [c,d]])           # definimos la matriz
R = ElimGJ(A,1)                       # Eliminación hasta obtener la Identidad
Tr = R.TrC                            # Transformaciones de las Columnas
    
```

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \xrightarrow{\left[(-\frac{b}{a})^{1+2}\right]} \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d - \frac{bc}{a} \end{bmatrix} \xrightarrow{\left[\left(-\frac{ac}{ad-bc}\right)^{2+1}\right]} \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d - \frac{bc}{a} \end{bmatrix} \xrightarrow{\left[\left(\frac{\frac{1}{a}}{ad-bc}\right)^2\right]} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(asumiendo que $a \neq 0$ y que $ad - bc \neq 0$).

Ahora ya sabemos que aplicando las transformaciones sobre las columnas de **I** obtenemos la inversa

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\left[(-\frac{b}{a})^{1+2}\right]\left[\left(-\frac{ac}{ad-bc}\right)^{2+1}\right]\left[\left(\frac{1}{a}\right)^1\right]\left[\left(\frac{a}{ad-bc}\right)^2\right]} = \begin{bmatrix} \frac{d}{ad-bc} & -\frac{b}{ad-bc} \\ -\frac{c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{bmatrix}$$

```

A * (I(2) & Tr)           # comprobación de que I(2) & Tr es la inversa de A
    
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



... Pero aplicar k transformaciones elementales $\tau_1 \cdots \tau_k$ a las columnas de **A** hasta tener **I**, y después aplicar dichas transformaciones a las columnas de la matriz identidad **I** _{τ_i} puede ser bastante pesado.

¿Hay alguna una forma de realizar ambas operaciones a la vez: la transformación $\mathbf{A}_{\tau_1 \cdots \tau_k} = \mathbf{I}$ y la transformación $\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k} = \mathbf{A}^{-1}$?

¡Si! y es sencillísimo... basta “alargar” las columnas de **A** con **I** y entonces aplicar $\tau_1 \cdots \tau_k$ a $\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}$.

5.2. Secuencias de transformaciones elementales. Parte II

Concatenando **A** y **B** (ambas con el mismo número de columnas), es decir, alargando las columnas de **A** poniendo las de **B** por debajo $\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix}$; podemos aplicar una transformación elemental τ a las columnas de esta matriz “alargada”, y el resultado es equivalente a transformar tanto **A** como **B** y concatenar luego las matrices resultantes:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix} \xrightarrow{\tau} \begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix}_{\tau} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\tau} \\ \mathbf{B}_{\tau} \end{bmatrix},$$

de manera que la columna j ésima $\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\tau} \\ \mathbf{B}_{\tau} \end{bmatrix}_{|j}$ es la concatenación de las columnas $(\mathbf{A}_{\tau})_{|j}$ y $(\mathbf{B}_{\tau})_{|j}$.

Lo mismo ocurre si aplicamos una secuencia de k transformaciones elementales:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix}_{\tau_1 \cdots \tau_k} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\tau_1 \cdots \tau_k} \\ \mathbf{B}_{\tau_1 \cdots \tau_k} \end{bmatrix}.$$

Por tanto, si antes de realizar las transformaciones “pegamos” por debajo de $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 7 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ la matriz \mathbf{I} de orden 3 y aplicamos algunas transformaciones:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 7 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(3)\mathbf{2}]} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 7 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(2)\mathbf{1}+2]} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 7 & 14 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \boldsymbol{\tau} \\ \mathbf{I} & \boldsymbol{\tau}_{[(3)\mathbf{2}][(2)\mathbf{1}+2]} \end{bmatrix},$$

entonces sin necesidad de multiplicar sabemos por una parte que

$$\mathbf{I}_{\boldsymbol{\tau}_{[(3)\mathbf{2}][(2)\mathbf{1}+2]}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad \text{y por la otra que} \quad \mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_{[(3)\mathbf{2}][(2)\mathbf{1}+2]}} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 7 & 14 & 4 \end{bmatrix}.$$

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos calcular fácilmente la inversa de \mathbf{A} : basta con “pegar” la matriz identidad debajo y tratar de transformar la submatriz superior (la matriz \mathbf{A}) en la matriz identidad \mathbf{I} mediante transformaciones elementales.

Ejemplo 6.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 2 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(1)\mathbf{2}+1]} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{bmatrix} [(\frac{1}{5})\mathbf{1}] \\ [(-\frac{1}{2})\mathbf{2}] \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1/5 & 0 \\ 1/5 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_1\boldsymbol{\tau}_2\boldsymbol{\tau}_3} \\ \mathbf{I}_{\boldsymbol{\tau}_1\boldsymbol{\tau}_2\boldsymbol{\tau}_3} \end{bmatrix}.$$

Puesto que $\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_1\boldsymbol{\tau}_2\boldsymbol{\tau}_3} = \mathbf{I}$, entonces $\mathbf{I}_{\boldsymbol{\tau}_1\boldsymbol{\tau}_2\boldsymbol{\tau}_3} = \begin{bmatrix} 1/5 & 0 \\ 1/5 & -1/2 \end{bmatrix} = \mathbf{A}^{-1}$.



Método para encontrar la inversa de una matriz (cuadrada)

1. Con transformaciones elementales de las columnas encuentre una forma escalonada reducida de $\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}$.
2. Si en la matriz obtenida $\begin{bmatrix} \mathbf{R} \\ \mathbf{I}_{\boldsymbol{\tau}_1 \dots \boldsymbol{\tau}_k} \end{bmatrix}$ la submatriz \mathbf{R} tiene columnas nulas, entonces \mathbf{A} no tiene inversa.
3. En caso contrario, $\mathbf{I}_{\boldsymbol{\tau}_1 \dots \boldsymbol{\tau}_k}$ es la inversa de \mathbf{A} .

```
A = Matrix([ [1, -1, -3], [0, 1, 0], [0, -1, 1] ])
InvMat(A,1)
```

Calcula la inversa por eliminación Gauss-Jordan

Librería NAcAL para Python

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(1)\mathbf{1}+2], [(3)\mathbf{1}+3]} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(1)\mathbf{3}+2]} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

5.3. Inversa de una matriz triangular

Definición 5.4. Decimos que una matriz \mathbf{L} es *triangular inferior* cuando todos los componentes por encima de la diagonal principal son nulos, es decir, si $l_{ij} = 0$ cuando $i \leq j$.

Por ejemplo las matrices


$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mp} & 0 \end{bmatrix}; \quad \text{y} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & c_{(m-1)n} \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}.$$

Las tres son triangulares inferiores, aunque solo \mathbf{A} es cuadrada. Fíjese que las componentes de la diagonal principal y por debajo pueden tomar cualquier valor (por eso el nombre de “inferior”)... ¡Por tanto, una matriz nula $\mathbf{0}$ siempre es triangular inferior... y superior!

Definición 5.5. Decimos que una matriz \mathbf{U} es *triangular superior* cuando todos los componentes por debajo de la diagonal principal son nulos, es decir, si $u_{ij} = 0$ cuando $i \geq j$.

Por tanto, una matriz es *triangular superior* si su transpuesta es *triangular inferior*.

Las matrices *diagonales* son simultáneamente triangulares superiores e inferiores.

 Veamos ahora que una matriz triangular no puede tener ceros en la diagonal principal y ser invertible.

Por ejemplo, la siguiente matriz no es invertible, pues es imposible encontrar un vector (x, y, z) tal que

$$\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & c & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{I}_{|2}.$$

Por una parte z es necesariamente cero, y por otra, con la primera y segunda columnas no podemos obtener la segunda componente del vector del lado derecho... Ahora vayamos con la demostración general.

Proposición 5.3.1. Una matriz triangular invertible no tiene ceros en la diagonal principal.

Demostración. Si \mathbf{A} es triangular superior (si *las componentes por debajo de la diagonal son nulas*).

¿Puede haber un cero en a_{11} ? (en la primera posición de la diagonal). Puesto que las componentes por debajo de la diagonal son cero, si además a_{11} también fuera cero, entonces la primera columna sería nula, lo cual es imposible dado que \mathbf{A} es invertible. **Por tanto a_{11} no puede ser cero.**

¿Puede haber un primer cero en la posición j ésima de la diagonal? Por ser el *primer* cero de la diagonal, las anteriores componentes de la diagonal serían distintas de cero. Así que aplicando eliminación, podemos anular todas las componentes por encima de a_{jj} ; pero como todas las componentes por debajo también son cero (por ser la matriz triangular superior), anularíamos la columna; algo imposible, pues \mathbf{A} es invertible. **Así que a_{jj} tampoco puede ser cero.** (La demostración es semejante para una triangular inferior) \square

Consecuentemente, una matriz triangular inferior e invertible está necesariamente escalonada, pues los elementos en la diagonal son distintos de cero. Así, para encontrar la inversa solo necesitamos aplicar las dos últimas etapas de la eliminación Gauss-Jordan: *la eliminación “de derecha a izquierda”* para anular (en cada fila) los componentes situados a la izquierda de la diagonal, y *normalizar los pivotes* dividiendo cada columna por el valor de su pivote (fíjese en el Ejemplo 6 en la página anterior).

$$\begin{bmatrix} \mathbf{L} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \xrightarrow{\tau_1, \dots, \tau_n} \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{L}^{-1} \end{bmatrix}.$$

Como las transformaciones aplicadas en la eliminación “de derecha a izquierda” (y en la normalización) no modifican las componentes nulas a la derecha (y por encima) de la diagonal principal de la matriz identidad, llegamos a la siguiente conclusión:

Proposición 5.3.2. *La inversa de una matriz triangular inferior es triangular inferior.*

Además, puesto que la inversa de transpuesta es la transpuesta de la inversa, tenemos el siguiente corolario:

Corolario 5.3.3. *La inversa de una matriz triangular superior es triangular superior.*

👁 Vimos (Corolario 5.1.12) que si una matriz es invertible, ninguna de sus formas pre-escaladas tiene columnas nulas. Una generalización de este resultado da lugar a la definición de **rango** que usaremos aquí.

5.4. Rango de una matriz

Puesto que una forma escalonada es tan solo una reordenación de las columnas de una pre-escalada (Corolario 4.4.2), y como es mucho más sencillo visualizar la estructura de una forma escalonada; el siguiente razonamiento lo realizaremos usando matrices escalonadas sin pérdida de generalidad.

Supongamos que $\mathbf{E} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ y $\mathbf{E}' = \mathbf{I}_{\tau'_1 \dots \tau'_p}$ son dos matrices invertibles tales que $\mathbf{AE} = \mathbf{L}$ y $\mathbf{AE}' = \mathbf{L}'$ son escalonadas. Veamos que las posiciones de los pivotes de \mathbf{L} y \mathbf{L}' son coincidentes.

Por simetría basta comprobar que la posición de pivote de cualquier columna no nula de \mathbf{L}' coincide con la posición de pivote de alguna columna no nula de \mathbf{L}^1 . Para ello tendremos en cuenta que como

$$\mathbf{L}' = \mathbf{AE}' = \mathbf{LE}^{-1}\mathbf{E}', \quad \text{pues } \mathbf{A} = \mathbf{LE}^{-1},$$

por tanto las columnas de $\mathbf{L}' = \mathbf{L}(\mathbf{E}^{-1}\mathbf{E}')$ son combinación lineal de las de \mathbf{L} . Además, por ser \mathbf{L} escalonada, la posición del pivote de cualquier combinación lineal de columnas de \mathbf{L} coincide con la posición de pivote de la primera columna que esté multiplicada por un número no nulo. Por ejemplo, si la primera componente no nula del vector está en la tercera posición, obtenemos un vector cuyo pivote tiene la misma posición que el pivote de la tercera columna (es decir, quinta fila):

$$\begin{bmatrix} * & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ : & * & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ : & : & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ : & : & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ : & : & * & & 0 & \cdots & 0 \\ : & : & : & & 0 & \cdots & 0 \\ : & : & : & \cdots & * & & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \star \\ : \\ : \\ : \\ : \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} * \\ : \\ : \\ : \\ : \\ : \\ : \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ * \\ : \\ : \\ : \\ : \\ : \end{pmatrix} + \star \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ * \\ : \\ : \end{pmatrix} + \cdots = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \star\star \\ : \\ : \end{pmatrix}$$

donde “*” son pivotes y “ $\star \neq 0$ ”.

Así pues, la posición del pivote de cualquier combinación lineal de columnas de \mathbf{L} coincide con la posición del pivote de alguna de columna de \mathbf{L} ... y por tanto la posición de pivote de cada columna de \mathbf{L}' (que es una combinación de las columnas de \mathbf{L}) coincide con la posición de pivote de alguna columna \mathbf{L} ; y lo mismo se puede decir de las columnas de \mathbf{L} respecto de las de \mathbf{L}' , pues $\mathbf{L} = \mathbf{L}'((\mathbf{E}')^{-1}\mathbf{E})$. Concluimos que como las posiciones de los pivotes de \mathbf{L} y \mathbf{L}' son coincidentes, el número de columnas no nulas de \mathbf{L} coincide con el número de columnas no nulas de \mathbf{L}' . Este resultado nos permite dar la siguiente definición:

Definición 5.6 (Rango de una matriz). *El rango de \mathbf{A} es el número de columnas no nulas de cualquiera de sus formas pre-escaladas, es decir, el número de pivotes de cualquiera de sus formas pre-escaladas.*

¹por “simetría” me refiero a que siguiendo el mismo razonamiento también se llega a que la posición del pivote de cualquier columna no nula de \mathbf{L} coincide con la posición del pivote de alguna columna no nula de \mathbf{L}'

5.4.1. Algunas propiedades del rango de una matriz

Proposición 5.4.1. Si \mathbf{E} es invertible, entonces $\text{rango}(\mathbf{A}) = \text{rango}(\mathbf{AE})$.

Demostración. Con ambas matrices se pueden obtener idénticas formas pre-escaladas:

$$\text{Si } \mathbf{E} = \mathbf{I}_{\tau'_1 \dots \tau'_p}, \text{ entonces } \mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} = (\mathbf{AEE}^{-1})_{\tau_1 \dots \tau_k} = (\mathbf{AE})_{(\tau'_1 \dots \tau'_p)^{-1} \tau_1 \dots \tau_k}.$$

□

Proposición 5.4.2. El rango de \mathbf{AB} es menor o igual que el de \mathbf{B} .

Demostración. Sea $\mathbf{E} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ tal que $\mathbf{BE} = \mathbf{L}$ es escalonada. Entonces

- Aplicando la proposición anterior tenemos que en particular: $\text{rango}(\mathbf{AB}) = \text{rango}((\mathbf{AB})\mathbf{E})$.
- Por otra parte tenemos que $(\mathbf{AB})\mathbf{E} = \mathbf{A}(\mathbf{BE}) = \mathbf{AL}$, y si k es el número de columnas nulas de la matriz escalonada \mathbf{L} , las últimas k columnas de \mathbf{AL} son necesariamente nulas.
- Si realizamos transformaciones elementales sobre las columnas de \mathbf{AL} de manera que no modificamos las k últimas, obtendremos una forma escalonada con al menos k columnas nulas. Por tanto, el rango de \mathbf{AL} es menor o igual que el rango de \mathbf{L} , por lo que finalmente concluimos que

$$\text{rango}(\mathbf{AB}) = \text{rango}(\mathbf{ABE}) = \text{rango}(\mathbf{AL}) \leq \text{rango}(\mathbf{L}) = \text{rango}(\mathbf{B}).$$

□

Proposición 5.4.3. Si \mathbf{E} es invertible, entonces $\text{rango}(\mathbf{EA}) = \text{rango}(\mathbf{A})$.

Demostración. La proposición anterior nos indica que $\text{rango}(\mathbf{EA}) \leq \text{rango}(\mathbf{A})$, pero también nos indica que $\text{rango}(\mathbf{E}^{-1}(\mathbf{EA})) \leq \text{rango}(\mathbf{EA})$; por tanto $\text{rango}(\mathbf{A}) \leq \text{rango}(\mathbf{EA})$. Por tanto, $\text{rango}(\mathbf{EA}) = \text{rango}(\mathbf{A})$.

□

Fíjese que si tenemos una forma escalonada reducida \mathbf{R} y aplicamos la eliminación por filas, para anular las componentes por debajo de los pivotes, obtenemos una matriz escalonada reducida cuya transpuesta también es escalonada reducida:

Librería NAcAL para Python

```
R = Matrix( [ [1,0,0,0], [-1,0,0,0], [0,1,0,0], [0,0,1,0], [0,0,2,0] ] )
S = ElimGF(R,1)           # Eliminación Gaussiana por filas
~S                         # transpuesta de S
```

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(1)\tau_1+2]} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-2)\tau_4+5]} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau_3 \rightleftharpoons \tau_4 \\ [2 \rightleftharpoons 3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{S}$$

$$\mathbf{S}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Vamos a aprovechar este hecho para demostrar la siguiente proposición.

Proposición 5.4.4. Si \mathbf{R} es escalonada reducida, entonces $\text{rango}(\mathbf{R}) = \text{rango}(\mathbf{R}^T)$.

Demostración. Mediante k transformaciones elementales de las filas es posible anular las componentes por debajo de los pivotes de \mathbf{R} , de manera que todas las componentes de $\tau_k \dots \tau_1 \mathbf{R} = \mathbf{S}$ son nulas salvo los pivotes, que siguen siendo los mismos unos. Por tanto, \mathbf{S} también es escalonada reducida y con el mismo rango que \mathbf{R} . Sea $\mathbf{E} = \tau_k \dots \tau_1 \mathbf{I}$, aplicando la Proposición 5.4.1 en la primera igualdad y la Proposición 5.4.3 en la última, concluimos que

$$\text{rango}(\mathbf{R}^T) = \text{rango}(\mathbf{R}^T \mathbf{E}^T) = \text{rango}(\mathbf{S}^T) = \text{rango}(\mathbf{S}) = \text{rango}(\mathbf{E} \mathbf{R}) = \text{rango}(\mathbf{R}).$$

□

Proposición 5.4.5. $\text{rango}(\mathbf{A}) = \text{rango}(\mathbf{A}^T)$.

Demostración. Sea \mathbf{E} invertible tal que $\mathbf{A} \mathbf{E} = \mathbf{R}$ es escalonada reducida, entonces (aplicando la Proposición 5.4.3 en la última igualdad) tenemos que: $\text{rango}(\mathbf{A}) = \text{rango}(\mathbf{A} \mathbf{E}) = \text{rango}(\mathbf{R}) = \text{rango}(\mathbf{R}^T) = \text{rango}(\mathbf{E}^T \mathbf{A}^T) = \text{rango}(\mathbf{A}^T)$. □

Y por último

Proposición 5.4.6. El rango de $\mathbf{A} \mathbf{B}$ es menor o igual que el de \mathbf{A} .

Demostración. $\text{rango}(\mathbf{A} \mathbf{B}) = \text{rango}(\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T) \leq \text{rango}(\mathbf{A}^T) = \text{rango}(\mathbf{A})$. □

Librería NAcAL para Python

```
Elim(A).rango    # rango es una atributo de la clase Elim
A.rango()        # rango() es un método de la clase Matrix
```

Rango completo por filas (por columnas). Rango completo. Una matriz cuyas formas pre-escaladas tienen pivote en todas las columnas se dice que es *de rango completo por columnas*; y si tienen pivote en todas las filas se dice que es *de rango completo por filas*. Una matriz que es de rango completo tanto por filas como por columnas (y que por tanto es cuadrada) se dice que es *de rango completo*. Así pues, por el Corolario 5.1.11, *una matriz de rango completo es invertible*, pues es cuadrada y sin columnas nulas (por tener todas pivote).

Parte III

Subespacios y resolución de sistemas de ecuaciones lineales

Introducción a subespacios y funciones lineales



El propósito de esta lección es introducir terminología abstracta que usaremos a partir de ahora y, de paso, podremos recapitular lo visto hasta aquí empleando la nueva terminología abstracta.

Comenzaremos con los espacios vectoriales y la creación de nuevos espacios vectoriales mediante el productos cartesianos. Luego trataremos sobre las funciones lineales. Terminaremos con espacios vectoriales formados por funciones.

Casi cualquier espacio vectorial con el que se encuentre en otras disciplinas será fruto de un encadenamiento de espacios vectoriales de funciones y productos cartesianos.

6.1. Espacios vectoriales y subespacios vectoriales

Para cualesquiera *números reales* a , b y c (y empleando la suma y producto habituales) se verifica que:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. $a + b = b + a$. | 5. $a(b + c) = ab + ac$. |
| 2. $a + (b + c) = (a + b) + c$. | 6. $(a + b)c = ac + bc$. |
| 3. $a + 0 = a$. | 7. $a(bc) = (ab)c$. |
| 4. $a + (-a) = 0$. | 8. $1a = a$. |

También sabemos que si definimos la suma y el producto por escalares para \mathbb{R}^n como:

$$(a + b)_{|i} = a_{|i} + b_{|i} \quad \text{y} \quad (\lambda b)_{|i} = \lambda(b_{|i}),$$

se verifican las siguientes propiedades (Proposición 1.2.1 en la página 9):

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. $a + b = b + a$ | 5. $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$ |
| 2. $a + (b + c) = (a + b) + c$ | 6. $(\lambda + \eta)a = \lambda a + \eta a$ |
| 3. $a + 0 = a$ | 7. $\lambda(\eta a) = (\lambda\eta)a$ |
| 4. $a + (-a) = 0$ | 8. $1a = a$ |

Y si definimos la suma y el producto por escalares para $\mathbb{R}^{m \times n}$ (*matrices de orden m por n*) como

$$(A + B)_{|j} = A_{|j} + B_{|j} \quad \text{y} \quad (\lambda A)_{|j} = \lambda(A_{|j}),$$

se verifican las siguientes propiedades (Proposición 1.5.1 en la página 19):

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. $A + B = B + A$ | 5. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ |
| 2. $A + (B + C) = (A + B) + C$ | 6. $(\lambda + \eta)A = \lambda A + \eta A$ |
| 3. $A + 0 = A$ | 7. $\lambda(\eta A) = (\lambda\eta)A$ |
| 4. $A + (-A) = 0$ | 8. $1A = A$ |

A primera vista es evidente que subyace una estructura común a \mathbb{R} , a \mathbb{R}^n (con la suma y producto por escalares correspondiente) y al conjunto de matrices $\mathbb{R}^{m \times m}$ (y sus correspondientes operaciones de suma de matrices y producto por escalares). Esta estructura se denomina *espacio vectorial*.

Definición 6.1. Un espacio vectorial es un conjunto \mathcal{V} de objetos¹ junto con dos operaciones que denominamos: **suma** y **producto por escalares**.

En cuanto a los elementos de \mathcal{V} :

- se denominan **vectores** y los denotaremos genéricamente con letras minúsculas en cursiva y con una flecha por encima: $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \dots$

En cuanto a las operaciones:

- la **suma** asocia cualquier par de elementos de \mathcal{V} con otro elemento de \mathcal{V} .

Dicho de otro modo, la suma de dos vectores, \vec{x} e \vec{y} , de \mathcal{V} es otro vector de \mathcal{V} que denotamos $\vec{x} + \vec{y}$. Esto se representa esquemáticamente con²

$$\begin{aligned} _ + _: \mathcal{V} \times \mathcal{V} &\rightarrow \mathcal{V} \\ (\vec{x}, \vec{y}) &\rightarrow \vec{x} + \vec{y} \end{aligned}$$

(Puesto que sumando vectores de \mathcal{V} se obtienen elementos \mathcal{V} , se dice que \mathcal{V} es cerrado para la suma).

La operación suma debe verificar las siguientes cuatro propiedades:

1. $\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$
 2. $\vec{x} + (\vec{y} + \vec{z}) = (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z}$
 3. Existe un vector, que denotamos con $\vec{0}$, tal que $\vec{x} + \vec{0} = \vec{x}$, para todo $\vec{x} \in \mathcal{V}$.
 4. Para cada $\vec{x} \in \mathcal{V}$ existe un vector, que denotamos con $-\vec{x}$, tal que $\vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0}$.
- el **producto por escalares** asocia cualquier par, formado por un un escalar y un vector de \mathcal{V} , con un vector de \mathcal{V} .

Dicho de otro modo, el producto de $a \in \mathbb{R}$ por $\vec{x} \in \mathcal{V}$ es otro vector de \mathcal{V} que denotamos $a \cdot \vec{x}$. Esto se representa esquemáticamente con

$$\begin{aligned} _ \cdot _: \mathbb{R} \times \mathcal{V} &\rightarrow \mathcal{V} \\ (a, \vec{y}) &\rightarrow a \cdot \vec{x} \end{aligned}$$

(normalmente omitimos el “punto” y escribimos sencillamente $a\vec{x}$, que llamaremos *múltiplo* de \vec{x}).

La operación producto por un escalar debe verificar las siguientes cuatro propiedades:

5. $a(\vec{x} + \vec{y}) = a\vec{x} + a\vec{y}$
6. $(a + b)\vec{x} = a\vec{x} + b\vec{x}$
7. $(a \cdot b)\vec{x} = a(b\vec{x})$
8. $1\vec{x} = \vec{x}$

Por tanto, y recordando lo visto en la Lección 1, sabemos que el conjunto de números reales \mathbb{R} , el conjunto de listas ordenadas \mathbb{R}^n y el conjunto de matrices $\mathbb{R}^{m \times n}$ (junto con las operaciones de suma y producto por escalares definidas respectivamente en a cada conjunto) son espacios vectoriales.

EJERCICIO 31. Demuestre que

- (a) si $\vec{z} + \vec{x} = \vec{x}$ para cualquier \vec{x} , entonces necesariamente $\vec{z} = \vec{0}$.
- (b) si $\vec{z} + \vec{x} = \vec{0}$ entonces $\vec{z} = -\vec{x}$.

Por tanto, en todo espacio vectorial los vectores $\vec{0}$ y, para cada \vec{x} , el vector opuesto son únicos.

¹objetos del mismo tipo: o números, o vectores, o matrices, o funciones, o polinomios, o variables aleatorias, etc.

²Véase el Apéndice 6.4.1 en la página 81 de esta lección.

Notación. En el caso particular de \mathbb{R}^n usamos los símbolos \mathbf{a} , \mathbf{x} , $\mathbf{0}$, etc. para denotar las *listas ordenadas de números reales* (i.e., los vectores de \mathbb{R}^n); y en el caso de $\mathbb{R}^{m \times n}$ usamos \mathbf{A} , \mathbf{X} , $\mathbf{0}$, etc. para las matrices (i.e., los vectores de $\mathbb{R}^{m \times n}$). Pero en general denotamos los vectores de un espacio vectorial genérico \mathcal{V} con \vec{a} , \vec{x} , $\vec{0}$, etc.

Para denotar espacios vectoriales genéricos usaremos caracteres como: \mathcal{C} , \mathcal{N} , \mathcal{X} , \mathcal{V} , \mathcal{W} ...



Fíjese que la definición de espacio vectorial es abstracta, pues nada se dice sobre la naturaleza de los objetos que constituyen el conjunto \mathcal{V} , como tampoco sobre la definición de las operaciones *suma de vectores* y *producto de un escalar por un vector*; tan solo se enumeran las propiedades que deben verificar las operaciones.

Consecuentemente, para definir un espacio vectorial concreto necesitaremos indicar qué elementos constituyen el conjunto; y definir las operaciones (suma y producto por escalares) de manera que verifiquen las propiedades indicadas. Implícitamente así lo hicimos en la Lección 1. (véase el ejercicio a continuación del recuadro)

EJERCICIO 32. Considere el conjunto de números reales *positivos*, \mathbb{R}^+ , junto con las siguientes definiciones: suma de \vec{x} e \vec{y} es xy ; y el producto de un escalar por el vector \vec{x} es x^c , es decir,

$$\begin{array}{ccc} _ + _: \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} & \text{y} & _ \cdot _: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ (\vec{x}, \vec{y}) & \rightarrow & xy \qquad \qquad \qquad (c, \vec{x}) \rightarrow x^c \end{array}$$

Demuestre que \mathbb{R}^+ junto con las operaciones indicadas es un espacio vectorial. ¿Quién es $\vec{0}$ en este caso?

6.1.1. Algunas propiedades

Hay algunas propiedades muy elementales que se cumplen en cualquier espacio vectorial \mathcal{V} y que se deducen de las ocho propiedades descritas más arriba: para el vector nulo $\vec{0} \in \mathcal{V}$ y cualquier escalar a :

$$a\vec{0} = a(\vec{0} + \vec{0}) = a\vec{0} + a\vec{0}.$$

Restando $-(a\vec{0})$ a ambos lados deducimos que $\vec{0} = a\vec{0}$. Y para el escalar 0 y cualquier vector $\vec{x} \in \mathcal{V}$:

$$0\vec{x} = (0 + 0)\vec{x} = 0\vec{x} + 0\vec{x}$$

Restando $-(0\vec{x})$ a ambos lados deducimos que $\vec{0} = 0\vec{x}$. Además, $(-1)\vec{x} = -\vec{x}$, puesto que

$$\vec{x} + (-1)\vec{x} = 1\vec{x} + (-1)\vec{x} = (1 - 1)\vec{x} = 0\vec{x} = \vec{0}.$$

Por último, si $a\vec{v} = \vec{0}$, hay dos casos posibles. O bien $a = 0$; o si es distinto de cero, multiplicando ambos lados por a^{-1} , tenemos $a^{-1}(a\vec{v}) = a^{-1}\vec{0}$. Desarrollando el lado izquierdo llegamos a $a^{-1}(a\vec{v}) = (a^{-1}a)\vec{v} = 1\vec{v} = \vec{v}$; y el lado derecho es $\vec{0}$, pues $\vec{0}$ por cualquier escalar es $\vec{0}$. Así llegamos a que si $a \neq 0$ entonces $\vec{v} = \vec{0}$.

Acabamos de demostrar el siguiente

Teorema 6.1.1. Si \mathcal{V} es un espacio vectorial

1. $\vec{0} = a\vec{0}$ para $\vec{0} \in \mathcal{V}$ y $a \in \mathbb{R}$.
2. $\vec{0} = 0\vec{x}$ para $\vec{x} \in \mathcal{V}$ y $0 \in \mathbb{R}$.
3. $(-1)\vec{x} = -\vec{x}$ para todo $\vec{x} \in \mathcal{V}$.
4. Si $a\vec{v} = \vec{0}$ o bien $a = 0$ o bien $\vec{v} = \vec{0}$.

Particularizando a los espacios \mathbb{R}^n y $\mathbb{R}^{m \times n}$ tenemos que:

En \mathbb{R}^n

1. $\mathbf{0} = a\mathbf{0}$ para $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ y $a \in \mathbb{R}$.
2. $\mathbf{0} = 0\mathbf{x}$ para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ y $0 \in \mathbb{R}$.
3. $(-1)\mathbf{x} = -\mathbf{x}$ para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
4. Si $a\mathbf{x} = \mathbf{0}$ o bien $a = 0$ o bien $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

En $\mathbb{R}^{m \times n}$

1. $\mathbf{0} = a\mathbf{0}$ para $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $a \in \mathbb{R}$.
2. $\mathbf{0} = 0\mathbf{A}$ para $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $0 \in \mathbb{R}$.
3. $(-1)\mathbf{A} = -\mathbf{A}$ para todo $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.
4. Si $a\mathbf{A} = \mathbf{0}$ o bien $a = 0$ o bien $\mathbf{A} = \mathbf{0}$.



Hemos visto que el conjunto de matrices m por n ($\mathbb{R}^{m \times n}$), las listas ordenadas de n números (\mathbb{R}^n) y el conjunto de números reales \mathbb{R} , comparten una estructura común: la estructura de *espacio vectorial*.

Dicha estructura consiste en un conjunto de objetos junto con las operaciones de *suma* y *producto por escalares* que verifican las mismas propiedades que ya vimos para la suma y producto para escalares en la Lección 1. Los elementos de un espacio vectorial \mathcal{V} se denominan *vectores* de \mathcal{V} .

En la Definición 2.2 de la Página 24 definimos las *combinaciones lineales* de vectores de \mathbb{R}^n . Ahora daremos una definición de combinación lineal para vectores de un espacio vectorial genérico \mathcal{V} :

Definición 6.2 (Combinación lineal). Sea $[\vec{v}_1; \vec{v}_2; \dots \vec{v}_n]$ un sistema de n vectores de \mathcal{V} . Llamamos *combinación lineal* a cualquier suma de múltiplos de dichos vectores:

$$a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2 + \dots + a_n\vec{v}_n$$

donde los " a_i " son los coeficientes de la combinación lineal.

6.1.2. Subespacios

Algunos subconjuntos de un espacio vectorial \mathcal{V} (y con las mismas operaciones de \mathcal{V}) son espacios vectoriales por sí mismos. Dichos subconjuntos se denominan *subespacios*.

Definición 6.3. Un subconjunto \mathcal{W} no vacío de un espacio vectorial \mathcal{V} es un subespacio de \mathcal{V} si es cerrado para la suma y el producto por escalares. Es decir, si para todo \vec{x} e \vec{y} en \mathcal{W} y todo escalar a ,

1. $\vec{x} + \vec{y}$ esta en el subespacio \mathcal{W}
2. $a\vec{x}$ esta en el subespacio \mathcal{W}

Así, para demostrar que \mathcal{W} es un subespacio de \mathcal{V} basta comprobar que es cerrado tanto para la suma como para el producto por escalares. Alternativamente, también basta demostrar que *es cerrado para las combinaciones lineales*, pues si para todo \vec{x} e \vec{y} en \mathcal{W} y para todo $a, b \in \mathbb{R}$

$$a\vec{x} + b\vec{y} \text{ esta en el subespacio } \mathcal{W}$$

entonces con $a = b = 1$ satisfacemos la primera condición de la definición y con $b = 0$ la segunda. Por tanto, decir que *el conjunto es cerrado para las combinaciones lineales* es equivalente a decir que el conjunto es cerrado para la suma y el producto por escalares.

EJERCICIO 33. ¿Es subespacio el conjunto de combinaciones lineales de n vectores de un espacio vectorial?

Fíjese que si W es un subconjunto de un espacio vectorial \mathcal{V} ; sabremos inmediatamente que W no es un subespacio si $\vec{0}$ no está en W , o si está \vec{x} pero no $-\vec{x}$.



Un subespacio es un espacio vectorial que está contenido dentro de otro espacio vectorial.

Para comprobar que W es subespacio basta verificar si es cerrado para la suma y el producto por escalares (es decir, que es cerrado para las combinaciones lineales).

Ejemplos de subespacios

- Los vectores de \mathbb{R}^3 cuya primera componente es cero

Si sumamos dos vectores con primera componente nula, obtenemos otro vector con la primera componente nula; y lo mismo ocurre con cualquier múltiplo de un vector con primera componente nula.

- Las funciones reales ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) que además son continuas (véase la Sección 6.4 en la página 80).

Si sumamos dos funciones reales y continuas, obtenemos otra función real y continua; y lo mismo ocurre si multiplicamos una función real y continua por un escalar.

- Polinomios ($\mathbb{R}[x]$).
- Variables aleatorias con esperanza cero: su suma tiene esperanza cero y cualquier múltiplo también.
- Variables aleatorias con distribución normal (gaussiana).

☞ Nótese que como todo conjunto está contenido en si mismo, todo espacio vectorial es un *subespacio* de si mismo. Por tanto, son subespacios de cualquier espacio vectorial \mathcal{V} , tanto \mathcal{V} , como el subconjunto $\{\vec{0}\}$ que contiene únicamente el vector cero (pues obviamente es cerrado para la suma y el producto por escalares).

Intersección de subespacios

La intersección de subespacios es un subespacio:

Teorema 6.1.2. Sean \mathcal{V}_1 y \mathcal{V}_2 subespacios de \mathcal{S} , entonces la intersección de $\mathcal{W} = \mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2$ también lo es.

Demostración. Basta probar que la intersección es cerrada para las combinaciones lineales. Para ello tomamos a y b de \mathbb{R} y \vec{x} e \vec{y} de \mathcal{W} . Como \mathcal{W} es la intersección, entonces \vec{x} e \vec{y} pertenecen tanto a \mathcal{V}_1 como a \mathcal{V}_2 .

- Por ser \mathcal{V}_1 un subespacio (i.e., cerrado para las comb. lineales) sabemos que $a\vec{x} + b\vec{y} \in \mathcal{V}_1$.
- Por ser \mathcal{V}_2 un subespacio (i.e., cerrado para las comb. lineales) sabemos que $a\vec{x} + b\vec{y} \in \mathcal{V}_2$.

Por tanto, si \vec{x} y \vec{y} pertenecen a \mathcal{W} , entonces $a\vec{x} + b\vec{y} \in \mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2 = \mathcal{W}$. □

Sin embargo, la unión de subespacios no suele ser cerrada para la suma (piense en la unión del conjunto de *vectores de \mathbb{R}^3 cuya primera componente es cero* y el conjunto de *vectores de \mathbb{R}^3 cuya última componente es cero*; si sumamos un vector del primer grupo con uno del segundo, generalmente obtendremos un vector en el que no son cero ni la primera, ni la última componentes (al sumar nos “salimos” del conjunto).

☞ En este curso trabajaremos principalmente con el espacio vectorial \mathbb{R}^n , pero debe saber que otros muchos conjuntos poseen estructura de espacio vectorial (véase la Sección 6.4).

Veamos una primera forma de construir espacios vectoriales a partir de otros espacios vectoriales.

6.2. Espacios vectoriales de productos cartesianos

El *producto Cartesiano* de dos conjuntos A y B , que denotamos con $A \times B$, es el conjunto de pares ordenados (a, b) donde $a \in A$ y $b \in B$:

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B \}.$$

Si \mathcal{A} y \mathcal{B} son espacios vectoriales, definimos la suma de pares ordenados del conjunto $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ como el par ordenado formado por la suma de las primeras componentes y la suma de las segundas:

$$(\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{c}, \vec{d}) = (\vec{a} + \vec{c}, \vec{b} + \vec{d}); \tag{6.1}$$

donde es importante hacer notar que el símbolo “+” de la izquierda representa la suma de pares ordenados; pero que los símbolos “+” de la derecha representan las sumas de los vectores de los respectivos espacios vectoriales. Por ejemplo, si consideramos pares del producto Cartesiano $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{p \times q}$, entonces

$$(\mathbf{x}, \mathbf{A}) + (\mathbf{y}, \mathbf{B}) = (\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{A} + \mathbf{B})$$

evidentemente los tres tipos de sumas, lo son de objetos muy distintos.

Y definimos el producto de un escalar λ por un par ordenado como el par ordenado que resulta de multiplicar cada componente por el escalar λ

$$\lambda(\vec{a}, \vec{b}) = (\lambda\vec{a}, \lambda\vec{b}); \quad (6.2)$$

siguiendo con los productos el mismo criterio que con las sumas en la definición anterior. Por ejemplo

$$\lambda(\mathbf{x}, \mathbf{A}) = (\lambda\mathbf{x}, \lambda\mathbf{A}).$$

EJERCICIO 34. Demuestre la siguiente

Proposición 6.2.1. *El producto Cartesiano $\mathcal{A} \times \mathcal{X}$ de los espacios vectoriales \mathcal{A} y \mathcal{X} , junto con la suma de pares ordenados (6.1) y el producto de un par ordenado por un escalar (6.2) es un espacio vectorial.*

Generalizando, el *producto Cartesiano* de n conjuntos A, B, \dots, M , que denotamos con $A \times B \times \dots \times M$, e consiste en el conjunto de n -tuplas ordenadas (a, b, \dots, m) donde $a \in A$, $b \in B, \dots$ y $m \in M$:

$$A \times B \times \dots \times M = \{ (a, b, \dots, m) \mid a \in A, b \in B, \dots \text{ y } m \in M \}.$$

Pero alternativamente podemos considerar esta generalización como el producto cartesiano del primer conjunto con el producto cartesiano de los $n - 1$ restantes:

$$A \times B \times \dots \times M = A \times (B \times \dots \times M).$$

Ejemplo 7.

$$A \times B \times C \times D = A \times (B \times (C \times D)).$$

De este modo, aprovechamos el resultado anterior para saber que el producto Cartesiano $\mathcal{A} \times \mathcal{B} \times \dots \times \mathcal{X}$ de los espacios vectoriales $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \dots, \mathcal{X}$, junto con la suma de pares ordenados (6.1) y el producto de un par ordenado por un escalar (6.2) es un espacio vectorial.

👉 El segundo término abstracto de la lección son las funciones lineales...

6.3. Funciones lineales

A lo largo de estas lecciones hemos indicado en numerosas ocasiones que ciertos operadores eran *lineales*.³ En cada una de esas ocasiones lo que hemos visto es un ejemplo de función lineal.⁴

Definición 6.4 (Función lineal). *Sean \mathcal{D} y \mathcal{V} dos espacios vectoriales. Decimos que la función $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{V}$ es **lineal** si satisface las siguientes propiedades:*

1. Para todo $\vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{D}$, $f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y})$.
2. Para todo $\vec{x} \in \mathcal{D}$ y para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, $f(\alpha\vec{x}) = \alpha f(\vec{x})$.

👉 Si recapitulamos sobre las operaciones que hemos empleado en este curso hasta el momento, veremos que casi todas son funciones lineales.

³Consideraremos como sinónimos los términos: función lineal, aplicación lineal, transformación lineal u operador lineal.

⁴Se da por supuesto que usted conoce lo que son las funciones pero, por si no lo recuerda, dispone de un Apéndice 6.4.1 en la página 81 con todo lo necesario al final de esta Lección.

6.3.1. Ejemplos de funciones lineales que ya hemos usado

Ejemplo 8. Las definiciones de suma y producto por escalares dadas en la Sección 1.2 en la página 6 convierten a la función $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}_{|i}$ que selecciona la componente i ésima de un vector de \mathbb{R}^n en una función lineal que podemos describir con el siguiente esquema

$$\begin{array}{ccc} \text{---}|i : \mathbb{R}^n & \rightarrow & \mathbb{R} \\ \mathbf{x} & \rightarrow & x_i \end{array}$$

Y sabemos que $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}_{|i}$ es lineal puesto que

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= (\mathbf{a} + \mathbf{b})_{|i} = \mathbf{a}_{|i} + \mathbf{b}_{|i} = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) \\ f(\lambda \mathbf{x}) &= (\lambda \mathbf{b})_{|i} = \lambda(\mathbf{b}_{|i}) = \lambda f(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

EJERCICIO 35. Describa con un esquema (al modo de ejemplo anterior) las siguientes funciones lineales, e indique (como en el ejemplo anterior) por qué son funciones lineales:

- (a) La selección de la columna j ésima de una matriz $f(\mathbf{A}) = \mathbf{A}_{|j}$ (Página 19)
- (b) La selección de la componente de la fila i ésima y columna j ésima de una matriz $f(\mathbf{A}) = {}_i|\mathbf{A}_{|j}$ (Página 20)
- (c) La transposición de una matriz de orden m por n ; $f(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^\top$ (Página 20)
- (d) La selección de la fila i ésima de una matriz $f(\mathbf{A}) = {}_i|\mathbf{A}$ (Página 20)
- (e) El producto de una matriz por el vector \mathbf{b} por su derecha $f_{\cdot \mathbf{b}}(\mathbf{A}) = \mathbf{A}\mathbf{b}$ (Página 26)
- (f) El producto de un vector por una matriz \mathbf{A} a su izquierda $f_{\mathbf{A}}(\mathbf{b}) = \mathbf{A}\mathbf{b}$ (Página 24)
- (g) El producto de una matriz por el vector \mathbf{a} por su izquierda $f_{\mathbf{a}}(\mathbf{B}) = \mathbf{a}\mathbf{B}$ (Página 27)
- (h) El producto de un vector por una matriz \mathbf{B} a su derecha $f_{\mathbf{B}}(\mathbf{a}) = \mathbf{a}\mathbf{B}$ (Página 28)
- (i) El producto de una matriz por una matriz \mathbf{B} a su derecha $f_{\cdot \mathbf{B}}(\mathbf{A}) = \mathbf{A}\mathbf{B}$ (Página 31)
- (j) El producto de una matriz por una matriz \mathbf{A} a su izquierda $f_{\mathbf{A}}(\mathbf{B}) = \mathbf{A}\mathbf{B}$ (Página 31)
- (k) Una transformación elemental de las columnas de una matriz $\mathbf{A} : c_\tau(\mathbf{A}) = \mathbf{A}_\tau$ (Página 46)
- (l) Una transformación elemental de las filas de una matriz $\mathbf{A} : f_\tau(\mathbf{A}) = {}_\tau\mathbf{A}$ (Página 54)

👁️ ¡Fíjese que podríamos haber titulado “Ejemplos de funciones lineales” a las cuatro primeras lecciones!

6.3.2. Algunas propiedades de las funciones lineales

A continuación vamos a ver algunos resultados básicos de las funciones lineales. Empecemos con la *composición* y la *inversa* de funciones lineales:

EJERCICIO 36. Demuestre las siguientes proposiciones (ambas demostraciones son muy similares):

- (a) **Proposición 6.3.1.** La composición $g \circ f$ de dos funciones lineales $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{V}$ y $g: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ es una función lineal.
- (b) **Proposición 6.3.2.** Si $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{V}$ es lineal e invertible, su inversa $f^{-1}: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{D}$ también es lineal.

¡En las primeras lecciones también nos hemos topado con composiciones de funciones lineales! Por ejemplo:

- La selección de la componente de la fila i ésima y columna j ésima de una matriz $f(\mathbf{A}) = {}_i|\mathbf{A}_{|j}$, es decir

$${}_i|\text{---}|j : \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}$$

es la composición de la función que selecciona la i ésima fila de la matriz, con la función que selecciona la componente j ésima de la fila.

$${}_i|\text{---}|j : \mathbb{R}^{m \times n} \xrightarrow{{}_i|\text{---}} \mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{---}|j} \mathbb{R}$$

- El producto de dos matrices por un vector $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{x}$ es un ejemplo de composición de funciones lineales; pues si $f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$ y $f_{\mathbf{B}}(\mathbf{x}) = \mathbf{B}\mathbf{x}$; entonces

$$[f_{\mathbf{A}} \circ f_{\mathbf{B}}](\mathbf{x}) = f_{\mathbf{A}}(f_{\mathbf{B}}(\mathbf{x})) = f_{\mathbf{A}}(\mathbf{B}\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{x} = f_{\mathbf{AB}}(\mathbf{x}).$$

Fíjese que aunque en el ejemplo anterior el orden en el que aparecen compuestas las funciones coincide con el orden en el que aparecen las matrices en el producto, ocurre lo contrario cuando se multiplica por la izquierda: si $g_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}\mathbf{A}$ y $g_{\mathbf{B}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}\mathbf{B}$, entonces

$$[g_{\mathbf{A}} \circ g_{\mathbf{B}}](\mathbf{x}) = g_{\mathbf{A}}(g_{\mathbf{B}}(\mathbf{x})) = g_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}\mathbf{B}) = \mathbf{x}\mathbf{B}\mathbf{A} = g_{\mathbf{BA}}(\mathbf{x}).$$

Otro ejemplo es el producto de varias matrices: \mathbf{ABC} .

- Una sucesión de k transformaciones elementales de las columnas $\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ es una composición de k funciones lineales; y lo mismo una sucesión de transformaciones de las filas... o también una sucesión de transformaciones elementales tanto de las filas como de las columnas (puesto que las transformaciones elementales sobre \mathbf{A} se pueden representar como un producto de varias matrices).

Como ejemplos de funciones lineales invertibles podemos indicar

- Las transformaciones elementales.
- Si \mathbf{A} es invertible, entonces $f_{\mathbf{A}}$ es invertible; en particular $(f_{\mathbf{A}})^{-1} = f_{\mathbf{A}^{-1}}$.

Explicación: por una parte $f_{\mathbf{A}}(f_{\mathbf{A}^{-1}}(\mathbf{x})) = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{x}$ y por otra $f_{\mathbf{A}^{-1}}(f_{\mathbf{A}}(\mathbf{y})) = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{y}$. (Proposición 6.A.1 en la página 83 del apéndice de la lección).



Con la *suma de funciones* y el *producto de un escalar por una función* lograremos ¡una potente herramienta para crear nuevos espacios vectoriales!

6.4. Espacios vectoriales de funciones

Definamos la suma y el producto por escalares para funciones con el mismo dominio X y cuyas imágenes están contenidas en el mismo espacio vectorial \mathcal{V} :

Definición 6.5. Se define la suma de dos funciones $f: X \rightarrow \mathcal{V}$ y $g: X \rightarrow \mathcal{V}$ como la función

$$\begin{aligned} [f + g]: X &\rightarrow \mathcal{V} \\ \vec{x} &\rightarrow f(\vec{x}) + g(\vec{x}) \end{aligned} \quad (6.3)$$

Definición 6.6. Se define producto de un escalar α por una función $f: X \rightarrow \mathcal{V}$ como la función

$$\begin{aligned} [\alpha \cdot f]: X &\rightarrow \mathcal{V} \\ \vec{x} &\rightarrow \alpha f(\vec{x}) \end{aligned} \quad (6.4)$$

EJERCICIO 37. Demuestre la siguiente

Proposición 6.4.1. El conjunto \mathcal{V}^X de funciones cuyo dominio es X y cuya imagen está contenida en \mathcal{V} junto con la suma (6.3) y el producto por escalares (6.4), es un espacio vectorial.

Ejemplos con los que probablemente se encontrará en futuras asignaturas...

aunque quizá no le indiquen explícitamente que está trabajando con espacios vectoriales...

- $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$: funciones reales de variable real: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
- $\mathbb{R}^{(\mathbb{R}^n)}$: funciones reales de varias variables reales: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.
- $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$: sucesiones de números reales: $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.
- $\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$: sucesiones de números reales: $S: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$.
- \mathbb{R}^{Ω} : variables aleatorias (donde Ω es el conjunto de sucesos elementales): $S: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.
- $(\mathbb{R}^{\Omega})^{\mathbb{Z}}$: series temporales: $S: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}^{\Omega}$.
- Etcetera, etcetera, etcetera...

6.4.1. Subespacios de funciones lineales

EJERCICIO 38. Demuestre las siguientes proposiciones (ambas demostraciones son muy similares):


- (a) **Proposición 6.4.2.** *La suma de dos funciones lineales es una función lineal.*
(b) **Proposición 6.4.3.** *El producto de un escalar por una función lineal es una función lineal.*

De las dos últimas definiciones (6.5 y 6.6) junto con las dos últimas proposiciones, concluimos que el conjunto $\mathcal{V}^{\mathcal{D}}$ de funciones lineales cuyo dominio es \mathcal{D} y cuya imagen está contenida en \mathcal{V} , es decir, el conjunto de funciones lineales $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{V}$ es cerrado para la suma y para el producto por escalares.

Por tanto, cerramos la lección con el siguiente

Corolario 6.4.4. *Dados \mathcal{D} y \mathcal{V} , el conjunto de funciones lineales $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{V}$ es un subespacio de $\mathcal{V}^{\mathcal{D}}$.*

(hemos citado algunos ejemplos en la Sección 6.1.2)

 Se suele asumir que los estudiantes conocen las funciones, pero creo oportuno añadir al siguiente apéndice.

Apéndices a la lección

6.A. Funciones

Definición 6.7. *Una función es un conjunto de pares ordenados en los que no existen dos pares distintos que tengan su primeras componentes iguales.*

Dada una función f , se llama *dominio* de f , al conjunto de primeras componentes de los pares de f .

$$\text{dom}(f) = \{x \mid \text{existe } y \text{ tal que } (x, y) \in f\}.$$

Dada una función f , se llama *imagen* de f , al conjunto de segundas componentes de f .

$$\text{imagen}(f) = \{y \mid \text{existe } x \text{ tal que } (x, y) \in f\}.$$

Ejemplos.

Ejemplo 9. El siguiente conjunto (en el que las segundas componentes son el cuadrado de las primeras) es una función

$$f = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{Z}\} = \{(0, 0), (1, 1), (-1, 1), (2, 4), (-2, 4), (3, 9), (-3, 9), \dots\}$$

donde \mathbb{Z} es el conjunto de números enteros.

Sin embargo, este otro conjunto (en el que las primeras componentes son el cuadrado de las segundas) NO es función:

$$\{(x^2, x) \mid x \in \mathbb{Z}\} = \{(0, 0), (1, 1), (1, -1), (4, 2), (4, -2), (9, 3), (9, -3), \dots\}$$

pues hay pares distintos que tienen la misma primera componente; por ejemplo $(1, 1)$ y $(1, -1)$.

Ejemplo 10 (Función nula). La *función nula* es aquella cuyas segundas componentes son todas nulas, es decir

$$n = \{(x, 0) \mid x \in \text{dom}(n)\} = \{(x, 0), (y, 0), (z, 0), \dots\};$$

(donde con el símbolo “0” denotamos el elemento *nulo* del conjunto que contiene la *imagen* de la función —véase un ejemplo de función nula más abajo).

Ejemplo 11 (Función identidad). La *función identidad* es aquella cuyas segundas componentes son iguales a las primeras, es decir

$$id = \{(x, x) \mid x \in \text{dom}(id)\} = \{(x, x), (y, y), (z, z), \dots\}.$$

6.A.1. Notación

Son habituales distintas formas de notación relacionadas con las funciones.

Por ejemplo, la expresión

$$f: X \rightarrow Y$$

es una forma abreviada de expresar lo siguiente:

1. f es una función
2. $\text{dom}(f) = X$
3. $\text{imagen}(f) \subset Y$

Y el esquema

$$\begin{array}{l} f: X \rightarrow Y \\ x \rightarrow \text{expresión de } x \end{array}$$

es una forma abreviada de expresar el siguiente conjunto de pares:

$$f = \{(x, \text{expresión de } x) \mid x \in X\}.$$

Así, el Ejemplo 9 en la [página anterior](#) se puede expresar como
$$\begin{array}{l} f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \\ x \rightarrow x^2 \end{array}$$

Y la función *nula* que asigna a todo número real el vector nulo de \mathbb{R}^2 como

$$\begin{array}{l} n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ x \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array},$$

donde aquí el elemento *nulo* de \mathbb{R}^2 es $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Y podemos expresar la función *identidad* en \mathbb{R}^3 como
$$\begin{array}{l} id: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x} \end{array}$$

Uso de la notación funcional. Posiblemente esté familiarizado con la siguiente notación funcional

$$y = f(x)$$

que equivale a escribir $(x, y) \in f$.

Así, el Ejemplo 9 en la página 81 se puede expresar como:

$$f(x) = x^2, \quad \text{donde } x \in \mathbb{Z};$$

pues indica que cada par (x, x^2) pertenece a f . Seguramente alguna vez haya tenido que representar gráficamente los pares (x, x^2) asociados a esta función, y sabrá que describen una parábola.

De igual modo, expresamos la función *nula* que asigna a todo número real la matriz nula de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$:

$$f(x) = \mathbf{0}_{2 \times 2}, \quad \text{donde } x \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \mathbf{0}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Y podemos expresar la función *identidad* en \mathbb{R}^3 como:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, \quad \text{donde } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3.$$

Por tanto, con esta notación podemos expresar la imagen de f como:

$$\text{imagen}(f) = \{y \mid \text{existe } x \in \text{dom}(f) \text{ tal que } y = f(x)\}. \quad (6.5)$$

6.A.2. Invertibilidad

Decimos que una función es invertible si al invertir el orden de los pares se obtiene una función. En tal caso dicha función se denota f^{-1} , y se llama *función inversa* de f .

Fíjese que de los tres ejemplos anteriores, únicamente la función identidad es invertible. En los otros dos, al invertir el orden de los pares, se pueden obtener pares distintos que tienen la misma primera componente (si invertimos el orden de los pares de la función nula, todos tendrán como primera componente la matriz nula de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$; y más arriba ya vimos qué pasaba al invertir los pares ordenados del primer ejemplo).

Evidentemente

$$(f^{-1})^{-1} = f;$$

pues si intercambiamos el orden de los pares dos veces, recuperamos los pares originales.

También es evidente que $\text{dom}(f^{-1}) = \text{imagen}(f)$, y que $\text{imagen}(f^{-1}) = \text{dom}(f)$.

Proposición 6.A.1. Si f y g son dos funciones tales que

$$g(f(x)) = x \quad \text{para todo } x \in \text{dom}(f) \quad \text{y} \quad f(g(y)) = y \quad \text{para todo } y \in \text{dom}(g)$$

entonces f es invertible y su inversa es g .

Demostración. Puesto que f y g son funciones basta comprobar que $(x, y) \in f$ si y solo si $(y, x) \in g$.

Por una parte

$$(x, y) \in f \Rightarrow y = f(x) \Rightarrow g(y) = g(f(x)) = x \Rightarrow (y, x) \in g$$

y por otra

$$(y, x) \in g \Rightarrow g(y) = x \Rightarrow f(g(y)) = f(x) = y \Rightarrow (x, y) \in f$$

□

6.A.3. Composición de funciones

Si tenemos dos funciones f y g tales que el dominio de g contiene a la imagen de f , llamamos *composición* de f y g al conjunto de pares

$$g \circ f = \{(x, z) \mid \text{existe } y \text{ de modo que } (x, y) \in f \text{ y } (y, z) \in g\}.$$

La composición de funciones se escribe usando la notación funcional como

$$[g \circ f](x) = g(f(x)).$$

pues $z = [g \circ f](x)$ siempre que $y = f(x)$ y $z = g(y)$.

Así, resulta evidente que

$$[f^{-1} \circ f](x) = f^{-1}(f(x)) = x, \quad \text{para todo } x \in \text{dom}(f).$$

Igualmente evidente es que

$$[f \circ f^{-1}](y) = f(f^{-1}(y)) = y, \quad \text{para todo } y \in \text{dom}(f^{-1}).$$

Resolviendo $Ax = 0$

7.1. Ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales



La Parte III del curso trata sobre sistemas de ecuaciones lineales. Como veremos enseguida, los sistemas de ecuaciones lineales están íntimamente relacionados con los subespacios de \mathbb{R}^n .

Una advertencia. Quizá conozca algún método de resolución de sistemas. Mi experiencia es que generalmente los alumnos saben ejecutar unos pasos a ciegas para obtener una solución, pero sin entender bien el método... y con alguna frecuencia no son capaces de ejecutar el método correctamente.

El método que veremos es deliberadamente distinto del que se cuenta habitualmente. Con ello pretendo, entre otras cosas, que el estudiante no aplique ciegamente una batería de recetas (mal aprendidas en muchos casos). Así pues, *por el momento olvide lo que sabe y trate de entender el método que expondré aquí.*

Por suerte el método es muy sencillo, aplicable a otros problemas que veremos más adelante... y para mayor fortuna ¡usted ya lo ha empleado en la Lección 5 para invertir matrices!

Llamamos *ecuación lineal* a aquella que se puede escribir de la siguiente forma

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b,$$

donde b y los *coeficientes* a_1, \dots, a_n denotan números fijos y x_1, \dots, x_n son las variables, es decir, etiquetas para ser reemplazadas por números.

Llamamos *solución* a los valores que, reemplazando a las variables, hacen cierta la igualdad.

7.1.1. Sistemas de ecuaciones lineales

Se llama sistema de ecuaciones lineales a una colección de ecuaciones en la que cada variable es reemplazada por idéntico valor en todas las ecuaciones. Por ejemplo,

$$\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - 2y + z = 2 \\ -2x + y + z = 3 \end{cases},$$

es un sistema de tres ecuaciones con tres variables (o incógnitas) x , y y z . La llave indica que cada variable debe ser reemplazada por el mismo valor en cada una de las tres ecuaciones, es decir, si asignamos el valor $x = 5$, lo hacemos para las tres ecuaciones a la vez. No hay un orden ni en la disposición de las ecuaciones ni en las sumas dentro de cada ecuación; de manera que el anterior sistema también lo podemos escribir como

$$\begin{cases} z + y - 2x = 3 \\ y + x - 2z = 1 \\ x + z - 2y = 2 \end{cases}$$

pero esta libertad en la notación tradicional no ayuda a trabajar con ellos.

7.1.2. Notación matricial

Aquí emplearemos la notación matricial en lugar de la tradicional. Ello nos permitirá aprovechar fácilmente toda la potencia de los conceptos de espacio vectorial.

El primer paso, para usar la notación matricial con el anterior ejemplo de sistema de ecuaciones, requiere tomar una decisión inicial y arbitraria. Hemos de establecer quién es la primera variable, quién la segunda y quién la tercera; así como también qué ecuación será la primera, cuál la segunda y cuál la tercera. La decisión que tomemos no es importante, pero una vez tomada, debe ser mantenida.

Por ejemplo, podemos decidir que el orden de las variables es, primero x , luego y y por último z ; definiendo de este modo el *vector de incógnitas*: $\mathbf{x} = (x, y, z)$. También podemos establecer que las ecuaciones serán ordenadas tal como aparecen dentro de la llave en la primera versión del ejemplo. Siguiendo este criterio, generamos una *matriz de coeficientes* cuya primera fila contiene los coeficientes de la primera ecuación (y en el orden que hayamos establecido para las variables), cuya segunda fila contiene los coeficientes de la segunda ecuación (respetando el mismo orden de las variables), etc.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

El orden de las ecuaciones también determina el orden de las componentes del vector con los números del lado derecho de cada ecuación: $\mathbf{b} = (1, 2, 3)$. A este vector lo denominamos *vector del lado derecho*.


Así, con la siguiente ecuación matricial denotamos de manera muy compacta un sistema de ecuaciones:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b},$$

donde ahora la variable \mathbf{x} es una etiqueta para ser reemplazada por un vector. Así, con

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{denotamos} \quad \begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - 2y + z = 2 \\ -2x + y + z = 3 \end{cases}.$$

Llamaremos *solución* al conjunto de vectores que, reemplazando a $\mathbf{x} = (x, y, z)$, hacen cierta la igualdad.

 La ecuación matricial, $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ define un *sistema de ecuaciones lineales*.

7.2. Sistemas de ecuaciones homogéneos

Cuando el vector del lado derecho es un vector nulo el sistema de ecuaciones se denomina *homogéneo*. En esta Lección 7 solo nos ocuparemos de los sistemas de ecuaciones que son homogéneos:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}.$$

Fíjese que el lado izquierdo de un sistema de ecuaciones está formado por el producto \mathbf{Ax} , es decir, *el lado izquierdo es una combinación lineal* de las columnas de la matriz de coeficientes. Por tanto, el sistema de más arriba nos está preguntando ¿qué combinaciones lineales de las columnas de \mathbf{A} son vectores nulos? Evidentemente si el vector de incógnitas \mathbf{x} es igual a $\mathbf{0}$, tenemos que

$$\mathbf{A0} = \mathbf{0}.$$

Pero aparte de la solución trivial $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, ¿existen otros vectores $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ para los que la combinación lineal \mathbf{Ax} es el vector nulo? Veamos un par de ejemplos. Imagine que la matriz de coeficientes es la matriz identidad

de orden 3, entonces tenemos el sistema $\mathbf{I}\mathbf{x} = \mathbf{0}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Puesto que el lado izquierdo del sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

tiene que ser igual al vector del lado derecho (que es $\mathbf{0}$); no hay más solución que aquella en la que todas las componentes de \mathbf{x} son nulas (es decir, la solución trivial $\mathbf{I}\mathbf{0} = \mathbf{0}$).

Sin embargo, es posible encontrar soluciones no triviales para el sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

por ejemplo: $\mathbf{x} = (2, 2, 2)$... piense un poco y seguro que es capaz de encontrar muchísimas más.

7.2.1. Espacio nulo de una matriz $\mathcal{N}(\mathbf{A})$

Los ejemplos anteriores muestran que algunos sistemas homogéneos tienen únicamente la *solución trivial*, $\mathbf{x} = \mathbf{0}$; pero que otros tienen más soluciones (además de la trivial). Para algunos sistemas de ecuaciones homogéneos el conjunto de soluciones contiene únicamente el vector nulo $\mathbf{0}$, pero para otros el conjunto de soluciones contiene otros vectores además de $\mathbf{0}$.

Vamos a dar un nombre más corto al “conjunto de soluciones del un sistema homogéneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ ”:

Definición 7.1. Sea \mathbf{A} de orden $m \times n$. Denominamos **espacio nulo de \mathbf{A}** (que denotamos con $\mathcal{N}(\mathbf{A})$) al subconjunto de vectores de \mathbb{R}^n que son solución del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, es decir ¹

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{Ax} = \mathbf{0}\}.$$

En el primer ejemplo de la página anterior vimos que el *espacio nulo de \mathbf{I}* solo contiene el vector $\mathbf{0}$, es decir, $\mathcal{N}(\mathbf{I}) = \{\mathbf{0}\}$. En el segundo ejemplo, $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ contiene infinitos vectores (además del $\mathbf{0}$). Pues bien, resulta que el *espacio nulo* de cualquier matriz de n columnas es un subespacio vectorial de \mathbb{R}^n .

Proposición 7.2.1. Para cualquier \mathbf{A} de orden $m \times n$, el espacio nulo $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ es un subespacio de \mathbb{R}^n .

EJERCICIO 39. Demuestre la Proposición 7.2.1.

Pista. Basta comprobar que el conjunto es cerrado para las combinaciones lineales.

Es muy importante subrayar que el conjunto de soluciones es subespacio solo para los sistemas *homogéneos*... pero nunca para sistemas NO homogéneos $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ (con $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$); pues evidentemente el vector nulo $\mathbf{0}$ no pertenece al conjunto de soluciones.

7.2.2. Resolución de un Sistema Homogéneo por eliminación

Puesto que $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ es un subespacio, sabemos que si conocemos algunas soluciones del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, también son solución sus combinaciones lineales, pero...¿cómo encontrar todas las soluciones? es decir, ¿cómo calcular $\mathcal{N}(\mathbf{A})$?

¹Esta forma de caracterizar los elementos de un conjunto como soluciones de un sistema de ecuaciones se denomina *ecuación cartesiana*.

Revisitando el método de eliminación. Vimos en la Sección 5.2 que si aplicamos una secuencia de transformaciones elementales $\tau_1 \cdots \tau_k$ a las columnas de la matriz particionada que resulta de concatenar \mathbf{A} con \mathbf{I} , tenemos:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}_{\tau_1 \cdots \tau_k} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\tau_1 \cdots \tau_k} \\ \mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k}) \\ \mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}\mathbf{E} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix}, \quad \text{donde } \mathbf{E} = \mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k}.$$

Ahora fijémonos en la columna j -ésima de la matriz particionada resultante

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}\mathbf{E} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix}_{|j} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}(\mathbf{E}_{|j}) \\ \mathbf{E}_{|j} \end{pmatrix};$$

para cada columna j -ésima tenemos que el vector de la parte inferior, $\mathbf{E}_{|j}$, contiene los coeficientes (“la receta”) de la combinación lineal de las columnas de \mathbf{A} que hemos usado para calcular (“cocinar”) la parte superior de la columna, $\mathbf{A}\mathbf{E}_{|j}$.

Ejemplo 12. Apliquemos la eliminación (de izquierda a derecha) para la concatenación de la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

con la matriz identidad de orden 4. Y fíjese cómo la parte inferior de cada columna, de cada matriz en cada uno de los pasos de la eliminación, indica cómo calcular la parte superior de esa misma columna:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(-2)1+2] \\ [(-1)1+4] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(-1)2+3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\tau_1 \tau_2 \tau_3} \\ \mathbf{I}_{\tau_1 \tau_2 \tau_3} \end{bmatrix}$$

Por ejemplo, la 1ª columna de la 1ª matriz, la 2ª columna de la 2ª matriz, y la 3ª columna de la 3ª matriz, verifican respectivamente que:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \text{ó} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Y no puede ser de otra manera, pues ya sabemos que la relación $(\mathbf{A}_{\tau_1 \cdots \tau_k})_{|j} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k})_{|j}$ se cumple en todas y cada una de las columnas, de todos y cada uno de los pasos de eliminación.



En todo momento a lo largo de la secuencia de transformaciones

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}_{\tau_1} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}_{\tau_1 \cdots \tau_k} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\tau_1 \cdots \tau_k} \\ \mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k} \end{bmatrix}.$$

la parte inferior de cada columna indica qué combinación lineal de las columnas de \mathbf{A} hemos usado para calcular la parte superior de la columna: $(\mathbf{A}_{\tau_1 \cdots \tau_h})_{|j} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_h})_{|j}; \quad h = 1 : k.$

Por el Teorema 4.4.2 sabemos que para cualquier \mathbf{A} existen k transformaciones elementales tales que $\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \mathbf{K}$ es pre-escalada. Por tanto

$$\left[\begin{array}{c} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{array} \right]_{\tau_1 \dots \tau_k} = \left[\begin{array}{c} \mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} \\ \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}) \\ \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \mathbf{A}\mathbf{E} \\ \mathbf{E} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \mathbf{K} \\ \mathbf{E} \end{array} \right]; \quad \text{donde } \mathbf{E} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}.$$

Y ahora solo caben dos posibilidades, que \mathbf{K} tenga columnas nulas o que no tenga:

Cuando \mathbf{K} tiene columnas nulas: si la columna $\mathbf{K}_{|j}$ es nula sabemos que

$$\mathbf{K}_{|j} = \mathbf{A}(\mathbf{E}_{|j}) = \mathbf{0} \quad \text{y por lo tanto} \quad \mathbf{E}_{|j} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Es decir, que si \mathbf{K} tiene columnas nulas, los vectores que aparecen por debajo de las columnas nulas son *soluciones al sistema* $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ (y como veremos, también todas sus combinaciones lineales).

Por tanto, en este caso encontrar soluciones al sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ es tan sencillo como alargar \mathbf{A} poniendo la matriz identidad por debajo, y aplicar transformaciones elementales a las columnas de la matriz por bloques hasta pre-escalar el bloque superior. Si la forma pre-escalada \mathbf{K} tiene columnas nulas, los vectores que hay debajo son soluciones de $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Con respecto al Ejemplo 12 en la página anterior, sabemos que los vectores

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

son soluciones al sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Pero también es solución cualquier combinación lineal de ambos vectores. Por ejemplo, si sumamos ambos vectores obtenemos una nueva solución

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cuando \mathbf{K} no tiene columnas nulas: cuando \mathbf{K} es de rango completo por columnas (i.e., no tiene columnas nulas), la única solución es $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (la solución trivial).

Y ahora nos puede surgir una duda, ¿existen otras soluciones que no sean combinación lineal de las encontradas mediante eliminación?

La Proposición 7.2.3 demuestra que no; es decir, *todas las soluciones son combinación lineal de las soluciones que hemos encontrado aplicando el método de Gauss.*

Pero antes necesitamos demostrar un resultado previo:

EJERCICIO 40. Demuestre que

Lema 7.2.2. Si \mathbf{K} es pre-escalada, entonces $\mathbf{Kx} = \mathbf{0}$ si y solo si son nulos los coeficientes x_j correspondientes a las columnas no nulas de \mathbf{K} .

Veamos ahora el resultado fundamental de esta lección...

Proposición 7.2.3. O todas las soluciones de $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ son combinaciones lineales de las soluciones encontradas por el método de eliminación, o bien, la forma pre-escalada de \mathbf{A} no tiene columnas nulas y la única solución es $\mathbf{0}$, es decir:

$$\text{O } \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\text{combinaciones lineales de las soluciones encontradas por eliminación}\} \quad \text{ó} \quad \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}.$$

Demostración. Sea $\mathbf{E} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ tal que $\mathbf{A}\mathbf{E} = \mathbf{K}$ es pre-escalónada. Puesto que \mathbf{E} es invertible, para todo vector \mathbf{x} de \mathbb{R}^n existe un *único* vector tal que

$$\mathbf{E}\mathbf{y}_x = \mathbf{x};$$

concretamente $\mathbf{y}_x = (\mathbf{E}^{-1})\mathbf{x}$.

Si $\mathbf{K}_{|p_1}, \dots, \mathbf{K}_{|p_r}$ son las r columnas no nulas de \mathbf{K} (es decir, las columnas con pivote), por el Lemma 7.2.2 sabemos que la condición necesaria y suficiente para que $\mathbf{K}\mathbf{y}_x = \mathbf{0}$ es que las componentes del vector \mathbf{y}_x que multiplican a las columnas con pivote sean nulas, es decir, $(\mathbf{y}_x)_{|p_1} = \dots = (\mathbf{y}_x)_{|p_r} = 0$.

Así, si $\{e_1, \dots, e_{n-r}\}$ es el conjunto de índices correspondientes a las columnas nulas de \mathbf{K} , es decir, si $\{p_1, \dots, p_r\} \cup \{e_1, \dots, e_{n-r}\} = \{1, \dots, n\}$; como

$$\mathbf{x} = \mathbf{E}\mathbf{y}_x = (\mathbf{E}_{|p_1})(\mathbf{y}_x)_{|p_1} + \dots + (\mathbf{E}_{|p_r})(\mathbf{y}_x)_{|p_r} + (\mathbf{E}_{|e_1})(\mathbf{y}_x)_{|e_1} + \dots + (\mathbf{E}_{|e_{(n-r)}})(\mathbf{y}_x)_{|e_{(n-r)}},$$

tendremos que $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, es decir, que $\mathbf{A}\mathbf{E}\mathbf{y}_x = \mathbf{K}\mathbf{y}_x = \mathbf{0}$ si y solo si

$$\mathbf{x} = (\mathbf{E}_{|e_1})(\mathbf{y}_x)_{|e_1} + \dots + (\mathbf{E}_{|e_{(n-r)}})(\mathbf{y}_x)_{|e_{(n-r)}}.$$

□

Ahora ya podemos terminar el Ejemplo 12 en la página 88 concluyendo que el espacio nulo de \mathbf{A} (es decir, el conjunto de soluciones del sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$) es:

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \left| \text{existen } a, b \in \mathbb{R} \text{ tales que } \mathbf{x} = a \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right. \right\}.$$

Es decir, $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ es el subconjunto de vectores \mathbf{x} de \mathbb{R}^4 que verifican que, para cada \mathbf{x} , es posible encontrar dos números reales a y b tales que a veces la primera solución especial más b veces la segunda es igual a \mathbf{x} .²

Nomenclatura usada por G. Strang Siguiendo la nomenclatura de G. Strang, a las columnas de \mathbf{A} que acaban siendo nulas en la forma pre-escalónada \mathbf{K} se denominarán *columnas libres* y el resto (i.e. las que mantienen un pivote) se llamarán *columnas pivote*.

Las variables (o incógnitas) correspondientes a columnas pivote, se denominarán *variables pivote* (o variables endógenas), el resto se denominarán *variables libres* (o variables exógenas); y las columnas que quedan debajo de las columnas nulas de \mathbf{K} se denominarán *soluciones especiales* (realmente no son especiales, pero así es como las llama G. Strang).

² Esta forma de identificar los elementos \mathbf{x} de un subconjunto como aquellos que para los que es posible encontrar parámetros que permitan expresar cada \mathbf{x} como una combinación lineal se denomina *ecuación paramétrica*.

Fíjese que con las *ecuaciones paramétricas* es muy fácil obtener elementos del conjunto, basta emplear elegir dos valores cualesquiera para a y b para obtener una solución. Por el contrario, las *ecuaciones cartesianas* (Definición 7.1) nos sirven para verificar si un vector \mathbf{x} pertenece o no al conjunto, basta verificar que $\mathbf{A}\mathbf{x}$ es cero. ¡Cada tipo de ecuación sirve para una cosa distinta, unas para generar ejemplos, y las otras para verificar la pertenencia!



Algoritmo para resolver $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$

1. Aplicamos la eliminación: $\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \xrightarrow{\tau_1, \dots, \tau_k} \begin{bmatrix} \mathbf{K} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix}$, donde $\mathbf{K} = \mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ y $\mathbf{E} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$.
2. Si hay *soluciones especiales* (columnas de \mathbf{E} bajo las columnas nulas de \mathbf{K})
 - Solución completa: $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\text{combinaciones lineales de las } \textit{soluciones especiales}\}$
3. Si no hay *soluciones especiales* (si \mathbf{K} no tiene columnas nulas)
 - Solución completa: $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$

Librería NAcAL para Python

```
A = Matrix( [ [1,2,0,1], [0,1,1,0], [1,2,0,1] ] )
Homogenea(A, 1)
```

Resuelve la ecuación homogénea

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} [(-2)1+2] \\ [(-1)1+4] \end{smallmatrix}]{\tau} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-1)2+3]} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Conjunto de combinaciones lineales de: $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

7.3. Generalizaciones o visiones alternativas de resultados previos

Podemos generalizar la Proposición 7.2.1:

EJERCICIO 41. Demuestre la siguiente

Proposición 7.3.1. Para toda función lineal $f: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$, el conjunto

$$\mathcal{N}(f) = \{\vec{v} \mid f(\vec{v}) = \vec{0}\}$$

es un subespacio de \mathcal{V} .

Fíjese que la Proposición 7.2.1 es un caso particular en el que la función es $f_{\mathbf{A}}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

$$\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{Ax}$$

Resolviendo $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

En esta lección veremos que el método de eliminación también nos permite deducir si es resoluble $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ y, cuando lo es, encontrar el conjunto de vectores \mathbf{x} tales que \mathbf{Ax} es igual a \mathbf{b} .

8.1. Eliminación sobre la matriz ampliada

Considere el sistema *NO* homogéneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ (es decir, con $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$). Es posible re-escribir el sistema para que tenga una apariencia de *sistema homogéneo* ya que:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \iff \mathbf{Ax} - \mathbf{b} = \mathbf{0} \iff [\mathbf{A} \mid -\mathbf{b}] \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}; \quad (8.1)$$

donde el vector de incógnitas, $\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix}$, tiene una restricción: *su última componente debe ser un 1*.

La matriz $[\mathbf{A} \mid -\mathbf{b}]$ se denomina *matriz de coeficientes “ampliada”*, y marcamos una línea vertical para recordar que la parte izquierda de la matriz corresponde a la *matriz de coeficientes* del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ y que la columna de la derecha es el *vector del lado derecho (con el signo cambiado)*.

Pues bien, el método de resolución que exponemos aquí intenta resolver este “pseudo-sistema homogéneo” tratando de encontrar soluciones que tengan un 1 en su última componente (es decir, *trataremos de encontrar algún vector de $\mathcal{N}([\mathbf{A} \mid -\mathbf{b}])$ que tenga un 1 en la última componente*).



Las implicaciones “si y solo si” de más arriba indican que encontrar soluciones al sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ es equivalente a encontrar *vectores del espacio nulo de la matriz ampliada que tengan un 1 como última componente*.

La mecánica consiste en aplicar el método de eliminación como en la lección anterior, pero usando ahora la *matriz de coeficientes “ampliada”*. Si logramos anular la última columna de la matriz de coeficientes “ampliada”, entonces el sistema tiene solución. ¡Si además logramos mantener el 1 de la solución especial correspondiente a la columna $n + 1$, entonces tendremos a la vista una solución a $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$!

Veamos primero un ejemplo de un sistema sin solución:

Ejemplo 13. Considere el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{d}$ con $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{d} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Para resolver el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{d}$ (con \mathbf{A} de orden m por n) por el método de eliminación, “alargamos”

la matriz ampliada $\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & -\mathbf{d} \end{array} \right]$ (de orden m por $(n+1)$) con una matriz identidad de orden $(n+1)$:

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & -\mathbf{d} \\ \hline \mathbf{I} & \\ \hline & \mathbf{1} \end{array} \right] \quad \text{donde} \quad \mathbf{I}_{(n+1) \times (n+1)} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I} & \\ \hline & \mathbf{1} \end{array} \right];$$

donde distinguimos los bloques correspondientes a las distintas partes con una partición (mediante líneas horizontales y verticales).

Y ahora pre-escalamos la matriz de coeficientes ampliada (fila superior de bloques de la matriz particionada)... pero aplicando las transformaciones a las columnas completas, es decir, a las columnas “alargadas” (con un total de $m+n+1$ componentes):

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & -\mathbf{d} \\ \hline \mathbf{I} & \\ \hline & \mathbf{1} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & -5 \\ 2 & 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & -1 \\ 4 & 1 & 5 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} \tau \\ [(-1)1+2] \\ [(-2)1+3] \\ [(5)1+4] \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 11 \\ 3 & -2 & -2 & 14 \\ 4 & -3 & -3 & 21 \\ \hline 1 & -1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} \tau \\ [(-1)2+3] \\ [(7)2+4] \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 11 \\ 3 & -2 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ \hline 1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

La parte superior de la matriz está pre-escalada, y como no hay ningún pivote en la segunda fila de 1 bloque de la izquierda (correspondiente a la matriz de coeficientes), no es posible eliminar el pivote (el **11**) de la última columna de la matriz de coeficientes ampliada. Por tanto, \mathbf{b} no es combinación lineal de las columnas de \mathbf{A} , es decir, el sistema no tiene solución, pues no es posible encontrar una combinación de columnas $\mathbf{A}\mathbf{x}$ que sea igual a \mathbf{b} .

O visto de otro modo, no existe un **vector** de $\mathcal{N}(\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & -\mathbf{d} \end{array} \right])$ cuya última componente sea un uno, así que el sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{d}$ **NO tiene solución**.

Ejemplo 14. Ahora considere el sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Aplicando el método de eliminación sobre la matriz ampliada tenemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & -5 \\ 2 & 2 & 4 & -10 \\ 3 & 1 & 4 & -1 \\ 4 & 1 & 5 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} \tau \\ [(-1)1+2] \\ [(-2)1+3] \\ [(5)1+4] \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & -2 & 14 \\ 4 & -3 & -3 & 21 \\ \hline 1 & -1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} \tau \\ [(-1)2+3] \\ [(7)2+4] \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ \hline 1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Hemos encontrado dos soluciones especiales (los vectores por debajo de las dos columnas nulas), de las cuales la segunda tiene un **1** como ultima componente. Así pues, por las implicaciones “si y solo si” de la Ecuación 8.1 sabemos que el sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es resoluble y que $\mathbf{x} = (-2, 7, 0)$ es una solución (compruébelo).

¿Una solución o infinitas soluciones?

Fíjese que si sumamos cualquier múltiplo de la tercera columna a la cuarta, obtenemos un nuevo vector de $\mathcal{N}(\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & -\mathbf{b} \end{array} \right])$ con un 1 como última componente. De hecho, el conjunto de vectores de $\mathcal{N}(\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & -\mathbf{b} \end{array} \right])$

con un 1 como última componente son los vectores de la forma

$$\left\{ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^4 \left| \text{existe } a \in \mathbb{R} \text{ tal que } \mathbf{y} = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right. \right\}$$

Consecuentemente (Ecuación 8.1) todas las soluciones del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ son de la forma

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \left| \text{existe } a \in \mathbb{R} \text{ tal que } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right. \right\}$$

Estas ecuaciones paramétricas nos permiten obtener tantos ejemplos de soluciones como queramos, basta con dar valores arbitrarios al parámetro a (obtenga alguna otra solución \mathbf{y} y compruebe que $\mathbf{Ay} = \mathbf{b}$).

En general, considere un sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ que tiene solución y donde el rango de la matriz de coeficientes \mathbf{A} es r ; Y sea $[\mathbf{A} \mid -\mathbf{b}]_{\tau_1 \dots \tau_k}$ una forma pre-escalada de la matriz de coeficientes ampliada y $\mathbf{E} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$. Sabemos que el espacio nulo $\mathcal{N}([\mathbf{A} \mid -\mathbf{b}])$ son las combinaciones lineales de las soluciones especiales. Como en la demostración de la Proposición 7.2.3 en la página 89, sea $\{e_1, \dots, e_{n-r}, (n+1)\}$ el conjunto de índices correspondientes a las columnas nulas de la forma pre-escalada, y donde sabemos que el último índice es $n+1$ puesto que $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ tiene solución; entonces:

$$\mathcal{N}([\mathbf{A} \mid -\mathbf{b}]) = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{(n+1)} \text{ tales que } \mathbf{x} = (\mathbf{E}_{|e_1})\lambda_{e_1} + \dots + (\mathbf{E}_{|e_{(n-r)}})\lambda_{e_{(n-r)}} + (\mathbf{E}_{|(n+1)})\lambda_{(n+1)} \right\};$$

y como únicamente la última columna $\mathbf{E}_{|n+1}$ tiene un 1 en su última componente¹, el conjunto de vectores de $\mathcal{N}([\mathbf{A} \mid -\mathbf{b}])$ con un 1 en su última componente es

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n+1} \text{ tales que } \mathbf{x} = (\mathbf{E}_{|e_1})\lambda_{e_1} + \dots + (\mathbf{E}_{|e_{(n-r)}})\lambda_{e_{(n-r)}} + \mathbf{E}_{|n+1} \right\}; \quad (8.2)$$

es decir, necesariamente $\lambda_{(n+1)} = 1$. De esto se deduce que *cuando $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ es resoluble:*

1. El conjunto de soluciones del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ es el resultado de quitar la última componente a los vectores del conjunto de la Ecuación (8.2).
2. si la forma pre-escalada de \mathbf{A} tiene columnas nulas (si $\text{rango}(\mathbf{A}) < n$) entonces el sistema tiene infinitas soluciones. Y si por el contrario $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$, entonces existe un único vector solución... (el vector cuyas n componentes son las n primeras componentes de $\mathbf{E}_{|n+1}$).

Algoritmo de resolución de un sistema no homogéneo

Aplicando el método de eliminación de izquierda a derecha para pre-escalonar, logramos:

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & -\mathbf{b} \\ \hline \mathbf{I} & \\ \hline & 1 \end{array} \right]_{\tau_1 \dots \tau_k \dots \tau_p} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{K} & \mathbf{c} \\ \hline \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k} & \mathbf{v} \\ \hline & d \end{array} \right], \quad (8.3)$$

donde $[\mathbf{K} \mid \mathbf{c}]$ es una matriz pre-escalada de la matriz de coeficientes ampliada $[\mathbf{A} \mid -\mathbf{b}]$; y donde la única componente distinta de cero, de la última fila, es d en la última columna. Si sigue el algoritmo de la demostración del Teorema 4.4.1 en la página 51, entonces d siempre será igual a 1, pues no emplea

¹recuerde que la última componente del resto de vectores $\mathbf{E}_{|j}$ con $j \neq (n+1)$ es un 0

transformaciones de *Tipo II*. Pero si usted opera como lo hace la librería NAcAL (que multiplica algunas columnas por números no nulos para evitar así operar con fracciones cuando ello es posible), entonces d podrá tomar cualquier valor no nulo.

Tras la eliminación en (8.3), solo caben dos posibilidades:

1. Si $\mathbf{c} = \mathbf{0}$, entonces el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ tiene solución, pues debajo de \mathbf{c} hay un vector del espacio nulo de la matriz ampliada cuya última componente d es distinta de cero (es lo que pasó en el segundo de los dos ejemplos anteriores). Si $d \neq 1$, basta dividir la última columna por d para obtener un vector del espacio nulo de la matriz ampliada.

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{K} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k} & \mathbf{v} \\ \hline & d \end{array} \right] \xrightarrow{[(\frac{1}{d})(n+1)]} \left[\begin{array}{cccccc|c} * & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ : & * & \dots & 0 & 0 & 0 \\ : & : & & 0 & 0 & 0 \\ : & : & \dots & * & 0 & 0 \\ : & : & \dots & : & 0 & 0 \\ \hline : & : & \dots & : & : & s_p \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \text{donde “*” son pivotes,}$$

y donde $s_p = \frac{1}{d}\mathbf{v}$ es un vector solución, es decir $\mathbf{A}(s_p) = \mathbf{b}$.

2. Si $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$, entonces el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ NO tiene solución.

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{K} & \mathbf{c} \\ \hline \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k} & \mathbf{v} \\ \hline & d \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cccccc|c} * & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ : & * & \dots & 0 & 0 & 0 \\ : & : & & 0 & 0 & * \\ : & : & \dots & * & 0 & : \\ : & : & \dots & : & 0 & : \\ \hline : & : & \dots & : & : & \mathbf{v} \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & d \end{array} \right] \quad \text{donde “*” son pivotes,}$$

Por tanto, *el sistema tiene solución si y solo si logramos transformar $-\mathbf{b}$ en un $\mathbf{0}$.*

Resolviendo varios sistemas a la vez Este método, con una mínima variación, permite resolver simultáneamente sistemas que compartan la matriz de coeficientes. Por ejemplo, podemos resolver simultáneamente los dos ejemplos anteriores:²

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} \mathbf{A} & -\mathbf{b} & -\mathbf{d} \\ \hline \mathbf{I} & & \\ \hline & 1 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 2 & -5 & -5 \\ 2 & 2 & 4 & -10 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & -1 & -1 \\ 4 & 1 & 5 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 11 \\ 3 & -2 & -2 & 14 & 14 \\ 4 & -3 & -3 & 21 & 21 \\ \hline 1 & -1 & -2 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 11 \\ 3 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & -1 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Es decir, $\mathbf{Ax} = \mathbf{d}$ NO tiene solución pero $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ si es resoluble, y el conjunto de todas las soluciones es

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \text{existe } a \in \mathbb{R} \text{ tal que } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

²pero tenga en cuenta que aquí no se puede usar la penúltima columna para eliminar componentes de la última!

Mediante la eliminación podemos saber si $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ es resoluble (y encontrar *una* solución cuando lo es).

Algoritmo para resolver $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$

Pre-escalamos (y luego dividimos la última columna por su última componente, d)^a:

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & -\mathbf{b} \\ \hline \mathbf{I} & \mathbf{1} \end{array} \right] \xrightarrow{\tau_1 \cdots \tau_k \cdots \tau_p} \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{K} & \mathbf{f} \\ \hline \mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k} & \mathbf{v} \\ \hline & d \end{array} \right] \xrightarrow{[(\frac{1}{d})(n+1)]} \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{K} & \mathbf{c} \\ \hline \mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k} & \mathbf{s} \\ \hline & 1 \end{array} \right]$$

donde $\mathbf{K} = \mathbf{A}_{\tau_1 \cdots \tau_k}$ está pre-escalada; y por tanto: $\mathbf{K}_{lj} = \mathbf{0} \implies (\mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k})_{lj} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$.

- Si $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$ el sistema $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ NO tiene solución.
- Si $\mathbf{c} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{A} \mathbf{s} = \mathbf{b}$, y el conjunto de todas las soluciones es

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \text{existe } \mathbf{y} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}) \text{ tal que } \mathbf{x} = \mathbf{s} + \mathbf{y}\}.$$

Por tanto, cuando \mathbf{K} no tiene columnas nulas ($\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$) la única solución es \mathbf{s} .

^aNótese que d siempre es igual a 1 si se aplica el algoritmo de la demostración del Teorema 4.4.1 en la página 51, pero si también se emplean transformaciones *Tipo II*, entonces d podría tomar cualquier valor no nulo.

Librería NAcAL para Python

```
A = Matrix( [ [7,-2,0], [6,4,2] ] )
b = Vector([4,12])
SEL( A, b, 1 ) # resuelve el Sistema de Ecuaciones Lineales
```

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 7 & -2 & 0 & -4 \\ 6 & 4 & 2 & -12 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} [(\frac{7}{1})2] \\ [(2)1+2] \\ [(7)4] \\ [(4)1+4] \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 40 & 2 & -60 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} [(20)3] \\ [(-1)2+3] \\ [(2)4] \\ [(3)2+4] \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 40 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 14 \\ 0 & 7 & -7 & 21 \\ 0 & 0 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 14 \end{array} \right] \xrightarrow{[(\frac{1}{14})4]} \left[\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 40 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 7 & -7 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\text{Conjunto de vectores: } \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1 \text{ tal que } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -7 \\ 20 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}.$$

(Como se ha multiplicado la cuarta columna por 7 y luego por 2, al final hay que dividir por 14.)

8.1.1. El Teorema de de Rouché-Frobenius

Del procedimiento anterior se deduce que los rangos de la matriz de coeficientes \mathbf{A} y de la matriz ampliada $[\mathbf{A} \mid -\mathbf{b}]$ nos clasifican los posibles casos en cuanto al número de soluciones del sistema $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Sabemos que tras aplicar el método de eliminación sobre las columnas de la matriz de coeficientes ampliada

$$[\mathbf{A} \mid -\mathbf{b}] \xrightarrow{\tau_1 \cdots \tau_k} [\mathbf{K} \mid \mathbf{c}]$$

solo se pueden dar dos casos: que la última columna sea nula ($\mathbf{c} = \mathbf{0}$), o que no lo sea ($\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$):

1. Si $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$, entonces la matriz ampliada tiene una **columna pivote** adicional, es decir,

$$\text{rango}([\mathbf{A} \mid -\mathbf{b}]) > \text{rango}(\mathbf{A}) \iff \text{el sistema NO tiene solución.}$$

2. Si $\mathbf{c} = \mathbf{0}$, entonces

$$\text{rango}([\mathbf{A} \mid -\mathbf{b}]) = \text{rango}(\mathbf{A}) \iff \text{el sistema es resoluble.}$$

Si además \mathbf{A} es de rango completo por columnas (si todas sus columnas son columnas pivote), entonces la forma pre-escalada \mathbf{K} no tiene columnas nulas (es decir, $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$), por lo que el sistema tiene una única solución.

Pero si el rango es menor que n entonces el sistema tiene infinitas soluciones, ya que a una solución \mathbf{x} se le puede sumar cualquier vector de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ para obtener otra solución.

El anterior resultado se resume en el siguiente teorema:

Teorema 8.1.1 (Rouché-Frobenius). *Un sistema de ecuaciones lineales $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ con n incógnitas tiene solución si y solo si el rango de la matriz de coeficientes \mathbf{A} es igual al rango de la matriz de coeficientes ampliada $[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]$. En particular:*

1. Si $\text{rango}(\mathbf{A}) = n$, la solución es única.
2. En caso contrario hay infinitas soluciones.

Si además \mathbf{A} es de rango completo por filas (si su rango es igual a su número de filas m), el sistema tiene solución para cualquier vector $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$; pues al pre-escalar la matriz ampliada se anulan todas las componentes de $-\mathbf{b}$, por estar a la derecha de las columnas pivote de \mathbf{A} y haber un pivote en cada fila).

Así, para el caso de matrices cuadradas, tenemos el siguiente

Corolario 8.1.2. *Para toda matriz cuadrada \mathbf{A} de orden n , las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. El rango de \mathbf{A} es n (ó \mathbf{A} es de rango completo).
2. $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ si y solo si $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
3. $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ tiene solución única.
4. \mathbf{A} no es singular.
5. \mathbf{A} es invertible.
6. \mathbf{A} es producto de matrices elementales: $\mathbf{A} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$.
7. $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ es la única solución a $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

8.2. Espacio columna de una matriz

Considere el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de \mathbf{A} de orden m por n

$$\left\{ \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n \mid \text{existen } x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \text{ tales que } \mathbf{b} = x_1 \mathbf{A}_{|1} + \dots + x_n \mathbf{A}_{|n} \right\}$$

o bien, usando la notación matricial,

$$\{ \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n \mid \text{existe } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } \mathbf{b} = \mathbf{Ax} \}$$

Puesto que este subconjunto de \mathbb{R}^n contiene todas las combinaciones lineales de las columnas, obviamente es cerrado para las combinaciones lineales. Por tanto, este conjunto es un **subespacio** de \mathbb{R}^n . Lo denominamos **espacio columna** de \mathbf{A} , y lo denotamos por $\mathcal{C}(\mathbf{A})$. Por ejemplo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad \Rightarrow \quad \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \left\{ \mathbf{b} \in \mathbb{R}^2 \mid \text{existen } x, y, z \in \mathbb{R} \text{ tales que } \mathbf{b} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Evidentemente

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad \text{tiene solución si y solo si} \quad \mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

El espacio columna y la eliminación

El subespacio $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ es cerrado para la suma y el producto por escalares, pero precisamente ese es el tipo de operaciones que realizan las transformaciones elementales de las columnas. Por tanto, al aplicar transformaciones elementales sobre las columnas de \mathbf{A} obtenemos nuevas matrices cuyas columnas pertenecen a $\mathcal{C}(\mathbf{A})$. Así, el espacio columna de $\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ está contenido en el espacio columna de \mathbf{A} :

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}) \subset \mathcal{C}(\mathbf{A});$$

pero como las transformaciones elementales son “reversibles”, mediante una sucesión de transformaciones elementales se puede retornar de $\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ a \mathbf{A} , pues $\mathbf{A} = (\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k})_{\tau_k^{-1} \dots \tau_1^{-1}}$. Por tanto, también ocurre que

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) \subset \mathcal{C}(\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}).$$

Por tanto

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}).$$

¡Al aplicar la eliminación, todas las matrices que aparecen en el proceso tienen el mismo espacio columna!

Así pues, concluimos que

$$\text{Si } \mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{E} \quad \text{y} \quad \mathbf{E} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}, \quad \text{entonces} \quad \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{B}).$$

8.3. Generalizaciones o visiones alternativas de resultados previos

EJERCICIO 42. Considere $\mathbf{A}_{m \times n}$, y compruebe que $\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{imagen}(f_{\mathbf{A}})$, donde $f_{\mathbf{A}}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{A}\mathbf{x}$.

EJERCICIO 43. Demuestre la siguiente

Proposición 8.3.1. Si $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ es una función lineal, entonces $\text{imagen}(f)$ es un subespacio de \mathcal{W} .

Independencia, base y dimensión

9.1. Combinaciones lineales de vectores de \mathcal{V}

[Recuerde las definiciones de *Espacio Vectorial* (Pag. 74) y de *Subespacio* (Pag. 76)]

En esta lección vamos a tratar con *sistemas* de vectores de un subespacio genérico \mathcal{V} :

$$\mathbf{Z} = [\vec{z}_1; \vec{z}_2; \dots; \vec{z}_n], \quad \text{con } \vec{z}_i \in \mathcal{V};$$

y dicho sistemas los denotaremos con caracteres del tipo: $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \dots, \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}$. Una vez más podemos emplear el operador selector para denotar el j ésimo vector de un sistema $\mathbf{Z} = [\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n]$:

$$\mathbf{Z}_{|j} = \vec{z}_j; \quad \text{y por tanto } \mathbf{Z} = [\mathbf{Z}_{|1}; \mathbf{Z}_{|2}; \dots; \mathbf{Z}_{|n}];$$

Fíjese que las matrices son un caso particular, pues \mathbf{A} de orden m por n es un sistema de n vectores de \mathbb{R}^m :

$$\mathbf{A} = [\mathbf{A}_{|1}; \mathbf{A}_{|2}; \dots; \mathbf{A}_{|n}], \quad \text{con } \mathbf{A}_{|j} \in \mathbb{R}^m.$$

```
A = Matrix( [ [1,0,0], [-1,0,1] ] )
A.sis()           # Devuelve el Sistema correspondiente a las columnas de A
```

Librería NAcAL para Python

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right].$$

9.1.1. Extendiendo la notación matricial a los espacios vectoriales

Aunque no es habitual, extenderé la notación empleada con las matrices a espacios vectoriales genéricos ¹ empezando por el...

Producto de un sistema de n vectores de \mathcal{V} por un vector de \mathbb{R}^n

Definimos el producto $\mathbf{Z}\mathbf{a}$ de un *sistema de n vectores de \mathcal{V} por un vector de \mathbb{R}^n* como la combinación lineal de los vectores de \mathbf{Z} , cuyos coeficientes son las componentes de \mathbf{a} :

$$\mathbf{Z}\mathbf{a} = (\mathbf{Z}_{|1})a_1 + \dots + (\mathbf{Z}_{|n})a_n;$$

donde $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ contiene los coeficientes de la combinación lineal.

Por tanto $\mathbf{Z}\mathbf{a}$ es un vector de \mathcal{V} . Así, en el caso particular del producto $\mathbf{A}\mathbf{x}$ obtenemos un vector de \mathbb{R}^m . Pero en el caso general $\mathbf{Z}\mathbf{a}$, y dependiendo de la naturaleza de \mathcal{V} , el vector resultante pudiera ser una función, o matriz, o polinomio, o variable aleatoria, o etc.... todo depende de la naturaleza de \mathcal{V} .

¹espacios vectoriales genéricos de dimensión finita.

Ejemplo:

Librería NAcAL para Python

```
A = Matrix([ [ 1, 1, 1], [1, 0, 0] ])
B = Matrix([ [-1, 1, 1], [0, 1, 0] ])
C = Matrix([ [ 2, 0, 1], [0, 0, 1] ])
Z = Sistema( [ A, B, C] )           # ;Sistema de Matrices!
A = Vector ( [ 1, 2, 3] )          # Sistema por Vector (comb. lineal de matrices)
Z*a
```

$$Za = \left[\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \right] \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

El siguiente ejercicio muestra que el producto Za verifica las *propiedades de linealidad*: la primera respecto a la suma, $Z(b + c) = Zb + Zc$, y la segunda respecto al producto por un escalar, $Z(\lambda b) = \lambda(Zb)$.

EJERCICIO 44. Demuestre las siguientes proposiciones.

(a) **Proposición 9.1.1.** Sean Z , un sistema de n vectores de \mathcal{V} , y sean b y c vectores de \mathbb{R}^n ; entonces

$$Z(b + c) = Zb + Zc.$$

(b) **Proposición 9.1.2.** Sean Z , un sistema de n vectores de \mathcal{V} , el escalar λ y b un vector de \mathbb{R}^n ; entonces

$$Z(\lambda b) = \lambda(Zb).$$

Podemos extender aún más la notación matricial.

Sistema de n vectores de \mathcal{V} por una matriz de $\mathbb{R}^{n \times p}$

Si Z es un sistema de n vectores y A una matriz de n filas y p columnas; entonces denotamos por ZA al sistema de vectores

$$ZA = [Z(A_{|1}); \dots; Z(A_{|p})];$$

es decir, el vector j -ésimo del sistema ZA es

$$(ZA)_{|j} = Z(A_{|j});$$

(compare esta expresión con la Definición 3.1). Así que podemos escribir sin ambigüedad el vector $ZA_{|j}$.

Continuando con el ejemplo de más arriba

Librería NAcAL para Python

```
D = Matrix([ Vector([1,0,0]), Vector([-1,0,1]) ])
Z*D           # Sistema por Matriz (Sistema de Matrices)
```

$$ZD = \left[\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \right] \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \left[\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \right].$$

Además de las propiedades de linealidad de más arriba, también se verifica la asociatividad con el producto de matrices: $Z(Bc) = (ZB)c$ y $Z(BC) = (ZB)C$:

EJERCICIO 45. Demuestre las siguientes proposiciones.

(a) **Proposición 9.1.3.** Sean Z un sistema de m vectores de \mathcal{V} , la matriz \mathbf{B} , y el vector \mathbf{c} de \mathbb{R}^n , entonces:

$$Z(\mathbf{Bc}) = (Z\mathbf{B})\mathbf{c}.$$

(b) **Proposición 9.1.4.** Sean Z un sistema de p vectores de \mathcal{V} , y \mathbf{B} y \mathbf{C} , entonces $Z(\mathbf{BC}) = (Z\mathbf{B})\mathbf{C}$.

Por lo que podemos escribir sin ambigüedad el vector $Z\mathbf{Bc}$ y el sistema $Z\mathbf{BC}$.

Al extender la notación matricial para expresar combinaciones lineales en espacios vectoriales genéricos, hemos logrado algunos resultados sobre combinaciones lineales de sistemas de vectores de \mathcal{V} que nos serán de utilidad.

$$\begin{aligned} \blacksquare Z(\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= Z\mathbf{b} + Z\mathbf{c} & \blacksquare Z(\mathbf{Bc}) &= (Z\mathbf{B})\mathbf{c} \\ \blacksquare Z(\lambda\mathbf{b}) &= \lambda(Z\mathbf{b}) & \blacksquare Z(\mathbf{BC}) &= (Z\mathbf{B})\mathbf{C} \end{aligned}$$

9.2. Sistemas generadores

En la Sección 8.2 definimos el espacio columna de la matriz \mathbf{A} como el conjunto de todas las combinaciones lineales de sus columnas:

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \left\{ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \text{existen } x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \text{ tales que } \mathbf{y} = (\mathbf{A}_{|1})x_1 + \dots + (\mathbf{A}_{|n})x_n \right\}.$$

o usando notación matricial

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \{ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \text{existe } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } \mathbf{y} = \mathbf{Ax} \}.$$

Ahora vamos a generalizar esta idea a cualquier espacio vectorial \mathcal{V} .

Definición 9.1 ($\mathcal{L}(Z)$: subespacio engendrado por un sistema Z). Dado un sistema $Z = [\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n]$, el subespacio engendrado por dicho sistema es

$$\mathcal{L}(Z) = \left\{ \vec{v} \in \mathcal{V} \mid \text{existen } a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R} \text{ tales que } \vec{v} = \vec{z}_1 a_1 + \dots + \vec{z}_n a_n \right\},$$

es decir $\mathcal{L}(Z)$ es el conjunto de combinaciones lineales de $Z_{|j}$ con $j = 1 : n$; o usando notación matricial

$$\mathcal{L}(Z) = \left\{ \vec{v} \in \mathcal{V} \mid \text{existe } \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } \vec{v} = Z\mathbf{a} \right\}. \quad (9.1)$$

Definición 9.2 (Sistema generador de \mathcal{V}). Decimos que Z es un sistema generador de \mathcal{V} si $\mathcal{V} = \mathcal{L}(Z)$.

Ejemplo 15.

- Las columnas de \mathbf{A} son un sistema generador de $\mathcal{C}(\mathbf{A})$.

Librería NAcAL para Python

```
A = Matrix([ Vector([1,0,0]), Vector([-1,0,1]) ])
SubEspacio( A.sis() ) # SubEspacio generado por el Sistema de columnas de A
```

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^2 \text{ tal que } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\} = \{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \}$$

(Ecuaciones paramétricas a la izquierda y cartesianas a la derecha)

- Las soluciones especiales de $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ son un *sistema generador* de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$.

Librería NAcAL para Python

```
C = Matrix([ [1,0,0], [1,1,1] ])
Homogenea(C,1).sgen      # Sistema generador del espacio nulo de C
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-1)2+3]} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right];$$

Librería NAcAL para Python

```
Homogenea(C).enulo      # Espacio nulo de C
```

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1 \text{ tal que } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\} = \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \right\}$$



Un sistema de vectores \mathbf{Z} es un sistema generador de \mathcal{V} si: $\mathcal{V} = \mathcal{L}(\mathbf{Z})$

$\mathcal{L}(\mathbf{Z})$ es el conjunto de combinaciones lineales de los vectores de \mathbf{Z} ; y puesto que

- la suma de dos combinaciones lineales $\mathbf{Z}\mathbf{b} + \mathbf{Z}\mathbf{c}$ es la combinación lineal $\mathbf{Z}(\mathbf{b} + \mathbf{c})$
- el producto de una combinación lineal por un escalar $(\mathbf{Z}\mathbf{b})\lambda$ es la combinación lineal $\mathbf{Z}(\mathbf{b}\lambda)$

$\mathcal{L}(\mathbf{Z})$ es un *subespacio*, pues es cerrado para la suma y el producto por escalares.

Además, puesto que $\mathcal{L}(\mathbf{Y})$ contiene *únicamente* las combinaciones lineales de $\mathbf{Y} = [\vec{y}_1; \dots; \vec{y}_n]$, el subespacio $\mathcal{L}(\mathbf{Y})$ *está contenido en cualquier otro subespacio que también contenga los vectores $\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n$* ; es decir, $\mathcal{L}(\mathbf{Y})$ es el subespacio más pequeño que contiene los vectores $\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n$.

Ahora ya podemos establecer un criterio para saber si dos sistemas \mathbf{Y} y \mathbf{Z} generan el mismo subespacio:

Sea \mathbf{Y} un sistema de n vectores; puesto que $\mathcal{L}(\mathbf{Y}) \subset \mathcal{L}(\mathbf{Z})$ si y solo si $\mathbf{Y}_{|i} \in \mathcal{L}(\mathbf{Z})$, $i = 1 : n$, y puesto que dos conjuntos A y B son iguales si y solo si $A \subset B$ y $B \subset A$, llegamos al siguiente

Corolario 9.2.1. Sean \mathbf{Y} con n vectores y \mathbf{Z} con k vectores; entonces $\mathcal{L}(\mathbf{Y}) = \mathcal{L}(\mathbf{Z})$ si y sólo si

$$\mathbf{Y}_{|i} \in \mathcal{L}(\mathbf{Z}) \text{ para todo } i = 1 : n \quad \text{y} \quad \mathbf{Z}_{|j} \in \mathcal{L}(\mathbf{Y}) \text{ para todo } j = 1 : k.$$

Definición 9.3. Diremos que dos sistemas generadores son *equivalentes* si generan el mismo espacio.

Librería NAcAL para Python

```
A = Matrix([ [2,-1,0], [-1,2,-1] ])
B = ElimGJ(Matrix(A))
SubEspacio( A.sis() ) == SubEspacio( B.sis() ) # ¿Son equivalentes?
```

True

9.3. Transformaciones elementales sobre sistemas de vectores

Al igual que con las matrices, podemos aplicar transformaciones elementales sobre los sistemas de vectores:

- (Transformación Tipo I sobre el sistema de vectores) Si $i \neq j$ entonces

$$Z = [\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_i; \dots; \vec{z}_j; \dots; \vec{z}_n] \xrightarrow{[(\alpha)\mathbf{i}+\mathbf{j}]} [\vec{z}_1; \dots; (\alpha\vec{z}_i + \vec{z}_j); \dots; \vec{z}_j; \dots; \vec{z}_n] = Z \underset{[(\alpha)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}{\tau} = Z \left(\underset{[(\alpha)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}{\mathbf{I}} \underset{[(\alpha)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}{\tau} \right)$$

- (Transformación Tipo II sobre el sistema de vectores) Si $\alpha \neq 0$ entonces

$$Z = [\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_i; \dots; \vec{z}_n] \xrightarrow{[(\alpha)\mathbf{i}]} [\vec{z}_1; \dots; (\alpha\vec{z}_i); \dots; \vec{z}_n] = Z \underset{[(\alpha)\mathbf{i}]}{\tau} = Z \left(\underset{[(\alpha)\mathbf{i}]}{\mathbf{I}} \underset{[(\alpha)\mathbf{i}]}{\tau} \right)$$

Sistemas equivalentes

Así, si mediante una sucesión de transformaciones elementales τ_1, \dots, τ_k transformamos Z en un nuevo sistema $Y = Z_{\tau_1 \dots \tau_k}$; por el Corolario 9.2.1 concluimos que ambos sistemas son equivalentes:

$$\mathcal{L}(Z) = \mathcal{L}(ZE) = \mathcal{L}(Y), \quad \text{donde } E = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}; \quad (9.2)$$

puesto que, por una parte, $Y|_j = ZE|_j$ y por otra $Z|_j = Y(E^{-1})|_j$.

Consideremos ahora una transformación de naturaleza completamente distinta: *quitar vectores nulos de un sistema*:

$$\text{▪ (Quitando vectores nulos)} \quad [\vec{z}_1; \vec{0}; \dots; \vec{z}_i; \vec{0}; \dots; \vec{z}_n; \vec{0}] \xrightarrow{\text{Quitando vectores nulos}} [\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_i; \dots; \vec{z}_n].$$

Por el Corolario 9.2.1

$$\mathcal{L}([\vec{z}_1; \vec{0}; \dots; \vec{z}_i; \vec{0}; \dots; \vec{z}_n; \vec{0}]) = \mathcal{L}([\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_i; \dots; \vec{z}_n]).$$

Es mas, podemos generalizar el resultado con la siguiente

Proposición 9.3.1. Si $Z = [\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n]$ es un sistema de vectores entonces

$$\mathcal{L}([\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_{i-1}; \vec{z}_i; \vec{z}_{i+1}, \dots, \vec{z}_n]) = \mathcal{L}([\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_{i-1}; \vec{z}_{i+1}; \dots; \vec{z}_{n-1}]).$$

si, y solo si, \vec{z}_i es combinación lineal del resto de vectores de Z .

Demostración. Basta aplicar el Corolario 9.2.1. □



Como consecuencia, y volviendo al espacio generado por las columnas de una matriz \mathbf{A} :

Si \mathbf{L} es una forma escalonada de \mathbf{A} con r columnas no nulas ($\text{rango}(\mathbf{A}) = r$), entonces

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{L}) = \mathcal{C}(\mathbf{L}_{(1:r)}),$$

donde $\mathbf{L}_{(1:r)}$ es la submatriz correspondiente a las r primeras columnas (véase Apéndice 3.A en la página 33).

Por tanto, las columnas no nulas de cualquier forma pre-escalada de \mathbf{A} generan $\mathcal{C}(\mathbf{A})$.

Observación. Como $\vec{0} \in \mathcal{V}$, y puesto que $\mathcal{L}([\vec{0}; \vec{0}; \vec{0}]) = \mathcal{L}([\vec{0}; \vec{0}]) = \mathcal{L}([\vec{0}]) = \{ \vec{0} \}$, convenimos que $\mathcal{L}([\]) = \{ \vec{0} \}$; es decir, admitimos el sistema vacío como sistema generador del subespacio $\{ \vec{0} \}$.

9.4. Sistemas linealmente dependientes

EJERCICIO 46. Demuestre la siguiente...

Proposición 9.4.1. Dado un sistema de vectores $Z = [\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n]$, existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que z_i es combinación lineal del resto de vectores de Z si, y solo si, existe $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ en \mathbb{R}^n tal que $Z\mathbf{a} = \vec{0}$.

La anterior proposición da lugar a la definición de *sistema linealmente dependiente* y de *sistema linealmente independiente*:

Definición 9.4. Diremos que el sistema de n vectores, Z

- es linealmente **dependiente** si existe $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ no nulo tal que, $Z\mathbf{a} = \vec{0}$.
- es linealmente **independiente** si ocurre lo contrario, es decir, $Z\mathbf{a} = \vec{0}$ si y solo si $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.



Particularizando para \mathbb{R}^m tenemos que

Proposición 9.4.2. Para un sistema $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1; \dots; \mathbf{v}_n]$ de n vectores de \mathbb{R}^m , las siguientes propiedades son equivalentes:

- El rango de $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1; \dots; \mathbf{v}_n]$ es n
- $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$
- La combinación lineal $\mathbf{A}\mathbf{x}$ es $\mathbf{0}$ si y solo si $\mathbf{x} = \mathbf{0}$
- Las columnas de \mathbf{A} son linealmente independientes

Demostración. ¡Son propiedades que ya hemos demostrado anteriormente!

□

9.5. Bases y dimensión

Hemos visto que en un sistema de vectores linealmente dependiente es posible retirar algún vector sin reducir el espacio generado. Pero si el sistema es linealmente independiente, al retirar cualquiera de los vectores se reduce el espacio engendrado por ellos. Un sistema de vectores que tenga el tamaño justo para generar el subespacio \mathcal{V} sin que sobre ningún vector tiene un nombre especial:

Definición 9.5. Diremos que el sistema \mathbf{B} es una **base** de un subespacio \mathcal{V} si simultáneamente

1. \mathbf{B} genera el subespacio, es decir, si $\mathcal{L}(\mathbf{B}) = \mathcal{V}$.
2. \mathbf{B} es linealmente independiente, es decir, $\mathbf{B}\mathbf{x} = \vec{0}$ si y solo si $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Es decir, una base de \mathcal{V} es un sistema de vectores \mathbf{B} con un número suficiente elevado de vectores como para generar el subespacio \mathcal{V} pero, simultáneamente, suficientemente reducido como para que el sistema sea linealmente independiente.

Ejemplo 16. Las columnas no nulas de una matriz escalonada de \mathbf{A} constituyen una base de $\mathcal{C}(\mathbf{A})$.

Ejemplo 17. Las soluciones *especiales* encontradas al resolver $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ constituyen una base de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$.

Pues resulta que ¡todas las bases de un subespacio \mathcal{V} tienen el mismo número de vectores! Usaremos la siguiente proposición para demostrarlo:

Proposición 9.5.1. Si \mathbf{X} y \mathbf{Z} son dos sistemas con p y q vectores de \mathcal{V} respectivamente, donde $p > q$; tales que $\mathcal{L}(\mathbf{X}) \subset \mathcal{L}(\mathbf{Z})$ entonces \mathbf{X} es linealmente dependiente.

Demostración. Como cada $\mathbf{X}_{|i}$ es combinación lineal de los vectores del sistema \mathbf{Z} , existe $\underset{p \times q}{\mathbf{M}}$ tal que

$$\mathbf{X}_{|j} = \mathbf{Z}\mathbf{M}_{|j} \text{ para } j = 1 : p; \text{ es decir, tal que } \mathbf{X} = \mathbf{Z}\mathbf{M}.$$

Como \mathbf{M} tiene más columnas que filas, existe un vector $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ tal que $\mathbf{Ma} = \mathbf{0}$; y por tanto

$$\mathbf{Xa} = \mathbf{ZMa} = \mathbf{Z0} = \vec{0}.$$

□

Así pues, *dos bases de un mismo subespacio tienen el mismo número de vectores*; pues si una tuviera más que la otra, por la Proposición 9.5.1, sería un sistema dependiente, y por tanto ya no sería una base.

Definición 9.6. Decimos que un subespacio \mathcal{V} es de dimensión finita si tiene una base con un número finito de vectores. En tal caso, llamamos *dimensión de \mathcal{V}* al número de vectores de cualquiera de sus bases.

Hemos visto un procedimiento para generar una base quitando vectores. Veamos ahora otro procedimiento para completar una base añadiendo vectores.

Proposición 9.5.2. Si $[\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n]$ es un sistema linealmente independiente y $\vec{z}_{n+1} \notin \mathcal{L}([\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n])$ entonces $[\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n; \vec{z}_{n+1}]$ es linealmente independiente.

Demostración. Supongamos que $a_1\vec{z}_1 + \dots + a_n\vec{z}_n + a_{n+1}\vec{z}_{n+1} = \vec{0}$. Como $\vec{z}_{n+1} \notin \mathcal{L}([\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n])$, necesariamente $a_{n+1} = 0$. Y como $[\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n]$ es un sistema linealmente independiente, entonces también $a_1, \dots, a_n = 0$. □

Corolario 9.5.3. Cualquier subespacio \mathcal{W} de un espacio \mathcal{V} de dimensión finita es de dimensión finita y su dimensión es menor o igual a la del espacio.

Demostración. Sea \mathcal{W} un subespacio de \mathcal{V} , entonces sabemos que existen sistemas linealmente independientes formados por vectores de \mathcal{W} . Por ejemplo el vacío. Por otra parte, cualquier sistema de vectores linealmente independientes tiene como mucho tantos vectores como la dimensión del espacio. Tomemos de todos los posibles sistemas linealmente independientes de \mathcal{W} , un sistema \mathbf{M} con el mayor número posible de vectores. Entonces $\mathcal{L}(\mathbf{M}) \subset \mathcal{W}$. Veamos que si suponemos que existe $\vec{v} \in \mathcal{W}$ tal que $\vec{v} \notin \mathcal{L}(\mathbf{M})$, necesariamente llegamos a una contradicción. Basta añadir \vec{v} al sistema \mathbf{M} para obtener un sistema linealmente independiente formado por vectores de \mathcal{W} . Pero esto contradice que \mathbf{M} sea un sistema linealmente independiente con el mayor número posible de vectores. □

Corolario 9.5.4. Si \mathcal{W} es un subespacio de \mathcal{V} de la misma dimensión de \mathcal{V} , entonces \mathcal{W} y \mathcal{V} son iguales.

Demostración. Tomemos una base \mathbf{B} de \mathcal{W} . Entonces sabemos que $\mathcal{L}(\mathbf{B}) = \mathcal{W}$. Para demostrar que $\mathcal{L}(\mathbf{B}) = \mathcal{V}$, supongamos lo contrario. Supongamos que existe $\vec{v} \in \mathcal{V}$ tal que $\vec{v} \notin \mathcal{L}(\mathbf{B})$. Entonces podríamos incluir \vec{v} en \mathbf{B} y obtendríamos un sistema linealmente independiente con más elementos que la dimensión de \mathcal{V} . □

9.5.1. Eliminación “de izquierda a derecha” y sistemas “acoplados” de vectores



En esta sección vamos a diseñar un algoritmo para encontrar una base de $\mathcal{L}(\mathbf{Z})$. La mecánica es sencilla y se basa en que $\mathcal{L}(\mathbf{Z}) = \mathcal{L}(\mathbf{Z}_{\tau_1 \dots \tau_k})$ (Ecuación 9.2).

El método consiste en aplicar la eliminación sobre \mathbf{Z} , y observar qué vectores de \mathbf{Z} no acaban anulándose en dicho proceso de eliminación. Aquellos vectores de \mathbf{Z} que no se anulen constituyen una base de $\mathcal{L}(\mathbf{Z})$.

Por tanto, el procedimiento es muy sencillo; aunque la demostración de por qué funciona no será inmediata. Aprovecharemos para introducir notación y operaciones nuevas, pero a cambio lograremos una comprensión más profunda de las propiedades de los sistemas obtenidos en el proceso de eliminación (“de izquierda a derecha”).

Notación. Denotaremos con $Y_{|(1:s)}$ al subsistema de $Y = [\vec{y}_1; \dots; \vec{y}_n]$ formado por sus primeros s vectores

$$Y_{|(1:s)} = [\vec{y}_1; \dots; \vec{y}_s] = [\vec{y}_j | j < s] \quad \text{con} \quad s \leq n,$$

y asumiremos que $\mathcal{L}(Z_{|(1:0)}) = \mathcal{L}([\emptyset]) = \{\vec{0}\}$.

Definición 9.7 (Sistemas acoplados). *Los sistemas Y y Z , de n vectores cada uno, están **acoplados** si*

$$\mathcal{L}([\vec{y}_1; \dots; \vec{y}_i]) = \mathcal{L}([\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_i]) \quad \text{para } i = 1 : n,$$

es decir, si

$$\mathcal{L}(Y_{|(1:i)}) = \mathcal{L}(Z_{|(1:i)}) \quad \text{para } i = 1 : n.$$

Proposición 9.5.5 (Eliminación “de izquierda a derecha” en Z). *Si transformamos un sistema de vectores $Z = [\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n]$ mediante una secuencia τ_1, \dots, τ_k de transformaciones elementales “de izquierda a derecha”*

$$Z_{\tau_1 \dots \tau_k} = ZE = Y \quad \text{donde} \quad E = I_{\tau_1 \dots \tau_k},$$

de tal forma que cada $Y_{|j}$ es de la forma $ZE_{|j}$ con $e_{jj} \neq 0$, es decir,

$$Y = [\vec{y}_1; \dots; \vec{y}_n] = [\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n] \begin{bmatrix} e_{11} & e_{12} & e_{13} & \cdots & e_{1n} \\ & e_{22} & e_{23} & \cdots & e_{2n} \\ & & e_{33} & \cdots & e_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & e_{nn} \end{bmatrix} = ZE,$$

entonces Y y Z están acoplados.

Demostración. Por una parte, como E es triangular superior sin elementos nulos en la diagonal principal, cada vector $Y_{|j} = ZE_{|j}$ es un múltiplo no nulo ($e_{jj} \neq 0$) de $Z_{|j}$ más una combinación lineal de los vectores $Z_{|k}$ con $k = 1 : (j-1)$, y por tanto $\mathcal{L}(Y_{|(1:j)}) \subset \mathcal{L}(Z_{|(1:j)})$ para $j = 1 : n$.

Por otra parte, ya que la inversa de una matriz triangular superior es triangular superior (Sección 5.3), sabemos que E^{-1} es triangular superior sin elementos nulos en la diagonal, y como $Z = YE^{-1}$, usando el mismo argumento del párrafo anterior concluimos que $\mathcal{L}(Z_{|(1:j)}) = \mathcal{L}(Y_{|(1:j)})$ para $j = 1 : n$. \square

Notación. Sean $Y = [\vec{y}_1; \dots; \vec{y}_n]$ y $Z = [\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_k]$ dos sistemas de vectores de \mathcal{V} . Denotaremos con $Y \sim Z$ al sistema de $n+k$ vectores resultante de *concatenar* Y (de n vectores) y Z (de k vectores)

$$Y \sim Z = [\vec{y}_1; \dots; \vec{y}_n; \vec{z}_1; \dots; \vec{z}_k].$$

Lema 9.5.6. *Sean $Y = [\vec{y}_1; \dots; \vec{y}_n]$ y $Z = [\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_k]$ dos sistemas de vectores de \mathcal{V} tales que $\mathcal{L}(Y) = \mathcal{L}(Z)$. Entonces para cualquier sistema $X = [\vec{x}_1; \dots; \vec{x}_r]$ de vectores de \mathcal{V} se verifica que*

$$\mathcal{L}(Y \sim X) = \mathcal{L}(Z \sim X).$$

Demostración. Hay que demostrar que $\{\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_k, \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r\} \subset \mathcal{L}(Y \sim X)$ y que $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n, \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r\} \subset \mathcal{L}(Z \sim X)$. Como ambos contenidos se prueban de la misma manera, solo comprobaremos el primero.

Por un lado tenemos que $\{\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_k\} \subset \mathcal{L}(Z) = \mathcal{L}(Y) \subset \mathcal{L}(Y \sim X)$. Por otro que $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r\} \subset \mathcal{L}(Y \sim X)$. Luego $\{\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_k\} \cup \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r\} \subset \mathcal{L}(Y \sim X)$. \square

Corolario 9.5.7. Si $\mathbf{Y} = [\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n]$ y $\mathbf{Z} = [\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_n]$ son dos sistemas acoplados y \vec{z}_k es combinación de los vectores que le anteceden en la lista \mathbf{Z}

$$\vec{z}_k \in \mathcal{L}(\mathbf{Z}_{|1:k-1}) = \mathcal{L}([\vec{z}_j | j < k]), \quad \text{entonces} \quad (9.3)$$

los sistemas resultantes tras quitar el k -ésimo vector, $[\vec{z}_j | j \neq k]$ y $[\vec{y}_j | j \neq k]$, también están acoplados.

Demostración. El resultado es trivial si $k = n$. Así que supongamos que $k < n$. Puesto que \mathbf{Z} y \mathbf{Y} están acoplados, $\mathcal{L}(\mathbf{Y}_{|1:i}) = \mathcal{L}(\mathbf{Z}_{|1:i})$ para todo $i < k$, y como consecuencia de (9.3) tendremos que

$$\mathcal{L}(\mathbf{Y}_{|1:k-1}) = \mathcal{L}(\mathbf{Z}_{|1:k-1}) \stackrel{(9.3)}{=} \mathcal{L}(\mathbf{Z}_{|1:k}) = \mathcal{L}(\mathbf{Y}_{|1:k})$$

luego aplicando el Lema 9.5.6 (en $\stackrel{*}{=}$) tendremos que para todo $k < i$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}([\vec{y}_j | j \neq k]) &= \mathcal{L}(\mathbf{Y}_{|1:k-1} \sim \mathbf{Y}_{|k+1:i}) \stackrel{*}{=} \mathcal{L}(\mathbf{Y}_{|1:k} \sim \mathbf{Y}_{|k+1:i}) = \mathcal{L}(\mathbf{Y}_{|1:i}) = \mathcal{L}(\mathbf{Z}_{|1:i}) \\ &= \mathcal{L}(\mathbf{Z}_{|1:k} \sim \mathbf{Z}_{|k+1:i}) \\ &\stackrel{*}{=} \mathcal{L}(\mathbf{Z}_{|1:k-1} \sim \mathbf{Z}_{|k+1:i}) = \mathcal{L}([\vec{z}_j | j \neq k]). \end{aligned}$$

□

Corolario 9.5.8. Si \mathbf{Y} y \mathbf{Z} son dos sistemas acoplados de n vectores y $\vec{y}_s = \vec{0}$ entonces los sistemas $[\vec{y}_j | j \neq s]$ y $[\vec{z}_j | j \neq s]$ también están acoplados.

Definición 9.8. Si $[\vec{y}_1; \dots; \vec{z}_y]$ y $[\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n]$ son dos sistemas acoplados diremos que el par (\vec{y}_s, \vec{z}_s) es superfluo si $\vec{y}_s = \vec{0}$. En tal caso diremos que $[\vec{y}_j | j \neq s]$ y $[\vec{z}_j | j \neq s]$ son los sistemas acoplados resultantes de quitar el par superfluo (\vec{y}_s, \vec{z}_s) .

Corolario 9.5.9. Si $[\vec{y}_1; \dots; \vec{y}_n]$ y $[\vec{z}_1; \dots; \vec{z}_n]$ son dos sistemas acoplados también lo son $[\vec{y}_j | \vec{y}_j \neq \vec{0}]$ y $[\vec{z}_j | \vec{y}_j \neq \vec{0}]$.

Demostración. Basta ir quitando los pares superfluos correspondientes a los ceros en el sistema $[\vec{y}_1; \dots; \vec{y}_n]$. □



El anterior corolario nos muestra una forma de encontrar una base de $\mathcal{L}(\mathbf{Z})$ entre los vectores de \mathbf{Z} : Basta seleccionar el subsistema con los vectores de $\mathbf{Z}_{|j}$ que no se anulen tras aplicar el método de eliminación $\mathbf{Z}_{\tau_1 \dots \tau_k}$, es decir

$$[\mathbf{Z}_{|j} \mid \mathbf{Z}\mathbf{E}_{|j} \neq \vec{0}], \quad \text{donde} \quad \mathbf{E} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}.$$

Encontrando una base de $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ entre las columnas de \mathbf{A} .

Aplicando la eliminación (de “izquierda a derecha”) sobre \mathbf{A} :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 8 \\ -1 & -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-2)\mathbf{3}+4]} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 2 \\ -1 & -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(-2)\mathbf{1}+2] \\ [(-1)\mathbf{1}+3] \\ [(-1)\mathbf{1}+4] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{K}$$

sabemos que $\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}([\mathbf{K}_{|1}; \mathbf{K}_{|3}])$ y que la dimensión es 2 por ser $\mathbf{K}_{|1}$ y $\mathbf{K}_{|3}$ linealmente independientes.

Por el Corolario 9.5.9, también sabemos que $\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}([\mathbf{A}_{|1}; \mathbf{A}_{|3}])$. Como la dimensión es 2, concluimos que $[\mathbf{A}_{|1}; \mathbf{A}_{|3}]$ es una base de $\mathcal{C}(\mathbf{A})$.

```
A = Matrix([ [0,0,1,2], [1,2,1,3], [2,4,3,8], [-1,-2,0,-1] ]),
SubEspacio( A.sis() ).base # una base del SubEspacio
```

$$\left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \right]$$

```
SubEspacio( A.sis() ).dim # dimensión del SubEspacio
```

2



Hemos visto que si tenemos un sistema de vectores y aplicamos el método de eliminación (de “izquierda a derecha”), los sucesivos sistemas que van apareciendo tienen la propiedad de que los subespacios generados por los j primeros vectores de los distintos sistemas generan el mismo espacio. Es decir, para Z , y la sucesión de transformaciones elementales τ_1, \dots, τ_k tal que $E = I_{\tau_1 \dots \tau_k}$ es triangular superior

$$\text{Si } Y = Z_{\tau_1 \dots \tau_k} = ZE, \text{ entonces } Y \text{ y } Z \text{ están acoplados.}$$

es decir,

$$\mathcal{L}([Z_{|1}; \dots; Z_{|j}]) = \mathcal{L}([Y_{|1}; \dots; Y_{|j}]) \quad \text{para } j = 1 : n.$$

Pero si además algunos vectores de Y acaban siendo nulos, los correspondientes vectores de Z se pueden quitar y el sistema resultante continúa generando el mismo subespacio (Corolario 9.5.9).

Hemos usado esta idea para encontrar una base de $\mathcal{C}(A)$ entre las columnas de A pre-escalando la matriz mediante eliminación (de “izquierda a derecha”).

Ahora podemos completar el Corolario 8.1.2 en la página 98 con cuatro nuevas afirmaciones:

Corolario 9.5.10. Para toda matriz cuadrada A de orden n , las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. El rango de A es n (ó A es de rango completo).
2. $Ax = 0$ si y solo si $x = 0$.
3. $Ax = b$ tiene solución única.
4. A no es singular.
5. A es invertible.
6. $A = I_{\tau_1 \dots \tau_k}$ (prod. de m elementales)
7. Las columnas de A son linealmente independientes.
8. Las filas de A son linealmente independientes.
9. Las columnas de A forman una base de \mathbb{R}^n .
10. Las filas de A forman una base de \mathbb{R}^n .

9.6. Generalizaciones o visiones alternativas de resultados previos

Las proposiciones 9.1.1 y 9.1.2 implican que Zx es una función lineal; lo que sugiere el uso de la siguiente:

Notación. Sea Z un sistema de n vectores de \mathcal{V} , denotaremos con f_Z a la función lineal:

$$f_Z: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{V} \\ x \rightarrow Zx$$

Es más, para cualquier función lineal $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{V}$, existe un sistema Z de n vectores de tal que $f(\mathbf{x}) = Z\mathbf{x}$ para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Demostración.

$$\begin{aligned}
 f(\mathbf{x}) &= f(\mathbf{I}\mathbf{x}) \\
 &= f(x_1\mathbf{I}_{|1} + \cdots + x_n\mathbf{I}_{|n}) && \text{por la definición de matriz por vector de } \mathbb{R}^n \\
 &= x_1f(\mathbf{I}_{|1}) + \cdots + x_nf(\mathbf{I}_{|n}) && \text{por ser } f \text{ una función lineal} \\
 &= [f(\mathbf{I}_{|1}); \dots f(\mathbf{I}_{|n})]\mathbf{x} && \text{por la definición de sistema por vector de } \mathbb{R}^n \\
 &= Z\mathbf{x} && \text{donde } Z = [f(\mathbf{I}_{|1}); \dots f(\mathbf{I}_{|n})].
 \end{aligned}$$

□

Nótese que tanto $Z\mathbf{B}\mathbf{c}$ como $Z\mathbf{B}\mathbf{C}$ son composiciones de funciones lineales. Por una parte:

$$[f_Z \circ f_B](\mathbf{c}) = f_Z(f_B(\mathbf{c})) = f_Z(\mathbf{B}\mathbf{c}) = Z\mathbf{B}\mathbf{c} = f_{Z\mathbf{B}}(\mathbf{c});$$

es decir

$$f_{Z\mathbf{B}}(\mathbf{c}): \mathbb{R}^n \xrightarrow{f_B} \mathbb{R}^n \xrightarrow{f_Z} \mathcal{V}$$

y por otra, si \mathbf{B} y \mathbf{C}
 $n \times p$ $p \times q$

$$[f_Z \circ f_B](\mathbf{C}) = f_Z(f_B(\mathbf{C})) = f_Z(\mathbf{B}\mathbf{C}) = Z\mathbf{B}\mathbf{C} = f_{Z\mathbf{B}}(\mathbf{C});$$

es decir

$$f_{Z\mathbf{B}}(\mathbf{C}): \mathbb{R}^{p \times q} \xrightarrow{f_B} \mathbb{R}^{n \times q} \xrightarrow{f_Z} \mathcal{V}^n$$

donde \mathcal{V}^n es el conjunto de sistemas de n vectores de \mathcal{V} .

Otra observación adicional es que

EJERCICIO 47. Compruebe que el espacio engendrado por un sistema Z es la imagen de f_Z .

Solución: Basta expresar la imagen de f_Z con la notación funcional (6.5) y comprobar que coincide con la notación matricial de la Definición 9.1 de espacio engendrado por Z (9.1):

$$\text{imagen}(f_Z) = \left\{ \vec{v} \in \mathcal{V} \mid \text{existe } \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } \vec{v} = Z\mathbf{a} \right\} = \mathcal{L}(Z)$$

□

EJERCICIO 48. Demuestre la siguiente

Proposición 9.6.1. Sean las funciones $f: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ y $g: \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Y}$, entonces la imagen de $g \circ f$ está contenida en la imagen de g .

Solución: Supongamos que $\vec{z} \in \text{imagen}(g \circ f)$. Entonces tiene que existir \vec{x} tal que $(x, y) \in f$ y $(y, z) \in g$. Por tanto $z \in \text{imagen}(g)$. □

EJERCICIO 49. Demuestre el siguiente

Corolario 9.6.2. Sean las funciones $f: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ y $g: \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Y}$, y donde f es invertible, entonces $\text{imagen}(g \circ f) = \text{imagen}(g)$.

Solución: Por una parte sabemos que $\text{imagen}(g \circ f) \subset \text{imagen}(g)$.

Por otra, puesto que $\text{imagen}(g) = \text{imagen}(g \circ f \circ f^{-1})$, aplicando la proposición anterior tenemos que

$$\text{imagen}(g) = \text{imagen}([g \circ f] \circ f^{-1}) \subset \text{imagen}(g \circ f).$$

□

Sistemas linealmente independientes y coordenadas

Proposición 9.6.3. *Un sistema Z de n vectores es independiente si y solo si f_Z es invertible.*

Demostración. Si Z es independiente, tenemos que comprobar que el conjunto de pares $(Z\mathbf{x}, \mathbf{x})$ tales que $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ es función. Supongamos que $Z\mathbf{x} = Z\mathbf{y}$, entonces $Z(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \mathbf{0}$. Como Z es independiente, necesariamente $(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \mathbf{0}$; es decir $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

Supongamos el conjunto de pares $(Z\mathbf{x}, \mathbf{x})$ tales que $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ es función, es decir, $(f_Z)^{-1}$; y que $Z\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Como también $Z\mathbf{0} = \mathbf{0}$, los pares $(Z\mathbf{x}, \mathbf{x})$ y $(Z\mathbf{0}, \mathbf{0})$ pertenecen a $(f_Z)^{-1}$. Como las primeras componentes son nulas, necesariamente \mathbf{x} tiene que ser $\mathbf{0}$. \square

Cuando Z es independiente, la función inversa $(f_Z)^{-1}: \mathcal{L}(Z) \rightarrow \mathbb{R}^n$ se conoce como *función de coordenadas respecto a Z* ; que denotaremos como

$$\vec{v}_{/Z} = (f_Z)^{-1}(\vec{v});$$

por tanto, $\vec{v}_{/Z}$, es decir, las coordenadas de \vec{v} respecto de Z , es el vector de \mathbb{R}^n que nos indica la única combinación lineal de los vectores el sistema Z que es igual a \vec{v} . Como la función *función de coordenadas respecto a Z* es lineal, sabemos que

$$(\mathbf{x} + \mathbf{y})_{/Z} = \mathbf{x}_{/Z} + \mathbf{y}_{/Z} \quad \text{y} \quad (a\mathbf{x})_{/Z} = a(\mathbf{x}_{/Z}).$$

Proposición 9.6.4. *Si B es una base de \mathcal{V} , entonces para cualquier función lineal $f: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ existe un sistema Z de vectores de \mathcal{W} tal que $f(\vec{v}) = Z(\vec{v}_B)$*

Demostración. La función $f \circ f_B$ es lineal y va de \mathbb{R}^n a \mathcal{W} . Por tanto existe un sistema Z de vectores de \mathcal{W} tal que $f \circ f_B = f_Z$. Por tanto

$$f(\vec{v}) = f\left(f_B\left((f_B)^{-1}(\vec{v})\right)\right) = f\left(f_B\left(\vec{v}_B\right)\right) = f_Z\left(\vec{v}_B\right) = Z\left(\vec{v}_B\right).$$

\square

Los cuatro subespacios fundamentales de una matriz \mathbf{A}

Hasta aquí hemos visto dos subespacios asociados a una matriz \mathbf{A} de orden m por n

- El espacio nulo de \mathbf{A} :

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}(\text{soluciones especiales de } \mathbf{Ax} = \mathbf{0}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{Ax} = \mathbf{0}\} \subset \mathbb{R}^n$$

- El espacio columna de \mathbf{A} :

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}(\text{columnas de } \mathbf{A}) = \{\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m \mid \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } \mathbf{b} = \mathbf{Ax}\} \subset \mathbb{R}^m$$

que están relacionados con los sistemas de ecuaciones $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ y $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Pero nótese que transponiendo la matriz \mathbf{A} podemos plantear dos sistemas de ecuaciones completamente nuevos, cuya la matriz de coeficientes es \mathbf{A}^\top (de n filas y m columnas):

$$(\mathbf{A}^\top)\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad \text{y} \quad (\mathbf{A}^\top)\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Así, los espacios nulo y columna asociados a la matriz (\mathbf{A}^\top) de orden n por m son

- El espacio nulo de \mathbf{A}^\top :

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{L}(\text{soluciones especiales de } (\mathbf{A}^\top)\mathbf{x} = \mathbf{0}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \mid (\mathbf{A}^\top)\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subset \mathbb{R}^m$$

- El espacio columna de \mathbf{A}^\top :

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{L}(\text{columnas de } \mathbf{A}^\top) = \{\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n \mid \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } \mathbf{b} = (\mathbf{A}^\top)\mathbf{x}\} \subset \mathbb{R}^n$$

Nótese que $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ es un subespacio de \mathbb{R}^n pero $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ es un subespacio de \mathbb{R}^m ; y que $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ es un subespacio de \mathbb{R}^m pero $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ es un subespacio de \mathbb{R}^n .

$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$: El espacio nulo por la izquierda de \mathbf{A}

El subespacio $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ es el conjunto de soluciones al sistema $(\mathbf{A}^\top)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, que nos pregunta ¿qué combinaciones lineales de las columnas de \mathbf{A}^\top son iguales a cero? Pero esto es lo mismo que preguntar ¿qué combinaciones lineales de las *filas* de \mathbf{A} son iguales a cero? Es decir, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ son las soluciones del siguiente sistema homogéneo

$$\mathbf{x}\mathbf{A} = \mathbf{0}.$$

lo que justifica el nombre de *espacio nulo por la izquierda* (pues en este sistema homogéneo el vector \mathbf{x} multiplica por la izquierda). Consecuentemente podemos expresar el espacio nulo por la izquierda de \mathbf{A} (de orden m por n) como

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \mid \mathbf{x}\mathbf{A} = \mathbf{0}\}.$$

$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$: El espacio fila de \mathbf{A}

El subespacio $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ es el conjunto de combinaciones lineales de las columnas de \mathbf{A}^\top , es decir, es el conjunto de combinaciones lineales de las *filas* de \mathbf{A} . Por este motivo lo denominamos *espacio fila de \mathbf{A}* . Consecuentemente podemos expresar el espacio fila de \mathbf{A} de orden m por n como

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) = \{\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n \mid \exists \mathbf{x} \text{ tal que } \mathbf{b} = \mathbf{x}\mathbf{A}\} = \mathcal{L}(\text{las filas de } \mathbf{A}).$$

Fíjese que el sistema de ecuaciones $\mathbf{x}\mathbf{A} = \mathbf{b}$ nos pregunta *qué combinación lineal de las filas $\mathbf{x}\mathbf{A}$ es igual a \mathbf{b}* .

10.1. Encontrando bases para los espacios $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ y $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$

Sabemos que aplicando la eliminación *sobre las columnas* de \mathbf{A} podemos encontrar bases para los espacios *columna* $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ y *nulo* $\mathcal{N}(\mathbf{A})$. Por tanto, aplicando la eliminación *sobre las columnas* de \mathbf{A}^\top encontraremos bases para los nuevos subespacios $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ y $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. ¡Pero esto supone que, para encontrar bases de los cuatro espacios, necesitamos aplicar el método de eliminación dos veces! una para \mathbf{A} y otra para \mathbf{A}^\top .

¿Es posible que aplicando la eliminación solo sobre las *columnas* de \mathbf{A} encontremos bases para cada uno de los cuatro subespacios?... ¡Afortunadamente sí!

La siguiente proposición nos da la pista necesaria para hacerlo.

Proposición 10.1.1. Sean \mathbf{A} de orden m por n y \mathbf{E} invertible y de orden n , entonces $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{N}((\mathbf{A}\mathbf{E})^\top)$, es decir, dado $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ se verifica que

$$\mathbf{x}\mathbf{A} = \mathbf{0} \iff \mathbf{x}\mathbf{A}\mathbf{E} = \mathbf{0}.$$

Demostración. Veamos las implicaciones en uno y otro sentido.

- Si $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \implies \mathbf{x}\mathbf{A} = \mathbf{0} \implies \mathbf{x}\mathbf{A}\mathbf{E} = \mathbf{0}\mathbf{E} \implies \mathbf{x}(\mathbf{A}\mathbf{E}) = \mathbf{0} \implies \mathbf{x} \in \mathcal{N}((\mathbf{A}\mathbf{E})^\top)$
- Si $\mathbf{x} \in \mathcal{N}((\mathbf{A}\mathbf{E})^\top) \implies \mathbf{x}(\mathbf{A}\mathbf{E}) = \mathbf{0} \implies \mathbf{x}\mathbf{A}\mathbf{E}\mathbf{E}^{-1} = \mathbf{0}\mathbf{E}^{-1} \implies \mathbf{x}\mathbf{A} = \mathbf{0} \implies \mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$

□

Consecuentemente, si \mathbf{A} es de orden m por n y \mathbf{E} es invertible y de orden n , entonces

- un sistema de vectores formado por varias filas $\begin{bmatrix} i_1 | \mathbf{A}, \dots, i_r | \mathbf{A} \end{bmatrix}$ es linealmente independiente si y sólo si el sistema de vectores $\begin{bmatrix} i_1 | \mathbf{A}\mathbf{E}, \dots, i_r | \mathbf{A}\mathbf{E} \end{bmatrix}$ es linealmente independiente.
- la dimensión del espacio fila de \mathbf{A} es igual a la dimensión del espacio fila de $\mathbf{A}\mathbf{E}$.
- por tanto, si encontramos una base entre las filas de $\mathbf{A}\mathbf{E}$, las correspondientes filas de \mathbf{A} serán una base del espacio fila de \mathbf{A} .

El siguiente lema demuestra que las filas con pivote de cualquier forma escalonada \mathbf{L} de \mathbf{A} son linealmente independientes. Demostramos el resultado sobre \mathbf{L} para ayudarnos en el razonamiento, pero como una matriz escalonada es una pre-escalonada con sus columnas reordenadas; y como reordenar las columnas no cambia los pivotes de fila, el resultado también es cierto para cualquier forma pre-escalonada \mathbf{K} .

EJERCICIO 50. Demuestre que

Lema 10.1.2. Si \mathbf{L} está escalonada, entonces las filas con pivote son linealmente independientes. Además, cada fila sin pivote es combinación lineal de las filas con pivote que la preceden.

Pista. Recuerde la demostración del Lema 7.2.2 en la página 89.

Encontrando una base para el espacio fila.

Sea $\mathbf{E} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ tal que \mathbf{AE} es pre-escalona; y sea \mathbf{S} una matriz que selecciona las filas de \mathbf{AE} que forman una base del espacio fila de \mathbf{AE} ; por ejemplo, las filas pivote:

$$\mathbf{S}(\mathbf{AE}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -4 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ -6 & -7 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -4 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Como \mathbf{S} selecciona una base del espacio fila, entonces para cualquier vector \mathbf{u} existe un único vector \mathbf{x} (una única combinación lineal de las filas) tal que

$$\mathbf{xSAE} = \mathbf{uAE}.$$

Pero entonces también la ecuación $\mathbf{xSA} = \mathbf{uA}$ tiene una única solución ya que por ser \mathbf{E} invertible

$$\mathbf{xSA} = \mathbf{uA} \iff \mathbf{xSAE} = \mathbf{uAE}.$$

Luego \mathbf{SA} (la misma selección, pero de las columnas de \mathbf{A}) selecciona una base del espacio de fila de \mathbf{A} .

Por tanto, la dimensión del espacio fila de una matriz coincide con la dimensión del espacio fila de cualquiera de sus formas pre-escalonadas, que a su vez coincide con el rango.

Ejemplo 18.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & -4 & -3 & -4 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -6 & 5 & 5 & 6 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(2)\tau+2] \\ [(1)1+3] \\ [(1)1+4] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -4 & -1 & 0 \\ 4 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ -6 & -7 & -1 & 0 \\ \hline 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(4)3] \\ [(-1)2+3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -4 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ -6 & -7 & 3 & 0 \\ \hline 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{K} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix}$$

De este proceso de eliminación, deducimos que:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Una base del espacio columna } \mathcal{C}(\mathbf{A}): \text{ Las columnas 1, 2 y 3 de } \mathbf{K} & \Rightarrow \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}([\mathbf{K}_{|1}; \mathbf{K}_{|2}; \mathbf{K}_{|3}]) \\ \text{Una base del espacio } \textit{fila} \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top): \text{ Las filas 1, 2 y 4 de } \mathbf{A} & \Rightarrow \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{L}([{}_1\mathbf{A}; {}_2\mathbf{A}; {}_4\mathbf{A}]) \\ \text{Una base del espacio nulo } \mathcal{N}(\mathbf{A}): \text{ La última columna de } \mathbf{E} & \Rightarrow \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}([\mathbf{E}_{|4}]) \end{array} \right.$$

Encontrando una base para el espacio nulo por la izquierda.

Nos falta una regla sencilla para encontrar una base de $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. Puesto que $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{N}((\mathbf{AE})^\top)$, una estrategia es simplificar al máximo alguna forma escalonada de \mathbf{A} , y mirar ahí qué combinaciones de las filas son nulas. Por ello, aplicaremos la eliminación Gauss-Jordan hasta llegar a \mathbf{R} , una forma escalonada *reducida* (es decir, hasta que los pivotes sean iguales a 1 y con ceros a derecha e izquierda).

Continuando el ejemplo anterior:

$$\begin{aligned}
 [\mathbf{A}] &= \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & -4 & -3 & -4 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -6 & 5 & 5 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(2)1+2] \\ [(1)1+3] \\ [(1)1+4] \\ [(-1)2+3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -4 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ -6 & -7 & 3 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(2)1] \\ [(-1)2+1] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ -5 & -7 & 3 & 0 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(1)3+1] \\ [(1)3+2] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(\frac{1}{2})1] \\ [(-\frac{1}{4})2] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} = [\mathbf{R}]
 \end{aligned}$$

Ahora es inmediato ver en \mathbf{R} que cada fila sin pivote es combinación de las filas con pivote que la anteceden:

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} {}_3|\mathbf{R} = 2({}_1|\mathbf{R}) - 1({}_2|\mathbf{R}) \\ \text{y} \\ {}_5|\mathbf{R} = -1({}_1|\mathbf{R}) + 1({}_2|\mathbf{R}) + 3({}_3|\mathbf{R}) \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{R} = \mathbf{0} \\
 &\qquad \qquad \qquad \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{R} = \mathbf{0}
 \end{aligned}$$

Y las mismas relaciones se verifican en la matriz original \mathbf{A} ;

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} {}_3|\mathbf{A} = 2({}_1|\mathbf{A}) - 1({}_2|\mathbf{A}) \\ \text{y} \\ {}_5|\mathbf{A} = -1({}_1|\mathbf{A}) + 1({}_2|\mathbf{A}) + 3({}_3|\mathbf{A}) \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{A} = \mathbf{0} \\
 &\qquad \qquad \qquad \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{A} = \mathbf{0}
 \end{aligned}$$



En el proceso de eliminación $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{R}$ “se ven” bases para los cuatro subespacios fundamentales de \mathbf{A}

$$\begin{aligned}
 \text{Base } \mathcal{C}(\mathbf{A}) &= \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right] = [\mathbf{R}_{|1}; \mathbf{R}_{|2}; \mathbf{R}_{|3};] & \text{Base } \mathcal{N}(\mathbf{A}) &= \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = [\mathbf{E}_{|4};] \\
 \text{Base } \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) &= \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = [{}_1|\mathbf{A}; {}_2|\mathbf{A}; {}_4|\mathbf{A};] & \text{Base } \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) &= \left[\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right]
 \end{aligned}$$

Nótese que hubiéramos obtenido la misma base del espacio nulo por la izquierda si hubiéramos asignado sistemáticamente los siguientes valores a las variables que multiplican a las filas sin pivote (*variables libres*) y deducido el valor de las variables que multiplican a las filas con pivote (*variables pivote*):¹.

¹Puesto que esta asignación de valores a las variables libres es arbitraria, dichas variables también reciben el nombre de variables *exógenas*. Puesto que una vez fijado el valor de las variables libres el valor de las variables pivote queda fijado, las variables pivote también reciben el nombre de variables *endógenas* (véase la *Nomenclatura usada por G. Strang*). Pero tenga en cuenta que los nombres de variables *exógenas* y variables *endógenas* son engañosos, pues dependiendo de los pasos que se realicen en la eliminación, los pivotes pueden cambiar de posición (para una matriz \mathbf{A} , en general las formas (pre)escalonadas no son únicas), de manera que para un mismo sistema de ecuaciones, una misma variable puede ser endógena si se pre-escalona la matriz de coeficientes de una manera, y exógena si se pre-escalona de otra forma distinta. Por eso a mi no me gustan la calificación de *exógenas* y *endógenas* (aunque son nombres habituales en los estudios de Economía).

- Un 1 a la *primera* variable libre y 0 al resto (de variables libres) y se calcula el valor de las variables pivote.
- Un 1 a la *segunda* variable libre y 0 al resto (de variables libres) y se calcula el valor de las variables pivote.

Y si hubiera habido más filas sin pivote hubiéramos seguido igual...

- Un 1 a la *tercera* variable libre y 0 al resto (de variables libres) y se calcula el valor de las variables pivote ...

Por este motivo las componentes de los vectores correspondientes a las filas sin pivote forman una matriz identidad (en verde en el ejemplo anterior). De hecho, es la estructura que de manera natural arrojan las soluciones especiales del siguiente procedimiento alternativo:².

Puesto que $\mathcal{N}(\mathbf{R}^\top) = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, si aplicamos la eliminación sobre \mathbf{R}^\top , las nuevas soluciones especiales serán una base de $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$.

Continuando el ejemplo anterior

$$\begin{bmatrix} \mathbf{R}^\top \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(-2)1+3] \\ [(1)1+5] \\ [(1)2+3] \\ [(-1)2+5] \\ [(-3)4+5] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Además, las filas con pivote de la submatriz de columnas con pivote de la matriz \mathbf{R} también forman una matriz identidad. Los unos en azul del ejemplo forman la diagonal de dicha matriz identidad.

Un caso en el que es inmediato ver una base del Espacio Nulo por la izquierda Ambos hechos (la matriz identidad de orden r en \mathbf{R} y la matriz identidad de orden $n - r$ en las columnas que resultan ser soluciones especiales) sugieren una sencilla ilustración para el caso en que la forma escalonada reducida resulta tener las primeras filas con pivote, de manera que se encuentran sobre las filas sin pivote. Es decir, el caso en que las filas con pivote de \mathbf{R} son consecutivas y aparecen en la parte superior de la matriz:

Sea \mathbf{A} de rango r y \mathbf{E} (no singular) tales que $\mathbf{AE} = \mathbf{R}$, es una forma escalonada reducida cuyas primeras filas tienen pivote, y que escribimos como una matriz por bloques:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{G} & \mathbf{0} \end{bmatrix},$$

entonces aplicando la eliminación sobre \mathbf{R}^\top tendremos

$$\begin{bmatrix} \mathbf{R}^\top \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{G}^\top \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & -\mathbf{G}^\top \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix};$$

por lo que las columnas de la matriz por bloques $\begin{bmatrix} -\mathbf{G}^\top \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}$ es decir las filas de la matriz por bloques $\begin{bmatrix} -\mathbf{G} & \mathbf{I} \end{bmatrix}$, son una base de $\mathcal{N}(\mathbf{R}^\top) = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$.

²Evidentemente también se puede obtener una base a partir de \mathbf{A} mediante eliminación gaussiana por columna de $\begin{bmatrix} \mathbf{A}^\top \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}$ pero en general son necesarios más pasos que si partimos de \mathbf{R}^\top .

10.2. Suma e intersección de subespacios

Sean \mathcal{A} y \mathcal{B} subespacios de un espacio vectorial \mathcal{V} . La suma de \mathcal{A} y \mathcal{B} , que escribimos como $\mathcal{A} + \mathcal{B}$, es el conjunto de vectores de \mathcal{V} que se pueden escribir como $\vec{a} + \vec{b}$ con $\vec{a} \in \mathcal{A}$ y $\vec{b} \in \mathcal{B}$. Ya sabemos que la intersección $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ es un subespacio. Veamos que la suma $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ también lo es:

Proposición 10.2.1. *Si \mathcal{A} y \mathcal{B} son subespacios de \mathcal{V} , entonces la suma $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ también es un subespacio.*

Demostración. Sean $\vec{a}_1, \vec{a}_2 \in \mathcal{A}$ y $\vec{b}_1, \vec{b}_2 \in \mathcal{B}$. Si $\vec{p} = \vec{a}_1 + \vec{b}_1$ y $\vec{q} = \vec{a}_2 + \vec{b}_2$, entonces $\vec{p}, \vec{q} \in \mathcal{A} + \mathcal{B}$. Veamos que cualquier combinación lineal también pertenece a $\mathcal{A} + \mathcal{B}$. Sean $x, y \in \mathbb{R}$, entonces

$$x(\vec{p}) + y(\vec{q}) = x(\vec{a}_1 + \vec{b}_1) + y(\vec{a}_2 + \vec{b}_2) = (x(\vec{a}_1) + y(\vec{a}_2)) + (x(\vec{b}_1) + y(\vec{b}_2)) \in \mathcal{A} + \mathcal{B},$$

pues $(x(\vec{a}_1) + y(\vec{a}_2)) \in \mathcal{A}$ y $(x(\vec{b}_1) + y(\vec{b}_2)) \in \mathcal{B}$. □

Librería NAcAL para Python

```
A = Sistema([Vector([1, 0, 1, 0]), Vector([0, -1, 0, -1])]);
B = Sistema([Vector([1, 1, 1, 1]), Vector([1, 0, 0, 0])]);
SubEspacio(A) + SubEspacio(B) # SubEspacio suma de los SubEspacios L(A) y L(B)
```

$$\left\{ \vec{v} \in \mathbb{R}^4 \mid \exists \vec{p} \in \mathbb{R}^3 \text{ tal que } \vec{v} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \vec{p} \right\} = \{ \vec{v} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{v} = \vec{0} \}$$

Proposición 10.2.2. *Si \mathcal{A} y \mathcal{B} son subespacios de \mathcal{V} , entonces $\dim(\mathcal{A} + \mathcal{B}) = \dim(\mathcal{A}) + \dim(\mathcal{B}) - \dim(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})$.*

Demostración. Asumamos que $\dim(\mathcal{A}) = p$, $\dim(\mathcal{B}) = q$ y $\dim(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = r$, y sean $\mathbf{A} = [\vec{a}_1; \dots; \vec{a}_p]$ y $\mathbf{B} = [\vec{b}_1; \dots; \vec{b}_q]$ bases de \mathcal{A} y \mathcal{B} respectivamente. Consideremos el sistema $\mathbf{Z} = [\vec{a}_1; \dots; \vec{a}_p; \vec{b}_1; \dots; \vec{b}_q]$ que genera $\mathcal{A} + \mathcal{B}$. Para encontrar una base de $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ entre los vectores de \mathbf{Z} procedemos aplicando transformaciones elementales “de izquierda a derecha” como hicimos en la Proposición 9.5.5 en la página 108. Cada vector \vec{b}_i que acaba siendo eliminado necesariamente pertenece a $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$. Puesto que $\dim(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = r$, tras el proceso de eliminación “de izquierda a derecha”, habremos eliminado r vectores de \mathbf{B} . Dichos vectores son necesariamente una base de $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ y el conjunto de vectores de \mathbf{Z} que no se anulan es una base de $\mathcal{A} + \mathcal{B}$. Así, $\dim(\mathcal{A} + \mathcal{B}) = (p + q) - r = \dim(\mathcal{A}) + \dim(\mathcal{B}) - \dim(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})$. □

Librería NAcAL para Python

```
print( (SubEspacio(A) + SubEspacio(B)).dim ) # dimensión SubEspacio suma
print( SubEspacio(A).dim )                  # dimensión SubEspacio generado por A
print( SubEspacio(B).dim )                  # dimensión SubEspacio generado por B
print( (SubEspacio(A) & SubEspacio(B)).dim ) # dimensión SubEspacio intersección
```

```
3
2
2
1
```

Definición 10.1 (Suma directa). *Si \mathcal{A} y \mathcal{B} son subespacios de \mathcal{V} , y su intersección es $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \vec{0}$; entonces la suma de los subespacios \mathcal{A} y \mathcal{B} se denomina suma directa y se denota con $\mathcal{A} \oplus \mathcal{B}$.*

Definición 10.2 (Espacios complementarios). Si \mathcal{A} y \mathcal{B} son subespacios de \mathcal{V} , y su suma directa es todo el espacio, $\mathcal{A} \oplus \mathcal{B} = \mathcal{V}$, entonces decimos que \mathcal{A} y \mathcal{B} son subespacios complementarios.

Veamos que si $\mathcal{V} = \mathcal{A} \oplus \mathcal{B}$, cualquier vector $\vec{v} \in \mathcal{V}$ se puede descomponer de manera única en la suma de dos vectores, uno que pertenece a \mathcal{A} y otro que pertenece a \mathcal{B} .

Proposición 10.2.3. Si $\vec{v} = \vec{a} + \vec{b}$ con $\vec{a} \in \mathcal{A}$, $\vec{b} \in \mathcal{B}$ y $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \{\vec{0}\}$, entonces \vec{a} y \vec{b} son únicos.

Demostración. Imagine que $\vec{v} = \vec{a} + \vec{b}$ y $\vec{v} = \vec{a}_* + \vec{b}_*$, con $\vec{a}, \vec{a}_* \in \mathcal{A}$ y $\vec{b}, \vec{b}_* \in \mathcal{B}$. Entonces

$$\vec{v} - \vec{v} = (\vec{a} + \vec{b}) - (\vec{a}_* + \vec{b}_*) = \underbrace{(\vec{a} - \vec{a}_*)}_{\in \mathcal{A}} - \underbrace{(\vec{b} + \vec{b}_*)}_{\in \mathcal{B}} = \vec{0} \implies (\vec{a} - \vec{a}_*) = -(\vec{b} + \vec{b}_*) \in \mathcal{B}.$$

Es decir, $(\vec{a} - \vec{a}_*) \in \mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \{\vec{0}\}$, y por tanto $(\vec{a} - \vec{a}_*) = \vec{0} = (\vec{b} + \vec{b}_*)$, es decir, $\vec{a} = \vec{a}_*$ y $\vec{b} = \vec{b}_*$. \square

Para una matriz \mathbf{A} de orden m por n con rango r , el subespacio $\mathcal{C}(\mathbf{A}) \subset \mathbb{R}^m$ tiene dimensión r y el subespacio $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \subset \mathbb{R}^m$ tiene dimensión $m - r$, por tanto, $\dim(\mathcal{C}(\mathbf{A}) \cap \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)) = 0$, y $\mathbb{R}^m = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$; es decir, $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ y $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ son complementarios. Por otra parte el subespacio $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) \subset \mathbb{R}^n$ tiene dimensión r y el subespacio $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \subset \mathbb{R}^n$ tiene dimensión $n - r$, por tanto, $\dim(\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) \cap \mathcal{N}(\mathbf{A})) = 0$, y $\mathbb{R}^n = \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A})$; es decir $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ y $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ son complementarios.

Así, si \mathbf{A} es de orden m por n , por la Proposición 10.2.3, todo vector de \mathbb{R}^m se puede descomponer en la suma de un vector de $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ más otro de $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$; y todo vector de \mathbb{R}^n se puede descomponer en la suma de un vector de $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ más otro de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$.

El siguiente teorema y dibujo resume lo visto hasta aquí.

Teorema 10.2.4 (Teorema Fundamental del Álgebra Lineal (parte 1)). Sea \mathbf{A} de orden m por n , entonces el espacio columna y el espacio fila tienen la misma dimensión, que es igual al rango r de la matriz. El espacio nulo tiene dimensión $n - r$ y el espacio nulo por la izquierda tiene dimensión $m - r$.




Figura 10.1: Teorema Fundamental del Álgebra Lineal (parte 1)

Ejemplo:

Librería NAcAL para Python

```
A = Matrix([ [0,1,1,0], [0,2,2,0], [0,-1,-1,0] ])
print( A.rg() )           # Rango de A
A
```

1

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Librería NAcAL para Python

```
Cola = SubEspacio(A.sis());           # Espacio Columna de A (en R3)
print(Cola.dim); Cola
```

1

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1 \text{ tal que } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\} = \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \right\}$$

Librería NAcAL para Python

```
NulAT = SubEspacio( ~A );           # Espacio Nulo Izda de A (en R3)
print(NulAT.dim); NulAT
```

2

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^2 \text{ tal que } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\} = \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \right\}$$

Librería NAcAL para Python

```
Fila = SubEspacio( (~A).sis() );     # Espacio Fila de A (en R4)
print(Fila.dim); Fila
```

1

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^4 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1 \text{ tal que } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\} = \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \right\}$$

Librería NAcAL para Python

```
NulA = SubEspacio( A );           # Espacio Nulo de A (en R4)
print(NulA.dim); NulA
```

3

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^4 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 \text{ tal que } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\} = \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \right\}$$

```
print( (Cola + NulAT).dim ) # Dimensión del SubEspacio suma (es  $R^3$ )
print( (Cola & NulAT).dim ) # Dimensión de la intersección (solo contiene el cero )
```

3

0

(son espacios complementarios)

```
print( (Fila + NulA).dim ) # Dimensión del SubEspacio suma (es  $R_4$ )
print( (Fila & NulA).dim ) # Dimensión de la intersección (solo contiene el cero )
```

4

0

(son espacios complementarios)

Parte IV

Ortogonalidad (Espacio Euclideo)

Vectores ortogonales. Subespacios ortogonales

11.1. Producto punto (producto escalar usual en \mathbb{R}^n)

En la Lección 2 vimos que el producto punto entre dos vectores \mathbf{a} y \mathbf{b} de \mathbb{R}^n es

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + \cdots + a_nb_n = \sum_{i=1}^n a_ib_i.$$

Propiedades del producto escalar usual

El producto punto (o producto escalar usual de \mathbb{R}^n) satisface los siguientes axiomas para cualesquiera vectores \mathbf{x} , \mathbf{y} y \mathbf{z} de \mathbb{R}^n y para cualquier número real a .

- **Simetría:** $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$
- **Linealidad respecto al primer argumento:**
 1. $(a\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = a(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})$
 2. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{z} + \mathbf{y} \cdot \mathbf{z}$
- **Positivo:** $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \geq 0$
- **Definido:** $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$.

El producto punto de un vector por si mismo es una operación importante, pues $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$ es el cuadrado de la longitud de \mathbf{x} :

Definición 11.1. La longitud (o norma) de un vector \mathbf{x} es la raíz cuadrada de $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$:

$$\text{longitud de } \mathbf{x} \equiv \|\mathbf{x}\| \equiv \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}}.$$

Por ejemplo, la longitud de $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ es $\sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} = \sqrt{\begin{pmatrix} 6 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}} = \sqrt{6^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{49} =$

7.

Nótese que $\|\mathbf{x}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Definición 11.2 (Vector unitario). Se dice que un vector es unitario si su longitud es igual a uno.

A partir de un vector no nulo \mathbf{x} , es muy fácil obtener un múltiplo unitario (longitud uno); basta con dividirlo por su longitud. Por ejemplo si $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, entonces $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} = \sqrt{4} = 2$. Así,

$$\mathbf{y} = \frac{1}{\|\mathbf{x}\|}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

es unitario. ¡Compruébelo!

Vectores perpendiculares

Definición 11.3 (Vectores perpendiculares u ortogonales). *Dos vectores son ortogonales (perpendiculares) si su producto escalar es cero.*

Por ejemplo, los vectores $(1 \ -2)$ y $(2 \ 1)$ son perpendiculares (dibújelos en el plano para comprobarlo):

$$(1 \ -2) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 - 2 = 0.$$

La propiedad más importante que verifican los vectores perpendiculares es el Teorema de Pitágoras.

Teorema 11.1.1 (Teorema de Pitágoras). *Sean \mathbf{x} e \mathbf{y} son dos vectores de \mathbb{R}^n ; entonces $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$ (son perpendiculares) si y solo si*

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2.$$

Demostración. Si \mathbf{x} e \mathbf{y} son perpendiculares, entonces $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$ y

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &= (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{y} \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \\ &= (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \cdot \mathbf{x} + (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \cdot \mathbf{y} \\ &= \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{y} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \mathbf{y} \cdot \mathbf{y} \\ &= \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} + \quad 2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) \quad + \mathbf{y} \cdot \mathbf{y} \\ &= \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} + \quad 0 \quad + \mathbf{y} \cdot \mathbf{y} = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2. \end{aligned}$$

□

Un sistema de vectores perpendiculares y no nulos es un sistema linealmente independiente. Para demostrarlo, veamos primero algunas propiedades del producto $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ cuando \mathbf{A} tiene columnas perpendiculares entre si.

Proposición 11.1.2. *Sea \mathbf{A} una matriz cuyas columnas son perpendiculares entre si, entonces $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ es diagonal, y las componentes de la diagonal son el cuadrado de las normas de cada una de las columnas de \mathbf{A} .*

Demostración. ${}_{ij}(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = (\mathbf{A}_{\cdot i}) \cdot (\mathbf{A}_{\cdot j}) = \begin{cases} 0 & \text{cuando } i \neq j \\ \|\mathbf{A}_{\cdot i}\|^2 & \text{cuando } i = j \end{cases}$

□

Puesto que $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ es diagonal, su fila i ésima es un múltiplo de la fila i ésima de la matriz identidad:

$${}_{i\cdot}(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = {}_{i\cdot} \mathbf{I} \left(\|\mathbf{A}_{\cdot i}\|^2 \right) = \|\mathbf{A}_{\cdot i}\|^2 ({}_{i\cdot} \mathbf{I});$$

y por tanto, el producto ${}_{i\cdot} \mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A} \mathbf{x}$, de la columna i ésima de \mathbf{A} (la fila ${}_{i\cdot} \mathbf{A}^T$) con la combinación de columnas $\mathbf{A} \mathbf{x}$ es:

$${}_{i\cdot} \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \|\mathbf{A}_{\cdot i}\|^2 ({}_{i\cdot} \mathbf{I} \cdot \mathbf{x}) = \|\mathbf{A}_{\cdot i}\|^2 (x_i), \text{ pues } ({}_{i\cdot} \mathbf{I} \cdot \mathbf{x}) \text{ selecciona el elemento } i\text{ésimo de } \mathbf{x}.$$

Vamos a usar esto para ver que un sistema de vectores no nulos y perpendiculares entre si, es linealmente independiente.

Proposición 11.1.3. *Sea un sistema de vectores $[\mathbf{a}_1; \dots; \mathbf{a}_n]$ distintos de $\mathbf{0}$ y perpendiculares entre si, entonces el sistema es linealmente independiente.*

Demostración. Consideremos la matriz $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1; \dots; \mathbf{a}_n]$. Tenemos que demostrar que si $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ entonces $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Multiplicando por \mathbf{A}^\top a ambos lados del sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tenemos que $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, y como

$${}_i\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{x} = \|\mathbf{A}_{|i}\|^2(x_i); \quad \text{resulta que} \quad {}_i\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{x} = {}_i\mathbf{0} \iff \|\mathbf{A}_{|i}\|^2(x_i) = 0.$$

Como los vectores del sistema son distintos de cero, sus normas también lo son ($\|\mathbf{A}_{|i}\| \neq 0$). Así que necesariamente $x_i = 0$ para $i = 1, \dots, n$, es decir, $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. \square

11.2. Ortogonalidad de los 4 subespacios

Definición 11.4 (Subespacios ortogonales). *Dos subespacios \mathcal{A} y \mathcal{B} de \mathbb{R}^n son ortogonales ($\mathcal{A} \perp \mathcal{B}$), si todo vector de \mathcal{A} es perpendicular a todo vector de \mathcal{B} ; es decir, si para cualquier $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ y cualquier $\mathbf{b} \in \mathcal{B}$, resulta que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.*

La siguiente proposición muestra que el espacio nulo es ortogonal al espacio fila; y que el espacio nulo por la izquierda es ortogonal al espacio columna.

Proposición 11.2.1 (Teorema Fundamental del Álgebra Lineal (parte 2)). *Sea \mathbf{A} de orden m por n , entonces*

- *El espacio nulo y el espacio fila son ortogonales:* $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$.
- *El espacio nulo por la izquierda y el espacio columna son ortogonales:* $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \perp \mathcal{C}(\mathbf{A})$.

Demostración. El espacio fila es el conjunto de combinaciones lineales de las filas de \mathbf{A} , es decir el conjunto de vectores de la forma $\mathbf{f} = \mathbf{y}\mathbf{A}$ con $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$; y los vectores del espacio nulo son los vectores \mathbf{x} tales que $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Evidentemente los vectores \mathbf{f} y \mathbf{x} son perpendiculares puesto que:

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{0} = 0.$$

Por otra parte, el espacio columna de \mathbf{A} es el conjunto de combinaciones lineales de las columnas de \mathbf{A} , es decir el conjunto de vectores de la forma $\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{v}$ con $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$; y los vectores del espacio nulo por la izquierda son los vectores \mathbf{z} tales que $\mathbf{z}\mathbf{A} = \mathbf{0}$. También los vectores \mathbf{z} y \mathbf{b} son perpendiculares puesto que:

$$\mathbf{z} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{z}\mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{v} = 0.$$

\square

Librería NAcAL para Python

```
a = Vector([1,1,1])
A = Matrix([a,-a,a,-a])

C = SubEspacio( A.sis )           # Espacio columna de A
F = SubEspacio( (~A).sis )        # Espacio fila de A
N = SubEspacio( A )               # Espacio nulo de A
NI = SubEspacio( ~A )             # Espacio nulo por la izquierda de A

print( F == ~N )                  # ¿Es cierto que F es igual a complemento ortogonal de N?
print( NI == ~C )                 # ¿Es cierto que NI es igual a complemento ortogonal de C?
```

El método de eliminación como generador de bases del complemento ortogonal

Si dos subespacios \mathcal{S} y \mathcal{T} son complementarios (Definición 10.2) y ortogonales entre si, se dice uno es el *complemento ortogonal* del otro.

En la lección anterior vimos que con el método de eliminación podíamos encontrar bases de los cuatro espacios fundamentales de una matriz. Por tanto es un método que sirve para encontrar una base del *complemento ortogonal* de cualquier subespacio de \mathbb{R}^m . Si tenemos un sistema de vectores \mathbf{Z} de \mathbb{R}^m , basta escribir dichos vectores en forma de filas de una matriz y aplicar el método: las soluciones especiales que encontremos serán una base del complemento ortogonal del espacio generado por \mathbf{Z} .

Por ejemplo, podemos buscar una base para el complemento ortogonal del espacio generado por los vectores

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Aplicando la eliminación sobre una matriz cuyas filas son los vectores dados tenemos:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(3)1+2] \\ [(1)1+4] \\ [(1)2+3] \\ [(1)2+4] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Base del complemento ortogonal: } \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Librería NAcAL para Python

```
S = Sistema( [Vector([1,-3,0,-1]), Vector([0,-1,1,1]), Vector([1,-4,1,0])] )
(~Matrix(S)                                     # Matriz cuyas filas son los vectores de S
Homogenea(~Matrix(S),1).sgen                     # Sistema generador del complemento ortogonal
SubEspacio( Homogenea(~Matrix(S)).sgen ) == ~SubEspacio(S)                # Comprobación
```

11.2.1. Ecuaciones implícitas (o cartesianas) y ecuaciones paramétricas

En la Sección 7.2.2 de la Lección 7 aparecieron por primera vez las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones cartesianas (véase las notas a pie de página números 2 en la página 90 y 1 en la página 87). Ahora vamos a ver cómo pasar de unas a las otras. Así dispondremos en todo momento de dos modos de describir el conjunto de soluciones. Cada modo tiene un propósito distinto: las ecuaciones paramétricas nos permiten generar ejemplos de vectores que pertenecen al conjunto (basta dar valores arbitrarios a los parámetros) y las cartesianas nos permiten comprobar si un vector \mathbf{y} pertenece al conjunto (basta comprobar que \mathbf{y} es solución de las ecuaciones cartesianas).

El camino que hemos recorrido hasta ahora: de las ecuaciones cartesianas (o implícitas) a las paramétricas

Podemos expresar el conjunto de soluciones de un sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, donde \mathbf{A} es de orden m por n , con las ecuaciones cartesianas

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{Ax} = \mathbf{b}\}$$

y una vez encontrada una solución particular \mathbf{s} y un sistema generador $[\mathbf{n}_1; \dots \mathbf{n}_k]$ de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, también hemos descrito el conjunto de soluciones con las ecuaciones paramétricas

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^k \text{ tal que } \mathbf{x} = \mathbf{s} + [\mathbf{n}_1; \dots \mathbf{n}_k]\mathbf{p}\}.$$

Hasta ahora siempre hemos pasado de las ecuaciones cartesianas (o implícitas) a las ecuaciones paramétricas; veamos como recorrer el camino inverso.

Recorriendo el camino inverso: de las ecuaciones paramétricas a las cartesianas (o implícitas)

En el camino inverso, dado el conjunto de soluciones de “un sistema desconocido, $\mathbf{D}\mathbf{x} = \mathbf{f}$ ”, encontraremos las filas de una matriz de coeficientes \mathbf{A} (ortogonales a los vectores que generan el espacio nulo) y un vector del lado derecho tales que definan un sistema de ecuaciones $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ cuyo conjunto de soluciones coincide con el dado.

Procedimiento. Cuando disponemos de unas ecuaciones paramétricas

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^k \text{ tal que } \mathbf{x} = \mathbf{s} + [\mathbf{n}_1; \dots \mathbf{n}_k]\mathbf{p}\},$$

disponemos tanto de una solución particular \mathbf{s} (un vector del conjunto de soluciones), como de un sistema generador del espacio nulo $[\mathbf{n}_1; \dots \mathbf{n}_k]$, es decir, $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}([\mathbf{n}_1; \dots \mathbf{n}_k])$. Y además sabemos que por eliminación podemos encontrar una base del complemento ortogonal de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, es decir una base de $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ (el espacio fila de \mathbf{A}). Pues bien, usaremos los vectores de una base del espacio fila como filas de la matriz \mathbf{A} que buscamos.

En particular, si \mathbf{F} es la matriz cuyas *filas* son los vectores $\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_k$, por ejemplo, si $\mathbf{F} = [\mathbf{n}_1 \dots \mathbf{n}_k]^\top$, entonces, aplicando la eliminación llegaremos a

$$\begin{bmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{K} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix}$$

donde las $n - r$ columnas de \mathbf{E} que quedan bajo las columnas nulas de \mathbf{K} (de rango r) son una base del espacio fila $\mathcal{C}(\mathbf{A})$, pues son una base del complemento ortogonal de $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}([\mathbf{n}_1; \dots \mathbf{n}_k])$.

Por ejemplo, si se aplica la eliminación *Gaussiana* y se escalona \mathbf{F} , basta usar como matriz de coeficientes $\mathbf{A} = (\mathbf{E}_{|(r+1, \dots, n)})^\top$, es decir, la matriz cuyas filas son las $(n - r)$ últimas columnas de \mathbf{E} . Así, puesto que las filas de \mathbf{A} son ortogonales a $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, sabemos que

$$\mathbf{A}[\mathbf{n}_1 \dots \mathbf{n}_k] = \mathbf{0}.$$

Multiplicando por \mathbf{A} la ecuación paramétrica $\mathbf{x} = \mathbf{s} + [\mathbf{n}_1; \dots \mathbf{n}_k]\mathbf{p}$ tendremos que

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{s} + \mathbf{A}[\mathbf{n}_1; \dots \mathbf{n}_k]\mathbf{p} \Rightarrow \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{s},$$

donde $\mathbf{A}\mathbf{s}$ es el vector del lado derecho, es decir, $\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{s}$. Este sistema es, por construcción, un sistema cuyas soluciones son las ecuaciones paramétricas de las que hemos partido, ya que

$$\begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} & \text{cuando } \mathbf{x} = \mathbf{s} \\ \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0} & \text{cuando } \mathbf{x} = \mathbf{n}_i \text{ para } i = 1 : k \end{cases}$$

Procedimiento abreviado para usar con lápiz y papel. No es necesario encontrar primero los vectores perpendiculares a $\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_k$ para luego formar con ellos las filas de \mathbf{A} y después multiplicar la ecuación paramétrica inicial para obtener el sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$... ¡Podemos hacer todo esto a la vez!

Si \mathbf{M} es la matriz

$$\mathbf{M} = [\mathbf{x} \mid \mathbf{s} \mid \mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_k]^\top \quad (\text{nótese el símbolo de transposición}),$$

donde \mathbf{x} es el vector de incógnitas, \mathbf{s} es una solución particular y $[\mathbf{n}_1; \dots \mathbf{n}_k]$ es un sistema generador de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$; podemos tratar de hacer columnas de ceros en la submatriz con las k últimas filas (correspondientes

a los vectores $\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_k$). Una vez finalizado el proceso de eliminación, “aparecerá” sobre dichas columnas nulas el sistema de ecuaciones deseado. Por ejemplo, sea el conjunto

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid \exists a, b \in \mathbb{R} \text{ tales que } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

entonces

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} x & y & z & w \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(-1)1+2] \\ [(-1)1+4] \end{matrix}} \begin{bmatrix} x & (y-x) & z & (w-x) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(-1)3+4] \end{matrix}} \begin{bmatrix} x & (y-x) & z & (w-x-z) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} y-x & = 0 \\ w-x-z & = 1 \end{cases} \Rightarrow \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Y donde las filas de \mathbf{A} son las soluciones especiales encontradas en el proceso de eliminación (véase las transparencias)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(-1)1+2] \\ [(-1)1+4] \\ [(-1)3+4] \end{matrix}} \begin{bmatrix} \mathbf{K} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix}.$$

Es decir, si \mathbf{A} es la matriz cuyas filas son las soluciones especiales (columnas de \mathbf{E}) encontradas al aplicar la eliminación sobre \mathbf{M} para anular las columnas formadas por sus últimas k filas (correspondientes a los k vectores \mathbf{n}_i multiplicados por parámetros en las ecuaciones paramétricas); tenemos que

$$\mathbf{A}\mathbf{M}^T = \mathbf{A} \left[\mathbf{x} \mid \mathbf{x}_p \mid \mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_k \right] = \left[\mathbf{A}\mathbf{x} \mid \mathbf{A}\mathbf{x}_p \mid \mathbf{0}, \dots, \mathbf{0} \right].$$

Así pues, las ecuaciones cartesianas del conjunto descrito más arriba es

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Puntos, rectas, planos e hiper-planos de \mathbb{R}^n . Espacios afines

Dado un sistema de ecuaciones $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, el conjunto de soluciones posee una forma geométrica especial, ya que es “plano”, es decir, no es curvado. En particular, si $\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = 0$ el conjunto es *un punto*; si $\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = 1$ el conjunto es *una recta*; si $\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = 2$ el conjunto es *un plano*, y si $\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = d > 2$ el conjunto es *un hiper-plano de dimensión d* .

Esto sugiere emplear nuevos nombres para conceptos ya conocidos: podemos denominar ecuaciones de un punto, recta, plano, etc. a las ecuaciones que describen el conjunto de soluciones de un sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Por tanto, podemos preguntarnos por las ecuaciones cartesianas (o las ecuaciones paramétricas) de, por ejemplo, una recta en \mathbb{R}^n .

De hecho, estos subconjuntos de \mathbb{R}^n descritos como la suma de un vector particular \mathbf{s} más las combinaciones lineales de un sistema de vectores $[\mathbf{n}_1; \dots \mathbf{n}_k]$ se denominan *espacios afines*. La librería de Python guarda el conjunto de soluciones de sistema de ecuaciones en forma de espacio afín en el atributo `eafin`; y su representación en Jupyter muestra tanto las ecuaciones cartesianas como las paramétricas de dichos espacios.


```
A = Matrix( [ [-1,1,0,0], [-1,0,-1,1] ] )
b = Vector([0,1])
SEL(A,b).eafin
```

Podemos generar un espacio afín con una matriz y un vector

```
A = Matrix( [ [-1,1,0,0], [-1,0,-1,1] ] )
v = Vector([0,0,0,1])
EAfin(A,v)
```

como con un sistema de vectores y un vector

```
S = Sistema([ Vector([-1,-1,1,0]), Vector([0,0,1,1]) ])
v = Vector([0,0,0,1])
EAfin(S,v)
```

11.3. Definición geométrica del producto escalar usual de \mathbb{R}^n



En muchos libros se emplea una definición “geométrica” del producto escalar usual de dos vectores \mathbf{x} y \mathbf{y} usando la norma de dichos vectores y el coseno del ángulo que forman. Lo exponemos a continuación.




Figura 11.1: Relación entre el ángulo y su seno y coseno (círculos con radio uno)

Definición 11.5 (Producto escalar en \mathbb{R}^n (definición *geométrica*)).

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \cos \theta$$

donde θ es el ángulo que forman los vectores \mathbf{a} y \mathbf{b} medido en radianes.

Por tanto, el *coseno del ángulo* θ formado por los vectores \mathbf{x} e \mathbf{y} es

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}; \quad -1 \leq \cos \theta \leq 1.$$

Si los vectores son perpendiculares, es decir, si $\theta = \pi/2$, entonces $\cos \theta = \cos \pi/2 = 0$ y por tanto

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot 0 = 0.$$

Si el ángulo es cero, ($\theta = 0$), entonces $\cos \theta = \cos 0 = 1$. y por tanto

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\|.$$

Así, con la definición geométrica se llega al mismo resultado

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|^2.$$

Nótese que el efecto de multiplicar un vector \mathbf{x} por α es obtener un vector paralelo a \mathbf{x} cuya longitud ha sido multiplicada por α .

$$\|\alpha \mathbf{x}\| = \sqrt{\alpha^2 (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})} = |\alpha| \|\mathbf{x}\|$$

Cuando un vector \mathbf{y} es paralelo al vector \mathbf{x} el producto escalar de ambos es

$$\mathbf{y} \cdot \mathbf{x} = \alpha (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}) = \alpha \|\mathbf{x}\|^2$$

En tal caso, cuando los vectores son paralelos (y $\alpha \neq 0$), su ángulo es cero (o 180) ya que:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} = \frac{\alpha \|\mathbf{x}\|^2}{|\alpha| \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{x}\|} = \frac{\alpha}{|\alpha|} = \pm 1.$$

En estadística, el *coseno del ángulo* θ de dos *variables centradas* (i.e., con media nula) se denomina *correlación*.

Proyecciones sobre subespacios

12.1. Proyecciones sobre subespacios

Definición 12.1 (Suma directa $\mathcal{A} \oplus \mathcal{B}$). Se dice que \mathbb{R}^n es suma directa de los subespacios \mathcal{A} y \mathcal{B} (y lo denotamos con $\mathbb{R}^n = \mathcal{A} \oplus \mathcal{B}$) si para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ existe una descomposición única de la forma $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$, con $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ y $\mathbf{b} \in \mathcal{B}$.

Teorema 12.1.1. Sea \mathbf{A} de orden m por n , y rango r ; entonces $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) = \mathbb{R}^m$ y $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^n$.

Demostración. ■ Sea $\mathbf{C} = [\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r]$ una base de $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ y $\mathbf{L} = [\mathbf{l}_1, \dots, \mathbf{l}_{(n-r)}]$ una base de $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. Puesto que cada vector de \mathbf{C} es perpendicular a los vectores de \mathbf{L} , los vectores de \mathbf{C} son linealmente independientes de los de \mathbf{L} , y por tanto el sistema $[\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r, \mathbf{l}_1, \dots, \mathbf{l}_{(n-r)}]$ es una base de \mathbb{R}^n . Consecuentemente, todo vector \mathbf{v} de \mathbb{R}^n se puede expresar de manera única como combinación de los vectores de dicha base:

$$\mathbf{v} = a_1 \mathbf{c}_1 + \dots + a_r \mathbf{c}_r + a_{(r+1)} \mathbf{l}_1 + \dots + a_n \mathbf{l}_{(n-r)} = \mathbf{b} + \mathbf{z},$$

donde $\mathbf{b} = (a_1 \mathbf{c}_1 + \dots + a_r \mathbf{c}_r) \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$ y $\mathbf{z} = (a_{(r+1)} \mathbf{l}_1 + \dots + a_n \mathbf{l}_{(n-r)}) \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$.

- De igual manera, sea el sistema de vectores $\mathbf{F} = [\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_r]$ una base de $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ y $\mathbf{N} = [\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_{(m-r)}]$ una base de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$. Puesto que cada vector de \mathbf{F} es perpendicular a los vectores de \mathbf{N} , los vectores de \mathbf{F} son linealmente independientes de los de \mathbf{N} , y por tanto el sistema $[\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_r, \mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_{(m-r)}]$ es una base de \mathbb{R}^m . Consecuentemente, todo vector \mathbf{y} de \mathbb{R}^m se puede expresar de manera única como combinación de los vectores de dicha base:

$$\mathbf{y} = a_1 \mathbf{f}_1 + \dots + a_r \mathbf{f}_r + a_{(r+1)} \mathbf{n}_1 + \dots + a_m \mathbf{n}_{(m-r)} = \mathbf{b} + \mathbf{z},$$

donde $\mathbf{b} = (a_1 \mathbf{f}_1 + \dots + a_r \mathbf{f}_r) \in \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ y $\mathbf{z} = (a_{(r+1)} \mathbf{n}_1 + \dots + a_m \mathbf{n}_{(m-r)}) \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$. □

Así, si \mathbf{A} es de orden m por n , todo vector de \mathbb{R}^m se puede descomponer como suma de un vector de $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ más otro de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$; y todo vector de \mathbb{R}^n se puede descomponer como suma de un vector de $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ más otro de $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$.

Proposición 12.1.2. $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})$.

Demostración. Para demostrar que dos conjuntos son iguales basta mostrar que todo elemento del primer conjunto está en el segundo, y viceversa. Veamos que así ocurre con $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ y $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})$.

Primero comprobemos que todo vector de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ es también un vector de $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})$:

Si $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ entonces $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Multiplicando ambos lados de la igualdad por \mathbf{A}^\top tenemos $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} = (\mathbf{A}^\top) \mathbf{0} = \mathbf{0}$; y por tanto $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})$.

Ahora toca la segunda parte:

Si $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})$ entonces $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$. Multiplicando por \mathbf{x} tenemos que $\mathbf{x} \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{0} = 0$. Pero esto quiere decir que el vector $\mathbf{A} \mathbf{x}$ tiene norma cero, ya que $\mathbf{x} (\mathbf{A}^\top) \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{A} \mathbf{x}) \cdot (\mathbf{A} \mathbf{x})$, es el cuadrado de la norma de $\mathbf{A} \mathbf{x}$. Como el único vector de norma cero es $\mathbf{0}$ (el vector nulo) tenemos que $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$, y por tanto $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$.

□

La proposición anterior tiene consecuencias sobre el rango de las matrices \mathbf{A} y $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$:

Corolario 12.1.3. *El rango de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ es igual al rango de \mathbf{A} .*

Demostración. El rango de una matriz es igual al número de columnas con pivote, es decir, al número total de columnas menos las columnas sin pivote. El número de columnas sin pivote es la dimensión del espacio nulo. Como tanto $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ como \mathbf{A} tienen n columnas e idéntico espacio nulo ($\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})$), necesariamente tienen el mismo rango: $k = n - \dim \mathcal{N}(\mathbf{A})$.

□

Mínimos cuadrados

Aunque el sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ no tiene solución cuando $\mathbf{b} \notin \mathcal{C}(\mathbf{A})$, ¡El sistema $(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})\mathbf{x} = (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}$ siempre se puede resolver! Antes de demostrarlo hay que recordar que \mathbf{A} y \mathbf{A}^\top tienen el mismo rango; y que $\text{rango}(\mathbf{AB}) \leq \text{rango}(\mathbf{A})$, pues las columnas de \mathbf{AB} son combinaciones de las columnas de \mathbf{A} y por tanto $\mathcal{C}(\mathbf{AB}) \subset \mathcal{C}(\mathbf{A})$.

Proposición 13.0.1. Sea \mathbf{A} de orden m por n y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, entonces el sistema $(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})\mathbf{x} = (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}$ siempre tiene solución.

Demostración. El sistema $(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})\mathbf{x} = (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}$ tiene solución si el rango de la matriz de coeficientes $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ es igual que el rango de la matriz ampliada $[\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mid (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}]$; es decir, si $(\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}$ es combinación lineal de las columnas de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Veámoslo:

Como al añadir una columna a una matriz, el rango (el número de pivotes) no puede disminuir, sabemos que $\text{rango}([\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mid (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}]) \geq \text{rango}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) = k$.

Por otra parte, $[\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mid (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}] = \mathbf{A}^\top [\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]$ que es el producto de la matriz \mathbf{A}^\top por la matriz ampliada $[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]$, y como recordábamos más arriba $\text{rango}([\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mid (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}]) = \text{rango}(\mathbf{A}^\top [\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]) \leq \text{rango}(\mathbf{A}^\top) = \text{rango}(\mathbf{A}) = k$.

Así que, como por una parte $\text{rango}([\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mid (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}]) \geq k$ y por la otra $\text{rango}([\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mid (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}]) \leq k$, se deduce que $\text{rango}([\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mid (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}]) = k$; que es el rango de la matriz de coeficientes $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ del sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} = (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}$, y por tanto el sistema siempre tiene solución $((\mathbf{A}^\top)\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}))$. \square

Se puede obtener el mismo resultado empleando la interpretación geométrica de la proyección ortogonal: cuando proyectamos el vector \mathbf{b} sobre el espacio columna de \mathbf{A} , descomponemos \mathbf{b} en un vector $\mathbf{p} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}$ (en el espacio columna de \mathbf{A}) y un vector \mathbf{e} (ortogonal a dicho espacio columna): $\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{e} = \mathbf{b}$. Entonces $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + (\mathbf{A}^\top)\mathbf{e} = (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}$. Pero \mathbf{e} es ortogonal al espacio fila de \mathbf{A}^\top , así que $(\mathbf{A}^\top)\mathbf{e} = \mathbf{0}$, y por tanto $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}$

Parte V

Determinantes

Propiedades de los determinantes

14.1. Función determinante y función volumen

14.1.1. Tres propiedades de la función volumen de un paralelogramo

La función volumen¹ (*base \times altura*) de un paralelepípedo de dimensión n , cuyas aristas son las columnas de una matriz cuadrada \mathbf{A} , tiene las siguientes tres propiedades:

- Dado que las columnas de la matriz identidad tienen norma uno ($\|\mathbf{I}_{|j}\| = 1$), el volumen del hipercubo de dimensión n descrito por las columnas de \mathbf{I} es siempre uno:

$$\text{Volumen}(\mathbf{I}_{n \times n}) = 1.$$




Figura 14.1: $\text{Area}[\mathbf{I}_1; \mathbf{I}_2] = 1$ (izquierda) y $\text{Volumen}[\mathbf{I}_1; \mathbf{I}_2; \mathbf{I}_3] = 1$ (derecha).

- Al sumar a una de las aristas (a una de las columnas) un múltiplo de otra arista (columna), el volumen del paralelogramo resultante no cambia; pues se mantiene la misma base y la misma altura h . Por tanto, aplicar una transformación elemental de Tipo I no modifica el volumen:

$$\text{Vol}(\mathbf{A}) = \text{Vol}(\mathbf{A}_{[(\alpha)\mathbf{k}+\mathbf{j}]}) \text{ para } i \neq k.$$




Figura 14.2: $\text{Area}[\mathbf{a}; \mathbf{b}] = \text{Area}[\mathbf{a}; (\alpha\mathbf{a}+\mathbf{b})]$ (izquierda) y $\text{Vol}[\mathbf{a}; \mathbf{b}; \mathbf{c}] = \text{Vol}[\mathbf{a}; (\alpha\mathbf{a}+\mathbf{b}); \mathbf{c}]$ (derecha).

¹en dimensión 2 se denomina área

- Al multiplicar uno de los lados (uno de los vectores) por un escalar, el volumen (o área) queda multiplicado por el valor absoluto de dicho escalar (no hay áreas o volúmenes negativos).

$$|\alpha| \cdot \text{Vol}(\mathbf{A}) = |\alpha| \cdot \text{Vol}[\dots; \mathbf{A}_{|k}; \dots] = \text{Vol}[\dots; \alpha \mathbf{A}_{|k}; \dots]$$




Figura 14.3: $|\alpha| \cdot \text{Area}[\mathbf{a}; \mathbf{b}] = \text{Area}[\alpha \mathbf{a}; \mathbf{b}]$ (izquierda) y $|\alpha| \cdot \text{Vol}[\mathbf{a}; \mathbf{b}; \mathbf{c}] = \text{Vol}[\alpha \cdot \mathbf{a}; \mathbf{b}; \mathbf{c}]$ (derecha).

Por tanto, y como caso particular, aplicar la transformación elemental de Tipo II, $\tau_{[(\alpha)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}$, donde $\alpha \neq 0$, multiplica el volumen por $|\alpha|$.

14.1.2. Las tres primeras propiedades (P-1 to P-3)

Por analogía con la función volumen, definimos el determinante del siguiente modo

Definición 14.1. Denominamos función determinante a toda función que asigna a cada sistema de n vectores de \mathbb{R}^n (o a cada matriz cuadrada de orden n) un número real

$$\det : \mathbb{R}^{n \times n} \longrightarrow \mathbb{R}$$

y que verifica las siguientes tres propiedades:

P-1 P-1 Determinante de las matrices identidad:

$$\det \mathbf{I} = 1$$

P-2 P-2 Sumar una columna a otra no altera el determinante:

$$\det \mathbf{A} = \det \left(\mathbf{A} \tau_{[(\alpha)\mathbf{k}+\mathbf{j}]} \right) \quad \text{para } i \neq k.$$

P-3 P-3 Multiplicar una columna multiplica el determinante

$$\alpha \cdot \det \mathbf{A} = \det [\dots; \alpha \mathbf{A}_{|k}; \dots] \quad \text{para cualquier } k \in \{1 : n\} \text{ y } \alpha \in \mathbb{R}$$

Nótese que como caso particular, concluimos que aplicar una transformación elemental de Tipo II, $\tau_{[(\alpha)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}$, multiplica el determinante por $\alpha \neq 0$. Consecuentemente, los determinantes pueden tomar valores negativos.

Notación Emplearemos dos notaciones alternativas para el determinante de la matriz \mathbf{A} :

$$\text{determinante de } \mathbf{A} \equiv \det(\mathbf{A}) \equiv |\mathbf{A}|$$

de manera que, por ejemplo, las tres propiedades anteriores se pueden expresar para matrices de orden 3 como:

$$\mathbf{P-1:} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1; \quad \det [\mathbf{I}_{|1}; \mathbf{I}_{|2}; \mathbf{I}_{|3}] = 1.$$

$$\mathbf{P-2:} \quad \begin{vmatrix} a_1 & (b_1 + \alpha c_1) & c_1 \\ a_2 & (b_2 + \alpha c_2) & c_2 \\ a_3 & (b_3 + \alpha c_3) & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}; \quad \det [\mathbf{a}; (\mathbf{b} + \alpha \mathbf{c}); \mathbf{c}] = \det [\mathbf{a}; \mathbf{b}; \mathbf{c}]$$

$$\mathbf{P-3:} \quad \begin{vmatrix} a_1 & (\beta b_1) & c_1 \\ a_2 & (\beta b_2) & c_2 \\ a_3 & (\beta b_3) & c_3 \end{vmatrix} = \beta \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}; \quad \det [\mathbf{a}; \beta \mathbf{b}; \mathbf{c}] = \beta \det [\mathbf{a}; \mathbf{b}; \mathbf{c}].$$

La relación entre la función *Volumen* y la función *Determinante*

Nótese que la única diferencia con la función *Volumen* es que los determinantes pueden tomar valores negativos. De hecho, la relación entre la función *Volumen* y la función *Determinante* es tan estrecha que podemos definir la función *Volumen* del paralelogramo cuyas aristas son las columnas de la matriz cuadrada \mathbf{A} como el valor absoluto del *Determinante* de \mathbf{A} :

$$\text{Vol}(\mathbf{A}) = \text{Valor absoluto de } |\mathbf{A}|$$

Advertencia: Una barra vertical a cada lado de una matriz $|\mathbf{A}|$ denota el determinante de \mathbf{A} . Una barra vertical a cada lado de un número $|a|$ significa valor absoluto del número. Es decir, el significado de las barras verticales viene dado por el objeto encerrado entre ellas: si es un número es el *valor absoluto*, y si es una matriz es el *determinante*. Jugando con esto, podemos decir que

$$\text{Vol}(\mathbf{A}) = \text{Valor absoluto de } \det(\mathbf{A}) = |\det \mathbf{A}| = ||\mathbf{A}||.$$

👉 Las propiedades **P-1**, **P-2** y **P-3** definen la función determinante. Ahora queda deducir todo lo demás...

14.2. Resto de propiedades (P-4 a P-9)

14.2.1. Determinante de una matriz con una columna de ceros

EJERCICIO 51. Demuestre la siguiente propiedad:

P-4 **Determinante de una matriz con una columna nula.**

P-4

Si \mathbf{A} tiene una columna nula entonces:

$$\det(\mathbf{A}) = 0$$

Esta propiedad es análoga a considerar el volumen de un paralelogramo con una arista de longitud cero.

14.2.2. Determinantes de matrices elementales

Ya sabemos que

$$\det \left(\mathbf{A} \begin{smallmatrix} \tau \\ [(\alpha)\mathbf{k}+\mathbf{j}] \end{smallmatrix} \right) = |\mathbf{A}|; \quad \det \left(\mathbf{A} \begin{smallmatrix} \tau \\ [(\alpha)\mathbf{k}] \end{smallmatrix} \right) = \alpha |\mathbf{A}|; \quad (14.1)$$

así que en particular, y puesto que $\det(\mathbf{I}) = 1$:

$$\det \left(\mathbf{I} \begin{smallmatrix} \tau \\ [(\alpha)\mathbf{k}+\mathbf{j}] \end{smallmatrix} \right) = 1 \quad \text{y} \quad \det \left(\mathbf{I} \begin{smallmatrix} \tau \\ [(\alpha)\mathbf{j}] \end{smallmatrix} \right) = \alpha.$$

Ahora recordando que $\mathbf{A}_\tau = \mathbf{A}(\mathbf{I}_\tau)$, y analizando tanto la igualdad de la izquierda como la de la derecha de (14.1), concluimos que

$$|\mathbf{A}(\mathbf{I}_\tau)| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{I}_\tau| \quad (14.2)$$

donde \mathbf{I}_τ es una matriz elemental (nos da igual de qué tipo sea).

14.2.3. Sucesión de transformaciones elementales por columnas

Veamos más resultados relacionados con las matrices elementales.

EJERCICIO 52. Demuestre las siguientes proposiciones.

- (a) $\det(\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{I}_{\tau_1}| \cdots |\mathbf{I}_{\tau_k}|$.
- (b) Si \mathbf{B} es de rango completo, es decir, si $\mathbf{B} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$, entonces $|\mathbf{B}| = |\mathbf{I}_{\tau_1}| \cdots |\mathbf{I}_{\tau_k}|$, y por tanto $|\mathbf{B}| \neq 0$.
- (c) Si \mathbf{A} y \mathbf{B} son de orden n , y \mathbf{B} es de rango completo entonces

$$\det(\mathbf{AB}) = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}| \quad (14.3)$$

Ejemplo 19. Una sucesión $\tau_1 \cdots \tau_k$ de transformaciones *Tipo I* de la matriz \mathbf{A} no altera el determinante.

$$|\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}| = |\mathbf{A} \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}| = |\mathbf{A}| \cdot 1 = |\mathbf{A}|$$

Ejemplo 20. Pero una sucesión de transformaciones *Tipo II* si puede modificar el valor del determinante:

$$\begin{vmatrix} 2a & 3c \\ 2b & 3d \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$$

14.2.4. Propiedad antisimétrica. Determinante de una matriz singular, de la inversa y del producto de matrices

Permutación (o intercambio) de columnas. Propiedad antisimétrica

P-5 **P-5** **[Propiedad antisimétrica]** Intercambiar dos columnas cambia el signo del determinante.

Demostración. Un intercambio de columnas es una sucesión de transformaciones elementales *Tipo I* y una única de *Tipo II* que multiplica por -1 una columna (EJERCICIO 28 en la página 49). \square

Así

$$\begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Matrices singulares. Matrices inversas

Vamos a demostrar conjuntamente dos propiedades más de la función determinante:

P-6 Si \mathbf{A} es singular entonces $|\mathbf{A}| = 0$. **P-6**

P-7 $\det(\mathbf{A}^{-1}) = (\det \mathbf{A})^{-1}$. **P-7**

Demostración. Sea \mathbf{A} y sea $\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ tal que $\mathbf{A}(\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = \mathbf{R}$ es una forma escalonada reducida. Entonces $|\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}| = |\mathbf{R}|$ y solo hay dos casos posibles:

$$\begin{cases} \mathbf{A} \text{ singular } (\mathbf{R}_{|n} = \mathbf{0}) : & |\mathbf{R}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}| = 0 \Rightarrow |\mathbf{A}| = 0 \\ \mathbf{A} \text{ invertible } (\mathbf{R} = \mathbf{I}) : & |\mathbf{R}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}| = 1 \Rightarrow |\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}| = |\mathbf{A}^{-1}| = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \end{cases}$$

□

Así pues, podemos calcular el determinante de la matriz inversa mediante la eliminación gaussiana.

- Cuando la matriz es singular (rango $< n$) el determinante es cero;
- Cuando la matriz es de rango completo, basta con mirar qué transformaciones elementales *Tipo II* han ido cambiando el valor del determinante de \mathbf{A} hasta llegar a la matriz \mathbf{I} (las de *Tipo I* no importan!...)

Ejemplo 21. Sea $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, entonces

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{[(-2)\mathbf{1}+2] \\ (Tipo I)}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -2 \\ 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{[(-1/2)\mathbf{2}] \\ (Tipo II)}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & -1/2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{[(-2)\mathbf{2}+1] \\ (Tipo I)}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Por tanto, $|\mathbf{A}^{-1}| = \left| \mathbf{l}_{\substack{\tau \\ [(-2)\mathbf{1}+2]}} \right| \cdot \left| \mathbf{l}_{\substack{\tau \\ [(-1/2)\mathbf{2}]}} \right| \cdot \left| \mathbf{l}_{\substack{\tau \\ [(-2)\mathbf{2}+1]}} \right| = 1 \cdot \frac{-1}{2} \cdot 1 = \frac{-1}{2}$; es decir $|\mathbf{A}| = -2$.

Determinante del producto.

Puesto que para cualquier \mathbf{B} de orden n , existe una sucesión de transformaciones elementales tal que $\mathbf{B}(\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = \mathbf{L}$ es una forma escalonada de \mathbf{B} , si \mathbf{B} es singular entonces $\mathbf{L}_{|n} = \mathbf{0}$. Aplicando las mismas transformaciones elementales a las columnas de \mathbf{AB} tenemos

$$(\mathbf{AB}(\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}))_{|n} = (\mathbf{AL})_{|n} = \mathbf{0};$$

y como $(\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k})_{|n} \neq \mathbf{0}$, necesariamente (\mathbf{AB}) es singular (véase Corolario 8.1.2 en la página 98).

Este resultado nos permite enunciar una nueva propiedad de la función determinante.

P-8 [Determinante del producto de matrices] **P-8**

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}). \quad (14.4)$$

$$\text{Demostración.} \quad \begin{cases} \text{Si } \mathbf{B} \text{ es singular, también lo es } \mathbf{AB} \Rightarrow \det(\mathbf{AB}) = 0 = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) \\ \text{Si } \mathbf{B} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k} \Rightarrow \det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) \quad (\text{Ecuación (14.3)}) \end{cases} \quad \square$$

14.2.5. Determinante de la matriz transpuesta.

EJERCICIO 53.

- (a) ¿Qué relación hay entre el determinante de \mathbf{I}_{τ} y el determinante de su transpuesta ${}_{\tau}\mathbf{I}$?
 (b) Sea \mathbf{B} de rango completo, demuestre que $|\mathbf{B}| = |\mathbf{B}^T|$.

P-9 P-9 Determinante de la transpuesta

$$|\mathbf{A}| = |\mathbf{A}^T|.$$

Demostración. Por una parte, si \mathbf{A} es singular, \mathbf{A}^T también es singular (véase Proposición 9.5.10 en la página 110); y por tanto ambas matrices tienen determinante nulo. Y por otra, si \mathbf{A} es de rango completo, acabamos de ver en el ejercicio anterior que su determinante es igual al de su transpuesta. \square

```
A = Matrix([ [1,-1,0], [1,1,1], [2,0,3] ])
A.determinante()
( Matrix(A) & T({ 1,3}) ).determinante()
(~Matrix(A) & T((10,2)) ).determinante()
```

Librería NAcAL para Python

Cofactores y fórmulas para el cálculo del determinante

Si la matriz elemental \mathbf{I}_τ es de orden n , sabemos que necesariamente la transformación τ actúa únicamente sobre las n primeras columnas; es decir, tanto si τ es de *Tipo I*: $\tau_{[(\alpha)\mathbf{p}+\mathbf{s}]}$ como si es de *Tipo II*: $\tau_{[(\alpha)\mathbf{p}]}$, los índices \mathbf{p}, \mathbf{s} son necesariamente menores o iguales a n .

Por tanto, para la siguiente matriz por bloques de orden $n+1$, e idéntica transformación τ se verifica que

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B}_\tau & \\ & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \\ & 1 \end{bmatrix}_\tau. \quad (15.1)$$

Y si $\mathbf{B} = \mathbf{I}$ es la matriz identidad, y puesto que $\begin{bmatrix} \mathbf{I} & \\ & 1 \end{bmatrix}_\tau$ y \mathbf{I}_τ son matrices elementales del mismo tipo, *ambas tienen idéntico determinante*. Repitiendo k veces el paso dado en (15.1) tenemos que

$$\left| \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k} & \\ & 1 \end{bmatrix} \right| = \det \left(\begin{bmatrix} \mathbf{I} & \\ & 1 \end{bmatrix}_{\tau_1 \dots \tau_k} \right) = \det \left(\begin{bmatrix} \mathbf{I} & \\ & 1 \end{bmatrix}_{\tau_1} \cdots \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \\ & 1 \end{bmatrix}_{\tau_k} \right) = |\mathbf{I}_{\tau_1}| \cdots |\mathbf{I}_{\tau_k}| = |\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}|. \quad (15.2)$$

Vamos a emplear este resultado para relacionar el determinante de dos matrices que tienen distinto orden:

Proposición 15.0.1. Si \mathbf{A} tiene la forma $\mathbf{A} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{B}_{n \times n} & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{smallmatrix} \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 \end{array} \right]$, entonces $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{B})$.

Demostración. Solo caben dos posibilidades. Si \mathbf{B} es de rango completo, es decir, si $\mathbf{B} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$, por (15.2) ya sabemos que

$$|\mathbf{A}| = \left| \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \\ & 1 \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k} & \\ & 1 \end{bmatrix} \right| = |\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}| = |\mathbf{B}|.$$

Y si \mathbf{B} es singular, es decir si las columnas de \mathbf{B} son linealmente dependientes, también lo son las de \mathbf{A} , por tanto

$$|\mathbf{A}| = 0 = |\mathbf{B}|.$$

□

15.1. Determinante matrices triangulares

EJERCICIO 54.

- (a) ¿Cómo es el determinante de una matriz triangular inferior \mathbf{L} de rango completo?
- (b) ¿Cuál es el determinante de una matriz cuadrada y triangular con algún elemento nulo en su diagonal?
- (c) ¿Cómo es el determinante de una matriz triangular superior \mathbf{U} ?

15.2. Cálculo del determinante por eliminación Gaussiana

Por tanto, el determinante de cualquier matriz cuadrada y triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Este descubrimiento nos permite calcular el determinante con menos operaciones, pues basta con encontrar una forma escalonada de la matriz extendida, compensando en su última columna las transformaciones elementales Tipo II aplicadas sobre las n primeras columnas.

Ejemplo 22. Considere de nuevo la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ entonces

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{[(-5)1+2]} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -7 & 1 \end{array} \right]$$

Multiplicando los elementos de la diagonal obtenemos el valor del determinante de \mathbf{A} . En este caso $\det \mathbf{A} = -7$.

Ejemplo 23. Para la matriz $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 9 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ tenemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 1 & 1 \\ 9 & 6 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} \tau \\ [(2)3] \\ [(-1)2+3] \\ [(\frac{1}{2})4] \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & \frac{1}{2} \\ 9 & 6 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} \tau \\ [(3)2] \\ [(-2)1+2] \\ [(\frac{1}{3})4] \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 6 & 0 & \frac{1}{6} \\ 9 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} \tau \\ [1 \leftrightarrow 2] \\ [(-1)4] \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 0 & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 9 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Y por tanto $\det \mathbf{A} = (6)(9)(1)(-\frac{1}{6}) = -9$.

15.3. Determinante de matrices diagonales por bloques

Puesto que para cualquier matriz cuadrada \mathbf{B} se verifica que $\begin{vmatrix} \mathbf{B} & \\ & \mathbf{I} \end{vmatrix}_1 = |\mathbf{B}|$; si \mathbf{A} es de orden m y \mathbf{I} de orden n , entonces, aplicando la anterior igualdad repetidamente n veces, deducimos que

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{vmatrix}_{\begin{smallmatrix} n \times m \\ m \times n \end{smallmatrix}} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{vmatrix}_{\begin{smallmatrix} (n-1) \times m \\ m \times (n-1) \end{smallmatrix}} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{vmatrix}_{\begin{smallmatrix} (n-2) \times m \\ m \times (n-2) \end{smallmatrix}} = \dots = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}|.$$

Pero todo lo realizado en las anteriores secciones se podía haber desarrollado de manera similar si en lugar de extender la matriz \mathbf{B} con la última fila y columna de la matriz identidad $n+1$, se hubiera hecho anteponiendo la primera fila y columna de la matriz identidad $n+1$. Así, para cualquier matriz cuadrada \mathbf{B} también se verifica que

$$\begin{vmatrix} 1 & \\ & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{B}|; \quad \text{por lo que también se deduce que} \quad \begin{vmatrix} \mathbf{I} & \\ & \mathbf{A} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}|.$$

Producto de matrices particionadas por bloques. En la Sección 3.B.2 se mostró cómo calcular el producto de matrices particionadas por bloques siguiendo la fórmula de la Ecuación 3.2 en la página 36.

EJERCICIO 55. Demuestre las siguientes propiedades:

- (a) Sean \mathbf{A} de orden m y \mathbf{B} de orden n , entonces $\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{vmatrix}_{\begin{smallmatrix} m \times n \\ n \times m \end{smallmatrix}} = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$.
- (b) Sean \mathbf{A} de orden m , \mathbf{B} de orden n y \mathbf{C} de orden n por m , entonces

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C} & \mathbf{B} \end{vmatrix}_{\begin{smallmatrix} m \times n \\ n \times m \end{smallmatrix}} = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|.$$

15.4. Fórmulas sencillas para matrices de orden menor que 4

Para matrices de orden 1, 2 o 3, hay formulas sencillas. ¡Ojo, para matrices de orden 4 o más NO HAY REGLAS SENCILLAS! No extrapole que lo que funciona para una matriz 3 por 3 se puede hacer de manera similar para una matriz de orden 4 por 4.

Para matrices de orden 1: Para $\mathbf{A} = [a]$ tenemos

$$\left[\begin{array}{c|c} a & \\ \hline & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \boxed{\det \mathbf{A} = |a| = a.}$$

Para matrices de orden 2. Deduzcamos la formula general para una matriz de la forma $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

■ Caso $a \neq 0$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} a & b & \\ c & d & \\ \hline & & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{smallmatrix} \tau \\ [(-\frac{1}{a})\mathbf{3}] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} [(a)\mathbf{2}] \\ [(-b)1+2] \end{smallmatrix}} \left[\begin{array}{cc|c} a & 0 & 0 \\ c & ad-cb & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a} \end{array} \right] \Rightarrow \det \mathbf{A} = ad - bc.$$

■ Caso $a = 0$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} a & b & \\ c & d & \\ \hline & & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{smallmatrix} \tau \\ [(-1)\mathbf{3}] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} [1\leftrightarrow 2] \end{smallmatrix}} \left[\begin{array}{cc|c} b & a & \\ d & c & \\ \hline & & -1 \end{array} \right] \text{ (que es como el caso anterior)} \Rightarrow \det \mathbf{A} = (bc-ad)(-1) = ad-bc.$$

Otra vez la misma regla. Por tanto, siempre

$$\boxed{\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.}$$

Para matrices de orden 3. Deduzcamos la formula general para una matriz de la forma $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$.

■ Caso $a \neq 0$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & b & c & \\ d & e & f & \\ g & h & i & \\ \hline & & & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{smallmatrix} \tau \\ [(-\frac{1}{a})\mathbf{4}] \\ [(-\frac{1}{a})\mathbf{4}] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} [(a)\mathbf{2}] \\ [(a)\mathbf{3}] \\ [(-b)1+2] \\ [(-c)1+3] \end{smallmatrix}} \left[\begin{array}{ccc|c} a & 0 & 0 & \\ d & ae-bd & af-cd & \\ g & ah-bg & ai-cg & \\ \hline & & & \frac{1}{a^2} \end{array} \right]$$

donde ahora tenemos una matriz diagonal por bloques y por tanto

$$\begin{aligned} \det \mathbf{A} &= |a| \cdot \begin{vmatrix} ae-bd & af-cd \\ ah-bg & ai-cg \end{vmatrix} \cdot \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a} \left((ae-bd)(ai-cg) - (af-cd)(ah-bg) \right) \\ &= \frac{1}{a} \left(a^2ei - aecg - bdai + bdcg - (a^2fh - afbg - cdah + cdbg) \right) \\ &= (aei - ecg - bdi + \frac{bdcg}{a}) - (afh - fbg - cdh + \frac{cdbg}{a}) \\ &= aei + fbg + cdh - ecg - bdi - afh + \frac{bdcg}{a} - \frac{cdbg}{a} \\ &= aei + fbg + cdh - ecg - bdi - afh. \end{aligned}$$

No hay expresiones sencillas para calcular determinantes de orden mayor que 3

Pero afortunadamente hay otra forma de calcular determinantes de matrices de orden n empleando fórmulas para calcular el determinante de orden $n - 1$. Esta descripción recursiva de la función determinante se llama expansión de Laplace. No obstante, con cualquier procedimiento el cálculo del determinante de una matriz genérica de orden elevado es computacionalmente intenso.

Para deducir la citada Expansión de Laplace, antes necesitamos enunciar una última propiedad de la función determinante, y definir los *menores* y los *cofactores*.

15.6. Expansión de Laplace (desarrollo por cofactores).

15.6.1. Propiedad multilineal

P-10 Propiedad multilineal

P-10

$$\det \left[\dots; (\beta \mathbf{b} + \psi \mathbf{c}); \dots \right] = \beta \det \left[\dots; \mathbf{b}; \dots \right] + \psi \det \left[\dots; \mathbf{c}; \dots \right]$$

Demostración. Puesto que se verifica la propiedad del producto **P-3**, nos basta con demostrar que $\det \left[\dots; \mathbf{b} + \mathbf{c}; \dots \right] = \det \left[\dots; \mathbf{b}; \dots \right] + \det \left[\dots; \mathbf{c}; \dots \right]$. Haremos la demostración para la primera columna. La demostración para el resto de columnas es similar.

Consideremos dos casos. Si $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_{n-1}$ son linealmente dependientes, entonces la demostración es inmediata:

$$\det \left[\mathbf{a} + \mathbf{b}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] = 0 = 0 + 0 = \det \left[\mathbf{a}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] + \det \left[\mathbf{b}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right].$$

En caso contrario, existe \mathbf{x} tal que $\left[\mathbf{x}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right]$ es una base de \mathbb{R}^n . Así,

$$\det \left[\alpha \mathbf{x} + \psi_1 \mathbf{y}_1 + \dots + \psi_{n-1} \mathbf{y}_{n-1}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] \stackrel{*}{=} \det \left[\alpha \mathbf{x}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] \quad (15.3)$$

$$= \alpha \det \left[\mathbf{x}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] \quad (15.4)$$

(*) ya que con una secuencia de transformaciones elementales se puede “simplificar” la primera columna. Ahora, si

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \alpha \mathbf{x} + \psi_1 \mathbf{y}_1 + \dots + \psi_{n-1} \mathbf{y}_{n-1} \\ \mathbf{b} &= \beta \mathbf{x} + \gamma_1 \mathbf{y}_1 + \dots + \gamma_{n-1} \mathbf{y}_{n-1} \end{aligned}$$

tendremos que

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (\alpha + \beta) \mathbf{x} + (\psi_1 + \gamma_1) \mathbf{y}_1 + \dots + (\psi_{n-1} + \gamma_{n-1}) \mathbf{y}_{n-1}$$

y consecuentemente

$$\begin{aligned} \det \left[\mathbf{a} + \mathbf{b}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] &= (\alpha + \beta) \det \left[\mathbf{x}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] && \text{por (15.4)} \\ &= \alpha \det \left[\mathbf{x}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] + \beta \det \left[\mathbf{x}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] && \text{pues } \det \mathbf{A} \text{ es un número} \\ &= \det \left[\alpha \mathbf{x}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] + \det \left[\beta \mathbf{x}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] && \text{por P-3} \\ &= \det \left[\mathbf{a}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] + \det \left[\mathbf{b}; \mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_{n-1} \right] && \text{por (15.3)} \end{aligned}$$

□

Ejemplo 24. Para \mathbb{R}^2

$$\begin{vmatrix} a + \alpha & c \\ b + \beta & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \alpha & c \\ \beta & d \end{vmatrix};$$

es decir

$$\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & c \\ 0 & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & c \\ b & d \end{vmatrix}.$$

15.6.2. Menores y cofactores



En esta sección veremos como calcular los determinantes mediante formulas más sencillas. Fórmulas que expresan determinantes de matrices de orden n como sumas de determinantes de matrices de un orden más pequeño ($n - 1$).

Proposición 15.6.1. Si \mathbf{A} es de la forma $\begin{bmatrix} \mathbf{B} & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{smallmatrix} \\ a_{11} & \cdots & a_{1n-1} & 1 \end{bmatrix}$ entonces $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{B})$.

Demostración. Mediante operaciones elementales por columnas de Tipo I, podemos reducir \mathbf{A} a

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{smallmatrix} \\ a_{11} & \cdots & a_{1n-1} & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{transformaciones Tipo I}} \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{smallmatrix} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \\ & 1 \end{bmatrix}$$

Donde solo hemos empleado transformaciones de Tipo I, así, por la Proposición 15.0.1 sabemos que

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \mathbf{B} & \\ & 1 \end{vmatrix} = |\mathbf{B}|. \quad (15.5)$$

□

Nueva notación y definición de menores y cofactores

Sea $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_n)$ de \mathbb{R}^n , si quitamos la j -ésima componente, q_j , denotamos al nuevo vector de $\mathbb{R}^{(n-1)}$ como

$$\mathbf{q}^j = (q_1, \dots, q_{j-1}, q_{j+1}, \dots, q_n) \in \mathbb{R}^{n-1}.$$

Análogamente, si \mathbf{A} es de orden m por n , denotamos a la submatriz que resulta de quitar la i -ésima fila con ${}^i\mathbf{A}$, y a la submatriz que resulta de quitar la j -ésima columna con \mathbf{A}^j . Así, ${}^i\mathbf{A}^j$, es la submatriz de orden $m - 1$ por $n - 1$ que resulta de quitar la fila i -ésima y la columna j -ésima.

Definición 15.1 (menores y cofactores). Denotamos a la submatriz resultante de eliminar la fila i y la columna j con

$${}^i\mathbf{A}^j;$$

su determinante $\det({}^i\mathbf{A}^j)$, se denomina menor de a_{ij} .

Los menores con los signos alternados en función de si $(i + j)$ es par (en cuyo caso el signo no cambia) o impar (en cuyo caso se invierte el signo) se denominan cofactores.

Así pues,

$$\text{cof}_{ij}(\mathbf{A}) = (-1)^{i+j} \det({}^i\mathbf{A}^j)$$

es el cofactor de a_{ij} .

Ejemplo 25. Para $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, tenemos

$${}^1\mathbf{A}^{\bar{2}} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}, \quad {}^3\mathbf{A}^{\bar{3}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

así

$$\text{cof}_{12}(\mathbf{A}) = (-1)^{1+2} \det({}^1\mathbf{A}^{\bar{2}}) = (-1) \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}.$$

y

$$\text{cof}_{33}(\mathbf{A}) = (-1)^{3+3} \det({}^3\mathbf{A}^{\bar{3}}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}.$$

15.6.3. Desarrollo del determinante por cofactores (Expansión de Laplace).

Teorema 15.6.2 ([Expansión de Laplace]). Para cualquier matriz de orden n , $\det(\mathbf{A})$ se puede expresar como suma de los productos de los elementos de cualquier columna (fila) de \mathbf{A} por sus correspondientes cofactores:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \text{cof}_{ij}(\mathbf{A}), \quad \text{expansión por la columna } j\text{ésima}$$

o bien

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \text{cof}_{ij}(\mathbf{A}), \quad \text{expansión por la fila } i\text{ésima}$$

Demostración. Probaremos la expansión por la columna j ésima. La expansión por filas es similar. Primero movemos la columna j ésima a la última posición con una secuencia de intercambios:

$$(\mathbf{A})_{[j=(j+1)]', [(j+1)=(j+2)]', \dots, [(n-1)=n]}^{\boldsymbol{\tau}} = [\mathbf{A}_{|1}, \dots, \mathbf{A}_{|j-1}, \mathbf{A}_{|j+1}, \dots, \mathbf{A}_{|n} | \mathbf{A}_{|j}]; = \left[\mathbf{A}^{\bar{j}} \mid \mathbf{A}_{|j} \right].$$

Puesto que hay $n - j$ permutaciones en la sucesión, tenemos que

$$\det \mathbf{A} = \det [\mathbf{A}_{|1}, \dots, \mathbf{A}_{|n}] = (-1)^{n-j} \cdot \det \left[\mathbf{A}^{\bar{j}} \mid \mathbf{A}_{|j} \right].$$

Escribiendo $\mathbf{A}_{|j}$ como $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ a_{2j} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ a_{nj} \end{pmatrix}$, y empleando la propiedad multilineal

(P-12):

$$\det \mathbf{A} = (-1)^{n-j} \left(\det \left[\mathbf{A}^{\bar{j}} \mid \begin{pmatrix} a_{1j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right] + \det \left[\mathbf{A}^{\bar{j}} \mid \begin{pmatrix} 0 \\ a_{2j} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right] + \dots + \det \left[\mathbf{A}^{\bar{j}} \mid \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ a_{nj} \end{pmatrix} \right] \right).$$

Si “hundimos” la primera fila de la primera matriz hasta la última posición mediante una sucesión de $(n-1)$ intercambios: $\begin{matrix} \boldsymbol{\tau} \\ [1 \rightleftharpoons 2] \end{matrix}, \begin{matrix} \boldsymbol{\tau} \\ [2 \rightleftharpoons 3] \end{matrix}, \dots, \begin{matrix} \boldsymbol{\tau} \\ [(n-1) \rightleftharpoons n] \end{matrix}$; y la segunda fila de la segunda matriz mediante $(n-2)$

intercambios: $\tau_{[2 \rightleftharpoons 3]}$, $\tau_{[3 \rightleftharpoons 4]}$, \dots , $\tau_{[(n-1) \rightleftharpoons n]}$; —y en general, “hundimos” la fila i ésima de la matriz i ésima con los $(n-i)$ intercambios:

$$\tau_{[i \rightleftharpoons (i+1)]}, \tau_{[(i+1) \rightleftharpoons (i+2)]}, \dots, \tau_{[(n-1) \rightleftharpoons n]}$$

obtenemos:

$$\det \mathbf{A} = (-1)^{n-j} \left((-1)^{n-1} \cdot \det \left[\begin{array}{c|c} {}^1\mathbf{A}^{\vec{r}_j} & \mathbf{0} \\ \hline {}_1\mathbf{A}^{\vec{r}_j} & a_{1j} \end{array} \right] + (-1)^{n-2} \cdot \det \left[\begin{array}{c|c} {}^2\mathbf{A}^{\vec{r}_j} & \mathbf{0} \\ \hline {}_2\mathbf{A}^{\vec{r}_j} & a_{2j} \end{array} \right] + \dots \right. \\ \left. \dots + (-1) \cdot \det \left[\begin{array}{c|c} {}^{(n-1)}\mathbf{A}^{\vec{r}_j} & \mathbf{0} \\ \hline {}_{(n-1)}\mathbf{A}^{\vec{r}_j} & a_{(n-1)j} \end{array} \right] + \det \left[\begin{array}{c|c} {}^n\mathbf{A}^{\vec{r}_j} & \mathbf{0} \\ \hline {}_n\mathbf{A}^{\vec{r}_j} & a_{nj} \end{array} \right] \right),$$

donde ${}_i\mathbf{A}^{\vec{r}_j}$ es la fila i ésima de la submatriz $\mathbf{A}^{\vec{r}_j}$. Así, por la Proposición 15.6.1

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^{n-j} \sum_{i=1}^n a_{ij} (-1)^{n-i} \det({}^i\mathbf{A}^{\vec{r}_j});$$

y puesto que $(-1)^{n-j} \cdot (-1)^{n-i} = (-1)^{2n-(i+j)} = (-1)^{-(i+j)} = (-1)^{i+j}$, sustituyendo llegamos a

$$\boxed{\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \operatorname{cof}_{ij}(\mathbf{A})}.$$

□

EJERCICIO 56. Calcule el siguiente determinante:

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

EJERCICIO 57. Calcule el determinante de la matriz genérica de orden 3, desarrollado por los cofactores de la segunda columna.

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

15.7. Aplicación de los determinantes

15.7.1. Regla de Cramer para la resolución de un sistema de ecuaciones

Suponga el sistema de ecuaciones $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde $|\mathbf{A}| \neq 0$. Sabemos que dicho sistema siempre tiene solución única, sea cual sea el vector \mathbf{b} . Dicha solución es

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b};$$

que verifica:

$$\mathbf{b} = (\mathbf{A}_{|1})x_1 + \cdots + (\mathbf{A}_{|j})x_j + \cdots + (\mathbf{A}_{|n})x_n, \quad (15.6)$$

donde los coeficiente x_i son los componentes¹ del vector solución \mathbf{x} .

Calculemos el determinante de una nueva matriz, idéntica a \mathbf{A} excepto por que su j ésima columna $\mathbf{A}_{|j}$ ha sido sustituida por el vector \mathbf{b} :

$$\det[\mathbf{A}_{|1}; \mathbf{A}_{|2}; \dots \overbrace{\mathbf{b}}^{\text{pos. } j}; \dots \mathbf{A}_{|n}].$$

Si nos fijamos en la Ecuación (15.6) es fácil constatar que para pasar de \mathbf{A} a la nueva matriz, hemos multiplicado $\mathbf{A}_{|j}$ por x_j y le hemos sumado una combinación lineal del resto de columnas; por tanto:

$$\det[\mathbf{A}_{|1}; \dots \overbrace{\mathbf{b}}^{\text{pos. } j}; \dots \mathbf{A}_{|n}] = x_j \cdot \det(\mathbf{A}).$$

Despejando x_j encontramos la regla de Cramer para la resolución de sistemas de ecuaciones determinados: *cada componente x_j de la solución \mathbf{x} del sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ se puede calcular del siguiente modo*

$$x_j = \frac{\det[\mathbf{A}_{|1}; \dots \overbrace{\mathbf{b}}^{\text{pos. } j}; \dots \mathbf{A}_{|n}]}{\det(\mathbf{A})}.$$

15.7.2. Cálculo de la inversa de una matriz

Definición 15.2. Para \mathbf{A} la matriz $\text{Adj}(\mathbf{A})$ (la matriz adjunta de \mathbf{A}) se define como la transpuesta de la matriz resultante de sustituir cada elemento a_{ij} de \mathbf{A} por su correspondiente cofactor $\text{cof}_{ij}(\mathbf{A})$. Es decir,

$$\text{Adj}(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} \text{cof}_{11}(\mathbf{A}) & \text{cof}_{12}(\mathbf{A}) & \cdots & \text{cof}_{1n}(\mathbf{A}) \\ \text{cof}_{21}(\mathbf{A}) & \text{cof}_{22}(\mathbf{A}) & \cdots & \text{cof}_{2n}(\mathbf{A}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{cof}_{n1}(\mathbf{A}) & \text{cof}_{n2}(\mathbf{A}) & \cdots & \text{cof}_{nn}(\mathbf{A}) \end{bmatrix}^T$$

¿Qué obtenemos si multiplicamos la matriz adjunta de \mathbf{A} por la matriz \mathbf{A} ?

$$[\text{Adj}(\mathbf{A})] \cdot \mathbf{A} =$$

$$\begin{bmatrix} \text{cof}_{11}(\mathbf{A}) & \text{cof}_{21}(\mathbf{A}) & \cdots & \text{cof}_{n1}(\mathbf{A}) \\ \text{cof}_{12}(\mathbf{A}) & \text{cof}_{22}(\mathbf{A}) & \cdots & \text{cof}_{n2}(\mathbf{A}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{cof}_{1n}(\mathbf{A}) & \text{cof}_{2n}(\mathbf{A}) & \cdots & \text{cof}_{nn}(\mathbf{A}) \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} |\mathbf{A}| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |\mathbf{A}| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |\mathbf{A}| \end{bmatrix} = |\mathbf{A}| \cdot \mathbf{I}$$

¹las coordenadas de \mathbf{b} en la base formada por las columnas de \mathbf{A}

$$\left(\frac{1}{|\mathbf{A}|} \cdot \mathbf{Adj}(\mathbf{A}) \right) \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}$$

El primer elemento de la diagonal de la matriz resultante es el desarrollo de $|\mathbf{A}|$ por la primera columna de \mathbf{A} . El segundo elemento de la diagonal es el desarrollo de $|\mathbf{A}|$ por la segunda columna, etc. Y en general el componente j ésimo de la diagonal es la expansión por la columna j ésima:

$$a_{1j} \text{cof}_{1j}(\mathbf{A}) + a_{2j} \text{cof}_{2j}(\mathbf{A}) + a_{3j} \text{cof}_{3j}(\mathbf{A}) + \cdots + a_{nj} \text{cof}_{nj}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \text{cof}_{ij}(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A})$$

Así pues, la diagonal de la matriz resultante está compuesta por el valor del determinante de \mathbf{A} .

Los elementos fuera de la diagonal son determinantes de matrices con dos columnas iguales. Por ejemplo, el segundo elemento de la primera fila de $[\mathbf{Adj}(\mathbf{A})] \cdot \mathbf{A}$ es el desarrollo por la primera columna de

$$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{12} \text{cof}_{11}(\mathbf{A}) + a_{22} \text{cof}_{21}(\mathbf{A}) + a_{32} \text{cof}_{31}(\mathbf{A}) + \cdots + a_{n2} \text{cof}_{n1}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{i2} \text{cof}_{i1}(\mathbf{A}) = 0,$$

donde la columna 2 aparece repetida en la primera posición, y por lo tanto el determinante es igual a cero.

Y el elemento k ésimo ($k \neq 1$) de la primera fila es

$$\begin{vmatrix} a_{1k} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{2k} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{3k} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nk} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{1k} \text{cof}_{11}(\mathbf{A}) + a_{2k} \text{cof}_{21}(\mathbf{A}) + a_{3k} \text{cof}_{31}(\mathbf{A}) + \cdots + a_{nk} \text{cof}_{n1}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ik} \text{cof}_{i1}(\mathbf{A}) = 0,$$

donde la columna k ésima aparece repetida en primera posición, y por lo tanto el determinante es igual a cero.

Se deduce entonces que $[\mathbf{Adj}(\mathbf{A})] \cdot \mathbf{A} = |\mathbf{A}| \cdot \mathbf{I}$; y despejando \mathbf{I} tenemos que:

$$\left[\frac{\mathbf{Adj}(\mathbf{A})}{|\mathbf{A}|} \right] \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I};$$

donde la primera matriz es necesariamente la matriz inversa de \mathbf{A} .

Parte VI

Autovalores y autovectores. Diagonalización y formas cuadráticas

En este Capítulo VI todas las matrices son cuadradas.

Autovalores y autovectores

Considere la siguiente ecuación donde \mathbf{A} es cuadrada y de orden n :

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \quad (16.1)$$

Definición 16.1 (Autovalor, autovector y espectro). Un **autovalor** de una matriz cuadrada \mathbf{A} es cualquier número λ tal que (16.1) tiene soluciones no nulas $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. En tal caso, a los vectores \mathbf{x} se les llama **autovectores** de \mathbf{A} correspondientes al autovalor λ . Al conjunto de autovalores de \mathbf{A} se le denomina **espectro** de \mathbf{A} .

Por ejemplo, es fácil ver que

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ y } \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ son autovectores de } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

correspondientes a los autovalores de \mathbf{A} , $\lambda_1 = 6$ y $\lambda_2 = 1$ respectivamente (basta multiplicar $\mathbf{A}\mathbf{x}_i$ para comprobarlo).

EJERCICIO 58. Demuestre la siguiente proposición:

Proposición 16.0.1. Una combinación lineal de autovectores correspondientes al autovalor λ es otro autovector correspondiente al mismo autovalor λ .

El anterior resultado justifica la siguiente definición:

Definición 16.2 (Autoespacio). Sea \mathbf{A} de orden n . Se denomina **autoespacio** correspondiente al autovalor λ de \mathbf{A} al subespacio formado por los autovectores correspondientes al autovalor λ de \mathbf{A} junto con el vector nulo.

$$\mathcal{E}_\lambda(\mathbf{A}) = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \right\}.$$

16.0.1. Cálculo de los autovalores y los autovectores

¿Cómo podemos encontrar los autovalores de una matriz? ¿Y qué podemos decir acerca de la existencia de autovalores de una matriz en general? Para responder, escribamos la Ecuación (16.1) de manera diferente

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{x} &= \lambda\mathbf{x} \\ \mathbf{A}\mathbf{x} &= \lambda\mathbf{I}\mathbf{x} \\ \mathbf{A}\mathbf{x} - \lambda\mathbf{I}\mathbf{x} &= \mathbf{0} \\ (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} &= \mathbf{0}, \end{aligned} \quad (16.2)$$

es decir, el autoespacio correspondiente a λ es el espacio nulo de $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$:

$$\mathcal{E}_\lambda(\mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}).$$

Como $\mathcal{E}_\lambda(\mathbf{A})$ contiene vectores no nulos (los autovectores), $\mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ también los contiene, es decir, la matriz cuadrada $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ es singular, y por tanto:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0. \quad (16.3)$$

Así pues, el problema reside en encontrar los valores de λ para los que $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ es singular (y por tanto $|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| = 0$). Como veremos a continuación, al desarrollar el determinante se comprueba que existen $n + 1$ coeficientes p_0, \dots, p_n de \mathbb{R} , tales que para todo λ

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = p_0 + p_1\lambda + \dots + p_{n-1}\lambda^{n-1} + p_n\lambda^n.$$

$|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}|$ es un polinomio en λ que denominamos *polinomio característico* de \mathbf{A} y que denotamos con $P_{\mathbf{A}}(\lambda)$.

En el ejemplo de más arriba:

$$P_{\mathbf{A}}(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 4 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 6 - 7\lambda + \lambda^2 = 0.$$

Vamos a demostrar que efectivamente para cualquier matriz \mathbf{A} cuadrada, $P_{\mathbf{A}}(\lambda)$ siempre es un polinomio.

Demostración. Vamos a demostrarlo por inducción sobre el orden n .

El resultado es evidente para cualquier matriz de orden uno, pues: $\det(a_{11} - \lambda) = a_{11} - \lambda$. Supuesto que es cierto para cualquier matriz de orden $(n - 1)$, veamos que también es cierto para cualquier matriz de orden n :

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) &= \det \left[\begin{array}{c|c} {}^n\mathbf{A}^r_n - \lambda\mathbf{I} & \begin{matrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{(n-1)n} \end{matrix} \\ \hline * & \dots & * & a_{nn} - \lambda \end{array} \right] \\ &= \det \left[\begin{array}{c|c} {}^n\mathbf{A}^r_n - \lambda\mathbf{I} & \begin{matrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{(n-1)n} \end{matrix} \\ \hline * & \dots & * & a_{nn} \end{array} \right] - \lambda \det \left[\begin{array}{c|c} {}^n\mathbf{A}^r_n - \lambda\mathbf{I} & \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \\ \hline * & \dots & * & 1 \end{array} \right] \\ &= \det \left[\begin{array}{c|c} {}^n\mathbf{A}^r_n - \lambda\mathbf{I} & \begin{matrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{(n-1)n} \end{matrix} \\ \hline * & \dots & * & a_{nn} \end{array} \right] - \lambda \det({}^n\mathbf{A}^r_n - \lambda\mathbf{I}), \end{aligned} \quad (16.4)$$

donde ${}^n\mathbf{A}^r_n$ es la submatriz de \mathbf{A} que resulta tras quitar la fila y columna n ésimas. Por hipótesis de inducción, $\det({}^n\mathbf{A}^r_n - \lambda\mathbf{I})$ es un polinomio de grado $(n - 1)$; por tanto, el término que resta en (16.4) es un polinomio de grado n .

Ahora se presentan dos casos. Si $a_{nn} \neq 0$, mediante transformaciones elementales de *Tipo I* se pueden anular todos los componentes de la última fila que están a la izquierda de a_{nn} . Entonces

$$\det \left[\begin{array}{c|c} {}^n\mathbf{A}^r_n - \lambda\mathbf{I} & \begin{matrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{(n-1)n} \end{matrix} \\ \hline * & \dots & * & a_{nn} \end{array} \right] = \det \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{B} - \lambda\mathbf{I} & \begin{matrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{(n-1)n} \end{matrix} \\ \hline 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{array} \right] = a_{nn} \cdot \det(\mathbf{B} - \lambda\mathbf{I}),$$

que por hipótesis de inducción es un polinomio de grado $(n-1)$, por lo que la diferencia de polinomios en (16.4) es un polinomio de grado n . En el segundo caso $a_{nn} = 0$, por tanto

$$\det \left[\begin{array}{ccc|c} n\mathbf{A}^n - \lambda\mathbf{I} & a_{1n} \\ & \vdots \\ & a_{(n-1)n} \\ \hline * & \dots & * & 0 \end{array} \right] = \det \left[\begin{array}{ccc|c} n\mathbf{A}^n - \lambda\mathbf{I} & a_{1n} \\ & \vdots \\ & a_{(n-1)n} \\ \hline * & \dots & * & -1 \end{array} \right] + \det \left[\begin{array}{ccc|c} n\mathbf{A}^n - \lambda\mathbf{I} & 0 \\ & \vdots \\ & 0 \\ \hline * & \dots & * & 1 \end{array} \right].$$

Repitiendo el argumento de más arriba, constatamos que ambos determinantes son polinomios de grado $(n-1)$, por lo que su diferencia es un polinomio de grado menor o igual que $(n-1)$. Así que de nuevo la diferencia de polinomios en (16.4) es un polinomio de grado n . \square

Corolario 16.0.2. *Todo autovalor de \mathbf{A} es raíz del polinomio característico $P_{\mathbf{A}}(\lambda)$.*

Para el ejemplo de más arriba, puesto que $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$; tenemos que

$$\lambda = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 24}}{2} = \frac{7 \pm 5}{2} = \begin{cases} 6 \\ 1 \end{cases} \implies \text{El espectro de } \mathbf{A} \text{ es } \{6, 1\}.$$

El Teorema Fundamental del Álgebra¹ establece que un polinomio $P(\lambda)$ con coeficientes complejos² y de grado $n > 0$ se puede factorizar como

$$P_{\mathbf{A}}(\lambda) = p_0 + p_1\lambda + \dots + p_{n-1}\lambda^{n-1} + p_n\lambda^n = \alpha(\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \dots (\lambda_n - \lambda), \quad \text{donde } \alpha, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}.$$

y por tanto, tiene como mínimo una raíz y como máximo n raíces complejas distintas.



A partir de ahora, y para poder hacer uso del Teorema Fundamental del Álgebra, asumiremos que tanto los vectores como las matrices están formadas por números complejos.

Como consecuencia tenemos el siguiente resultado:

Teorema 16.0.3. *Los autovalores de una matriz \mathbf{A} de orden n son las raíces del Polinomio Característico $P_{\mathbf{A}}(\lambda)$. Por tanto, \mathbf{A} tiene como mucho n autovalores distintos.*

Se denomina *multiplicidad* de una raíz al número de veces que aparece en la factorización del polinomio. Se extiende esta nomenclatura a los autovalores añadiendo la “coletilla” *algebraica*.

Definición 16.3 (Multiplicidad algebraica de un autovalor). *Si λ es una raíz de $P_{\mathbf{A}}$ de multiplicidad k diremos que λ es un autovalor de \mathbf{A} de multiplicidad algebraica k ; que denotamos con $\mu(\lambda) = k$.*

Siguiendo con el ejemplo de más arriba, la multiplicidad algebraica tanto del autovalor $\lambda_1 = 6$ como de $\lambda_2 = 1$ es uno; y los autoespacios de \mathbf{A} correspondientes a 6 y a 1 son respectivamente los espacios nulos

$$\mathcal{N}(\mathbf{A} - 6\mathbf{I}); \quad \text{y} \quad \mathcal{N}(\mathbf{A} - 1\mathbf{I});$$

por tanto los autovectores de \mathbf{A} correspondientes a 6 y 1 son, respectivamente, las soluciones no nulas de los sistemas

$$\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Definición 16.4 (Multiplicidad geométrica de un autovalor). *La dimensión del autoespacio $\mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ se denomina multiplicidad geométrica del autovalor λ ; que denotamos con $\gamma(\lambda)$.*

¹cuya demostración está fuera del alcance de este curso

²El conjunto de números complejos se denota con \mathbb{C} .



El problema de encontrar los autovalores y autovectores de una matriz requiere los siguientes pasos:

1. Encontrar el polinomio característico $P_{\mathbf{A}}(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})$.
2. Encontrar las raíces λ_i de la ecuación característica $P_{\mathbf{A}}(\lambda) = 0$.
3. Resolver los sistemas homogéneos $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ para encontrar los autovectores.

La multiplicidad *algebraica* de λ es el número de veces que se repite la raíz λ en el polinomio característico $P_{\mathbf{A}}(\lambda)$.

La multiplicidad *geométrica* de λ es la dimensión del correspondiente autoespacio $\mathcal{E}_{\lambda}(\mathbf{A})$.

Matrices semejantes y diagonalización por bloques triangulares

En esta lección vamos a ver que toda matriz cuadrada se puede transformar en una matriz diagonal **por bloques triangulares**, y que cada submatriz en la diagonal (cada bloque) es triangular y con un autovalor en su diagonal. Además, veremos cuál es la condición necesaria para que los bloques sean de tamaño 1, es decir, para que la matriz sea *diagonalizable*.

Primero introduzcamos nueva notación relacionada con las matrices elementales y las operaciones con filas y columnas.

17.1. Transformación elemental “espejo” de otra transformación

Resulta que podemos obtener una misma matriz elemental tanto operando sobre las filas como sobre las columnas de la matriz identidad. En el caso de las matrices elementales *Tipo I* es muy sencillo. Por ejemplo, para $\mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{2}+\mathbf{3}]}^{\tau}$

$$\mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{3}+\mathbf{2}]}^{\tau} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \alpha \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{2}+\mathbf{3}]}^{\tau}.$$

En general, para una misma matriz elemental $\mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{j}+\mathbf{k}]}^{\tau}$, la transformación elemental necesaria para crearla es distinta si actuamos sobre las filas, o sobre sus columnas, pues es necesario el *intercambio entre los índices \mathbf{j} y \mathbf{k}* .

$$\mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{k}+\mathbf{j}]}^{\tau} = \mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{j}+\mathbf{k}]}^{\tau}$$

A falta de un mejor nombre, llamaremos a cada una el “espejo” de la otra:

Definición 17.1. Llamaremos “espejo” de una transformación elemental τ (que denotaremos con $\text{esp}(\tau)$) a aquella transformación elemental que actuando por el otro lado de la matriz identidad arroja el mismo resultado; es decir

$$\text{esp}(\tau) \mathbf{I} = \mathbf{I}_{\tau} \quad \text{ó} \quad \tau \mathbf{I} = \mathbf{I}_{\text{esp}(\tau)}$$

El *espejo* de la transformación elemental $\mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{j}+\mathbf{k}]}^{\tau}$ es a la transformación que resulta de intercambiar los índices \mathbf{j} y \mathbf{k} , es decir,

$$\text{esp}\left(\mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{j}+\mathbf{k}]}^{\tau}\right) = \mathbf{I}_{[(\alpha)\mathbf{k}+\mathbf{j}]}^{\tau}.$$

Para las matrices elementales *Tipo II* (y para las matrices intercambio) el caso es mucho más sencillo. Como las matrices elementales *Tipo II* (y las matrices intercambio) son simétricas, $\tau \mathbf{I} = \mathbf{I}_{\tau}$, resulta que tanto las

transformaciones elementales *Tipo II* (y los intercambios), son su propio *espejo*. Por ejemplo

$${}_{[(\alpha)2]}^{\tau} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \alpha & \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} {}_{[(\alpha)2]}^{\tau}.$$

Por otra parte, dada una sucesión de transformaciones elementales, su *espejo* es la sucesión de transformaciones espejo:

$$esp(\tau_1 \dots \tau_k) = esp(\tau_1) \dots esp(\tau_k);$$

es decir

$$esp(\tau_1 \dots \tau_k) \mathbf{I} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$$

Librería NAcAL para Python

```
Tr = T((3,2,1)) & T((-2,3,2)) & T((7,1,3)) & T({2,3}) & T((20,1)) # Secuencia de transf.
A = I(3) & Tr # Transformación de las columnas de la Identidad
B = Tr.espejo() & I(3) # Transformación espejo sobre las filas de la Identidad
A == B # Verificación de que A y B son iguales
```

Así, como la inversa de ${}_{[(\alpha)j+i]}^{\tau}$ es ${}_{[(-\alpha)j+i]}^{\tau}$; la matriz $\begin{pmatrix} & \mathbf{I} \\ {}_{[(\alpha)j+i]}^{\tau} \end{pmatrix}$ es la inversa de $\begin{pmatrix} \mathbf{I} & \\ & {}_{[(\alpha)i+j]}^{\tau} \end{pmatrix}$; y por otra parte, la matriz $\begin{pmatrix} & \mathbf{I} \\ {}_{[(\frac{1}{\alpha})i]}^{\tau} \end{pmatrix}$ es la inversa de $\begin{pmatrix} \mathbf{I} & \\ & {}_{[(\alpha)i]}^{\tau} \end{pmatrix}$.

Por tanto,

$${}_{[(-\alpha)j+i]}^{\tau} \mathbf{I} {}_{[(\alpha)i+j]}^{\tau} = \mathbf{I}; \quad \text{y} \quad {}_{[(\frac{1}{\alpha})i]}^{\tau} \mathbf{I} {}_{[(\alpha)i]}^{\tau} = \mathbf{I}.$$

Y en general

$$esp(\tau^{-1}) \mathbf{I}_{\tau} = \mathbf{I} \quad \text{y} \quad esp(\tau_1^{-1} \dots \tau_k^{-1}) \mathbf{I}_{(\tau_1 \dots \tau_k)} = \mathbf{I}.$$

Librería NAcAL para Python

```
Tr = T((3,2,1)) & T((-2,3,2)) & T((7,1,3)) & T({2,3}) & T((20,1)) # Sec. de transf.
(Tr**-1).espejo() & I(3) & Tr
```

En lo que queda de lección aplicaremos a matrices cuadradas transformaciones de la forma

$$\mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S} = (\mathbf{I}_{(\tau_1 \dots \tau_k)})^{-1} \mathbf{A} (\mathbf{I}_{(\tau_1 \dots \tau_k)}) = ({}_{esp(\tau_1^{-1} \dots \tau_k^{-1})} \mathbf{I}) \mathbf{A} (\mathbf{I}_{(\tau_1 \dots \tau_k)}) = {}_{esp(\tau_1^{-1} \dots \tau_k^{-1})} \mathbf{A}_{(\tau_1 \dots \tau_k)},$$

donde $\mathbf{S} = \mathbf{I}_{(\tau_1 \dots \tau_k)}$.

17.2. Diagonalización por bloques triangulares

17.2.1. Matrices semejantes

Definición 17.2. Decimos que \mathbf{A} y \mathbf{C} (del mismo orden) son **semejantes** si existe una matriz invertible \mathbf{S} tal que

$$\mathbf{A} = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{C} \mathbf{S}.$$

Propiedades compartidas por dos matrices semejantes

Las matrices semejantes comparten muchas propiedades; por ejemplo, tienen el mismo determinante:

$$\det \mathbf{A} = \det \mathbf{S}^{-1} \cdot \det \mathbf{C} \cdot \det \mathbf{S} = \det \mathbf{C} \cdot \det \mathbf{S} \cdot \det \mathbf{S}^{-1} = \det \mathbf{C}.$$

Las matrices semejantes también tienen idéntico polinomio característico:

Proposición 17.2.1. Si \mathbf{A} y \mathbf{C} son semejantes, entonces tienen el mismo polinomio característico.

Demostración. Puesto que son similares, existe una matriz invertible \mathbf{S} tal que $\mathbf{C} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}$, entonces

$$\begin{aligned} P_{\mathbf{C}}(\lambda) &= \det(\mathbf{C} - \lambda \mathbf{I}) = \det(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} - \lambda \mathbf{S}^{-1}\mathbf{S}) && \text{pues } \mathbf{C} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} \text{ y } \mathbf{S}^{-1}\mathbf{S} = \mathbf{I} \\ &= \det(\mathbf{S}^{-1}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{S}) && \text{sacando factor común} \\ &= \det(\mathbf{S}^{-1}) \cdot \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \cdot \det(\mathbf{S}) && \text{determinante de un producto de matrices} \\ &= \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = P_{\mathbf{A}}(\lambda) && \text{ya que } \det(\mathbf{S}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{S})}. \end{aligned}$$

□

Y puesto que cada raíz del polinomio característico es un autovalor de la matrices, y la multiplicidad de cada raíz es la multiplicidad algebraica de cada autovalor, concluimos que *dos matrices semejantes tienen los mismos autovalores y con la misma multiplicidad algebraica.*

Pero además *los autovalores de dos matrices semejantes también tienen la misma multiplicidad geométrica.* Es fácil deducirlo. Sea \mathbf{A} de orden n ; sabemos que si \mathbf{S} es invertible y del mismo orden, entonces $\mathcal{C}(\mathbf{A}\mathbf{S}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})$, y por tanto las formas escalonadas de las matrices $\mathbf{A}\mathbf{S}$ y \mathbf{A} tienen n columnas y el mismo número de pivotes, por tanto $\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}\mathbf{S}) = \dim \mathcal{N}(\mathbf{A})$. Por otra parte sabemos que si \mathbf{S} es invertible, $\mathcal{N}(\mathbf{S}\mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A})$. Combinando ambos resultados y teniendo en cuenta que

$$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} - \lambda_i \mathbf{I} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} - \lambda_i \mathbf{S}^{-1}\mathbf{S} = \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})\mathbf{S},$$

tenemos que para cada autovalor λ_i de \mathbf{A} ,

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} - \lambda_i \mathbf{I}) = \dim \mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I}).$$

Definición 17.3. La traza de \mathbf{A} es la suma de los elementos de su diagonal principal, es decir,

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

Pues bien, *dos matrices semejantes también tienen la misma traza.* Para demostrarlo comenzamos multiplicando \mathbf{A} por la matriz elemental \mathbf{I}_{τ} por la derecha y por su inversa, $(\mathbf{I}_{\tau})^{-1}$, por la izquierda. Evidentemente la matriz resultante es similar a \mathbf{A} . Veamos que la traza no cambia...

Proposición 17.2.2. Si $\mathbf{A} = (\mathbf{I}_{\tau})^{-1} \mathbf{B} (\mathbf{I}_{\tau})$, es decir, si $\mathbf{A} =_{\text{esp}(\tau^{-1})} \mathbf{B}_{\tau}$, entonces $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{B})$.

Demostración. Veamos que la traza no cambia ni con transformaciones Tipo I ni con transformaciones Tipo II:

Si τ es de Tipo II y τ multiplica por α a la columna i ésima, entonces $esp(\tau^{-1})$ dividirá por α la fila i ésima. Por tanto, el i ésimo componente de la diagonal no cambiará. Veámoslo:

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \tau \\ & \end{pmatrix}_{[(\alpha)j]} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \tau \\ & \end{pmatrix}_{[(\alpha)j]} = \alpha(\mathbf{A}_{|j});$$

pero al aplicar la inversa también tenemos

$$\begin{pmatrix} \tau & \mathbf{I} \\ \left(\frac{1}{\alpha}\right)j & \end{pmatrix}_{j|} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \tau & \mathbf{A} \\ \left(\frac{1}{\alpha}\right)j & \end{pmatrix}_{j|} = \frac{1}{\alpha}(j|\mathbf{A});$$

Como la primera operación multiplica la componente $j|\mathbf{A}_{|j}$ por α y la segunda la divide por α , la diagonal no cambia; y por tanto tampoco cambia la traza.

Si τ es de Tipo I y τ suma α veces la columna i ésima a la j ésima, y a la correspondiente matriz elemental la denominamos $\mathbf{E} = \mathbf{I} + \tau_{[(\alpha)i+j]}$ entonces su inversa es $\mathbf{E}^{-1} = \mathbf{I} + \tau_{[(-\alpha)j+i]}$ y

$$(\mathbf{AE})_{|j} = \alpha(\mathbf{A}_{|i}) + \mathbf{A}_{|j} \Rightarrow j|(\mathbf{AE})_{|j} = \alpha(j|\mathbf{A}_{|i}) + j|\mathbf{A}_{|j}$$

pero

$$i|(\mathbf{E}^{-1}\mathbf{A}) = -\alpha(j|\mathbf{A}) + i|\mathbf{A} \Rightarrow i|(\mathbf{E}^{-1}\mathbf{A})_{|i} = -\alpha(j|\mathbf{A}_{|i}) + i|\mathbf{A}_{|i}$$

Así pues, estas transformaciones cambian los elementos j ésimo e i ésimo de la diagonal, a uno se le suma $\alpha j|\mathbf{A}_{|i}$ y al otro se le resta $\alpha j|\mathbf{A}_{|i}$. Por tanto (aunque cambia la diagonal) la traza no cambia. \square

...y puesto que las matrices invertibles son producto de matrices elementales, tenemos el siguiente corolario:

Corolario 17.2.3. Si \mathbf{A} y \mathbf{B} son semejantes, entonces tienen la misma traza.

Librería NAcAL para Python

```
A = Matrix([[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1]])
Tr = T((5,2)) & T((-2,3,1))
(Tr**-1).espejo() & Matrix(A) & Tr # No cambia la traza
```



Y ahora veamos el resultado más importante de la lección: que dada \mathbf{A} y conocidos sus autovalores, siempre es posible transformar \mathbf{A} en una matriz diagonal por bloques triangulares similar a \mathbf{A} y cuya diagonal contiene todos los autovalores de \mathbf{A} .

De propina deduciremos que la suma de los autovalores es la traza y su producto es el determinante.

Nota 3. ¡Recuerde que para obtener matrices semejantes hay que operar tanto con las filas como con las columnas! (...hay que multiplicar por la derecha con una matriz y por la izquierda con la inversa de dicha matriz).

17.2.2. Diagonalización por bloques triangulares

Teorema 17.2.4. Para toda matriz cuadrada $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ existe una matriz invertible \mathbf{S} tal que

$$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_k}} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_2}} \\ & & & \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_1}} \end{bmatrix} \quad \text{donde } \mathbf{T}_{\lambda_i} = \begin{bmatrix} \lambda_i & & \\ * & \lambda_i & \\ & * & \ddots \\ * & * & \cdots & \lambda_i \end{bmatrix} \quad \text{es triangular y de orden igual a la multiplicidad}$$

algebraica de λ_i , y donde $\{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ es el conjunto¹ de autovalores de \mathbf{A} .



Antes de demostrar este importante teorema, vamos a ver algunos resultados previos que nos ayudarán a entender los pasos del algoritmo de diagonalización por bloques.

Lema 17.2.5 (De paso inicial). Si $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es de la forma

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{C} & \\ \hline * & \mathbf{L} \end{array} \right]$$

donde \mathbf{C} (de orden m) es singular y \mathbf{L} es una triangular inferior sin ceros en la diagonal principal, entonces existe una matriz invertible \mathbf{S} tal que

$$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} = \left[\begin{array}{c|c|c} \mathbf{C}' & & \\ \hline & 0 & \\ * & & \mathbf{L} \end{array} \right], \quad \text{donde } \mathbf{C}' \text{ es de orden } (m-1).$$

Y si \mathbf{A} es simplemente singular, entonces $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{C}' & \\ \hline * & 0 \end{array} \right]$, donde \mathbf{C}' es de orden $(m-1)$.

Demostración. Etapa 1 [Anulando la última columna de \mathbf{C} (su columna m ésima)]. Como \mathbf{C} (de orden m) es singular, podemos anular su última columna por eliminación Gaussiana usando una sucesión de transformaciones elementales, $\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \mathbf{R}$, que involucran únicamente a las m primeras columnas de \mathbf{A} . Por tanto, al aplicar las correspondientes transformaciones inversas “espejo” a las filas, ${}_{\text{esp}(\tau_1^{-1} \dots \tau_k^{-1})} \mathbf{I} = \mathbf{R}^{-1}$, únicamente modificaremos las primeras m filas de \mathbf{A} (todas ellas con un cero en la posición m ésima). Así obtenemos una matriz de la forma

$${}_{\text{esp}(\tau_1^{-1} \dots \tau_k^{-1})} \mathbf{A}_{(\tau_1 \dots \tau_k)} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{R} = \left[\begin{array}{c|cc} * & 0 & \\ m \times (m-1) & \vdots & \\ & 0 & \\ \hline & d_{m+1} & \beta_{m+1} \\ * & d_{m+2} & * \quad \beta_{m+2} \\ & \vdots & * \quad * \quad \ddots \\ & d_n & * \quad * \quad \dots \quad \beta_n \end{array} \right]$$

Etapa 2 [Anulando el resto de coeficientes de la columna m ésima de \mathbf{A} (los que quedan a la izquierda de \mathbf{L})]. Gracias a que las componentes β_j de la diagonal principal de \mathbf{L} son pivotes, mediante una sucesión de transformaciones elementales $\mathbf{I}_{\tau_{(k+1)} \dots \tau_p}$, (del tipo $\mathbf{I}_{[(\alpha_j)j+m]} = \mathbf{P}$, con $j > m$), se pueden anular las componentes d_{m+1}, \dots, d_n de la columna m ésima. Al aplicar la sucesión de las correspondientes transformaciones inversas “espejo”, ${}_{\text{esp}(\tau_{k+1}^{-1} \dots \tau_p^{-1})} \mathbf{I} = \mathbf{P}^{-1}$, (del tipo $\mathbf{I}_{[(-\alpha_j)m+j]} = \mathbf{P}$, con $j > m$), solo varían las columnas correspondientes a los asteriscos “*”, ya que la fila m ésima contiene únicamente ceros a partir de la posición

¹ Asumimos que en $\{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ no hay elementos repetidos.

m ; resultando la matriz

$$esp(\tau_1^{-1} \dots \tau_k^{-1}, \tau_{(k+1)}^{-1} \dots \tau_p^{-1}) \mathbf{A}_{(\tau_1 \dots \tau_k, \tau_{k+1} \dots \tau_p)} = (\mathbf{P}^{-1} \mathbf{R}^{-1}) \mathbf{A} (\mathbf{R} \mathbf{P}) = \left[\begin{array}{c|c|c} \mathbf{C}' & & \\ \hline * & 0 & \\ \hline & & \mathbf{L} \end{array} \right], \quad \text{donde } \mathbf{P} = \mathbf{I}_{\tau_{(k+1)} \dots \tau_p}.$$

Llamando \mathbf{S} a la matriz $\mathbf{R} \mathbf{P} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_p}$ hemos terminado la demostración del primer caso.

Demostrar el caso en que \mathbf{A} es simplemente singular es más sencillo...basta con aplicar la *Etapas 1*. \square

Lema 17.2.6 (Paso de continuación). Si $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es de la forma

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{c|c|c} \mathbf{C} & & \\ \hline * & \mathbf{T} & \\ \hline * & & \mathbf{L} \end{array} \right].$$

donde \mathbf{C} (de orden k) es singular, donde \mathbf{L} (de orden $n - m$) es una triangular inferior sin ceros en la diagonal principal y donde \mathbf{T} es triangular inferior con la diagonal principal llena de ceros, entonces existe \mathbf{S} (invertible) tal que

$$\mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S} = \left[\begin{array}{c|c|c} \mathbf{C}' & & \\ \hline * & \mathbf{T}' & \\ \hline * & & \mathbf{L} \end{array} \right],$$

donde \mathbf{C}' es de orden $(k - 1)$ y \mathbf{T}' es triangular inferior con la diagonal principal llena de ceros.

Y si \mathbf{A} es simplemente de la forma $\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{C} & \\ \hline * & \mathbf{T} \end{array} \right]$, entonces $\mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{C}' & \\ \hline * & \mathbf{T}' \end{array} \right]$, donde \mathbf{C}' es de orden $k - 1$ y \mathbf{T}' es triangular inferior con la diagonal principal llena de ceros.

Demostración. *Etapas 1* [Anulando la última columna de \mathbf{C} (su columna k ésima)]. Aplicando la eliminación Gaussiana como en la *Etapas 1* del lema anterior obtenemos una matriz de la forma

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} & 0 & & \\ & \vdots & & \\ & 0 & & \\ \hline * & * & \mathbf{T} & \\ \hline & d_{m+1} & & \beta_{m+1} \\ & d_{m+2} & * & \beta_{m+2} \\ & \vdots & * & * & \ddots \\ & d_n & * & * & \dots & \beta_n \end{array} \right], \quad \text{donde } \mathbf{T}' = \left[\begin{array}{c|c} 0 & \\ \hline * & \mathbf{T} \end{array} \right].$$

Etapas 2 [Anulando coeficientes de la columna k ésima que están a la izquierda de \mathbf{L}]. hacemos lo mismo que en la *Etapas 2* del lema anterior quedando una matriz de la forma

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} \mathbf{C}' & & & \\ \hline & 0 & & \\ & * & \mathbf{T} & \\ \hline & 0 & & \mathbf{L} \end{array} \right], \quad \text{donde } \mathbf{T}' = \left[\begin{array}{c|c} 0 & \\ \hline * & \mathbf{T} \end{array} \right].$$

Y si \mathbf{A} es simplemente de la forma $\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{C}' & \\ \hline * & \mathbf{L} \end{array} \right]$, entonces basta aplicar el *Etapa 1*. □

Antes de pasar al siguiente corolario, recuérdese que para una *matriz triangular por bloques* (véase el EJERCICIO 55 en la página 146)

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{array} \right] \quad \text{se verifica que} \quad |\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| \cdot |\mathbf{D}|;$$

por tanto, el polinomio característico de la matriz triangular por bloques \mathbf{A} es igual al producto de los polinomios característicos de \mathbf{B} y \mathbf{D} ; es decir $P_{\mathbf{A}}(\lambda) = P_{\mathbf{B}}(\lambda) \cdot P_{\mathbf{D}}(\lambda)$, o expresado con determinantes:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \det(\mathbf{B} - \lambda \mathbf{I}) \cdot \det(\mathbf{D} - \lambda \mathbf{I}).$$

🔗 Usaremos este resultado sobre polinomios característicos en la última parte de la demostración del siguiente corolario, que nos indica como iniciar el algoritmo de diagonalización para generar un primer bloque:

Corolario 17.2.7. Si $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y λ_1 es un autovalor de \mathbf{A} , entonces existe \mathbf{S} invertible tal que

$$\text{o bien} \quad \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{C}' & \\ \hline * & \mathbf{T}_{\lambda_1} \end{array} \right]; \quad \text{o bien} \quad \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S} = \mathbf{T}_{\lambda_1};$$

$$\text{donde} \quad \mathbf{T}_{\lambda_1} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ * & \lambda_1 & & \\ * & * & \ddots & \\ * & * & \cdots & \lambda_1 \end{bmatrix} \quad \text{es de orden igual a la multiplicidad algebraica de } \lambda_1.$$

Demostración. Como $(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})$ es singular, aplicando el Lema de *paso inicial* e iterando el Lema de *paso de continuación* mientras sea posible (mientras la submatriz de la esquina superior izquierda sea singular), llegamos a

$$(\mathbf{S}_k^{-1} \cdots \mathbf{S}_1^{-1}) \cdot (\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I}) \cdot (\mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_k) = \begin{cases} \begin{bmatrix} \mathbf{T} \end{bmatrix} & \text{si hemos podido continuar hasta el final} \\ \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{C}' & \\ \hline * & \mathbf{T} \end{array} \right] & \text{si hemos topado un una submatriz } \mathbf{C}' \text{ no singular,} \end{cases} \quad (17.1)$$

donde en ambos casos \mathbf{T} es triangular inferior de orden k , con la diagonal llena de ceros (donde k es el número de *pasos* que hemos dado). Como para cualquier \mathbf{S} invertible se verifica que $\mathbf{S}^{-1}(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})\mathbf{S} = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S} - \lambda_1 \mathbf{I}$, sumando $(\lambda_1 \mathbf{I})$ en (17.1) tenemos

$$(\mathbf{S}_k^{-1} \cdots \mathbf{S}_1^{-1}) \cdot \mathbf{A} \cdot (\mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_k) = \begin{cases} \begin{bmatrix} \mathbf{T} + \lambda_1 \mathbf{I} \end{bmatrix} \\ \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{C}' + \lambda_1 \mathbf{I} & \\ \hline * & \mathbf{T} + \lambda_1 \mathbf{I} \end{array} \right] \end{cases} \quad ; \quad \text{donde } \mathbf{T}_{\lambda_1} = \begin{bmatrix} \mathbf{T} + \lambda_1 \mathbf{I} \end{bmatrix}.$$

En el primer caso $k = n$ y el polinomio característico de la matriz \mathbf{A} coincide con el polinomio característico de \mathbf{T}_{λ_1} , que es $(\lambda_1 - \lambda)^n$, donde n es el orden tanto de la matriz \mathbf{T} como de \mathbf{A} .

En el segundo caso, el polinomio característico de \mathbf{A} es igual al producto de los polinomios característicos de las dos submatrices, es decir, $(P_{(\mathbf{C}' + \lambda_1 \mathbf{I})}(\lambda)) \cdot (\lambda_1 - \lambda)^k$. Ahora bien, como λ_1 no es un autovalor² de $(\mathbf{C}' + \lambda_1 \mathbf{I})$, entonces k es la multiplicidad del autovalor λ_1 . \square

☞ ...el último corolario nos dice cómo continuar el algoritmo para seguir generando el resto de bloques en la diagonal (nótese que es casi idéntico al anterior) ...

Corolario 17.2.8. Si $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ de la forma
$$\left[\begin{array}{c|ccc} \mathbf{C} & & & \\ \hline & \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_r}} & & \\ * & & \ddots & \\ & & & \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_1}} \end{array} \right], \text{ donde } \mathbf{T}_{\lambda_i} = \begin{bmatrix} \lambda_i & & & \\ * & \lambda_i & & \\ * & * & \ddots & \\ * & * & \cdots & \lambda_i \end{bmatrix} \text{ es}$$

de orden igual a la multiplicidad algebraica del autovalor λ_i y donde λ_{r+1} es un autovalor³ de \mathbf{C} , entonces existe \mathbf{S} invertible tal que

$$\text{o bien } \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S} = \left[\begin{array}{c|ccc} \mathbf{C}' & & & \\ \hline & \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_{r+1}}} & & \\ * & & \ddots & \\ & & & \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_1}} \end{array} \right], \quad \text{o bien } \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S} = \left[\begin{array}{c|ccc} \mathbf{T}_{\lambda_{r+1}} & & & \\ \hline & \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_r}} & & \\ * & & \ddots & \\ & & & \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_1}} \end{array} \right],$$

donde $\mathbf{T}_{\lambda_{r+1}} = \begin{bmatrix} \lambda_{r+1} & & & \\ * & \lambda_{r+1} & & \\ * & * & \ddots & \\ * & * & \cdots & \lambda_{r+1} \end{bmatrix}$ es de orden igual a la multiplicidad algebraica del autovalor λ_{r+1} .

Demostración. Como $(\mathbf{C} - \lambda_{r+1} \mathbf{I})$ es singular, repitiendo los mismos pasos de la anterior demostración llegamos a

$$(\mathbf{S}_k^{-1} \cdots \mathbf{S}_1^{-1}) \cdot \mathbf{A} \cdot (\mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_k) = \begin{cases} \left[\begin{array}{c|ccc} \mathbf{T}_{\lambda_{r+1}} & & & \\ \hline & \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_r}} & & \\ * & & \ddots & \\ & & & \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_1}} \end{array} \right] & \text{si hemos podido continuar hasta el final} \\ \left[\begin{array}{c|ccc} \mathbf{C}' + \lambda_{r+1} \mathbf{I} & & & \\ \hline & \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_{r+1}}} & & \\ * & & \ddots & \\ & & & \boxed{\mathbf{T}_{\lambda_1}} \end{array} \right] & \text{si hemos topado un una submatriz } \mathbf{C}' \text{ no singular,} \end{cases}$$

²si fuera autovalor, entonces \mathbf{C}' sería singular.

³por tanto también es un autovalor de \mathbf{A} distinto de $\lambda_1, \dots, \lambda_r$

donde en ambos casos $\mathbf{T}_{\lambda_{r+1}}$ es triangular inferior de orden k , con λ_{r+1} en la diagonal principal y donde k es el número de *pasos* que hemos dado.

En el primer caso el polinomio característico de la matriz \mathbf{A} es el producto de los polinomios característicos

$$P_{\mathbf{A}}(\lambda) = P_{\mathbf{T}_{\lambda_1}}(\lambda) \cdots P_{\mathbf{T}_{\lambda_r}}(\lambda) \cdot P_{\mathbf{T}_{\lambda_{r+1}}}(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)^{\mu(\lambda_1)} \cdots (\lambda_r - \lambda)^{\mu(\lambda_r)} \cdot (\lambda_{r+1} - \lambda)^k,$$

donde $\mu(\lambda_i)$ es la multiplicidad *algebraica* del autovalor λ_i .

En el segundo caso, el polinomio característico de \mathbf{A} es

$$P_{\mathbf{A}}(\lambda) = \left(P_{(\mathbf{C}' + \lambda_{r+1}\mathbf{I})}(\lambda) \right) \cdot (\lambda_1 - \lambda)^{\mu(\lambda_1)} \cdots (\lambda_r - \lambda)^{\mu(\lambda_r)} \cdot (\lambda_{r+1} - \lambda)^k.$$

Ahora bien, como λ_{r+1} no es un autovalor de $(\mathbf{C}' + \lambda_{r+1}\mathbf{I})$, entonces k es la multiplicidad del autovalor λ_{r+1} . □

Ya solo resta demostrar el Teorema 17.2.4, pero...

Demostración del Teorema 17.2.4. Ya no hay nada que demostrar. Basta aplicar el primer corolario e iterar el segundo hasta finalizar la generación de bloques. □

Ejemplo 26. Sea la matriz $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ con autovalores 1, 1 y 0. Vamos a diagonalizar por bloques triangulares.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \xrightarrow[\mathbf{0I}]{(-)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} \tau \\ [(1)\mathbf{1}+\mathbf{2}] \\ [(2)\mathbf{3}+\mathbf{2}] \\ [\mathbf{2} \Rightarrow \mathbf{3}] \end{smallmatrix}]{\tau} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} \tau \\ [(-1)\mathbf{2}+\mathbf{1}] \\ [(-2)\mathbf{2}+\mathbf{3}] \\ [\mathbf{2} \Rightarrow \mathbf{3}] \end{smallmatrix}]{\tau} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\mathbf{0I}]{(+)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{D} \\ \mathbf{S} \end{bmatrix}$$

Así pues,

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S};$$

Por lo que hemos llegado a una matriz diagonal.

Librería NAcAL para Python

```
A = Matrix([[1,-1,0],[0,0,0],[0,-2,1]]); L=[1,1,0];
Diagonaliza(A, L , 1)
```

Ejemplo 27. Sea la matriz $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & -9 \\ -1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ con autovalores 1, 1 y 0. Vamos a diagonalizar por bloques.

$$\begin{aligned}
 \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \\ \hline \mathbf{I} & \end{array} \right] & \xrightarrow[1\mathbf{I}]{(-)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -3 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & -9 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\tau_{[-(-2)2+3]}]{[(1)1+3]} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & -3 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\tau_{[(2)3+2]}]{[(1)3+1]} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & -2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[1\mathbf{I}]{(+)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow[1\mathbf{I}]{(-)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & -2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\tau_{[(1)1+2]}]{[(1)2+1]} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[(1)2+1]{\tau} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[1\mathbf{I}]{(+)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow[0\mathbf{I}]{(-)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\tau_{[(4)3+1]}]{[(1)2+1]} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -9 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\tau_{[(1)1+2]}]{[(1)1+2]} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -9 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[0\mathbf{I}]{(+)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -9 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{S} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Así pues,

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -1 & 1 \\ -9 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & -9 \\ -1 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & -1 & 1 \\ -9 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S}.$$

Por lo que hemos llegado a una matriz diagonal por bloques triangulares.

Librería NAcAL para Python

```

A = Matrix([[-2,0,3],[3,-2,-9],[-1,2,6]]); L=[1,1,0];
C = Diagonaliza (A, L, 1) # Matriz diagonal por bloques triangulares
S = C.S                  # C = (S**-1) * A * S (La matriz S se guarda como un atributo de C)
(S**-1) * A * S          # Comprobación

```

Como se ha visto, el algoritmo es un poco pesado para ser calculado con “papel y lápiz”...¡pero para eso se inventaron los ordenadores!

Ejemplo 28. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & 0 \\ -3 & -2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ con autovalores 2 (doble) y 1 (doble). Diagonalicemos por bloques:

Librería NAcAL para Python

```

A = Matrix([[3,0,-1,1],[3,2,-2,2],[1,-2,2,0],[-3,-2,3,-1]]); L=[1,1,2,2];
C = Diagonaliza (A, L) # Añada como tercer argumento un 1 si quiere ver los pasos
C.S                  # La matriz S se guarda como atributo S

```

$$\text{Así pues, } \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & 0 \\ -3 & -2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S}.$$

17.2.3. Autovalores, determinante y traza

Como matrices semejantes tienen el mismo determinante, traza y autovalores (con la misma multiplicidad aritmética y geométrica); y puesto que por el Teorema 17.2.4 sabemos que para toda matriz cuadrada podemos encontrar otra similar a ella, que es diagonal por bloques *con sus autovalores en la diagonal principal*, se deduce que:

Corolario 17.2.9. *La suma de los autovalores de \mathbf{A} es igual a la traza de \mathbf{A} .*

Corolario 17.2.10. *El producto de los autovalores de \mathbf{A} es igual al determinante de \mathbf{A} .*

17.2.4. Autovectores

Hemos visto que para toda matriz \mathbf{A} cuadrada, existe una matriz \mathbf{S} invertible tal que

$$\mathbf{C} = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S}$$

es diagonal por bloques triangulares, y donde cada bloque triangular tiene repetido el mismo autovalor λ_i en su diagonal principal. Fijémonos ahora en aquellas columnas de \mathbf{C} en la que aparezca un autovalor λ_i con únicamente ceros por debajo, es decir, $\mathbf{C}_{|j} = \lambda_i \mathbf{I}_{|j}$ (por ejemplo, las columnas $\mathbf{C}_{|2}$ y $\mathbf{C}_{|4}$ del último ejemplo). Puesto que $\mathbf{C} = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S}$, tenemos que

$$\mathbf{A} \mathbf{S} = \mathbf{S} \mathbf{C} \implies \mathbf{A} \mathbf{S}_{|j} = \mathbf{S} \mathbf{C}_{|j},$$

y como para dichas columnas $\mathbf{C}_{|j} = \lambda_i \mathbf{I}_{|j}$, tenemos que $\mathbf{S} \mathbf{C}_{|j} = \lambda_i \mathbf{S} \mathbf{I}_{|j} = \lambda_i \mathbf{S}_{|j}$ y por tanto

$$\mathbf{A}(\mathbf{S}_{|j}) = \lambda_i(\mathbf{S}_{|j}).$$

Corolario 17.2.11. *Si $\mathbf{C} = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S}$ es diagonal por bloques triangulares y $\mathbf{C}_{|j}$ tan solo tiene ceros por debajo del autovalor λ_i , entonces $\mathbf{S}_{|j}$ es un autovector asociado al autovalor λ_i .*

$$\text{Así, usando nuestra librería de Python con el último ejemplo, llegamos a } \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{S} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & \color{blue}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \color{blue}{1} \\ \hline 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

y deducimos que $(0, 0, -1, -1)$ es un autovector para $\lambda = 2$; y $(-2, -2, -2, 2)$ lo es para $\lambda = 1$.

Nótese que tras diagonalizar por bloques triangulares

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{esp}(\tau_1^{-1} \dots \tau_p^{-1})]{\tau_1 \dots \tau_p} \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{S} \end{bmatrix} \quad \text{donde } \mathbf{S} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_p},$$

puesto que \mathbf{S} es invertible, necesariamente *los autovectores correspondientes a autovalores distintos son linealmente independientes*.

17.3. Matrices diagonalizables

Definición 17.4 (Matriz diagonalizable). Se dice que \mathbf{A} (de orden n) es **diagonalizable** si existe una matriz \mathbf{S} tal que $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}$ es diagonal.

Ejemplo 29.

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \\ \hline \mathbf{I} & \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{(-) \\ \mathbf{0I}}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 4 & 2 & & & \\ 0 & 1 & 2 & & & \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ \hline 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{[(-2)2+3] \\ [(2)1+3]}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 4 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ \hline 1 & 0 & 2 & & & \\ 0 & 1 & -2 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{\tau \\ [(-2)3+1] \\ [(2)3+2]}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 4 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ \hline 1 & 0 & 2 & & & \\ 0 & 1 & -2 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{(+ \\ \mathbf{0I}}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 4 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ \hline 1 & 0 & 2 & & & \\ 0 & 1 & -2 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{\substack{(-) \\ \mathbf{1I}}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & -1 & & & \\ \hline 1 & 0 & 2 & & & \\ 0 & 1 & -2 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right] \xrightarrow{[(-2)1+2]} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & -1 & & & \\ \hline 1 & -2 & 2 & & & \\ 0 & 1 & -2 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right] \xrightarrow{[(2)2+1]} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & -1 & & & \\ \hline 1 & -2 & 2 & & & \\ 0 & 1 & -2 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{(+ \\ \mathbf{1I}}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ \hline 1 & -2 & 2 & & & \\ 0 & 1 & -2 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{D} & \\ \hline \mathbf{S} & \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{S}_{|1} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \cdot \mathbf{A}_{|1}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{S}_{|2} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \mathbf{A}_{|2}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{S}_{|3} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \mathbf{A}_{|3}.$$

Cuando la matriz es diagonalizable, todas las columnas de \mathbf{S} son autovectores (linealmente independientes), y por tanto, la multiplicidad *algebraica* de cada autovalor (el número de veces que aparece cada λ_i en la diagonal) necesariamente coincide con la multiplicidad *geométrica* (el número de autovectores linealmente independientes asociados a dicho autovalor).

Corolario 17.3.1. Si para cada autovalor λ_i de $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ las multiplicidades algebraica y geométrica coinciden, la matriz es diagonalizable (es decir, los bloques de la diagonalización por bloques son diagonales).

Por tanto:

Corolario 17.3.2. Si todos los autovalores \mathbf{A} son distintos entre si, entonces \mathbf{A} es diagonalizable.

Demostración. Si la multiplicidad algebraica de cada autovalor es uno, entonces al diagonalizar por bloques, cada bloque resultará de orden 1. \square

si \mathbf{A} es diagonalizable e invertible tenemos que

$$\mathbf{A}^{-1} = \left(\mathbf{S}\mathbf{D}\mathbf{S}^{-1} \right)^{-1} = \mathbf{S}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{S}^{-1}.$$

Además, si seguimos el siguiente convenio

$$\mathbf{A}^0 = \mathbf{A}^{(1-1)} = \mathbf{A}^1 (\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{I};$$

entonces, para toda \mathbf{A} diagonalizable e invertible y todo número entero n : $\mathbf{A}^n = \mathbf{S}\mathbf{D}^n\mathbf{S}^{-1}$.

Diagonalización de matrices simétricas

18.1. Método de Gram-Schmidt

Definición 18.1. Decimos que un *sistema de vectores es ortogonal*, si cada uno de los vectores es ortogonal al resto.

Proposición 18.1.1. Un sistema ortogonal sin vectores nulos es linealmente independiente.

Demostración. Si $\mathbf{0} = a_1 \mathbf{z}_1 + \cdots + a_n \mathbf{z}_n$ entonces para cada j

$$0 = \mathbf{0} \cdot \mathbf{z}_j = (a_1 \mathbf{z}_1 + \cdots + a_n \mathbf{z}_n) \cdot \mathbf{z}_j = a_j \mathbf{z}_j \cdot \mathbf{z}_j$$

como $\mathbf{z}_j \cdot \mathbf{z}_j \neq 0$, entonces, necesariamente $a_j = 0$ para $j = 1, \dots, n$. □

Teorema 18.1.2 (Método de Gram-Schmidt). Dado un sistema de vectores, existe una sucesión de transformaciones elementales “de izquierda a derecha” que transforman el sistema en otro equivalente¹ ortogonal.

Demostración. Lo demostraremos por inducción sobre el número de vectores del sistema.

Si el sistema contiene un único vector no hay nada que hacer. Veamos que si el resultado es cierto para sistemas de n vectores, entonces también es cierto para sistemas de $n + 1$ vectores.

Sea el sistema $[\mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_n; \mathbf{y}_{(n+1)}]$, aplicando la hipótesis de inducción, existe una sucesión, τ_1, \dots, τ_k , de transformaciones elementales de “izquierda a derecha” que transforman el sub-sistema formado por los n primeros vectores en otro sistema $[\mathbf{z}_1; \dots; \mathbf{z}_n]$ que es equivalente, pero además es ortogonal; por tanto, aplicando las transformaciones elementales sobre el sistema completo tenemos

$$[\mathbf{y}_1; \dots; \mathbf{y}_n; \mathbf{y}_{(n+1)}]_{\tau_1 \dots \tau_k} = [\mathbf{z}_1; \dots; \mathbf{z}_n; \mathbf{y}_{(n+1)}].$$

Y por último, mediante una segunda sucesión de transformaciones elementales “de izquierda a derecha”, $\tau_{(k+1)}, \dots, \tau_p$, podemos transformar el último vector en $\mathbf{z}_{(n+1)} = \mathbf{y}_{(n+1)} - a_1 \mathbf{z}_1 - a_2 \mathbf{z}_2 \cdots - a_n \mathbf{z}_n$. Pues bien, hagámoslo de manera que el nuevo vector $\mathbf{z}_{(n+1)}$ sea ortogonal a todos los vectores \mathbf{z}_j que le anteceden, es decir, de manera que

$$\mathbf{z}_{(n+1)} \cdot \mathbf{z}_j = 0, \quad \text{para } j = 1, \dots, n.$$

Para cada $j = 1, \dots, n$ tenemos dos casos posibles.

- Si \mathbf{z}_j es cero, entonces \mathbf{z}_j y $\mathbf{z}_{(n+1)}$ ya son ortogonales (y no hay nada que hacer).
- Si $\mathbf{z}_j \neq \mathbf{0}$, entonces

$$0 = \mathbf{z}_{(n+1)} \cdot \mathbf{z}_j = (\mathbf{y}_{(n+1)} - \widehat{a_1} \mathbf{z}_1 - \cdots - \widehat{a_n} \mathbf{z}_n) \cdot \mathbf{z}_j = (\mathbf{y}_{(n+1)} \cdot \mathbf{z}_j) - \widehat{a_j} (\mathbf{z}_j \cdot \mathbf{z}_j) \Leftrightarrow \widehat{a_j} = \frac{\mathbf{y}_{(n+1)} \cdot \mathbf{z}_j}{\mathbf{z}_j \cdot \mathbf{z}_j}.$$

¹decimos que dos sistemas son equivalentes si generan el mismo espacio

Por tanto, la segunda sucesión de transformaciones elementales realiza la siguiente transformación.

$$\mathbf{z}_{(n+1)} = \mathbf{y}_{(n+1)} - \sum_{\mathbf{z}_j \neq \mathbf{0}} \widehat{a_j} \mathbf{z}_j, \quad \text{donde} \quad \widehat{a_j} = \frac{\mathbf{y}_{(n+1)} \cdot \mathbf{z}_j}{\mathbf{z}_j \cdot \mathbf{z}_j},$$

de manera que tras las dos sucesiones de transformaciones tenemos que

$$[\mathbf{y}_1; \dots \mathbf{y}_n; \mathbf{y}_{(n+1)}] \xrightarrow{\tau_1, \dots, \tau_k} [\mathbf{z}_1; \dots \mathbf{z}_n; \mathbf{y}_{(n+1)}] \xrightarrow{\tau_{(k+1)}, \dots, \tau_p} [\mathbf{z}_1; \dots \mathbf{z}_n; \mathbf{z}_{(n+1)}]$$

es un sistema equivalente y ortogonal. \square

Corolario 18.1.3. *Cualquier sistema ortogonal de vectores de \mathbb{R}^n no nulos se puede extender hasta formar una base ortogonal de \mathbb{R}^n .*

Demostración. Sea $[\mathbf{z}_1; \dots \mathbf{z}_r]$ un sistema ortogonal de vectores de \mathbb{R}^n y sea $[\mathbf{y}_1; \dots \mathbf{y}_m]$ un sistema generador de \mathbb{R}^n . Entonces aplicando Gram-Schmidt sobre el sistema ampliado

$$[\mathbf{z}_1; \dots \mathbf{z}_r; \mathbf{y}_1; \dots \mathbf{y}_m]$$

comenzando sobre el vector $(r+1)$ ésimo, obtenemos un nuevo sistema equivalente al ampliado y ortogonal²

$$[\mathbf{z}_1; \dots \mathbf{z}_r; \mathbf{z}_{r+1}; \dots \mathbf{z}_{r+m}].$$

Por ser un sistema equivalente al anterior, es un sistema generador de \mathbb{R}^n . Si de este sistema quitamos los vectores nulos, seguirá siendo generador y ortogonal, pero además será un sistema linealmente independiente. \square

18.2. Matrices ortogonales

Definición 18.2. Un *sistema de vectores es ortonormal* si es ortogonal y cada vector es de norma uno.

En la demostración del Teorema espectral que enunciaremos más adelante, usaremos el siguiente resultado.

EJERCICIO 59. Demuestre el siguiente corolario:

Corolario 18.2.1. *Dado un vector \mathbf{q} de \mathbb{R}^n de norma uno, existe una base ortonormal de \mathbb{R}^n cuyo último vector es \mathbf{q} .*

Definición 18.3 (Vectores ortonormales). *Los vectores $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k$ de \mathbb{R}^n son ortonormales si son perpendiculares entre sí y de norma uno, es decir, si*

$$(\mathbf{q}_i) \cdot (\mathbf{q}_j) = \begin{cases} 0 & \text{cuando } i \neq j \quad (\text{vectores ortogonales}) \\ 1 & \text{cuando } i = j \quad (\text{vectores unitarios: } \|\mathbf{q}_1\| = 1) \end{cases}$$

Habitualmente denotamos con \mathbf{Q} las matrices cuyas columnas son *orto-normales*.

EJERCICIO 60. Demuestre la siguiente proposición:

Proposición 18.2.2. *Las columnas de \mathbf{Q} son orto-normales si y solo si $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}$*

$m \times n$

$n \times n$

²En realidad se puede empezar desde la posición 1, pues los vectores \mathbf{y}_i ya son ortogonales entre sí, y por tanto el método no los modifica.

Nótese que cuando $m > n = r$ entonces $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}_{n \times n} \neq \mathbf{Q}(\mathbf{Q}^T)$. Por ejemplo, si $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ entonces

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_{2 \times 2}; \quad \text{pero} \quad \mathbf{Q}(\mathbf{Q}^T) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq \mathbf{I}_{3 \times 3}.$$

Definición 18.4. Decimos que \mathbf{Q} es **ortogonal** si es cuadrada y sus columnas son ortonormales.

Corolario 18.2.3. Cuando \mathbf{Q} es ortogonal, $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$.

Nótese por tanto que las columnas de una matriz ortogonal \mathbf{Q} de orden n forman una base de \mathbb{R}^n .

EJERCICIO 61. Demuestre las siguientes proposiciones:

(a)

Proposición 18.2.4. El producto de matrices ortogonales es ortogonal.

(b)

Proposición 18.2.5. Si \mathbf{A} es simétrica y \mathbf{Q} es ortogonal, entonces $\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q}$ es simétrica.

18.3. Nota sobre la conjugación de números complejos

Un número complejo se expresa de la forma $a + bi$, donde a y b son números reales, y donde i es la solución de la ecuación $x^2 = -1$ (es decir, $i^2 = -1$).

Puesto que ningún número real satisface dicha ecuación, a i se le denomina *número imaginario*. Para el número complejo $a + bi$, denominamos *parte real* a “ a ” y *parte imaginaria* a “ b ”.

- Para un número complejo $a + bi$, su conjugado es: $\overline{a + bi} = a - bi$ (es decir, se cambia el signo de la parte imaginaria).
- Un número complejo es real si y solo si es igual a su conjugado: $\bar{x} = x$.
- El producto del número $a + bi$ por su conjugado es $(a + bi) \cdot \overline{(a + bi)} = a^2 + b^2$.
- El conjugado de una suma es la suma de los conjugados: $\overline{x + y} = \bar{x} + \bar{y}$.
- El conjugado de un producto es el producto de los conjugados: $\overline{x \cdot y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$.

18.4. Diagonalización de matrices simétricas

Proposición 18.4.1. Los autovalores λ de una matriz real y simétrica son reales.

Demostración. Suponga $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ (con $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$); y donde tanto λ como \mathbf{x} son complejos. Entonces multiplicando $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ por el conjugado $\bar{\mathbf{x}}$, tenemos

$$\bar{\mathbf{x}} \mathbf{A} \mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}} \cdot \lambda \mathbf{x} = \lambda(\bar{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{x}),$$

donde $\bar{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{x} \neq 0$ por ser $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Puesto que el conjugado de \mathbf{A} es \mathbf{A} , por ser una matriz real; tomando el conjugado de $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, tenemos $\mathbf{A}\bar{\mathbf{x}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{x}}$. Como \mathbf{A} es simétrica, para cualquier \mathbf{y} tenemos que $\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{y}\mathbf{A}$, en particular $\mathbf{A}\bar{\mathbf{x}} = \bar{\mathbf{x}}\mathbf{A} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{x}}$. Y multiplicando por \mathbf{x} a ambos lados tenemos

$$\bar{\mathbf{x}} \mathbf{A} \mathbf{x} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{x} = \bar{\lambda}(\bar{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{x}).$$

Como en las dos ecuaciones de más arriba los lados izquierdos son idénticos, necesariamente los lados derechos son iguales; por tanto

$$\bar{\lambda} = \lambda,$$

algo que sólo es posible si la parte imaginaria es cero. Por tanto los autovalores son reales. □

Además, como los autovectores provienen de resolver la ecuación real $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, necesariamente son reales; por tanto, obtenemos el siguiente corolario:

Corolario 18.4.2. *Los autovectores \mathbf{x} de una matriz real y simétrica son reales.*

Teorema 18.4.3. *Si \mathbf{A} es real y simétrica, entonces existe una matriz ortogonal \mathbf{Q} tal que $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}$ es diagonal.*

Demostración. Vamos a demostrarlo describiendo el algoritmo que construye dicha base, y que consta de dos etapas.

Paso inicial. Sea \mathbf{q}_n un autovector de \mathbf{A} correspondiente al autovalor λ_n y de norma 1. Aplicando el Corolario 18.2.1 extendemos el sistema formado por dicho autovector hasta obtener una base ortonormal de \mathbb{R}^n

$$\mathbf{Q}_n = [\mathbf{q}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{q}_n].$$

Por tanto \mathbf{Q}_n es ortogonal, y $\mathbf{Q}_n^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}_n$ es simétrica y de la forma $\mathbf{Q}_n^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}_n = \begin{bmatrix} & & & 0 \\ & \mathbf{A}' & & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$, ya que

$$\left(\mathbf{Q}_n^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}_n\right)_{|n} = \left(\mathbf{Q}_n^{\top}\mathbf{A}\mathbf{Q}_n\right)_{|n} = \mathbf{Q}_n^{\top}\mathbf{A}\mathbf{q}_n = \lambda_n \cdot \mathbf{Q}_n^{\top}\mathbf{q}_n = \lambda_n \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_n \\ \mathbf{q}_2 \cdot \mathbf{q}_n \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n \cdot \mathbf{q}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \lambda_n \cdot \mathbf{I}_{|n}.$$

Paso de continuación. Supongamos que tras $n - k$ pasos tenemos

$$\mathbf{Q}_{k+1}^{-1} \cdots \mathbf{Q}_n^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{Q}_n \cdots \mathbf{Q}_{k+1} = \left[\begin{array}{c|ccc} \mathbf{A}' & & & \\ \hline & \lambda_{k+1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{array} \right], \quad (18.1)$$

como \mathbf{A}' es simétrica, tomamos un autovector $\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^k$ de \mathbf{A}' correspondiente al autovalor λ_k y de norma 1. Aplicando el Corolario 18.2.1 formamos una base ortonormal $\mathbf{R} = [\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k]$ de \mathbb{R}^k . Ahora, si consideramos la matriz por bloques

$$\mathbf{Q}_k = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{array} \right]_{(n-k) \times (n-k)} = [\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n],$$

entonces \mathbf{Q}_k es ortogonal y sus últimas columnas $\mathbf{y}_k, \dots, \mathbf{y}_n$ son autovectores de la matriz de la Ecuación (18.1); es decir, llamando \mathbf{B} a la matriz de dicha ecuación tenemos que

$$\mathbf{B}\mathbf{y}_j = \lambda_j \mathbf{y}_j; \quad \text{para } j = k, \dots, n.$$

Consecuentemente, multiplicando (18.1) por \mathbf{Q}_k^{-1} y por \mathbf{Q}_k tenemos

$$\mathbf{Q}_k^{-1} \cdot \left(\mathbf{Q}_{k+1}^{-1} \cdots \mathbf{Q}_n^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{Q}_n \cdots \mathbf{Q}_{k+1} \right) \cdot \mathbf{Q}_k = \mathbf{Q}_k^{-1} \mathbf{B} \mathbf{Q}_k = \left[\begin{array}{c|ccc} \mathbf{A}'' & & & \\ \hline & \lambda_k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{array} \right],$$

ya que,
$$\left(\mathbf{Q}_k^{-1}\mathbf{B}\mathbf{Q}_k\right)_{|j} = \mathbf{Q}_k^{\top}(\mathbf{B}\mathbf{Q}_k)_{|j} = \mathbf{Q}_k^{\top}(\mathbf{B}\mathbf{y}_j) = \mathbf{Q}_k^{\top}(\lambda_j\mathbf{y}_j) = \lambda_j \begin{pmatrix} \mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_j \\ \mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_j \\ \vdots \\ \mathbf{y}_n \cdot \mathbf{y}_j \end{pmatrix} = \lambda_j (\mathbf{I}_{|j}).$$

Así, el producto de matrices $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}_n \cdots \mathbf{Q}_1$ es ortogonal y $\mathbf{D} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}$ es diagonal con los autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de \mathbf{A} correspondientes a las columnas de \mathbf{Q} en su diagonal principal. \square

Definición 18.5. \mathbf{A} es **diagonalizable ortogonalmente** si existe una matriz ortogonal \mathbf{Q} tal que $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}$ es diagonal.

Como consecuencia del teorema anterior tenemos el siguiente e importante corolario que se conoce por **Teorema Espectral**:

Corolario 18.4.4 (Teorema espectral). Si \mathbf{A} (de orden n) es **real y simétrica**, entonces existe una base ortonormal de \mathbb{R}^n formada por autovectores de \mathbf{A} .

Para finalizar, demostramos un último resultado acerca de la diagonalización de matrices simétricas:

Proposición 18.4.5. Los autovectores correspondientes a autovalores distintos, de una matriz simétrica, son ortogonales entre sí

Demostración. Considere dos autovectores, \mathbf{x} e \mathbf{y} , correspondientes a autovalores distintos: $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda_1\mathbf{x}$ y $\mathbf{A}\mathbf{y} = \lambda_2\mathbf{y}$. Entonces

$$\lambda_1 \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x}(\mathbf{A}^{\top})\mathbf{y} = \mathbf{x}\mathbf{A}\mathbf{y} = \lambda_2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}).$$

Puesto que $\lambda_1 \neq \lambda_2$ necesariamente:

$$\lambda_1(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) - \lambda_2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) = 0 \implies (\lambda_1 - \lambda_2)\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0 \implies \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0.$$

\square

EJERCICIO 62. Demuestre la siguiente proposición:

Proposición 18.4.6. Si una matriz es diagonalizable ortogonalmente, entonces es simétrica.

Para finalizar, la demostración del Teorema 18.4.3 nos describe el algoritmo para diagonalizar \mathbf{A} ortogonalmente y obtener una matriz ortogonal \mathbf{Q} de autovectores; pero, como toda matriz simétrica es diagonalizable, también podemos obtener una matriz \mathbf{Q} aplicando el algoritmo descrito en la demostración del Teorema 17.2.4 de diagonalización por bloques triangulares: primero aplicamos la diagonalización por semejanza

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{esp}(\boldsymbol{\tau}_1^{-1} \dots \boldsymbol{\tau}_p^{-1})]{\boldsymbol{\tau}_1 \dots \boldsymbol{\tau}_p} \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{S} \end{bmatrix} \quad \text{donde } \mathbf{S} = \mathbf{I}_{\boldsymbol{\tau}_1 \dots \boldsymbol{\tau}_p},$$

y a continuación aplicamos Gram-Schmidt sobre las columnas de \mathbf{S} para asegurarnos que las columnas de \mathbf{S} que corresponden a autovalores repetidos son perpendiculares; finalmente normalizamos todas las columnas para obtener una matriz \mathbf{Q} .

Formas cuadráticas

19.1. Formas cuadráticas y matrices definidas positivas

Un polinomio es una expresión que contiene variables y coeficientes, y en la que únicamente están involucradas las operaciones de suma, resta, producto y exponentes no negativos de las variables. Un ejemplo de polinomio en x es $x^2 - 4x + 7$. Y un ejemplo de polinomio en tres variables es $x^3 + 2xyz^2 - yz + 1$.

El grado de un polinomio es el mayor de los grados de sus monomios (o términos individuales) con coeficientes no nulos. El grado de cada término es la suma de los exponentes de las variables que aparecen en él, y por tanto nunca es negativo. Así, para los ejemplos anteriores, el grado del polinomio $x^2 - 4x^1 + 7x^0$ es dos; y el grado del polinomio $x^3 + 2x^1y^1z^2 - y^1z^1 + 1$ es cuatro ($1 + 1 + 2$).

Definición 19.1. Una forma cuadrática es un polinomio en el que todos sus términos son de grado dos.

Por ejemplo, $4x^2 + 2xy - 3y^2$ es una forma cuadrática en las variables x e y .

19.1.1. Formas cuadráticas reales

Toda matriz \mathbf{A} simétrica y de orden n define una forma cuadrática $q_{\mathbf{A}}$ en n variables mediante la siguiente fórmula:

$$q_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}\mathbf{A}\mathbf{x}.$$

Recíprocamente, dada una forma cuadrática en n variables, sus coeficientes se pueden arreglar en una matriz simétrica de orden n . Volviendo al ejemplo de más arriba

$$4x^2 + 2xy - 3y^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

y con la matriz $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ formamos la forma cuadrática

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & \\ -2 & 3 & \\ & & 5 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 - 4xy + 3y^2 + 5z^2.$$

19.1.2. Matrices definidas positivas

Definición 19.2. Una matriz simétrica $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es **definida positiva** si para todo vector $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ de \mathbb{R}^n , $\mathbf{x}\mathbf{A}\mathbf{x} > 0$.

Como consecuencia de la definición tenemos que

Proposición 19.1.1. Si \mathbf{A} tiene rango n , entonces $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ es definida positiva.

Demostración. Por una parte,

$$\mathbf{x}(\mathbf{A}^T)\mathbf{Ax} = (\mathbf{Ax}) \cdot (\mathbf{Ax}) = \|\mathbf{Ax}\|^2 \geq 0.$$

Pero como \mathbf{A} es de rango completo por columnas, si $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{Ax} \neq \mathbf{0}$; y por tanto $\mathbf{xAx} = \|\mathbf{Ax}\|^2 > 0$. \square

Hay una estrecha relación entre los signos de los autovalores de la matriz y el signo de la forma cuadrática asociada.

Proposición 19.1.2. *Una matriz real y simétrica de orden n es definida positiva si y sólo si, son positivos todos sus autovalores.*

Demostración. La demostración se basa en la misma idea de la última demostración junto al hecho de que toda matriz real y simétrica es diagonalizable ortogonalmente de la forma $\mathbf{D} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q}$, donde \mathbf{D} tiene los autovalores de \mathbf{A} en la diagonal principal, y donde las columnas de \mathbf{Q} son autovectores correspondientes a dichos autovalores...

Puesto que \mathbf{A} es real y simétrica, tenemos que $\mathbf{A} = \mathbf{QDQ}^{-1}$ con $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T$; y por tanto

$$\mathbf{xAx} = \mathbf{xQD}(\mathbf{Q}^T)\mathbf{x} = ((\mathbf{Q}^T)\mathbf{x})\mathbf{D}((\mathbf{Q}^T)\mathbf{x}) = \mathbf{yDy}, \quad (\text{donde } \mathbf{y} = (\mathbf{Q}^T)\mathbf{x}).$$

De esta expresión es evidente que \mathbf{xAx} es es una suma ponderada de cuadrados:

$$\mathbf{xAx} = \mathbf{yDy} = (y_1, \dots, y_n) \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n \lambda_j (y_j^2)$$

donde las ponderaciones λ_j son los autovalores de \mathbf{A} . Como \mathbf{Q} es invertible, $\mathbf{y} = \mathbf{Q}^T\mathbf{x}$ es distinto de cero siempre que \mathbf{x} también lo sea. Por tanto, si los autovalores son positivos entonces la suma $\sum_{j=1}^n \lambda_j (y_j^2)$ es positiva.

Por otra parte, la forma cuadrática nunca puede ser positiva si algún autovalor λ_j es negativo o cero; para verlo basta elegir $\mathbf{y} = \mathbf{I}_{|j}$ para ver que $\mathbf{yDy} = {}_j|\mathbf{DI}|_j = {}_j|\mathbf{D}|_j = \lambda_j$. \square

EJERCICIO 63. Demuestre las siguientes proposiciones.

- (a) Si \mathbf{A} y \mathbf{B} son definidas positivas, entonces la suma $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$ también es definida positiva.
- (b) Si \mathbf{A} es simétrica y definida positiva, entonces \mathbf{A}^{-1} también es definida positiva.

19.2. Diagonalización de matrices simétricas por congruencia



Podemos diagonalizar cualquier matriz por congruencia (mediante eliminación Gaussiana de filas y columnas). En general, la matriz obtenida con este procedimiento no contiene los autovalores de la matriz original en su diagonal, pero permite expresar cualquier forma cuadrática como sumas y/o restas de términos al cuadrado. Así podremos comprobar si una matriz es definida positiva sin necesidad de calcular sus autovalores (basta comprobar que la expresión solo contiene sumas de cuadrados).

Este resultado tiene importancia práctica. No es posible encontrar las raíces de un polinomio cualquiera (tan solo está asegurado para polinomios de grado menor o igual a 4). Pero al menos, la diagonalización por congruencia nos revelará *los signos* de los autovalores de *cualquier matriz simétrica*. Este resultado se llama *Ley de inercia*^a.

^aAunque este año no incluiré su demostración, pues nos hemos dejado algunas cosas importantes por el camino que necesito para la demostración.

To-Do: Incluir demostración *ley de inercia* cuando haya incluido aplicaciones lineales en la primera parte del curso

Definición 19.3. Dos matrices \mathbf{A} y \mathbf{C} son congruentes si existe una matriz \mathbf{B} invertible tal que

$$\mathbf{C} = \mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B}.$$

En esta lección vamos a ver que, dada una matriz simétrica \mathbf{A} siempre es posible encontrar una matriz diagonal que es congruente con \mathbf{A} mediante transformaciones elementales de sus filas y columnas. La demostración que veremos más abajo describe los pasos a seguir para diagonalizar por congruencia (paso de inicio y paso de continuación). Pero antes de exponer la demostración, veamos un ejemplo de diagonalización por congruencia. El método consiste en tratar de escalonar una matriz, pero aplicaremos a las filas todas las operaciones que hayamos aplicado a las columnas.

Ejemplo 30. Vamos a diagonalizar la matriz $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ mediante eliminación, pero cada operación sobre las columnas, la repetiremos también sobre las filas:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} [(1)1+2] \\ [(2)2] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(2)2] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} [(1)1+2] \\ [(2)2] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(2)2] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} [(1)2+3] \\ [(3)3] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(3)3] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} [(1)2+3] \\ [(3)3] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(3)3] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix}.$$

Fíjese que aunque la matriz obtenida es diagonal, ni 6 ni 12 son autovalores de la matriz original (este método NO nos dice quienes son los autovalores). Pero como los tres componentes de la diagonal son positivos, sabemos que \mathbf{A} es definida positiva.

Y si en la diagonal tenemos un cero ¿qué podemos hacer?...Podemos sumar a la primera columna otra columna (aunque en un ejemplo posterior veremos que hay que hacerlo con cuidado, puesto no siempre funciona).

Ejemplo 31. Considere $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. La primera componente de la primera fila es un cero, así que no tenemos

un pivote con el que anular todo lo que queda a la derecha de la diagonal. Como la segunda columna si tiene un pivote en la primera fila, podemos sumar la segunda columna a la primera columna y lograr tener un pivote donde nos interesa (pero *recuerde que cada operación sobre las columnas se repite sobre las filas*):

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} [(1)2+1] \\ [(1)2+1] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(1)2+1] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} [(1)2+1] \\ [(1)2+1] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(1)2+1] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} [(-1)1+2] \\ [(-1)1+3] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(-1)1+2] \\ [(-1)1+3] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} [(-1)1+3] \\ [(-1)1+2] \\ [(2)2] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(-1)1+3] \\ [(-1)1+2] \\ [(2)2] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Un tercer ejemplo nos indica que debemos andar con cuidado cuando encontramos un cero en la diagonal.

Ejemplo 32. Considere la matriz, $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a \end{bmatrix}$ que tiene un cero en donde querríamos tener un pivote con el que eliminar todo lo que queda a su derecha (y por debajo).

Primer intento: podemos intentar la estrategia del ejemplo anterior, y sumar la segunda columna a la primera (y repetir la operación con las filas):

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} [(1)2+1] \\ [(1)2+1] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(1)2+1] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1+a \\ 1 & a \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} [(1)2+1] \\ [(1)2+1] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(1)2+1] \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 2+a & 1+a \\ 1+a & a \end{bmatrix}$$

y ahora con el pivote $(2 + a)$ podemos anular todo lo que está a su derecha (y por debajo), pero...¿cómo sabemos que es un pivote? si $a = -2$, estamos como al principio... (en el anterior ejemplo la estrategia funcionó porque sumamos un vector que tenía un cero en la diagonal,...este tenía el número a que puede hacer fallar el algoritmo)

Segundo intento: para que la estrategia anterior no falle, debemos asegurarnos de que el vector que sumamos a la primera columna tiene un cero en la componente situada en la diagonal. Como en este caso no hay un vector así, sencillamente intercambiamos filas y columnas para colocar el cero de la primera posición de la diagonal en otro lugar.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\tau]{[1 \rightleftharpoons 2]} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\tau]{[1 \rightleftharpoons 2]} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ahora ya podemos eliminar todo lo que queda a la derecha y por debajo del *pivote* sin problemas.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\tau]{[1 \rightleftharpoons 2]} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\tau]{[1 \rightleftharpoons 2]} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\tau]{\begin{matrix} [(2)2] \\ [(1)1+2] \end{matrix}} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\tau]{\begin{matrix} [(1)1+2] \\ [(2)2] \end{matrix}} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Vayamos con la demostración de los pasos para diagonalizar por congruencia:

Proposición 19.2.1 (Paso de inicio). *Dada una matriz \mathbf{A} , simétrica y de orden n , existe una matriz no singular \mathbf{B} tal que $\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B}$ es una matriz simétrica de la forma*

$$\left[\begin{array}{c|c} * & \\ \hline & \mathbf{A}' \\ & (n-1) \times (n-1) \end{array} \right].$$

Demostración. Tenemos tres casos:

Caso trivial. Si \mathbf{A} ya tiene la forma de más arriba, es decir, si a la derecha y por debajo de a_{11} son todos ceros, entonces basta que \mathbf{B} sea la matriz identidad.

En caso contrario hay dos posibilidades: que a_{11} sea cero, o que no lo sea.

Caso 1 ($a_{11} \neq 0$). Cuando a_{11} es un pivote se pueden anular los componentes situados a su derecha por eliminación, y aplicando las mismas operaciones sobre las filas llegamos a la siguiente matriz congruente con \mathbf{A} :

$$\tau_k \cdots \tau_1 \mathbf{A} \tau_1 \cdots \tau_k = \mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B} = \left[\begin{array}{c|c} a_{11} & \\ \hline & \mathbf{A}' \\ & (n-1) \times (n-1) \end{array} \right]; \quad \text{donde } \mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k} = \mathbf{B}.$$

Caso 2 ($a_{11} = 0$). En este caso hay dos posibilidades: que algún otro elemento de la diagonal principal sea distinto de cero, o que todos los elementos de la diagonal sean cero.

- Si el elemento a_{jj} (con $j > 1$) es distinto de cero; intercambiamos la primera columna con la j -ésima, de manera que ahora el elemento no nulo se encuentra en la posición $(j, 1)$ y a continuación se intercambia la fila j -ésima por la primera, con lo que el componente no nulo finalmente termina por situarse en la posición $(1, 1)$. Con lo que hemos llegado al **Caso 1**.
- Si todos los elementos de la diagonal principal son nulos —y puesto que algún elemento a_{1j} es distinto de cero (pues no estamos en el **Caso Trivial**)— sumamos \mathbf{A}_{1j} a la primera columna, y por

tanto, también sumamos $j|\mathbf{A}$ a la primera fila. Entonces tendremos que

$$\begin{matrix} \tau & & \\ [(1)j+1] & \mathbf{A} & \tau \\ & [(1)j+1] & \end{matrix} = \left[\begin{array}{c|ccc} 2a_{1j} & * & \dots & * \\ * & & & \\ \vdots & & & \\ * & & & \end{array} \right] ;$$

así que de nuevo hemos llegado al Caso 1.

□

Proposición 19.2.2 (Paso de continuación). *Dada una matriz simétrica de orden n de la forma*

$$\left[\begin{array}{c|ccc} * & & & \\ & \ddots & & \\ & & * & \\ \hline & & & \mathbf{A}' \end{array} \right],$$

$k \times k$

existe una matriz no singular \mathbf{B} tal que $\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B}$ es una matriz simétrica de la forma

$$\left[\begin{array}{c|ccc} * & & & \\ & \ddots & & \\ & & * & \\ \hline & & & \mathbf{A}'' \end{array} \right].$$

$(k-1) \times (k-1)$

Demostración. La demostración es como la del *Paso de Inicio*, pero trabajando con las filas y columnas de la submatriz \mathbf{A}' . □

De la combinación de las dos proposiciones anteriores llegamos al siguiente corolario:

Corolario 19.2.3. *Para toda matriz simétrica de orden n , existe una matriz invertible \mathbf{B} tal que $\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B}$ es diagonal.*

Ejemplo 33. Diagonalice por congruencia la matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Piense en qué pasos debe sumar una columna (y una fila) para generar un pivote en la diagonal, y cuando debe intercambiar columnas (y filas).

Librería NAcAL para Python

```
A = Matrix([[0,1,0,0],[1,0,1,1],[0,1,0,1],[0,1,1,1]])
D = DiagonalizaC(A,1)
```

19.3. Algunos tipos de formas cuadráticas



Ahora usaremos el signo de los pivotes de la matriz diagonalizada por congruencia (y su rango) para decidir el signo de las formas cuadráticas.

Decimos que una forma cuadrática (y su correspondiente matriz de orden n) es

- Definida positiva si para cualquier $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ no nulo se verifica que $\mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$.

- Semi-definida positiva si para cualquier $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ no nulo se verifica que $\mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$.
- Definida negativa si para cualquier $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ no nulo se verifica que $\mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{x} < 0$.
- Semi-definida negativa si para cualquier $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ no nulo se verifica que $\mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$.
- Indefinida si no es ni semi-definida positiva ni semi-definida negativa.

Nótese que si \mathbf{A} es (*semi*-) definida positiva, entonces $(-\mathbf{A})$ es (*semi*-) definida negativa.

EJERCICIO 64. Demuestre que si \mathbf{A} es definida positiva, entonces todos los elementos de la diagonal deben ser positivos (y si es semidefinida positiva todos los elementos de la diagonal deben ser no negativos).

To-Do: Me falta la otra regla: $|a_{ij}| < |a_{ii}|$

19.4. Completar el cuadrado para clasificar las formas cuadráticas

Se denomina “completar el cuadrado” a expresar una forma cuadrática $\mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{x}$ como sumas (y/o restas) de términos al cuadrado. Pues bien, la diagonalización por congruencia nos permite encontrar muchas formas distintas de completar el cuadrado. Basta darse cuenta de que dada \mathbf{A} (simétrica), para toda \mathbf{B} invertible tal que $\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B}$ es diagonal, tenemos que

$$\mathbf{D} = \mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = (\mathbf{B}^{-1})^T \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{B}^{-1}$$

y por tanto, denotando con \mathbf{y} al vector $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{x}$, la forma cuadrática se puede expresar como

$$\mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{y} \mathbf{D} \mathbf{y} = \sum d_{jj} (y_j)^2;$$

es decir, como una suma de los cuadrados de los elementos del vector $\mathbf{y} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{x}$ ponderados por los elementos de la diagonal de \mathbf{D} . Así, si todos los pivotes de \mathbf{D} son positivos la correspondiente forma cuadrática es definida positiva. Por tanto, hemos demostrado la siguiente proposición:

Proposición 19.4.1. Una matriz real y simétrica de orden n es definida positiva si y sólo si, es congruente con una matriz diagonal cuyos pivotes son todos mayores que cero.

Es lo que ocurría con la matriz del Ejemplo 30 en la página 183. Vamos repetir su diagonalización, pero ahora realizando solo transformaciones Tipo I (así minimizamos el número de operaciones, con lo que facilitamos pensar quien es la inversa de \mathbf{B} ; y además no modificamos su determinante, por lo que el producto de los sucesivos pivotes de \mathbf{D} calcula los sucesivos *menores* de la matriz):

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(\frac{1}{2})^T 1+2]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(\frac{1}{2})^T 1+2]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(\frac{2}{3})^T 2+3]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & -1 & \frac{4}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{[(\frac{2}{3})^T 2+3]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}.$$

Así, la forma cuadrática $\mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{x}$ se puede re-escribir como suma de cuadrados: ¹

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{x} &= (x \quad y \quad z) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -2/3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 3/2 & \\ & & 4/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{x} (\mathbf{B}^{-1})^T \mathbf{D} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{x} \\ &= ((x-1/2y) \quad (y-2/3z) \quad z) \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 3/2 & \\ & & 4/3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} (x-1/2y) \\ (y-2/3z) \\ z \end{pmatrix} = (\mathbf{B}^{-1} \mathbf{x}) \cdot \mathbf{D} \cdot (\mathbf{B}^{-1} \mathbf{x}) \\ &= 2 \cdot (x-1/2y)^2 + 3/2 \cdot (y-2/3z)^2 + 4/3 \cdot (z)^2 = \sum_j |\mathbf{D}_{jj}| \cdot (y_j)^2 \quad (\text{con } \mathbf{y} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{x}). \end{aligned}$$

¹Esto está relacionado con la factorización LDU, Y ahora que he separado la eliminación (de izquierda a derecha) de la eliminación Gaussiana (intercambio), el resultado de la factorización $\mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{L} \mathbf{U}$ es casi inmediato. Quizá debería volver a contar la factorización LU tras la Lección 5.

$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ es una suma de tres términos al cuadrado, cada uno de ellos multiplicado por un pivote de \mathbf{D} ; como todos los pivotes son positivos, la forma cuadrática es evidentemente definida positiva. Algo que también podemos verificar en este caso si calculamos los tres autovalores, pues la ecuación característica de \mathbf{A} es

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^3 - 2(2-\lambda) = 0 \implies \begin{cases} \lambda = 2 \\ (2-\lambda)^2 - 2 = \lambda^2 - 4\lambda + 2 \end{cases} \begin{cases} \lambda = 2 + \sqrt{2} \\ \lambda = 2 - \sqrt{2} \end{cases}.$$

De manera similar, como la matriz diagonal del Ejemplo 31 en la página 183 tiene dos pivotes negativos y uno positivo, deducimos que la correspondiente forma cuadrática es indefinida (y de hecho, los correspondientes autovalores son -1 (doble) y 2).

Librería NAcAL para Python

```
A = Matrix([[0,1,0,0],[1,0,1,1],[0,1,0,1],[0,1,1,1]])
D = DiagonalizaC(A,1)
B = D.B
~B*A*B                                # D es congruente con A
```



Nota 4. El Teorema Espectral muestra una forma muy especial de completar el cuadrado de una forma cuadrática; pues la diagonalización

$$\mathbf{D} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q},$$

lo es simultáneamente por semejanza y por congruencia.

Corolario 19.4.2. Si una matriz real y simétrica de orden n es congruente con una matriz diagonal cuyos pivotes son todos mayores que cero, entonces sus autovalores también son mayores que cero.

Resumen de los temas por lecciones

A.1. Resumen del Tema 1

El tema consta de cinco lecciones que resumimos a continuación.

Lección 1.

En la primera lección solo se establece la notación para vectores, matrices, y operadores selectores junto con algunas reglas de reescritura. Por ejemplo, estas dos reglas de reescritura

$$\boxed{(a + b)_{|i} = a_{|i} + b_{|i}} \quad \text{y} \quad \boxed{(\lambda b)_{|i} = \lambda(b_{|i})}$$

definen la suma de vectores y su producto por escalares. Jugando con estas reglas se deducen las propiedades de la suma de vectores y producto por escalares que permitirán definir el *espacio vectorial* \mathbb{R}^n en el Tema 2. Las reglas

$$\boxed{(A + B)_{|j} = A_{|j} + B_{|j}} \quad \text{y} \quad \boxed{(\lambda B)_{|j} = \lambda(B_{|j})}$$

definen la suma de matrices y su producto por escalares (operando con las columnas). Como estas reglas son esencialmente iguales a las anteriores, se obtienen propiedades análogas, lo que permitirá definir el espacio vectorial $\mathbb{R}^{n \times m}$. ¡El juego con las reglas de reescritura, independientemente del significado que tengan los símbolos a o A da lugar a las mismas propiedades! Con la transposición de una matriz

$$\boxed{(A^T)_{|j} = {}_j|A}$$

mostraremos que las operaciones con matrices también se pueden definir como operaciones entre filas ${}_i|A$ (y también entre componentes ${}_i|A_{|j}$). Teniendo en cuenta que $\boxed{\lambda a = a\lambda}$ y que $\boxed{\lambda A = A\lambda}$, y jugando con la notación se deducen una serie de reglas de reescritura que se usarán en las siguientes lecciones: ¹

Reglas distributivas

$$\begin{aligned} (a + b)_{|i} &= a_{|i} + b_{|i} & {}_i|(a + b) &= {}_i|a + {}_i|b \\ (A + B)_{|j} &= A_{|j} + B_{|j} & {}_i|(A + B) &= {}_i|A + {}_i|B \end{aligned}$$

Reglas asociativas (desplazando el paréntesis)

$$\begin{aligned} (\lambda b)_{|i} &= \lambda(b_{|i}) & {}_i|(b\lambda) &= ({}_i|b)\lambda \\ (\lambda A)_{|j} &= \lambda(A_{|j}) & {}_i|(A\lambda) &= ({}_i|A)\lambda \end{aligned}$$

¹De hecho, la librería de Python solo se implementan las reglas recuadradas...y entonces ¡todo lo demás funciona automáticamente!

Intercambio entre el escalar y el operador

$$\begin{aligned}(b\lambda)_{|i} &= (b_{|i})\lambda & {}_{|i}(\lambda b) &= \lambda({}_{|i}b) \\ (\mathbf{A}\lambda)_{|j} &= (\mathbf{A}_{|j})\lambda & {}_{|i}(\lambda \mathbf{A}) &= \lambda({}_{|i}\mathbf{A})\end{aligned}$$

Lección 2

Comienza con el *producto punto* (o producto escalar usual) de dos vectores de \mathbb{R}^n y sus propiedades.²

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_i a_i b_i$$

El uso del producto punto nos dota de una notación muy compacta (sin sumatorios).

La Lección 2 trata de *combinaciones lineales* de vectores de \mathbb{R}^n y su notación matricial $\mathbf{A}\mathbf{b}$ (combinación de las columnas de \mathbf{A}) y $\mathbf{a}\mathbf{B}$ (combinación de las filas de \mathbf{B}).

$$\mathbf{A}\mathbf{b} = \sum_j (\mathbf{A}_{|j})b_j \quad \text{y} \quad \mathbf{a}\mathbf{B} = (\mathbf{B}^\top)\mathbf{a}$$

Usando las reglas de reescritura de la lección anterior, se deducen nuevas reglas para el producto de una matriz por un vector a su derecha $\mathbf{A}\mathbf{b}$:

Propiedades de linealidad

- $\mathbf{A}(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{A}\mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{c}$
- $\mathbf{A}(\lambda\mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{b})$

Otras propiedades

- $\mathbf{A}(\lambda\mathbf{b}) = (\lambda\mathbf{A})\mathbf{b}$
- $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{c} = \mathbf{A}\mathbf{c} + \mathbf{B}\mathbf{c}$
- $\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{c}) = \left[\mathbf{A}(\mathbf{B}_{|1}), \dots, \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|n}) \right] \mathbf{c}$

y propiedades análogas para el producto de un vector por una matriz $\mathbf{a}\mathbf{B}$.

Adicionalmente, y solo en las transparencias de la clase correspondiente a esta lección, se adelanta la interpretación geométrica de un sistema de ecuaciones $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$...¿qué combinaciones lineales de las columnas ($\mathbf{A}\mathbf{x}$) son iguales al vector del lado derecho \mathbf{b} ?

Lección 3.

Trata sobre el *producto de matrices*.

$$(\mathbf{AB})_{|j} = \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|j})$$

(cada columna de \mathbf{AB} es una combinación de las columnas de \mathbf{A}). Jugando con la definición y con las reglas de reescritura de las lecciones anteriores se deducen las siguientes propiedades

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ▪ $\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{c}) = (\mathbf{AB})\mathbf{c}$ | ▪ $\mathbf{A}(\lambda\mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{AB})$ |
| ▪ $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$ | ▪ $\mathbf{A}(\lambda\mathbf{B}) = (\lambda\mathbf{A})\mathbf{B}$ |
| ▪ $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC}$ | ▪ $\mathbf{IA} = \mathbf{A}$ |
| ▪ $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$ | ▪ $\mathbf{AI} = \mathbf{A}$ |

²Como en este material se hace una marcada distinción entre vectores y matrices, aquí carece de sentido “transponer un vector”. Así evitamos el frecuente abuso de notación del que hacen uso otros textos.

Y continuado con el mismo juego de manipulación de símbolos, se deducen nuevas interpretaciones del producto

$${}_i(\mathbf{AB}) = ({}_i\mathbf{A})\mathbf{B} \quad \text{y} \quad {}_i(\mathbf{AB})_{|j} = ({}_i\mathbf{A}) \cdot (\mathbf{B}_{|j})$$

es decir, las filas de \mathbf{AB} son combinaciones lineales de las filas de \mathbf{B} , y los elementos de \mathbf{AB} son productos punto de las filas de \mathbf{A} con las columnas de \mathbf{B} . Aquí se evidencian las bondades de la notación. Una expresión como

$${}_i\mathbf{AB}_{|j}$$

se puede interpretar como el elemento de la fila i , y columna j de \mathbf{AB} , como el elemento i ésimo de la combinación de las columnas $\mathbf{A}(\mathbf{B}_{|j})$, como el elemento j ésimo de una combinación de las filas $({}_i\mathbf{A})\mathbf{B}$, o como el producto escalar de la fila ${}_i\mathbf{A}$ con la columna $\mathbf{B}_{|j}$. Todas estas interpretaciones son correctas, y todas ellas están sugeridas en la expresión, ${}_i\mathbf{AB}_{|j}$. Es destacable la potencia computacional de la notación (véase la demostración de $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top(\mathbf{A}^\top)$ así como su implementación en la librería de Python).

Lección 4

Trata sobre las *transformaciones elementales*, y su uso en el *método de eliminación*.

Aquí solo consideramos dos tipos de transformaciones elementales:

- $\tau_{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}$ suma λ veces el vector i ésimo al j ésimo.
- $\tau_{[(\alpha)\mathbf{i}]}$ multiplica por α el vector i ésimo.

Llamamos *matriz elemental* a la matriz resultante de aplicar una única transformación elemental sobre las columnas (o bien sobre las filas) de una matriz identidad

$$\mathbf{I}_\tau \quad \text{o} \quad {}_\tau\mathbf{I}$$

Dada la transformación elemental, τ , las dos matrices elementales de más arriba son una la transpuesta de la otra. Por tanto, la transpuesta de una matriz elemental es otra matriz elemental. Aplicar una transformación elemental a una matriz es equivalente a multiplicarla por la correspondiente matriz elemental, es decir

$$\mathbf{A}_\tau = \mathbf{A}(\mathbf{I}_\tau) \quad \text{y} \quad {}_\tau\mathbf{A} = ({}_\tau\mathbf{I})\mathbf{A}.$$

Para describir la aplicación de la secuencia $\tau_1 \dots \tau_k$ de k transformaciones elementales de las *columnas* de \mathbf{A} usamos el esquema.³

$$\mathbf{A} \xrightarrow{\tau_1} (\mathbf{A}_{\tau_1}) \xrightarrow{\tau_2} (\mathbf{A}_{\tau_1\tau_2}) \dots \xrightarrow{\tau_k} (\mathbf{A}_{\tau_1\dots\tau_k}) \quad \text{o agregando varios pasos} \quad \mathbf{A} \xrightarrow[\tau_1]{\tau_1 \dots \tau_p} (\mathbf{A}_{\tau_1\dots\tau_p}) \xrightarrow[\tau_{p+1}]{\tau_{p+1} \dots \tau_k} (\mathbf{A}_{\tau_1\dots\tau_k}).$$

Cuando se aplica la sucesión $\tau_1 \dots \tau_k$ de k transformaciones elementales sobre las *columnas*, o bien la sucesión $\tau_k \dots \tau_1$ de k transformaciones elementales sobre las *filas* (nótese el distinto orden en las sucesiones) se obtienen relaciones similares a las que encontramos al aplicar una única transformación:

$$\mathbf{A}_{\tau_1\dots\tau_k} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1\dots\tau_k}) \quad \text{y} \quad {}_{\tau_1\dots\tau_k}\mathbf{A} = ({}_{\tau_1\dots\tau_k}\mathbf{I})\mathbf{A}.$$

³De manera análoga, para describir una secuencia de transformaciones elementales de las *filas* de \mathbf{A} (donde τ_1 es la primera que se aplica, luego τ_1 , ...y por último τ_k) se debe usar el siguiente esquema

$$\mathbf{A} \xrightarrow{\tau_1} ({}_{\tau_1}\mathbf{A}) \xrightarrow{\tau_2} ({}_{\tau_2\tau_1}\mathbf{A}) \dots \xrightarrow{\tau_k} ({}_{\tau_k\dots\tau_1}\mathbf{A}) \quad \text{o agregando varios pasos} \quad \mathbf{A} \xrightarrow[\tau_1]{\tau_p \dots \tau_1} ({}_{\tau_p\dots\tau_1}\mathbf{A}) \xrightarrow[\tau_{p+1}]{\tau_k \dots \tau_{p+1}} ({}_{\tau_k\dots\tau_1}\mathbf{A});$$

donde la secuencia $\tau_k \dots \tau_1$ es la transpuesta de la secuencia $\tau_1 \dots \tau_k$, es decir, $(\tau_1 \dots \tau_k)^\top = \tau_k \dots \tau_1$, pues al actuar por la izquierda, las primeras transformaciones que se aplican son la que están más a la derecha de la secuencia. Por tanto ${}_{\tau_k\dots\tau_1}\mathbf{I}$ es la transpuesta de $\mathbf{I}_{\tau_1\dots\tau_k}$ (cuando ambas tienen el mismo orden).

Es posible realizar un *intercambio* de posición entre dos vectores mediante una sucesión de transformaciones elementales:

- $\begin{matrix} \tau \\ [i \rightleftharpoons j] \end{matrix}$ intercambia de posición los vectores *i*ésimo y *j*ésimo.

Llamamos matriz de intercambio a la matriz resultante de aplicar un único intercambio entre dos columnas (o bien dos filas) de una matriz identidad.

$$\mathbf{I}_{\tau_{[i \rightleftharpoons j]}} \quad \text{o} \quad \begin{matrix} \tau \\ [i \rightleftharpoons j] \end{matrix} \mathbf{I}$$

Las matrices intercambio son simétricas (por lo que estas dos de arriba son iguales si tienen el mismo orden). Aplicar un intercambio a una matriz es equivalente a multiplicarla por la correspondiente matriz de intercambio, es decir

$$\mathbf{A}_{\tau_{[i \rightleftharpoons j]}} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \tau \\ & [i \rightleftharpoons j] \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{matrix} \tau \\ [i \rightleftharpoons j] \end{matrix} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \tau & \mathbf{I} \\ [i \rightleftharpoons j] \end{pmatrix} \mathbf{A}.$$

La aplicación de una sucesión de intercambios da lugar a un reordenamiento de los vectores. Denominamos *matriz permutación* a la matriz que resulta tras una sucesión de intercambios en las columnas (o en las filas) de la matriz identidad. De nuevo tenemos que

$$\mathbf{A}_{\tau_{[\odot]}} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \tau \\ & [\odot] \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{matrix} \tau \\ [\odot] \end{matrix} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \tau & \mathbf{I} \\ [\odot] \end{pmatrix} \mathbf{A}$$

(la flecha circular denota un reordenamiento de las columnas (o de las filas) de la matriz).

Mediante una sucesión de transformaciones elementales es posible pre-escalonar cualquier matriz. La demostración de este importante teorema describe la implementación del método en Python. A este procedimiento se le llama *Método de eliminación*. Hay dos extensiones más: la *eliminación Gaussiana* que escalona la matriz reordenando las columnas y la *eliminación Gauss-Jordan*, que reduce la matriz escalonada.

Lección 5.

Trata sobre la *inversión de las transformaciones elementales* y la *inversión de matrices* (cuando es posible) aplicando el Método de eliminación Gauss-Jordan.

Definimos la inversa de \mathbf{A} de orden n (por tanto *cuadrada*) como aquella matriz \mathbf{B} tal que $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}$. Y demostramos que, si existe \mathbf{B} , es única y la denotamos por \mathbf{A}^{-1} . A continuación se demuestra que:

- Si \mathbf{A} y \mathbf{B} tienen inversa, entonces $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{A}^{-1})$.
- Si \mathbf{B} es invertible, entonces \mathbf{AB} es invertible si y solo si \mathbf{A} es invertible.
- Si \mathbf{A} es invertible, entonces \mathbf{AB} es invertible si y solo si \mathbf{B} es invertible.
- Si \mathbf{A} es invertible, entonces $(\mathbf{A}^{\top})^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^{\top}$.
- Si \mathbf{A} tiene alguna columna (o fila) nula entonces no tiene inversa.

Todas *las transformaciones elementales* se pueden deshacer (todas *son invertibles*), lo que implica que *todas las matrices elementales son invertibles*. En la segunda parte de lección relacionamos la invertibilidad de una matriz con las transformaciones elementales, pues cualquier matriz de la forma $\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ es invertible por ser producto de matrices elementales:

$$\left(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k} \right) \left(\mathbf{I}_{\tau_k^{-1} \dots \tau_1^{-1}} \right) = \mathbf{E}_1 \dots \mathbf{E}_k \cdot \mathbf{E}_k^{-1} \dots \mathbf{E}_1^{-1} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k \cdot \tau_k^{-1} \dots \tau_1^{-1}} = \mathbf{I}.$$

Siguiendo esta idea, se demuestra que

- Si \mathbf{A} es producto de matrices elementales, entonces es invertible.

- Si \mathbf{A} tiene columnas que son combinación lineal del resto, entonces no es invertible.
- \mathbf{A} es invertible si y solo si sus formas escalonadas \mathbf{L} son invertibles.

A continuación se demuestra que toda matriz cuadrada \mathbf{L} escalonada y sin columnas nulas se puede transformar en la matriz identidad mediante transformaciones elementales (de nuevo la demostración indica los pasos para implementar el algoritmo en Python). Esto da lugar a un corolario que establece que las siguientes propiedades son equivalentes

1. El resultado de escalonar \mathbf{A} no tiene columnas nulas.
2. \mathbf{A} es producto de matrices elementales.
3. \mathbf{A} tiene inversa.

A continuación se demuestra que si \mathbf{A} y \mathbf{B} son cuadradas y del mismo orden, y $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$, entonces \mathbf{A} y \mathbf{B} son una la inversa de la otra.

En la lección anterior vimos que el [Método de eliminación](#) permite encontrar una forma pre-escalonada de toda matriz (Teorema 4.4.2 en la [página 53](#))

$$\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_p} = \mathbf{K},$$

y, si \mathbf{K} no tiene columnas nulas, se puede continuar con las transformaciones elementales hasta transformar \mathbf{K} en \mathbf{I} (Teorema 5.1.10 en la [página 60](#))

$$\mathbf{K}_{\tau_{(p+1)} \dots \tau_k} = \mathbf{I}.$$

Por tanto, la sucesión de k transformaciones elementales $\tau_1 \dots \tau_p, \tau_{(p+1)} \dots \tau_k$ transforma \mathbf{A} en \mathbf{I} , es decir,

$$\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = \mathbf{I};$$

así, si \mathbf{L} no tiene columnas nulas, entonces $\boxed{\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}}$. Por otra parte, \mathbf{A}^{-1} no existe cuando \mathbf{L} tiene columnas nulas.

La lección finaliza proponiendo un método para encontrar la inversa a la vez que se transforma \mathbf{A} en \mathbf{I} , y dando una definición de *rango* de una matriz (el número de columnas no nulas de cualquiera de sus formas escalonadas).

Aquí finaliza el primer tema del curso.

Soluciones a los Ejercicios

Ejercicio 1. $(3*b)|_2$, primero multiplica el vector por 3. Después selecciona la segunda componente. En $3*(b|_2)$, primero se selecciona la segunda componente. Luego multiplica dicha componente por 3. $3*b|_2$ hace exactamente lo mismo que con la primera expresión (pues $*$ tiene precedencia sobre $|$).

□

Ejercicio 2. Como en Python el operador $+$ tiene precedencia sobre $|$, en la expresión $b+b|_2$ primero se suman los vectores, y luego se selecciona la segunda componente del resultado.

Pero para nosotros la expresión es incorrecta, pues entendemos $b + b|_2$ como la suma del vector b con la segunda componente de b ; y la operación suma entre un vector y un número *no está definida*.

El modo correcto de escribir la operación sería $(b + b)|_2$, así que, por claridad, en Python también deberíamos escribir $(b+b)|_2$.

□

Ejercicio 3. Mostraremos ambas estrategias en cada caso. En el caso de la segunda, en azul aparecen las operaciones entre números reales.

1. Estrategia 1:

$$a + b = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_m + b_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 + a_1 \\ \vdots \\ b_m + a_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} = b + a.$$

$$\text{Estrategia 2: } (a + b)_{|i} = a_{|i} + b_{|i} = b_{|i} + a_{|i} = (b + a)_{|i}.$$

2. Estrategia 1:

$$\begin{aligned} a + (b + c) &= \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} + \left(\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 + c_1 \\ \vdots \\ b_m + c_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 + c_1 \\ \vdots \\ a_m + b_m + c_m \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_m + b_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \right) + \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} = (a + b) + c. \end{aligned}$$

Estrategia 2:

$$\begin{aligned} (a + (b + c))_{|i} &= a_{|i} + (b + c)_{|i} = a_{|i} + (b_{|i} + c_{|i}) = (a_{|i} + b_{|i}) + c_{|i} \\ &= (a + b)_{|i} + c_{|i} = ((a + b) + c)_{|i}. \end{aligned}$$

3. Estrategia 1:

$$0 + a = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 + a_1 \\ \vdots \\ 0 + a_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} = a.$$

$$\text{Estrategia 2: } (0 + a)_{|i} = 0_{|i} + a_{|i} = 0 + a_{|i} = a_{|i}.$$

4. Estrategia 1:

$$\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a_1 \\ \vdots \\ -a_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 - a_1 \\ \vdots \\ a_m - a_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

Estrategia 2: $(\mathbf{a} + (-\mathbf{a}))_{|i} = \mathbf{a}_{|i} + (-\mathbf{a})_{|i} = 0 = \mathbf{0}_{|i}.$

5. Estrategia 1:

$$\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} \lambda(a_1 + b_1) \\ \vdots \\ \lambda(a_m + b_m) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 + \lambda b_1 \\ \vdots \\ \lambda a_m + \lambda b_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \vdots \\ \lambda a_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda b_1 \\ \vdots \\ \lambda b_m \end{pmatrix} = \lambda \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b}.$$

Estrategia 2: $(\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}))_{|i} = \lambda((\mathbf{a} + \mathbf{b})_{|i}) = \lambda(\mathbf{a}_{|i} + \mathbf{b}_{|i}) = \lambda(\mathbf{a}_{|i}) + \lambda(\mathbf{b}_{|i}) = (\lambda \mathbf{a})_{|i} + (\lambda \mathbf{b})_{|i} = (\lambda \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b})_{|i}.$

6. Estrategia 1:

$$(\lambda + \eta)\mathbf{a} = \begin{pmatrix} (\lambda + \eta)a_1 \\ \vdots \\ (\lambda + \eta)a_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 + \eta a_1 \\ \vdots \\ \lambda a_m + \eta a_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \vdots \\ \lambda a_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \eta a_1 \\ \vdots \\ \eta a_m \end{pmatrix} = \lambda \mathbf{a} + \eta \mathbf{a}.$$

Estrategia 2: $((\lambda + \eta)\mathbf{a})_{|i} = (\lambda + \eta)(\mathbf{a}_{|i}) = \lambda(\mathbf{a}_{|i}) + \eta(\mathbf{a}_{|i}) = (\lambda \mathbf{a})_{|i} + (\eta \mathbf{a})_{|i} = (\lambda \mathbf{a} + \eta \mathbf{a})_{|i}.$

7. Estrategia 1:

$$\lambda(\eta \mathbf{a}) = \lambda \begin{pmatrix} \eta a_1 \\ \vdots \\ \eta a_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \eta a_1 \\ \vdots \\ \lambda \eta a_m \end{pmatrix} = \lambda \eta \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} = (\lambda \eta) \mathbf{a}.$$

Estrategia 2: $(\lambda(\eta \mathbf{a}))_{|i} = \lambda((\eta \mathbf{a})_{|i}) = \lambda(\eta(\mathbf{a}_{|i})) = (\lambda \eta)(\mathbf{a}_{|i}) = ((\lambda \eta) \mathbf{a})_{|i}.$

8. Estrategia 1:

$$1\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \cdot a_1 \\ \vdots \\ 1 \cdot a_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} = \mathbf{a}.$$

Estrategia 2: $(1\mathbf{a})_{|i} = 1(\mathbf{a}_{|i}) = \mathbf{a}_{|i}.$

□

Ejercicio 4(a) Primero multiplica el vector por 3 y luego selecciona la primera componente.

□

Ejercicio 4(b) ¡Selecciona la tercera componente del vector!

□

Ejercicio 4(c) ¡También selecciona la tercera componente del vector!

□

Ejercicio 4(d) Como en la primera expresión, primero multiplica el vector por 3 y luego selecciona la primera componente.

□

Ejercicio 5(a) ${}_{k|}(\mathbf{A}^\top)_{|j} = {}_{k|}((\mathbf{A}^\top)_{|j}) = {}_{k|}({}_{j|}\mathbf{A}) = ({}_{j|}\mathbf{A})_{|k} = {}_{j|}\mathbf{A}_{|k}.$

□

Ejercicio 5(b) ${}_{j|}((\mathbf{A}^\top)^\top)_{|k} = {}_{k|}(\mathbf{A}^\top)_{|j} = {}_{j|}\mathbf{A}_{|k}.$

□

Ejercicio 5(c) $\mathbf{A}_{|i} = ((\mathbf{A}^\top)^\top)_{|i} = {}_{i|}(\mathbf{A}^\top).$

□

Ejercicio 6. Las demostraciones son prácticamente idénticas a las vistas en el caso de los vectores. En azul aparecen las operaciones entre vectores.

1. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|j} = \mathbf{A}_{|j} + \mathbf{B}_{|j} = \mathbf{B}_{|j} + \mathbf{A}_{|j} = (\mathbf{B} + \mathbf{A})_{|j}.$
2. $((\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C})_{|j} = (\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|j} + \mathbf{C}_{|j} = (\mathbf{A}_{|j} + \mathbf{B}_{|j}) + \mathbf{C}_{|j} = \mathbf{A}_{|j} + (\mathbf{B}_{|j} + \mathbf{C}_{|j}) = \mathbf{A}_{|j} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})_{|j} = (\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}))_{|j}.$
3. $(\mathbf{0} + \mathbf{A})_{|j} = \mathbf{0}_{|j} + \mathbf{A}_{|j} = \mathbf{0} + \mathbf{A}_{|j} = \mathbf{A}_{|j}.$
4. $(\mathbf{A} + (-\mathbf{A}))_{|j} = \mathbf{A}_{|j} + (-\mathbf{A})_{|j} = \mathbf{A}_{|j} - \mathbf{A}_{|j} = \mathbf{0} = \mathbf{0}_{|j}.$
5. $(\lambda(\mathbf{A} + \mathbf{B}))_{|j} = \lambda((\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|j}) = \lambda(\mathbf{A}_{|j} + \mathbf{B}_{|j}) = \lambda(\mathbf{A}_{|j}) + \lambda(\mathbf{B}_{|j}) = (\lambda\mathbf{A})_{|j} + (\lambda\mathbf{B})_{|j} = (\lambda\mathbf{A} + \lambda\mathbf{B})_{|j}.$
6. $((\lambda + \eta)\mathbf{A})_{|j} = (\lambda + \eta)(\mathbf{A}_{|j}) = \lambda(\mathbf{A}_{|j}) + \eta(\mathbf{A}_{|j}) = (\lambda\mathbf{A})_{|j} + (\eta\mathbf{A})_{|j} = (\lambda\mathbf{A} + \eta\mathbf{A})_{|j}.$
7. $(\lambda(\eta\mathbf{A}))_{|j} = \lambda((\eta\mathbf{A})_{|j}) = \lambda(\eta(\mathbf{A}_{|j})) = (\lambda\eta)(\mathbf{A}_{|j}) = ((\lambda\eta)\mathbf{A})_{|j}.$
8. $(1\mathbf{A})_{|j} = 1(\mathbf{A}_{|j}) = \mathbf{A}_{|j}.$

□

Ejercicio 7. Comenzamos por la suma.

$${}_{i|}(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|j} = {}_{i|}((\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|j}) = {}_{i|}(\mathbf{A}_{|j} + \mathbf{B}_{|j}) = {}_{i|}\mathbf{A}_{|j} + {}_{i|}\mathbf{B}_{|j}.$$

Y ahora el producto.

$${}_{i|}(\lambda\mathbf{A})_{|j} = {}_{i|}((\lambda\mathbf{A})_{|j}) = {}_{i|}(\lambda(\mathbf{A}_{|j})) = \lambda({}_{i|}(\mathbf{A}_{|j})) = \lambda({}_{i|}\mathbf{A}_{|j}).$$

□

Ejercicio 8(a) $((\lambda\mathbf{A})^\top)_{|j} = {}_{j|}(\lambda\mathbf{A}) = \lambda({}_{j|}\mathbf{A}) = \lambda((\mathbf{A}^\top)_{|j}) = (\lambda(\mathbf{A}^\top))_{|j}.$

□

Ejercicio 8(b) $((\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top)_{|j} = {}_{|j}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = {}_{|j}\mathbf{A} + {}_{|j}\mathbf{B} = (\mathbf{A}^\top)_{|j} + (\mathbf{B}^\top)_{|j} = (\mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top)_{|j}.$

□

Ejercicio 9. Comenzamos con la suma

$${}_i(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = ((\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top)_{|i} = (\mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top)_{|i} = (\mathbf{A}^\top)_{|i} + (\mathbf{B}^\top)_{|i} = {}_i\mathbf{A} + {}_i\mathbf{B}$$

Y continuamos con el producto:

$${}_i(\mathbf{A}\lambda) = ((\mathbf{A}\lambda)^\top)_{|i} = ((\mathbf{A}^\top)\lambda)_{|i} = ((\mathbf{A}^\top)_{|i})\lambda = ({}_i\mathbf{A})\lambda.$$

□

Ejercicio 10(a) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n = y_1x_1 + \cdots + y_nx_n = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$

□

Ejercicio 10(b)

$$\blacksquare (a\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = ax_1y_1 + \cdots + ax_ny_n = a(x_1y_1 + \cdots + x_ny_n) = a(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}).$$

$$\blacksquare (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} = (x_1 + y_1)z_1 + \cdots + (x_n + y_n)z_n = x_1z_1 + \cdots + x_nz_n + y_1z_1 + \cdots + y_nz_n = \mathbf{x} \cdot \mathbf{z} + \mathbf{y} \cdot \mathbf{z}.$$

□

Ejercicio 10(c) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = x_1^2 + \cdots + x_n^2 \geq 0.$

□

Ejercicio 10(d) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 0 \iff x_i = 0 \text{ para } i = 1 : n.$

□

Ejercicio 11. $2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+2-4 \\ 2-4+2 \\ -4+2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$

□

Ejercicio 12.

$$\mathbf{A}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

□

Ejercicio 13. $\mathbf{A}(\mathbf{l}_{|j}) = \mathbf{A} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = (\mathbf{A}_{|1})0 + \cdots + (\mathbf{A}_{|j})1 + \cdots + (\mathbf{A}_{|n})0 = \mathbf{A}_{|j}.$

□

Ejercicio 14. Sea \mathbf{A} , de n columnas y \mathbf{b} de \mathbb{R}^n , entonces

$$\begin{aligned} {}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}\mathbf{b}) &= {}_i\mathbf{I}\left((\mathbf{A}_{|1})b_1 + \cdots + (\mathbf{A}_{|n})b_n\right) \\ &= {}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}_{|1})b_1 + \cdots + {}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}_{|n})b_n \\ &= ({}_i\mathbf{A})_{|1}b_1 + \cdots + ({}_i\mathbf{A})_{|n}b_n = {}_i\mathbf{A} \cdot \mathbf{b}. \end{aligned}$$

□

Ejercicio 15(a)

$${}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}(\mathbf{b} + \mathbf{c})) = ({}_i\mathbf{A}) \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = ({}_i\mathbf{A}) \cdot \mathbf{b} + ({}_i\mathbf{A}) \cdot \mathbf{c} = {}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}\mathbf{b}) + {}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}\mathbf{c}) = {}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}\mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{c}).$$

□

Ejercicio 15(b)

$${}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}(\lambda\mathbf{b})) = ({}_i\mathbf{A}) \cdot (\lambda\mathbf{b}) = \lambda\left({}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}) \cdot \mathbf{b}\right) = \lambda\left({}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}\mathbf{b})\right) = {}_i\mathbf{I}(\lambda(\mathbf{A}\mathbf{b})).$$

□

Ejercicio 16.

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{c}) &= \mathbf{A}\left((\mathbf{B}_{|1})c_1 + \cdots + (\mathbf{B}_{|n})c_n\right) && \text{por la Definición 2.3 de producto} \\ &= \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|1})c_1 + \cdots + \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|n})c_n && \text{proposiciones 2.2.1 y 2.2.2} \\ &= \left[\mathbf{A}(\mathbf{B}_{|1}), \quad \dots, \quad \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|n})\right] \mathbf{c} && \text{por la Definición 2.3 de producto.} \end{aligned}$$

□

Ejercicio 17(a)

$${}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}(\lambda\mathbf{b})) = ({}_i\mathbf{A}) \cdot (\lambda\mathbf{b}) = \lambda\left({}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}) \cdot \mathbf{b}\right) = \left(\lambda({}_i\mathbf{A})\right) \cdot \mathbf{b} = \left({}_i\mathbf{I}(\lambda\mathbf{A})\right) \cdot \mathbf{b} = {}_i\mathbf{I}((\lambda\mathbf{A})\mathbf{b})$$

□

Ejercicio 17(b)

$${}_i\mathbf{I}((\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{c}) = ({}_i(\mathbf{A} + \mathbf{B})) \cdot \mathbf{c} = ({}_i\mathbf{A} + {}_i\mathbf{B}) \cdot \mathbf{c} = ({}_i\mathbf{A}) \cdot \mathbf{c} + ({}_i\mathbf{B}) \cdot \mathbf{c} = {}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}\mathbf{c}) + {}_i\mathbf{I}(\mathbf{B}\mathbf{c}) = {}_i\mathbf{I}(\mathbf{A}\mathbf{c} + \mathbf{B}\mathbf{c}).$$

□

Ejercicio 18(a) $\mathbf{a}\mathbf{I} = (\mathbf{I}^\top)\mathbf{a} = \mathbf{I}\mathbf{a} = \mathbf{a}.$

□

Ejercicio 18(b) $({}_i\mathbf{I})\mathbf{A} = (\mathbf{A}^\top)({}_i\mathbf{I}) = (\mathbf{A}^\top)(\mathbf{I}_{|i}) = (\mathbf{A}^\top)_{|i} = {}_i\mathbf{A}.$

□

Ejercicio 18(c) $(a + b)\mathbf{C} = (\mathbf{C}^\top)(a + b) \underset{(*)}{=} (\mathbf{C}^\top)a + (\mathbf{C}^\top)b = a\mathbf{C} + b\mathbf{C}.$

□

Ejercicio 18(d) $(\lambda a)\mathbf{B} = (\mathbf{B}^\top)(\lambda a) \underset{(*)}{=} \lambda((\mathbf{B}^\top)a) = \lambda(a\mathbf{B})$

□

Ejercicio 18(e) $a(\lambda\mathbf{B}) = ((\lambda\mathbf{B})^\top)a = (\lambda(\mathbf{B}^\top))a \underset{(*)}{=} (\mathbf{B}^\top)(\lambda a) = (\lambda a)\mathbf{B}.$

□

Ejercicio 18(f) $a(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{B} + \mathbf{C})^\top a = ((\mathbf{B}^\top) + (\mathbf{C}^\top))a \underset{(*)}{=} (\mathbf{B}^\top)a + (\mathbf{C}^\top)a = a\mathbf{B} + a\mathbf{C}.$

□

Ejercicio 19(a) Recordando la Proposición 2.2.3 en la página 26 (*) y usando la Definición 3.1 de producto:

$$\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{c}) \underset{(*)}{=} \left[\mathbf{A}(\mathbf{B}_{|1}), \dots, \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|n}) \right] \mathbf{c} = (\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{c}.$$

□

Ejercicio 19(b) Aplicando repetidamente la definición de producto y una vez (*) la proposición anterior tenemos:

$$\left(\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{C}) \right)_{|j} = \mathbf{A}((\mathbf{B}\mathbf{C})_{|j}) = \mathbf{A}(\mathbf{B}(\mathbf{C}_{|j})) \underset{(*)}{=} (\mathbf{A}\mathbf{B})(\mathbf{C}_{|j}) = ((\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C})_{|j}, \quad j = 1 : n.$$

□

Ejercicio 20(a) Usando la Definición 3.1 de producto matricial y recordando que $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{c} = \mathbf{A}\mathbf{c} + \mathbf{B}\mathbf{c}$; para $j = 1 : n$ tenemos

$$\left((\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} \right)_{|j} = (\mathbf{A} + \mathbf{B})(\mathbf{C}_{|j}) = \mathbf{A}(\mathbf{C}_{|j}) + \mathbf{B}(\mathbf{C}_{|j}) = (\mathbf{A}\mathbf{C})_{|j} + (\mathbf{B}\mathbf{C})_{|j} = (\mathbf{A}\mathbf{C} + \mathbf{B}\mathbf{C})_{|j}.$$

□

Ejercicio 20(b) Usando la Definición 3.1 de producto matricial y la propiedad de linealidad: $\mathbf{A}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{A}\mathbf{u} + \mathbf{A}\mathbf{v}$; para $j = 1 : n$ tenemos

$$\left(\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) \right)_{|j} = \mathbf{A}((\mathbf{B} + \mathbf{C})_{|j}) = \mathbf{A}((\mathbf{B}_{|j}) + (\mathbf{C}_{|j})) = \mathbf{A}(\mathbf{B}_{|j}) + \mathbf{A}(\mathbf{C}_{|j}) = (\mathbf{A}\mathbf{B})_{|j} + (\mathbf{A}\mathbf{C})_{|j} = (\mathbf{A}\mathbf{B} + \mathbf{A}\mathbf{C})_{|j}.$$

□

Ejercicio 20(c)

$$\left(\mathbf{A}(\lambda\mathbf{B}) \right)_{|j} = \mathbf{A}((\lambda\mathbf{B})_{|j}) = \mathbf{A}(\lambda(\mathbf{B}_{|j})) \begin{cases} = (\lambda\mathbf{A})(\mathbf{B}_{|j}) = ((\lambda\mathbf{A})\mathbf{B})_{|j} \\ = \lambda(\mathbf{A}(\mathbf{B}_{|j})) = \lambda((\mathbf{A}\mathbf{B})_{|j}) = (\lambda(\mathbf{A}\mathbf{B}))_{|j} \end{cases}, \quad j = 1 : n.$$

Ejercicio 20(d) $(\mathbf{IA})_{|j} = \mathbf{I}(\mathbf{A}_{|j}) = \mathbf{A}_{|j}, \quad j = 1 : n.$

Ejercicio 20(e) $(\mathbf{AI})_{|j} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{|j}) = \mathbf{A}_{|j}, \quad j = 1 : n.$

Ejercicio 21.

$${}_i(\mathbf{AB})_{|j} = {}_i\left((\mathbf{AB})_{|j}\right) = {}_i\left(\mathbf{A}(\mathbf{B}_{|j})\right) = ({}_i\mathbf{A}) \cdot (\mathbf{B}_{|j})$$

Ejercicio 22.

Veamos que las componentes j ésimas son iguales:

$$\left({}_i(\mathbf{AB})\right)_{|j} = {}_i(\mathbf{AB})_{|j} = ({}_i\mathbf{A}) \cdot (\mathbf{B}_{|j}) = \left({}_i(\mathbf{A})\mathbf{B}\right)_{|j};$$

por tanto: ${}_i(\mathbf{AB}) = ({}_i\mathbf{A})\mathbf{B}.$

Ejercicio 23. ${}_i(\mathbf{AB})^\top_{|j} = {}_j\mathbf{AB}_{|i} = {}_j\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}_{|i} = \mathbf{B}_{|i} \cdot {}_j\mathbf{A} = {}_i(\mathbf{B}^\top)(\mathbf{A}^\top)_{|j}$

Ejercicio 24(a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 24(b)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 24(c)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 24(d)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 25. a) $\tau_{[(-7)\mathbf{1}+\mathbf{3}]}$ transforma $\mathbf{B}_{|3}$, restándole siete veces $\mathbf{B}_{|1}$, es decir: $\left(\mathbf{B}_{\tau_{[(-7)\mathbf{1}+\mathbf{3}]}}\right)_{|3} = -7\mathbf{B}_{|1} + \mathbf{B}_{|3}$.

b) $\tau_{[(1)\mathbf{1}+\mathbf{4}]}$ transforma la cuarta columna de \mathbf{B} , sumándole la primera columna: $\left(\mathbf{B}_{\tau_{[(1)\mathbf{1}+\mathbf{4}]}}\right)_{|4} = \mathbf{B}_{|1} + \mathbf{B}_{|4}$.

c) $\tau_{[(3)\mathbf{2}+\mathbf{1}]}$ transforma la primera columna de \mathbf{B} , sumándole tres veces la segunda: $\left(\mathbf{B}_{\tau_{[(3)\mathbf{2}+\mathbf{1}]}}\right)_{|1} = 3\mathbf{B}_{|2} + \mathbf{B}_{|1}$.

d) $\tau_{[(-10)\mathbf{3}]}$ transforma la tercera columna de \mathbf{B} , multiplicándola por -10 , es decir: $\left(\mathbf{B}_{\tau_{[(-10)\mathbf{3}]}}\right)_{|3} = -10\mathbf{B}_{|3}$.

□

$$\text{Ejercicio 26(a)} \quad \mathbf{A}_{\tau_{[(3)\mathbf{1}]}} = \mathbf{A}\left(\mathbf{I}_{\tau_{[(3)\mathbf{1}]}}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

□

$$\text{Ejercicio 26(b)} \quad \mathbf{A}_{\tau_{[(-1)\mathbf{1}+\mathbf{2}]}} = \mathbf{A}\left(\mathbf{I}_{\tau_{[(-1)\mathbf{1}+\mathbf{2}]}}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

□

Ejercicio 27. Por una parte,

$$(\lambda\mathbf{A})_{\tau_1 \dots \tau_k} = (\lambda\mathbf{A})(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = \lambda(\mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k})) = \lambda(\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}),$$

y por otra

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{\tau_1 \dots \tau_k} = (\mathbf{A} + \mathbf{B})(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}) + \mathbf{B}(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = \mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} + \mathbf{B}_{\tau_1 \dots \tau_k}.$$

□

Ejercicio 28(a) Una posible sucesión de transformaciones elementales por columnas es:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\tau_{[(1)\mathbf{1}+\mathbf{2}]}]{\text{Tipo I}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\tau_{[(-1)\mathbf{2}+\mathbf{1}]}]{\text{Tipo I}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\tau_{[(1)\mathbf{1}+\mathbf{2}]}]{\text{Tipo I}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\tau_{[(-1)\mathbf{1}]}]{\text{Tipo II}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

es decir, $\mathbf{I}_{\tau_{[\mathbf{1}=\mathbf{2}]}} = \mathbf{I}_{\tau_{[(1)\mathbf{1}+\mathbf{2}]} \tau_{[(-1)\mathbf{2}+\mathbf{1}]} \tau_{[(1)\mathbf{1}+\mathbf{2}]} \tau_{[(-1)\mathbf{1}]}}$.

□

Ejercicio 28(b) Hay muchas combinaciones posibles. Por ejemplo: $\mathbf{I}_{\tau_{[\mathbf{i}=\mathbf{j}]}} = \mathbf{I}_{\tau_{[(-1)\mathbf{j}]} \tau_{[(-1)\mathbf{j}+\mathbf{i}]} \tau_{[(1)\mathbf{i}+\mathbf{j}]} \tau_{[(-1)\mathbf{j}+\mathbf{i}]}}$.

□

Ejercicio 29(a) Por una parte $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}\mathbf{I}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$, y por otra $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{I}\mathbf{B} = \mathbf{I}$.

□

Ejercicio 29(b) Basta aplicar iterativamente la proposición anterior:

$$(\mathbf{A}_1 \cdots \mathbf{A}_k)^{-1} = (\mathbf{A}_2 \cdots \mathbf{A}_k)^{-1} \mathbf{A}_1^{-1} = (\mathbf{A}_3 \cdots \mathbf{A}_k)^{-1} \mathbf{A}_2^{-1} \mathbf{A}_1^{-1} = \cdots = (\mathbf{A}_{k-1} \mathbf{A}_k)^{-1} \mathbf{A}_{k-2}^{-1} \cdots \mathbf{A}_1^{-1} = \mathbf{A}_k^{-1} \cdots \mathbf{A}_1^{-1}.$$

□

Ejercicio 29(c) Si \mathbf{A} es invertible, entonces $\mathbf{A}\mathbf{B}$ es invertible (Proposición 5.1.2 en la página 58).

Supongamos que $\mathbf{A}\mathbf{B}$ es invertible. Entonces sabemos que existe \mathbf{C} tal que

$$(\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{I}, \quad \text{y} \quad \mathbf{C}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \mathbf{I}.$$

De la primera igualdad tenemos que \mathbf{A} es invertible por la derecha, pues

$$\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{C}) = \mathbf{I}.$$

Solo nos falta comprobar que también es invertible por la izquierda, es decir, que $(\mathbf{B}\mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{I}$. Para ello nos fijamos en la segunda igualdad, y multiplicando por \mathbf{B} por la izquierda y por \mathbf{B}^{-1} por la derecha (a ambos lados de la ecuación) tenemos

$$\mathbf{B}\mathbf{C}(\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{B}\mathbf{I}\mathbf{B}^{-1} \quad \Rightarrow \quad (\mathbf{B}\mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

□

Ejercicio 29(d) Si \mathbf{B} es invertible, entonces $\mathbf{A}\mathbf{B}$ es invertible (Proposición 5.1.2 en la página 58).

Supongamos que $\mathbf{A}\mathbf{B}$ es invertible. Entonces sabemos que existe \mathbf{C} tal que

$$(\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{I}, \quad \text{y} \quad \mathbf{C}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \mathbf{I}.$$

De la segunda igualdad tenemos que \mathbf{B} es invertible por la izquierda, pues

$$(\mathbf{C}\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{I}.$$

Solo nos falta comprobar que también es invertible por la derecha, es decir, que $\mathbf{B}(\mathbf{C}\mathbf{A}) = \mathbf{I}$. Para ello nos fijamos en la primera igualdad y multiplicando por \mathbf{A}^{-1} por la izquierda y por \mathbf{A} por la derecha (a ambos lados de la ecuación) tenemos

$$\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C}\mathbf{A} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{I}\mathbf{A}, \quad \Rightarrow \quad (\mathbf{B}\mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

□

Ejercicio 29(e) Aplicando la pista tenemos por un lado: $\mathbf{A}^{\mathsf{T}}(\mathbf{A}^{-1})^{\mathsf{T}} = (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})^{\mathsf{T}} = (\mathbf{I})^{\mathsf{T}} = \mathbf{I}$ y por el otro $(\mathbf{A}^{-1})^{\mathsf{T}}\mathbf{A}^{\mathsf{T}} = (\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1})^{\mathsf{T}} = (\mathbf{I})^{\mathsf{T}} = \mathbf{I}$. Es decir, $(\mathbf{A}^{-1})^{\mathsf{T}} = (\mathbf{A}^{\mathsf{T}})^{-1}$.

□

Ejercicio 29(f) Sea \mathbf{A} de orden n una matriz cuya j -ésima columna es nula: $\mathbf{A}_{\cdot j} = \mathbf{0}$. Si asumimos que existe \mathbf{A}^{-1} llegamos a una contradicción. Para verlo multipliquemos la ecuación por \mathbf{A}^{-1} :

$$\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}_{\cdot j}) = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{0}) \quad \Rightarrow \quad (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})_{\cdot j} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{I}_{\cdot j} = \mathbf{0}.$$

Pero sabemos que \mathbf{l}_i (la columna i ésima de \mathbf{I}) no es $\mathbf{0}$, así que hemos llegado a una contradicción. Por tanto \mathbf{A}^{-1} no puede existir: así, \mathbf{A} es singular (no tiene inversa) si tiene alguna columna nula.

Para las filas, basta repetir lo anterior con \mathbf{A}^\top pues, si ${}_i\mathbf{A} = (\mathbf{A}^\top)_i = \mathbf{0}$, llegamos a la misma contradicción.

□

Ejercicio 30. Si para alguna columna $\mathbf{A}_{|j}$ se verifica que $\mathbf{A}_{|j} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ (con $\mathbf{x}_{|j} = \mathbf{0}$) es decir, $\mathbf{A}_{|j}$ es una combinación lineal del resto de columnas, entonces mediante $(n-1)$ transformaciones elementales $\tau_{[(-x_k)k+j]}$ (con $k = 1 : n$ excepto $k = j$) es posible transformar la columna $\mathbf{A}_{|j}$ en un vector de ceros, es decir, hay transformaciones elementales tales que $(\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_{(n-1)}})_{|j} = \mathbf{0}$, pues a la columna $\mathbf{A}_{|j}$ se le resta $\mathbf{A}\mathbf{x}$:

$$\mathbf{A}(\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_{(n-1)}}) = \mathbf{A} \begin{matrix} \tau \\ [(-x_1)1+j] \\ [(-x_2)2+j] \\ \vdots \\ [(-x_n)n+j] \end{matrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} 1 & & -x_1 & & \\ & 1 & -x_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -x_n & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{A}_{|1}; \mathbf{A}_{|2}; \dots \mathbf{0}; \dots \mathbf{A}_{|n}],$$

Como $\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_{(n-1)}}$ es invertible y el resultado es una matriz singular (por ser la columna j ésima nula), \mathbf{A} es singular (Proposición 5.1.4 en la página 58).

□

Ejercicio 31(a)

$$\begin{aligned} \vec{0} &= \vec{z} + \vec{0} && \text{por la propiedad que hemos pedido a } \vec{z} \\ &= \vec{z} && \text{por la propiedad que tiene } \vec{0}. \end{aligned}$$

□

Ejercicio 31(b)

$$\vec{z} = \vec{z} + \vec{0} = \vec{z} + (\vec{x} + (-\vec{x})) = (\vec{z} + \vec{x}) + (-\vec{x}) = \vec{0} + (-\vec{x}) = -\vec{x}.$$

□

Ejercicio 32.

1. $\vec{x} + \vec{y} = xy = yx = \vec{y} + \vec{x}$.
2. $\vec{x} + (\vec{y} + \vec{z}) = x(yz) = (xy)z = (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z}$.
3. Si $\vec{0} = 1$; entonces $\vec{x} + \vec{0} = x1 = x = \vec{x}$; por tanto $\vec{0} = 1$.
4. Si $-\vec{x} = 1/x$; entonces $\vec{x} + (-\vec{x}) = x/x = 1 = \vec{0}$.
5. $1\vec{x} = x^1 = x = \vec{x}$.

$$6. (ab)\vec{x} = x^{(ab)} = (x^b)^a = (b\vec{x})^a = a(b\vec{x}).$$

$$7. a(\vec{x} + \vec{y}) = (xy)^a = x^a \cdot y^a = a\vec{x} + a\vec{y}.$$

$$8. (a + b)\vec{x} = (x)^{a+b} = x^a \cdot x^b = a\vec{x} + b\vec{x}.$$

□

Ejercicio 33. Si, lo es; pues la suma de dos combinaciones lineales es una combinación lineal; y cualquier múltiplo de una combinación lineal también es una combinación lineal. Por tanto el conjunto es cerrado para la suma y el producto por escalares.

□

Ejercicio 34. Hay que verificar que se cumplen las ocho propiedades de la Definición 6.1:

Sean los pares (\vec{a}, \vec{x}) , (\vec{b}, \vec{y}) y (\vec{c}, \vec{z}) , donde las primeras componentes son vectores de \mathcal{A} y las segundas componentes son vectores de \mathcal{X} ; y sean los escalares λ y μ . Entonces

1.

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{x}) + (\vec{b}, \vec{y}) &= (\vec{a} + \vec{b}, \vec{x} + \vec{y}) && \text{aplicado la definición de suma de pares} \\ &= (\vec{b} + \vec{a}, \vec{y} + \vec{x}) && \text{puesto que } \mathcal{A} \text{ y } \mathcal{X} \text{ son espacios vectoriales} \\ &= (\vec{b}, \vec{y}) + (\vec{a}, \vec{x}) && \text{aplicado la definición de suma de pares.} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{x}) + ((\vec{b}, \vec{y}) + (\vec{c}, \vec{z})) &= (\vec{a}, \vec{x}) + ((\vec{b} + \vec{c}, \vec{y} + \vec{z})) && \text{aplicado la definición de suma de pares} \\ &= (\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}), \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})) && \text{aplicado la definición de suma de pares} \\ &= ((\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}, (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z}) && \text{puesto que } \mathcal{A} \text{ y } \mathcal{X} \text{ son espacios vectoriales} \\ &= ((\vec{a} + \vec{b}), (\vec{x} + \vec{y})) + (\vec{c}, \vec{z}) && \text{aplicado la definición de suma de pares} \\ &= ((\vec{a}, \vec{x}) + (\vec{b}, \vec{y})) + (\vec{c}, \vec{z}). \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{x}) + (\vec{0}_{\mathcal{A}}, \vec{0}_{\mathcal{X}}) &= (\vec{a} + \vec{0}_{\mathcal{A}}, \vec{x} + \vec{0}_{\mathcal{X}}) && \text{aplicado la definición de suma de funciones} \\ &= (\vec{a}, \vec{x}) && \text{puesto que } \mathcal{A} \text{ y } \mathcal{X} \text{ son espacios vectoriales} \\ &&& \text{por tanto } \vec{0} = (\vec{0}_{\mathcal{A}}, \vec{0}_{\mathcal{X}}). \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{x}) + (-\vec{a}, -\vec{x}) &= (\vec{a} - \vec{a}, \vec{x} - \vec{x}) && \text{aplicado la definición de suma de funciones} \\ &= (\vec{0}_{\mathcal{A}}, \vec{0}_{\mathcal{X}}) && \text{puesto que } \mathcal{A} \text{ y } \mathcal{X} \text{ son espacios vectoriales} \\ &&& \text{por tanto } (-\vec{a}, -\vec{x}) = -(\vec{a}, \vec{x}). \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}
 \lambda((\vec{a}, \vec{x}) + (\vec{b}, \vec{y})) &= \lambda((\vec{a} + \vec{b}), (\vec{x} + \vec{y})) && \text{aplicado la definición de suma de pares} \\
 &= (\lambda(\vec{a} + \vec{b}), \lambda(\vec{x} + \vec{y})) && \text{aplicado la definición de escalar por par} \\
 &= (\lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{x} + \lambda\vec{y}) && \text{puesto que } \mathcal{A} \text{ y } \mathcal{X} \text{ son espacios vectoriales} \\
 &= (\lambda\vec{a}, \lambda\vec{x}) + (\lambda\vec{b}, \lambda\vec{y}) && \text{aplicado la definición de suma de pares} \\
 &= \lambda(\vec{a}, \vec{x}) + \lambda(\vec{b}, \vec{y}) && \text{aplicado la definición de escalar por par}
 \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}
 (\lambda + \mu)(\vec{a}, \vec{x}) &= ((\lambda + \mu)\vec{a}, (\lambda + \mu)\vec{x}) && \text{aplicado la definición de escalar por par} \\
 &= ((\lambda\vec{a} + \mu\vec{a}), (\lambda\vec{x} + \mu\vec{x})) && \text{puesto que } \mathcal{A} \text{ y } \mathcal{X} \text{ son espacios vectoriales} \\
 &= (\lambda\vec{a}, \lambda\vec{x}) + (\mu\vec{a}, \mu\vec{x}) && \text{aplicado la definición de suma de pares} \\
 &= \lambda(\vec{a}, \vec{x}) + \mu(\vec{a}, \vec{x}) && \text{aplicado la definición de escalar por par}
 \end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned}
 (\lambda\mu)(\vec{a}, \vec{x}) &= ((\lambda\mu)\vec{a}, (\lambda\mu)\vec{x}) && \text{aplicado la definición de escalar por par} \\
 &= (\lambda(\mu\vec{a}), \lambda(\mu\vec{x})) && \text{puesto que } \mathcal{A} \text{ y } \mathcal{X} \text{ son espacios vectoriales} \\
 &= \lambda(\mu\vec{a}, \mu\vec{x}) && \text{aplicado la definición de escalar por par}
 \end{aligned}$$

8.

$$\begin{aligned}
 1(\vec{a}, \vec{x}) &= (1\vec{a}, 1\vec{x}) && \text{aplicado la definición de escalar por par} \\
 &= (\vec{a}, \vec{x}) && \text{puesto que } \mathcal{A} \text{ y } \mathcal{X} \text{ son espacios vectoriales}
 \end{aligned}$$

□

Ejercicio 35(a) Esquema de la función lineal:

$$\begin{aligned}
 -|j : \mathbb{R}^{m \times n} &\rightarrow \mathbb{R}^m \\
 \mathbf{A} &\rightarrow (a_{1j}, \dots, a_{mj})
 \end{aligned}$$

Es lineal puesto que

$$\begin{aligned}
 f(\mathbf{A} + \mathbf{B}) &= (\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|j} = \mathbf{A}_{|j} + \mathbf{B}_{|j} = f(\mathbf{A}) + f(\mathbf{B}) \\
 f(\lambda\mathbf{A}) &= (\lambda\mathbf{A})_{|j} = \lambda(\mathbf{A}_{|j}) = \lambda f(\mathbf{A}).
 \end{aligned}$$

□

Ejercicio 35(b) Esquema de la función lineal:

$$\begin{aligned}
 i|-|j : \mathbb{R}^{m \times n} &\rightarrow \mathbb{R} \\
 \mathbf{A} &\rightarrow a_{ij}
 \end{aligned}$$

Es lineal puesto que

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A} + \mathbf{B}) &= {}_i|(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{|j} = {}_i|\mathbf{A}_{|j} + {}_i|\mathbf{B}_{|j} = f(\mathbf{A}) + f(\mathbf{B}) \\ f(\lambda \mathbf{A}) &= {}_i|(\lambda \mathbf{A})_{|j} = \lambda({}_i|\mathbf{A}_{|j}) = \lambda f(\mathbf{A}). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 35(c) Esquema de la función lineal:

$$\begin{aligned} _{}^\top: \mathbb{R}^{m \times n} &\rightarrow \mathbb{R}^{n \times m} \\ \mathbf{A} &\rightarrow [{}_1|\mathbf{A}; \dots m|\mathbf{A}] \end{aligned}$$

Es lineal puesto que

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A} + \mathbf{B}) &= (\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top = f(\mathbf{A}) + f(\mathbf{B}) \\ f(\lambda \mathbf{A}) &= (\lambda \mathbf{A})^\top = \lambda(\mathbf{A}^\top) = \lambda f(\mathbf{A}). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 35(d) Esquema de la función lineal:

$$\begin{aligned} {}_i|_: \mathbb{R}^{m \times n} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ \mathbf{A} &\rightarrow (a_{m1}, \dots a_{mn}) \end{aligned}$$

Es lineal puesto que

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A} + \mathbf{B}) &= {}_i|(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = {}_j|\mathbf{A} + {}_i|\mathbf{B} = f(\mathbf{A}) + f(\mathbf{B}) \\ f(\lambda \mathbf{A}) &= {}_i|(\lambda \mathbf{A}) = \lambda({}_i|\mathbf{A}) = \lambda f(\mathbf{A}). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 35(e) Esquema de la función lineal:

$$\begin{aligned} _{}^b: \mathbb{R}^{m \times n} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ \mathbf{A} &\rightarrow (\mathbf{A}_{|1})b_1 + (\mathbf{A}_{|2})b_2 + \dots + (\mathbf{A}_{|n})b_n \end{aligned}$$

Es lineal puesto que

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A} + \mathbf{C}) &= (\mathbf{A} + \mathbf{C})^b = \mathbf{A}^b + \mathbf{C}^b = f(\mathbf{A}) + f(\mathbf{C}) \\ f(\lambda \mathbf{A}) &= (\lambda \mathbf{A})^b = \lambda(\mathbf{A}^b) = \lambda f(\mathbf{A}). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 35(f) Esquema de la función lineal:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}__: \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ \mathbf{b} &\rightarrow (\mathbf{A}_{|1})b_1 + (\mathbf{A}_{|2})b_2 + \dots + (\mathbf{A}_{|n})b_n \end{aligned}$$

Es lineal puesto que

$$\begin{aligned} f(\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= \mathbf{A}(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{A}\mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{c} = f(\mathbf{b}) + f(\mathbf{c}) \\ f(\lambda \mathbf{b}) &= \mathbf{A}(\lambda \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{b}) = \lambda f(\mathbf{b}). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 35(g) Esquema de la función lineal:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_-: \mathbb{R}^{m \times n} &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \mathbf{B} &\rightarrow a_1({}_1|\mathbf{B}) + \cdots + a_m({}_m|\mathbf{B}) \end{aligned}$$

Es lineal puesto que

$$\begin{aligned} f(\mathbf{B} + \mathbf{C}) &= \mathbf{a}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{a}\mathbf{B} + \mathbf{a}\mathbf{C} = f(\mathbf{B}) + f(\mathbf{C}) \\ f(\lambda\mathbf{B}) &= \mathbf{a}(\lambda\mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{a}\mathbf{B}) = \lambda f(\mathbf{B}). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 35(h) Esquema de la función lineal:

$$\begin{aligned} _ \mathbf{B}: \mathbb{R}^m &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \mathbf{a} &\rightarrow a_1({}_1|\mathbf{B}) + \cdots + a_m({}_m|\mathbf{B}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(\mathbf{a} + \mathbf{c}) &= (\mathbf{a} + \mathbf{c})\mathbf{B} = \mathbf{a}\mathbf{B} + \mathbf{c}\mathbf{B} = f(\mathbf{a}) + f(\mathbf{c}) \\ f(\lambda\mathbf{a}) &= (\lambda\mathbf{a})\mathbf{B} = \lambda(\mathbf{a}\mathbf{B}) = \lambda f(\mathbf{a}). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 35(i) Esquema de la función lineal:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_-: \mathbb{R}^{m \times n} &\rightarrow \mathbb{R}^{m \times p} \\ \mathbf{A} &\rightarrow [\mathbf{A}\mathbf{B}_{|1}; \dots \mathbf{A}\mathbf{B}_{|p}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A} + \mathbf{C}) &= (\mathbf{A} + \mathbf{C})\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{B} + \mathbf{C}\mathbf{B} = f(\mathbf{A}) + f(\mathbf{C}) \\ f(\lambda\mathbf{A}) &= (\lambda\mathbf{A})\mathbf{B} = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \lambda f(\mathbf{A}). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 35(j) Esquema de la función lineal:

$$\begin{aligned} _ \mathbf{B}: \mathbb{R}^{m \times n} &\rightarrow \mathbb{R}^{k \times n} \\ \mathbf{B} &\rightarrow [{}_1|\mathbf{A}\mathbf{B}; \dots {}_k|\mathbf{A}\mathbf{B}]^\top \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(\mathbf{B} + \mathbf{C}) &= \mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A}\mathbf{B} + \mathbf{A}\mathbf{C} = f(\mathbf{B}) + f(\mathbf{C}) \\ f(\lambda\mathbf{B}) &= \mathbf{A}(\lambda\mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \lambda f(\mathbf{B}). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 35(k) Esquema de la función lineal:

$$\begin{aligned} _ \boldsymbol{\tau}: \mathbb{R}^{m \times n} &\rightarrow \mathbb{R}^{m \times n} \\ \mathbf{A} &\rightarrow \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\boldsymbol{\tau}}) \end{aligned}$$

donde \mathbf{I}_τ es una matriz elemental del orden n .

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A} + \mathbf{B}) &= (\mathbf{A} + \mathbf{B})_\tau = \mathbf{A}_\tau + \mathbf{B}_\tau = f(\mathbf{A}) + f(\mathbf{B}) \\ f(\lambda \mathbf{A}) &= (\lambda \mathbf{A})_\tau = \lambda(\mathbf{A}_\tau) = \lambda f(\mathbf{A}); \end{aligned}$$

□

Ejercicio 35(l) Esquema de la función lineal:

$$\begin{array}{ccc} \tau_-: \mathbb{R}^{m \times n} & \rightarrow & \mathbb{R}^{m \times n} \\ \mathbf{A} & \rightarrow & (\tau \mathbf{I}) \mathbf{A} \end{array}$$

donde $\tau \mathbf{I}$ es una matriz elemental del orden m .

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A} + \mathbf{B}) &= \tau(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \tau \mathbf{A} + \tau \mathbf{B} = f(\mathbf{A}) + f(\mathbf{B}) \\ f(\lambda \mathbf{A}) &= \tau(\lambda \mathbf{A}) = \lambda(\tau \mathbf{A}) = \lambda f(\mathbf{A}); \end{aligned}$$

□

Ejercicio 36(a) Tenemos que comprobar que la función $[g \circ f]: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ es lineal.

Dados \vec{x} e \vec{y} de \mathcal{D} se verifica que

$$[g \circ f](\vec{x} + \vec{y}) = g(f(\vec{x} + \vec{y})) = g(f(\vec{x}) + f(\vec{y})) = g(f(\vec{x})) + g(f(\vec{y})) = [g \circ f](\vec{x}) + [g \circ f](\vec{y}).$$

Dados \vec{x} de \mathcal{D} y $\alpha \in \mathbb{R}$ se verifica que

$$[g \circ f](\alpha \vec{x}) = g(f(\alpha \vec{x})) = g(\alpha f(\vec{x})) = \alpha g(f(\vec{x})) = \alpha [g \circ f](\vec{x}).$$

□

Ejercicio 36(b) Tomemos \vec{x} e \vec{y} de \mathcal{V} , entonces

$$\begin{aligned} f^{-1}(\vec{x} + \vec{y}) &= f^{-1}(f(f^{-1}(\vec{x})) + f(f^{-1}(\vec{y}))) && \text{puesto que } \vec{x} = f(f^{-1}(\vec{x})) \text{ e } \vec{y} = f(f^{-1}(\vec{y})) \\ &= f^{-1}(f(f^{-1}(\vec{x}) + f^{-1}(\vec{y}))) && \text{puesto que } f \text{ es lineal} \\ &= f^{-1}(\vec{x}) + f^{-1}(\vec{y}) && \text{puesto que en general } \vec{z} = f^{-1}(f(\vec{z})). \end{aligned}$$

Tomemos $\vec{x} \in \mathcal{V}$ y $\alpha \in R$ entonces

$$\begin{aligned} f^{-1}(\alpha \vec{x}) &= f^{-1}(\alpha f(f^{-1}(\vec{x}))) && \text{puesto que } \vec{x} = f(f^{-1}(\vec{x})) \\ &= f^{-1}(f(\alpha f^{-1}(\vec{x}))) && \text{puesto que } f \text{ es lineal} \\ &= \alpha f^{-1}(\vec{x}) && \text{puesto que en general } \vec{z} = f^{-1}(f(\vec{z})). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 37. Hay que verificar que se cumplen las ocho propiedades de la Definición 6.1:

Sean las funciones $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{V}$, $g: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{V}$, y $h: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{V}$; y sean los escalares λ y μ . Entonces

1.

$$\begin{aligned}[f + g](\vec{x}) &= f(\vec{x}) + g(\vec{x}) \\ &= g(\vec{x}) + f(\vec{x}) \\ &= [g + f](\vec{x})\end{aligned}$$

aplicado la definición de suma de funciones

puesto que \mathcal{V} es un espacio vectorial

aplicado la definición de suma de funciones

2.

$$\begin{aligned}[f + (g + h)](\vec{x}) &= f(\vec{x}) + [g + h](\vec{x}) \\ &= f(\vec{x}) + (g(\vec{x}) + h(\vec{x})) \\ &= (f(\vec{x}) + g(\vec{x})) + h(\vec{x}) \\ &= [f + g](\vec{x}) + h(\vec{x}) \\ &= [(f + g) + h](\vec{x})\end{aligned}$$

aplicado la definición de suma de funciones

aplicado la definición de suma de funciones

puesto que \mathcal{V} es un espacio vectorial

aplicado la definición de suma de funciones

aplicado la definición de suma de funciones

3. Sea $0: X \rightarrow \mathcal{V}$, entonces

$$\vec{x} \rightarrow \vec{0}$$

$$\begin{aligned}[f + 0](\vec{x}) &= f(\vec{x}) + 0(\vec{x}) \\ &= f(\vec{x}) + \vec{0} \\ &= f(\vec{x})\end{aligned}$$

aplicado la definición de suma de funciones

pues $0(\vec{x}) = \vec{0}$

4. Sea $-f: X \rightarrow \mathcal{V}$, entonces

$$\vec{x} \rightarrow -f(\vec{x})$$

$$\begin{aligned}[f + (-f)](\vec{x}) &= f(\vec{x}) + (-f(\vec{x})) \\ &= \vec{0} \\ &= 0(\vec{x})\end{aligned}$$

aplicado la definición de suma de funciones

puesto que en \mathcal{V} se verifica que $f(\vec{x}) + (-f(\vec{x})) = \vec{0}$

pues $0(\vec{x}) = \vec{0}$

5.

$$\begin{aligned}[\lambda(f + g)](\vec{x}) &= \lambda([f + g](\vec{x})) \\ &= \lambda(f(\vec{x}) + g(\vec{x})) \\ &= \lambda f(\vec{x}) + \lambda g(\vec{x}) \\ &= [\lambda f](\vec{x}) + [\lambda g](\vec{x}) \\ &= [\lambda f + \lambda g](\vec{x})\end{aligned}$$

aplicado la definición de función por escalar

aplicado la definición de suma de funciones

puesto que \mathcal{V} es un espacio vectorial

aplicado la definición de función por escalar

aplicado la definición de suma de funciones

6.

$$\begin{aligned}[(\lambda + \mu)f](\vec{x}) &= (\lambda + \mu)f(\vec{x}) \\ &= \lambda f(\vec{x}) + \mu f(\vec{x}) \\ &= [\lambda f](\vec{x}) + [\mu f](\vec{x}) \\ &= [\lambda f + \mu f](\vec{x})\end{aligned}$$

aplicado la definición de función por escalar

puesto que \mathcal{V} es un espacio vectorial

aplicado la definición de función por escalar

aplicado la definición de suma de funciones

7.

$$\begin{aligned}[(\lambda \cdot \mu)f](\vec{x}) &= (\lambda \cdot \mu)f(\vec{x}) \\ &= \lambda(\mu f(\vec{x})) \\ &= \lambda([\mu f](\vec{x})) \\ &= [\lambda(\mu f)](\vec{x})\end{aligned}$$

aplicado la definición de función por escalar

puesto que \mathcal{V} es un espacio vectorial

aplicado la definición de función por escalar

aplicado la definición de función por escalar

8.

$$\begin{aligned} [1 \cdot f](\vec{x}) &= 1 \cdot f(\vec{x}) && \text{aplicado la definici3n de funci3n por escalar} \\ &= f(\vec{x}) && \text{puesto que } \mathcal{V} \text{ es un espacio vectorial} \end{aligned}$$

□

Ejercicio 38(a) Tenemos que comprobar que la funci3n $[g + f]: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ es lineal.

Dados \vec{x} e \vec{y} de \mathcal{D} se verifica que

$$[g+f](\vec{x}+\vec{y}) = g(\vec{x}+\vec{y})+f(\vec{x}+\vec{y}) = g(\vec{x})+g(\vec{y})+f(\vec{x})+f(\vec{y}) = g(\vec{x})+f(\vec{x})+g(\vec{y})+f(\vec{y}) = [g+f](\vec{x})+[g+f](\vec{y}).$$

Dados \vec{x} de \mathcal{D} y $\alpha \in \mathbb{R}$ se verifica que

$$[g+f](\alpha\vec{x}) = g(\alpha\vec{x}) + f(\alpha\vec{x}) = \alpha g(\vec{x}) + \alpha f(\vec{x}) = \alpha(g(\vec{x}) + f(\vec{x})) = \alpha[g+f](\vec{x}).$$

□

Ejercicio 38(b) Tenemos que comprobar que la funci3n $[\alpha \cdot f]: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ es lineal.

Dados \vec{x} e \vec{y} de \mathcal{D} se verifica que

$$[\alpha \cdot f](\vec{x} + \vec{y}) = \alpha f(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha(f(\vec{x}) + f(\vec{y})) = \alpha f(\vec{x}) + \alpha f(\vec{y}) = [\alpha \cdot f](\vec{x}) + [\alpha \cdot f](\vec{y}).$$

Dados \vec{x} de \mathcal{D} y $\gamma \in \mathbb{R}$ se verifica que

$$[\alpha \cdot f](\gamma\vec{x}) = \alpha f(\gamma\vec{x}) = \alpha(\gamma f(\vec{x})) = \gamma(\alpha f(\vec{x})) = \gamma[\alpha \cdot f](\vec{x}).$$

□

Ejercicio 39. Basta comprobar que cualquier combinaci3n de soluciones de $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es tambi3n soluci3n.

Sean \mathbf{x} y \mathbf{y} dos vectores de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, es decir, $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y $\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{0}$, y sean b y c dos n3meros reales; entonces

$$\mathbf{A}(b\mathbf{x} + c\mathbf{y}) = \mathbf{A}b\mathbf{x} + \mathbf{A}c\mathbf{y} = b\mathbf{A}\mathbf{x} + c\mathbf{A}\mathbf{y} = b\mathbf{0} + c\mathbf{0} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad (b\mathbf{x} + c\mathbf{y}) \in \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

□

Ejercicio 40. Si son nulos los coeficientes correspondientes a las columnas no nulas, entonces

$$\mathbf{K}\mathbf{x} = (\mathbf{K}_{|1})x_1 + (\mathbf{K}_{|2})x_2 + \cdots + (\mathbf{K}_{|n})x_n = \mathbf{0},$$

pues en cada producto $(\mathbf{K}_{|j})x_j$ es $\mathbf{0}$, ya que o bien $x_j = 0$ o bien $(\mathbf{K}_{|j}) = \mathbf{0}$.

Rec3procamente, supongamos que alg3n coeficiente x_k es distinto de cero para una columna no nula, y tomemos $j = \min \{k | x_k \neq 0 \text{ y } (\mathbf{K}_{|j}) \neq \mathbf{0}\}$. Por la elecci3n de j , si $h < j$ entonces el producto $(\mathbf{K}_{|h})x_h = \mathbf{0}$ (ya que alguno de los dos es cero). Por tanto tendremos que $(\mathbf{K}_{|1})x_1 + \cdots + (\mathbf{K}_{|n})x_n = (\mathbf{K}_{|j})x_j + \cdots + (\mathbf{K}_{|n})x_n$. Entonces si i es la posici3n de pivote de $\mathbf{K}_{|j}$ tendremos que $(\mathbf{K}_{|j})x_j + \cdots + (\mathbf{K}_{|n})x_n = ({}_i|\mathbf{K}_{|j})x_j \neq 0$; pues todas las componentes a la derecha del pivote son nulas por estar \mathbf{K} pre-escalada. Y por tanto $\mathbf{K}\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

□

Ejercicio 41. Basta comprobar que cualquier combinación de vectores de $\mathcal{N}(f) = \{\vec{v} \mid f(\vec{v}) = \vec{0}\}$ pertence a $\mathcal{N}(f)$.

Sean \vec{x} y \vec{y} dos vectores de $\mathcal{N}(f)$, es decir, $f(\vec{x}) = \vec{0}$ y $f(\vec{y}) = \vec{0}$, y sean b y c dos escalares; entonces

$$f(b\vec{x} + c\vec{y}) = f(\vec{x}) + f(c\vec{y}) = b \cdot f(\vec{x}) + c \cdot f(\vec{x}) = b\vec{0} + c\vec{0} = \vec{0} \Rightarrow (b\vec{x} + c\vec{y}) \in \mathcal{N}(f).$$

(Compare esta demostración con la de la Proposición 7.2.1).

□

Ejercicio 42. Recordemos que $\mathbf{b} = f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x})$ es equivalente a decir que $(\mathbf{x}, \mathbf{b}) \in f_{\mathbf{A}}$ (véase *notación funcional* en la Página 83). Así pues, la imagen de $f_{\mathbf{A}}$ es

$$\begin{aligned} \text{imagen}(f_{\mathbf{A}}) &= \{\mathbf{b} \mid \text{existe } \mathbf{x} \text{ tal que } (\mathbf{x}, \mathbf{b}) \in f_{\mathbf{A}}\} \\ &= \{\mathbf{b} \mid \text{existe } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } \mathbf{b} = f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}\} \\ &= \mathcal{C}(\mathbf{A}). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 43. Basta demostrar que el conjunto

$$\text{imagen}(f) = \{\vec{y} \mid \text{existe } \vec{x} \in \mathcal{D} \text{ tal que } \vec{y} = f(\vec{x})\}$$

es cerrado para la suma y el producto por escalares.

Sean $\vec{x}, \vec{y} \in \text{imagen}(f)$, es decir, vectores de \mathcal{W} tales que existen \vec{z} y \vec{w} de \mathcal{D} de manera que $\vec{x} = f(\vec{z})$ e $\vec{y} = f(\vec{w})$, y sean los escalares a y b . Entonces para el vector $(a\vec{x} + b\vec{y}) \in \mathcal{W}$ se verifica que

$$a\vec{x} + b\vec{y} = af(\vec{z}) + bf(\vec{w}) = f(a\vec{z} + b\vec{w});$$

pues f es lineal. Es decir, $(a\vec{x} + b\vec{y}) \in \text{imagen}(f)$.

□

Ejercicio 44(a)

$$Z(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \sum_{k=1}^n \left(Z_{|k} (b_k + c_k) \right) = \sum_{k=1}^n \left((Z_{|k})b_k + (Z_{|k})c_k \right) = \sum_{k=1}^n (Z_{|k})b_k + \sum_{k=1}^n (Z_{|k})c_k = Z\mathbf{b} + Z\mathbf{c}.$$

□

Ejercicio 44(b)

$$Z(\lambda \mathbf{b}) = \sum_{k=1}^n (Z_{|k})\lambda b_k = \lambda \sum_{k=1}^n (Z_{|k})b_k = \lambda(Z\mathbf{b}).$$

□

Ejercicio 45(a)

$$Z(\mathbf{B}\mathbf{c}) = Z \left(\sum_{k=1}^n (\mathbf{B}_{|k})c_k \right) = \sum_{k=1}^n \left(Z(\mathbf{B}_{|k})c_k \right) = \sum_{k=1}^n \left((Z\mathbf{B})_{|k} \right) c_k = \left[Z\mathbf{B}_{|1}; \dots; Z\mathbf{B}_{|n} \right] \mathbf{c} = (Z\mathbf{B})\mathbf{c}.$$

□

Ejercicio 45(b) Puesto que $\mathbf{C}_{|j}$ es un vector de \mathbb{R}^q , aplicando las definiciones de producto de sistema por matriz, y matriz por matriz junto con la proposición anterior, tenemos:

$$\left(Z(\mathbf{BC}) \right)_{|j} = Z(\mathbf{BC})_{|j} = Z\left(\mathbf{B}(\mathbf{C}_{|j}) \right) \stackrel{(\text{Prop. 9.1.3})}{=} \left(Z\mathbf{B} \right)(\mathbf{C}_{|j}) = \left((Z\mathbf{B})\mathbf{C} \right)_{|j}, \quad \forall j = \{1, \dots, n\}.$$

□

Ejercicio 46. Por una parte, si z_i es combinación lineal del resto de vectores de Z , entonces

$$\begin{aligned} \vec{z}_i &= a_1 \vec{z}_1 + \dots + a_{i-1} \vec{z}_{i-1} + a_{i+1} \vec{z}_{i+1} + \dots + a_n \vec{z}_n \Rightarrow \\ \vec{0} &= a_1 \vec{z}_1 + \dots + a_{i-1} \vec{z}_{i-1} + (-1) \vec{z}_i + a_{i+1} \vec{z}_{i+1} + \dots + a_n \vec{z}_n \Rightarrow \\ \vec{0} &= Z\mathbf{a} \quad (\text{con } a_i = -1). \end{aligned}$$

Por otra parte, si $\vec{0} = Z\mathbf{a}$, con $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, entonces existe un $i \in 1, \dots, n$ tal que $a_i \neq 0$, y por lo tanto

$$\begin{aligned} \vec{0} &= a_1 \vec{z}_1 + \dots + a_{i-1} \vec{z}_{i-1} + a_i \vec{z}_i + a_{i+1} \vec{z}_{i+1} + \dots + a_n \vec{z}_n \Rightarrow \\ -a_i \vec{z}_i &= a_1 \vec{z}_1 + \dots + a_{i-1} \vec{z}_{i-1} + a_{i+1} \vec{z}_{i+1} + \dots + a_n \vec{z}_n \Rightarrow \\ \vec{z}_i &= \frac{-1}{a_i} (a_1 \vec{z}_1 + \dots + a_{i-1} \vec{z}_{i-1} + a_{i+1} \vec{z}_{i+1} + \dots + a_n \vec{z}_n). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 50. La matriz \mathbf{L} es de la forma

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ *_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ : & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ : & *_{21} & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ : & : & & 0 & 0 & \dots & 0 \\ : & : & \dots & *_{r1} & 0 & \dots & 0 \\ : & : & \dots & : & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

y puesto que el último pivote $*_{r1} \neq 0$, necesariamente la última fila con pivote tiene que estar multiplicada por cero ($x_r = 0$); pero entonces, como el penúltimo pivote $*_{r-11} \neq 0$, necesariamente la penúltima fila con pivote debe estar multiplicada por cero ($x_{r-1} = 0$); pero entonces, como $*_{r-21} \neq 0$, necesariamente ...y razonando sucesivamente, es evidente que $x_i = 0$ para $i = 1, \dots, r$.

Para ver que cada fila sin pivote es combinación lineal de las filas con pivote que la preceden, basta aplicar la eliminación sobre las filas de \mathbf{L} para anular todas las filas sin pivote⁴.

□

Ejercicio 51. El vector cero $\mathbf{0}$ de \mathbb{R}^n es múltiplo de cualquier otro vector \mathbf{x} de \mathbb{R}^n , pues $\mathbf{0} = 0 \cdot \mathbf{x}$; y por tanto, por la propiedad **P-3** el determinante de \mathbf{A} es cero:

$$\det [\mathbf{A}_{|1} \dots; \mathbf{0}; \dots; \mathbf{A}_{|n}] = \det [\mathbf{A}_{|1} \dots; 0\mathbf{x}; \dots; \mathbf{A}_{|n}] = 0 \cdot \det [\mathbf{A}_{|1} \dots; \mathbf{x}; \dots; \mathbf{A}_{|n}] = 0$$

⁴aplicar la eliminación con las filas es equivalente a aplicar transformaciones elementales “de izquierda a derecha” sobre el sistema de vectores $[_1|\mathbf{L}, \dots, _m|\mathbf{L}]$.

□

Ejercicio 52(a) Puesto que $\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \mathbf{A}(\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = \mathbf{A}(\mathbf{l}_{\tau_1}) \cdots (\mathbf{l}_{\tau_k})$, aplicando repetidamente (14.2) tenemos

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}) &= |\mathbf{A}(\mathbf{l}_{\tau_1}) \cdots (\mathbf{l}_{\tau_k})| \\ &= |\mathbf{A}(\mathbf{l}_{\tau_1}) \cdots (\mathbf{l}_{\tau_{(k-1)}})| \cdot |\mathbf{l}_{\tau_k}| \\ &= |\mathbf{A}(\mathbf{l}_{\tau_1}) \cdots (\mathbf{l}_{\tau_{(k-2)}})| \cdot |\mathbf{l}_{\tau_{(k-1)}}| \cdot |\mathbf{l}_{\tau_k}| \\ &\quad \vdots \\ &= |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{l}_{\tau_1}| \cdots |\mathbf{l}_{\tau_k}|. \end{aligned}$$

□

Ejercicio 52(b)

$$|\mathbf{B}| = \det(\mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = |\mathbf{l}_{\tau_1}| \cdots |\mathbf{l}_{\tau_k}|.$$

y como los determinantes de las matrices elementales son distintos de cero, necesariamente $|\mathbf{B}| \neq 0$.

□

Ejercicio 52(c) Si \mathbf{B} es de rango completo entonces es producto de k matrices elementales; por tanto $\mathbf{B} = \mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}$. Así

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A} \mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = \det(\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}) = |\mathbf{A}| \cdot (|\mathbf{l}_{\tau_1}| \cdots |\mathbf{l}_{\tau_k}|) = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|.$$

□

Ejercicio 53(a) Puesto que ambas son matrices elementales del mismo tipo, $\det(\mathbf{l}_\tau) = \det(\tau \mathbf{l})$.

□

Ejercicio 53(b) Puesto que $\mathbf{B} = \mathbf{l}_{\tau_1 \dots \tau_k} = (\mathbf{l}_{\tau_1}) \cdots (\mathbf{l}_{\tau_k})$, su determinante es el producto de los determinantes $\det(\mathbf{l}_{\tau_i})$

$$|\mathbf{B}| = \det(\mathbf{l}_{\tau_1}) \cdots \det(\mathbf{l}_{\tau_k}) = \prod_{i=1}^k \det(\mathbf{l}_{\tau_i}).$$

Pero también sabemos que $\mathbf{B}^\top = {}_{\tau_k \dots \tau_1} \mathbf{l} = (\tau_k \mathbf{l}) \cdots (\tau_1 \mathbf{l})$, por lo que su determinante es

$$|\mathbf{B}^\top| = \prod_{i=1}^k \det(\tau_i \mathbf{l}) = \prod_{i=1}^k \det(\mathbf{l}_{\tau_i}) = |\mathbf{B}|.$$

□

Ejercicio 54(a) Como la matriz de orden n es de rango completo, los n elementos de la diagonal principal son pivotes (i.e., distintos de cero).

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} *_1 & & & \\ : & *_2 & & \\ : & : & \ddots & \\ : & : & : & *_n \end{bmatrix} \quad \text{donde } *_j \text{ son números distintos de cero.}$$

Dividiendo cada columna j ésima por su pivote $*_j$ para normalizar los pivotes (y compensando dichas transformaciones multiplicando la última fila por cada pivote); y aplicando, en una segunda fase, la eliminación de izquierda a derecha con transformaciones de Tipo I para anular todo lo que queda a la izquierda de los pivotes (ahora basta multiplicar la última fila por 1), llegamos a:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} *_1 & & & \\ \vdots & *_2 & & \\ & \vdots & \ddots & \\ \vdots & \vdots & & *_n \\ \hline & & & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{smallmatrix} \tau \\ [(*)_1(n+1)] \\ [(*)_n(n+1)] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} \tau \\ [(\frac{1}{*_1})1] \\ [(\frac{1}{*_n})n] \end{smallmatrix}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & & & \\ \vdots & 1 & & \\ & \vdots & \ddots & \\ \vdots & \vdots & & 1 \\ \hline & & & *_1 \cdot *_2 \cdots *_n \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{smallmatrix} \tau \\ [(1)(n+1)] \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} \tau_1 \dots \tau_q \\ \text{(de Tipo I)} \end{smallmatrix}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \\ \hline & & & *_1 \cdot *_2 \cdots *_n \end{array} \right]$$

por tanto, si la matriz es triangular inferior es de rango completo, su determinante es igual al producto de sus pivotes; es decir, al producto de los elementos de la diagonal.

$$\det(\mathbf{L}) = \text{producto de los elementos de la diagonal}$$

□

Ejercicio 54(b) Una matriz de orden n y triangular solo puede ser de rango completo si los n elementos de la diagonal son distintos de cero. Por tanto, si la matriz triangular es singular, necesariamente tiene algún cero en su diagonal principal. Como su determinante es cero, por ser singular, su determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal (donde uno de ellos es cero).

□

Ejercicio 54(c)

$$\det(\mathbf{U}) = \det(\mathbf{U}^T) = \text{producto de los elementos de la diagonal}$$

por ser \mathbf{U}^T triangular inferior.

□

Ejercicio 55(a) Puesto que $\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{B} \end{bmatrix}$ entonces $\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{I} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$.

□

Ejercicio 55(b) Puesto que

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{I} \\ \mathbf{C} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{B} \end{bmatrix}$$

y puesto que mediante una sucesión τ_1, \dots, τ_k de transformaciones elementales *Tipo I* es posible la transformación $\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \xrightarrow{\tau_1, \dots, \tau_k} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{I} \\ \mathbf{C} & \mathbf{I} \end{bmatrix}$ tenemos que $\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{I} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{I} \\ \mathbf{C} & \mathbf{I} \end{vmatrix}$; y por tanto

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{I} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{I} \\ \mathbf{C} & \mathbf{I} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{I} \\ \mathbf{C} & \mathbf{I} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|.$$

□

Ejercicio 56. Desarrollando por la segunda columna tenemos

$$\det \mathbf{A} = -0 \begin{vmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 5 & 2 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 5 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 + 17 - 0 + 3 \times 4 = 29$$

□

Ejercicio 57.

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} &= -b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + e \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} - h \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} \\
 &= -b(-fg + id) + e(-cg + ia) - h(-cd + fa) \\
 &= bfg - bdi - ecg + eia + hcd - hfa && \text{desarrollando términos} \\
 &= a(ei - hf) - d(bi - hc) + g(bf - ec) && \text{reordenando} \\
 &= aei + bfg + dhc - gec - dbi - hfa && \text{reordenando.}
 \end{aligned}$$

(esta fórmula se denomina regla de Sarrus)

□

Ejercicio 58. Sea λ un autovalor de \mathbf{A} y sean \mathbf{x} y \mathbf{y} dos autovectores correspondientes al autovalor λ , es decir, tales que $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$ y $\mathbf{Ay} = \lambda\mathbf{y}$; entonces

$$\mathbf{A}(a\mathbf{x} + b\mathbf{y}) = a\mathbf{Ax} + b\mathbf{Ay} = \lambda a\mathbf{x} + \lambda b\mathbf{y} = \lambda(a\mathbf{x} + b\mathbf{y}).$$

□

Ejercicio 59. Extendemos el sistema $[\mathbf{q}]$ hasta formar una base ortogonal de \mathbb{R}^n

$$[\mathbf{q}] \longrightarrow [\mathbf{q}; \mathbf{z}_1; \dots \mathbf{z}_{(n-1)}];$$

y luego colocamos \mathbf{q} en la última posición y normalizamos todos los vectores; obteniendo la siguiente base ortonormal de \mathbb{R}^n :

$$\left[\frac{1}{\|\mathbf{z}_1\|}(\mathbf{z}_1); \dots \frac{1}{\|\mathbf{z}_{(n-1)}\|}(\mathbf{z}_{(n-1)}); \mathbf{q} \right].$$

□

Ejercicio 60. ${}_i\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q}_j = (\mathbf{Q}_{|i}) \cdot (\mathbf{Q}_{|j}) = \begin{cases} 1 & \text{cuando } i = j \\ 0 & \text{cuando } i \neq j \end{cases}$, es decir $\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_{n \times n}$.

□

Ejercicio 61(a) $(\mathbf{QR})^\top = \mathbf{R}^\top (\mathbf{Q}^\top) = \mathbf{R}^{-1} (\mathbf{Q}^{-1}) = (\mathbf{QR})^{-1}$.

□

Ejercicio 61(b) $(\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q})^\top = \mathbf{Q}^\top \mathbf{A} (\mathbf{Q}^{-1})^\top = \mathbf{Q}^\top \mathbf{A} (\mathbf{Q}^\top)^\top = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q}$.

□

Ejercicio 62. Si $\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{D}$ es diagonal, entonces $\mathbf{A} = \mathbf{Q} \mathbf{D} \mathbf{Q}^\top$. Por tanto, $\mathbf{A}^\top = (\mathbf{Q} \mathbf{D} \mathbf{Q}^\top)^\top = \mathbf{Q} \mathbf{D} \mathbf{Q}^\top = \mathbf{A}$.

□

Ejercicio 63(a) $\mathbf{x}(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{x} = (\mathbf{x}\mathbf{A} + \mathbf{x}\mathbf{B})\mathbf{x} = \mathbf{x}\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}\mathbf{B}\mathbf{x} > 0$; por ser la suma de dos números positivos. □

Ejercicio 63(b) \mathbf{A} es invertible y, como es simétrica, es ortogonalmente diagonalizable $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^T$; así

$$\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^{-1})^{-1} = (\mathbf{Q}^{-1})^{-1} \mathbf{D}^{-1} \mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{Q}^T;$$

y como los autovalores de \mathbf{A} son positivos, sus inversos (los autovalores de \mathbf{A}^{-1} que se encuentran en la diagonal de \mathbf{D}^{-1}) también lo son. □

Ejercicio 64. Si \mathbf{A} es definida positiva, entonces para cualquier $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ no nulo se verifica que $\mathbf{x}\mathbf{A}\mathbf{x} > 0$. En particular, si \mathbf{x} es la columna j ésima de la matriz identidad, tenemos

$$j|\mathbf{A}\mathbf{I}|_j = j|\mathbf{A}|_j > 0.$$

La demostración es análoga para el caso semidefinido. □

Bibliografía

- Arvesú Carballo, J., Marcellán Español, F., and Sánchez Ruiz, J. (2005). *Problemas resueltos de Álgebra Lineal*. Thomson Learning, Madrid. España. ISBN 84-9732-284-3.
- Cullen, C. G. (1972). *Matrices and Linear Transformations*. Dover publications, Inc., New York, USA., second ed.
- Larson, R., Edwards, B. H., and Falvo, D. C. (2004). *Álgebra lineal*. Ediciones Pirámide, Madrid. España, fifth ed. ISBN 84-368-1878-4. Título de la obra original: Elementary Linear Algebra. Houghton Mifflin Company.
- Lay, D. C. (2007). *Álgebra Lineal y sus aplicaciones*. Pearson Educación, Inc., third ed.
- Poole, D. (2004). *Álgebra lineal. Una introducción moderna*. Thomson Learning, Mexico D.F. ISBN 970-686-272-2.
- Strang, G. (2003). *Introduction to Linear Algebra*. Wellesley-Cambridge Press, Wellesley, Massachusetts. USA, third ed. ISBN 0-9614088-9-8.
- Strang, G. (2007). *Álgebra Lineal y sus Aplicaciones*. Thomson Learning, Inc, Santa Fe, México, D. F., fourth ed. ISBN 970686609-4.

C

combinación lineal de los vectores de Z ($Z\mathbf{a}$).
concatenación de los sistemas Y y Z ($Y \sim Z$).
conjunto de matrices de orden $m \times n$ $\mathbb{R}^{m \times n}$.
conjunto de numeros complejos (\mathbb{C}).
conjunto de numeros reales (\mathbb{R}).
conjunto de sistemas de n números reales \mathbb{R}^n .

E

espacio columna de \mathbf{A} ($\mathcal{C}(\mathbf{A})$).
espacio nulo de \mathbf{A} ($\mathcal{N}(\mathbf{A})$).
espacios vectoriales ($\mathcal{C}, \mathcal{N}, \mathcal{X}, \mathcal{V}, \mathcal{W}$).

M

matrices particionadas ($\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$).
matrices ($\mathbb{R}^{m \times n}$) ($\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$).
 elemental (\mathbf{I}_{τ}).
 Tipo I ($\mathbf{I}_{\tau}^{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}$).
 Tipo II ($\mathbf{I}_{\tau}^{[(\alpha)\mathbf{i}]}$).
 escalonada reducida (por columnas) (\mathbf{R}).
 identidad (\mathbf{I}).
 intercambio ($\mathbf{I}_{\tau}^{[p \rightleftharpoons q]}$).
 invertible, de rango completo, o no singular ($\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$).
 inversa (de \mathbf{A}) (\mathbf{A}^{-1}).
 nula ($\mathbf{0}$).
 permutación ($\mathbf{I}_{\tau}^{[\sigma]}$).
 pre-escalonada (\mathbf{K}).
 rango de \mathbf{A} ($\text{rango}(\mathbf{A})$).
 transpuesta (\mathbf{A}^T ; transpuesta de \mathbf{A}).
 triangular inferior (\mathbf{L}).
 triangular superior (\mathbf{U}).

O

operador selector de componentes ($|$).
 por la derecha selecciona el elemento i ésimo de un sistema ($|i$).
 por la izquierda selecciona el elemento i ésimo de un vector o la fila i ésima de una matriz ($i|$).
operador transposición (\top).

P

producto punto (producto escalar usual en \mathbb{R}^n) ($\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$).

S

Sistema de ecuaciones lineales ($\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$).

sistemas de vectores de un subespacio genérico \mathcal{V} ($\mathbf{A}, \mathbf{B}, \dots, \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}$).

subespacio engendrado por un sistema \mathcal{Z} ($\mathcal{L}(\mathcal{Z})$).

suma directa de los subespacios \mathcal{A} y \mathcal{B} ($\mathcal{A} \oplus \mathcal{B}$).

T

Transformación (τ).

de las columnas de \mathbf{A} (\mathbf{A}_τ).

elemental Tipo I; suma λ veces el vector i ésimo al vector j ésimo $\left(\begin{matrix} \tau \\ [(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}] \end{matrix} \right)$.

elemental Tipo II; multiplica por α el vector i ésimo vector $\left(\begin{matrix} \tau \\ [(\alpha)\mathbf{i}] \end{matrix} \right)$.

intercambio entre los vectores i ésimo y j ésimo $\left(\begin{matrix} \tau \\ [\mathbf{i}=\mathbf{j}] \end{matrix} \right)$.

inversa de τ (τ^{-1}).

permutación de vectores $\left(\begin{matrix} \tau \\ [\odot] \end{matrix} \right)$.

V

vectores de \mathbb{R}^n ($\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$).

columna j ésima de \mathbf{A} ($\mathbf{A}_{|j}$).

combinación lineal de las columnas de \mathbf{A} (\mathbf{Ab}).

combinación lineal de las filas de \mathbf{A} (\mathbf{aB}).

fila i ésima de \mathbf{A} (${}_i|\mathbf{A}$).

nulo ($\mathbf{0}$).

vectores de un espacio vectorial genérico \mathcal{V} ($\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$).

conjuntos

$\{X, Y, X, \dots\}$ conjunto.
 \mathbb{C} conjunto de numeros complejos.
 \mathbb{R} conjunto de numeros reales.
 $\mathbb{R}^{m \times n}$ conjunto de matrices de orden $m \times n$.
 \mathbb{R}^n conjunto de sistemas de n números reales.

espacios y subespacios vectoriales

$\mathcal{C}(\mathbf{A})$ espacio columna de \mathbf{A} .
 $\mathcal{C}, \mathcal{N}, \mathcal{X}, \mathcal{V}, \mathcal{W}$ espacios vectoriales.
 $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ espacio nulo de \mathbf{A} .
 $\mathcal{L}(\mathbf{Z})$ subespacio engendrado por un sistema \mathbf{Z} .
 $\mathcal{A} \oplus \mathcal{B}$ suma directa de los subespacios \mathcal{A} y \mathcal{B} .

matrices

$[a \ b \ c \ \dots]$ con $a, b, c \in \mathbb{R}^m$; matriz de $\mathbb{R}^{m \times n}$.
 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ matrices ($\mathbb{R}^{m \times n}$).
 \mathbf{R} matriz escalonada reducida (por columnas).
 \mathbf{A}^{-1} matriz inversa (de \mathbf{A}).
 \mathbf{I}_{τ} matriz elemental.
 $\mathbf{I}_{\tau}^{[(\lambda)\mathbf{i}+\mathbf{j}]}$ matriz elemental Tipo I.
 $\mathbf{I}_{\tau}^{[(\alpha)\mathbf{i}]}$ matriz elemental Tipo II.
 \mathbf{I} matriz identidad.
 $\mathbf{I}_{\tau}^{[p \rightleftharpoons q]}$ matriz intercambio.
 $\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ matriz invertible, de rango completo, o no singular.
 $\mathbf{0}$ matriz nula.
 $\mathbf{I}_{\tau}^{[\odot]}$ matriz permutación.
 \mathbf{A}^{\top} transpuesta de \mathbf{A} .
 \mathbf{K} matriz pre-escalonada.
 $\text{rango}(\mathbf{A})$ rango de \mathbf{A} .
 \mathbf{L} matriz triangular inferior.
 \mathbf{U} matriz triangular superior.

matrices particionadas

$\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ matrices particionadas.

operaciones

$a \cdot b$ producto punto (producto escalar usual en \mathbb{R}^n).

operadores

\top operador transposición.
 $|$ operador selector de componentes.
 $i|$ por la izquierda.
 $|i$ por la derecha.

Sistema de ecuaciones lineales

$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ Sistema de ecuaciones lineales.

sistema de vectores de un espacio vectorial generico

$Y \sim Z$ concatenación de los sistemas Y y Z .
 A, B, \dots, X, Y, Z sistemas de vectores de un subespacio genérico \mathcal{V} .

sistemas genéricos

$[X; Y; Z; \dots]$ sistema.

transformaciones elementales (o sucesiones de transformaciones elementales)

τ Transformación.
 $\tau_{[i \rightleftharpoons j]}$ intercambio entre los vectores i ésimo y j ésimo.
 $\tau_{[\odot]}$ permutación de vectores.
 \mathbf{A}_τ de las columnas de \mathbf{A} .
 $\tau_{[(\alpha)i]}$ elemental Tipo II; multiplica por α el vector i ésimo vector.
 $\tau_{[(\lambda)i+j]}$ elemental Tipo I; suma λ veces el vector i ésimo al vector j ésimo.
 τ^{-1} transformación inversa de τ .

vectores

$Z\mathbf{a}$ combinación lineal de los vectores de Z .
 $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ vectores de un espacio vectorial genérico \mathcal{V} .
 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ vectores de \mathbb{R}^n .
 $\mathbf{A}_{|j}$ columna j ésima de \mathbf{A} .
 $\mathbf{A}\mathbf{b}$ combinación lineal de las columnas de \mathbf{A} .
 \mathbf{aB} combinación lineal de las filas de \mathbf{A} .
 $i|\mathbf{A}$ fila i ésima de \mathbf{A} .
 (a, b, c, \dots) vector de \mathbb{R}^n ; con $a, b, c, \dots \in \mathbb{R}$.
 $\mathbf{0}$ nulo.

- combinación lineal, 24, 27, 76, 101
- concatenación de sistemas, 108
- conjunto, 3
- coordenadas, 112

- ecuaciones cartesianas, 87
- ecuaciones paramétricas, 90
- ecuación lineal, 85
- eliminación, 51
 - de izquierda a derecha, 51, 108
 - pre-escalonar, 51
 - Gauss-Jordan, 53
 - escalonar y reducir, 53
 - gaussiana, 52, 53
 - escalonar, 53
- eliminación por filas, 54
- eliminación por filas, 55
- escalares, 3
 - números reales, 3
- espacio vectorial, 74
 - subespacio, *véase* subespacios vectoriales

- función, 81
 - composición de funciones, 84
 - invertible, 83
 - notación, 82
 - producto por un escalar, 80
 - suma de funciones, 80
- función lineal, 78
 - composición, 79
 - invertible, 79

- linealidad, *véase* operador lineal

- matriz, 11
 - columna de una matriz, 13
 - columna libre de una matriz, 90
 - columna pivote de una matriz, 90
 - componente (o elemento) de una, 12
 - cuadrada, 18
 - diagonal, 18
 - elemental, 43
 - elemental de Tipo I, 44
 - elemental de Tipo II, 45
 - escalonada, 52, 54
 - escalonada por filas, 55
 - escalonada reducida, 53, 54
 - fila de una matriz, 12
 - fila pivote de una matriz, 114
 - identidad, 18
 - igualdad, 14
 - intercambio, 49
 - inversa, 57
 - invertible, 57, 59, 61, 69
 - matriz columna*, 11, 15, 16
 - matriz fila*, 16
 - múltiplo de, 19
 - notación, 12
 - nula, 17
 - opuesta, 17
 - orden de una matriz, 12, 18
 - permutación, 50
 - pre-escalonada, 51, 54
 - producto de matrices, 29, 31, 36
 - producto por un escalar, 19
 - rango, 67
 - rango completo, 69, 110
 - rango completo por columnas, 69
 - rango completo por filas, 69
 - rectangular, 18
 - selección de un elemento (o componente), 14
 - selección de una columna, 13, 14
 - selección de una fila, 13, 14
 - simétrica, 18
 - singular, 57
 - suma, 19
 - transpuesta, 16, 32
 - triangular inferior, 66
 - triangular superior, 66
- matriz particionada, 34
 - producto, 35
 - suma de, 35
- método de eliminación, 51, 78
 - Gauss-Jordan, 53
 - gaussiano, 53

- nomenclatura de G. Strang, 90, 116

- operador lineal, 6, 19–21, 23, 26, 28, 31, 48, 102
- permutación, 50
- pivote, 51
 - columna pivote, 90
 - eliminación por filas, 55
 - fila pivote, 114
 - posición de pivote en eliminación por filas, 55
 - posición de pivote, 51, 67
- pre-escalonar, 51
- producto punto, 23
- Rouché-Frobenius* (Teorema), 98
- selector (*operador*), 4, 13, 14, 29, 33, 101, 108
- sistema, 3, 11, 101
- sistema de vectores de \mathcal{V}
 - generador de un subespacio, 103, 104
 - sistemas equivalentes, 104
 - linealmente dependiente, 106
 - linealmente independiente, 106, 107
 - sistemas acoplados, 108
- sistemas de ecuaciones lineales, 85
 - homogéneos, 86
 - solución trivial, 86
 - matriz de coeficientes ampliada, 93
 - no homogéneos, 93
 - soluciones especiales, 90
 - variables libres (o exógenas), 90
 - variables pivote (o endógenas), 90
- subespacios vectoriales, 76
 - base, 106
 - dimensión, 107, 118
 - espacio columna de \mathbf{A} , 98
 - espacio fila de \mathbf{A} , 114
 - espacio nulo de \mathbf{A} , 87
 - espacio nulo por la izquierda de \mathbf{A} , 113
 - generado por un sistema $\mathcal{L}(Z)$, 103, 104
 - iguales, 104, 107
 - intersección de, 77
 - subespacios complementarios, 119
 - suma de subespacios, 118
 - suma directa de subespacios, 118
- Teorema Fundamental del Álgebra Lineal, 119
- transformación elemental, 43
 - de las columnas de una matriz, 44, 46
 - de las filas de una matriz, 54
 - de los vectores de un sistema Z , 105
 - intercambio, 49
 - inversa, 59
 - permutación, 38, 50
 - secuencia de transformaciones, 48
 - Tipo I, 43
 - Tipo II, 45
 - transpuesta, 54
- vectores de \mathcal{V} , 74
 - combinación lineal, 76, 101
 - múltiplo de, 74
 - producto por escalares de, 74
 - suma de, 74
- vectores de \mathbb{R}^n , 3
 - combinación lineal, 24, 27
 - igualdad, 4
 - múltiplo de, 6
 - notación, 4
 - nulo, 5
 - opuesto, 5
 - producto escalar usual en \mathbb{R}^n , véase producto punto
 - producto por un escalar de, 6
 - selección de una componente, 4, 14, 15
 - suma, 6