Sesión 11 (D) — El cuarteto de Anscombe: cuatro rectas iguales, cuatro nubes distintas

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

Material adicional de la sesión, fuera del guion troncal: dura media hora y puede hacerse por su cuenta.

En la práctica C de la sesión 7 (actividad 1 (html)) vimos cuatro empresas con el mismo salario medio y la misma desviación típica y estructuras salariales muy distintas: los momentos no bastan para describir *una* variable. Hoy repetimos la comprobación con *dos* variables y su recta de regresión. El estadístico Francis Anscombe construyó en 1973 cuatro conjuntos de once puntos (x, y) que comparten, cifra por cifra, todo lo que una tabla de regresión resume: medias, varianzas, correlación, recta ajustada y R^2. Y sin embargo, sus diagramas de dispersión son completamente distintos.

Objetivos

1. Estimar la misma regresión simple sobre cuatro conjuntos de datos y comprobar que las cuatro tablas de resultados son idénticas.
2. Dibujar los cuatro diagramas de dispersión y ver que solo uno de ellos es lo que la tabla sugiere.
3. Sacar la conclusión: la tabla de una regresión (coeficientes, R^2, sumas de cuadrados) no dice qué forma tiene la nube de puntos; sin el gráfico, no se sabe qué se ha ajustado.

Comandos de esta práctica. `nulldata`, `setobs`, `series`, `summary --simple`, `printf`, `gnuplot` (sesiones 4 y 7) y `ols` con sus accesores `$coeff`, `$rsq` y `$ess` (práctica A de esta sesión). Dos detalles nuevos:

`{10, 8, 13, ...}'` una fila de números entre llaves, separados por comas, es una matriz fila; el apóstrofo final la traspone a columna, y así puede convertirse en una serie con un valor por observación.

`loop i=1..4` repite las líneas hasta `endloop` con `i` valiendo 1, 2, 3 y 4; dentro, `x$i` se convierte en `x1`, `x2`, etc. Como en la sesión 7, lo presentamos sin explicar su mecánica.

Actividad 1 - Los cuatro conjuntos de datos

Los cuatro comparten el mismo $\boldsymbol{x}$ salvo el último, en el que diez observaciones tienen el mismo valor.

Conjunto de once observaciones. Cada serie se escribe a mano: una fila de once números entre llaves, traspuesta con el apóstrofo para que sea una columna. Los tres primeros conjuntos comparten el regresor, por eso `x2` y `x3` se copian de `x1`. La última línea muestra media, mediana, desviación típica, mínimo y máximo de las ocho series.

en línea de comandos:

```
nulldata 11
setobs 1 1 --cross-section

series x1 = {10, 8, 13, 9, 11, 14, 6, 4, 12, 7, 5}'
series y1 = {8.04, 6.95, 7.58, 8.81, 8.33, 9.96, 7.24, 4.26, 10.84, 4.82, 5.68}'
series x2 = x1
series y2 = {9.14, 8.14, 8.74, 8.77, 9.26, 8.10, 6.13, 3.10, 9.13, 7.26, 4.74}'
```

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

```
series x3 = x1
series y3 = {7.46, 6.77, 12.74, 7.11, 7.81, 8.84, 6.08, 5.39, 8.15, 6.42, 5.73}'
series x4 = {8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 19, 8, 8, 8}'
series y4 = {6.58, 5.76, 7.71, 8.84, 8.47, 7.04, 5.25, 12.50, 5.56, 7.91, 6.89}'

summary x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 --simple
```

```
                Media     Mediana      D. T.         Mín         Máx
x1              9,000       9,000      3,317       4,000       14,00
y1              7,501       7,580      2,032       4,260       10,84
x2              9,000       9,000      3,317       4,000       14,00
y2              7,501       8,140      2,032       3,100       9,260
x3              9,000       9,000      3,317       4,000       14,00
y3              7,500       7,110      2,030       5,390       12,74
x4              9,000       8,000      3,317       8,000       19,00
y4              7,501       7,040      2,031       5,250       12,50
```

Lo que debe observar

Las cuatro parejas tienen la misma media de x (9,0), la misma media de y (7,50) y las mismas desviaciones típicas (hasta el segundo decimal). Con lo visto en la práctica C de la sesión 7, ya sabe que la coincidencia de estos momentos no implica que las nubes sean parecidas.

Actividad 2 - Cuatro regresiones

El primer `printf` imprime una cabecera. El bucle estima con `--quiet`, para cada conjunto, la regresión de `y$i` sobre la constante y `x$i`, y a continuación imprime una fila con el número del conjunto (`%d` es el formato de un entero), los dos coeficientes (`$coeff`), la correlación (`corr`), el R^2 (`$rsq`) y la suma de cuadrados de los residuos (`$ess`). Los anchos de campo alinean las columnas.

en línea de comandos:

```
printf "conjunto   beta1     beta2     rho(x,y)    R2       SRC\n"
loop i=1..4 --quiet
    ols y$i const x$i --quiet
    printf "   %d     %7.3f   %7.4f   %8.4f   %7.4f   %7.3f\n", i, $coeff(const), $coeff(x$i), corr(x$i, y$i), $rsq, $ess
endloop
```

```
conjunto   beta1      beta2      rho(x,y)    R2       SRC
   1       3,000     0,5001     0,8164    0,6665    13,763
   2       3,001     0,5000     0,8162    0,6662    13,776
   3       3,002     0,4997     0,8163    0,6663    13,756
   4       3,002     0,4999     0,8165    0,6667    13,742
```

Lo que debe observar

Las cuatro filas son la misma: recta $\hat{y} = 3{+}0{,}5x$, correlación 0,82, $R^2 = 0{,}67$, la misma suma de cuadrados de los residuos. Si solo tuviera estas tablas, diría que ha ajustado cuatro veces el mismo modelo a cuatro muestras equivalentes. El `loop` que hemos usado repite el mismo bloque para `i` de 1 a 4; su mecánica se explica en la práctica A de la sesión 16 (actividad 3 (html)); aquí basta con leerlo.

Actividad 3 - Cuatro diagramas de dispersión

en línea de comandos (o, para cada pareja, marque **y** *y* **x***, botón derecho, /Gráfico X-Y)/*. Cuatro diagramas de dispersión, `y` en el eje vertical y `x` en el horizontal, cada uno con su recta ajustada; en la consola, cada uno se abre en su ventana:

```
gnuplot y1 x1
gnuplot y2 x2
gnuplot y3 x3
gnuplot y4 x4
```




Figura 1: Los cuatro conjuntos de Anscombe, con la recta ajustada (la misma en los cuatro).

Lo que debe observar

Solo el primer conjunto es lo que la tabla sugiere: una nube alargada alrededor de la recta, con dispersión parecida en todo el rango. El segundo es una curva exacta, sin dispersión: la relación existe, pero no es lineal, y la recta la describe mal. El tercero es una recta exacta con una sola observación alejada de ella, que tira de la pendiente. Y el cuarto no tiene relación alguna: diez puntos con el mismo x y uno solo, muy alejado, que determina por completo la recta. Cuatro situaciones distintas, cuatro conclusiones distintas, la misma tabla.

Actividad 4 - Síntesis

Todo lo que una regresión simple imprime ($\hat{\beta}_1$, $\hat{\beta}_2$, R^2, STC, SEC, SRC) se calcula con cinco números: dos medias, dos varianzas y una covarianza. Dos conjuntos de datos que compartan esos cinco números tendrán la misma tabla, tengan la forma que tengan. Es la versión bivariante de lo que vimos con los salarios de las cuatro empresas, y la razón práctica de la advertencia de la lección 8: un R^2 no certifica que el modelo esté bien especificado. El diagrama de dispersión es la única forma de saber qué se ha ajustado.

Preguntas de interpretación para la clase

1. ¿Por qué basta con que dos conjuntos compartan medias, varianzas y covarianza para que su tabla de regresión sea idéntica? Enumere qué cantidades de la tabla dependen de cada uno de esos cinco números.

2. En el segundo conjunto no hay dispersión: los puntos están sobre una parábola. ¿Por qué el R^2 no vale 1?

3. En el cuarto conjunto, ¿qué ocurriría con la recta si se quitara la observación con $x = 19$? ¿Y con el R^2?

4. ¿Cuál de los cuatro conjuntos ilustra la situación de la práctica A de la sesión 14 (actividad 6 (html)), una vivienda que tira del ajuste?

Para profundizar:

- Anscombe, F. J. (1973). "Graphs in Statistical Analysis". *The American Statistician*, 27(1), 17-21.
- Lección 8 (lección 8), sección "Una advertencia: el nombre *suma explicada* es engañoso".

Código completo de la práctica

```
# ------------------------------------------------------------
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# ------------------------------------------------------------

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↪  directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#    DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↪  trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).
#
# Cada actividad guarda su salida en un fichero de texto (el que el documento de la práctica
# muestra) y la imprime a continuación en pantalla con readfile(), de modo que al ejecutar
# este guion se ve lo mismo que en el documento.

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

set verbose off

outfile --quiet datos.txt
    nulldata 11
    setobs 1 1 --cross-section

    series x1 = {10, 8, 13, 9, 11, 14, 6, 4, 12, 7, 5}'
    series y1 = {8.04, 6.95, 7.58, 8.81, 8.33, 9.96, 7.24, 4.26, 10.84, 4.82, 5.68}'
    series x2 = x1
    series y2 = {9.14, 8.14, 8.74, 8.77, 9.26, 8.10, 6.13, 3.10, 9.13, 7.26, 4.74}'
    series x3 = x1
    series y3 = {7.46, 6.77, 12.74, 7.11, 7.81, 8.84, 6.08, 5.39, 8.15, 6.42, 5.73}'
    series x4 = {8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 19, 8, 8, 8}'
    series y4 = {6.58, 5.76, 7.71, 8.84, 8.47, 7.04, 5.25, 12.50, 5.56, 7.91, 6.89}'

    summary x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 --simple
end outfile
printf "%s", readfile("datos.txt")   # en pantalla

outfile --quiet regresiones.txt
    printf "conjunto   beta1     beta2     rho(x,y)    R2       SRC\n"
    loop i=1..4 --quiet
        ols y$i const x$i --quiet
        printf "   %d     %7.3f   %7.4f   %8.4f   %7.4f   %7.3f\n", i, $coeff(const), $coeff(x$i),
        ↪  corr(x$i, y$i), $rsq, $ess
    endloop
end outfile
printf "%s", readfile("regresiones.txt")   # en pantalla

gnuplot y1 x1 --output=display                    # en pantalla
gnuplot y1 x1 --output="@workdir/anscombe1.png"   # guardada para el documento
gnuplot y2 x2 --output=display                    # en pantalla
gnuplot y2 x2 --output="@workdir/anscombe2.png"   # guardada para el documento
gnuplot y3 x3 --output=display                    # en pantalla
gnuplot y3 x3 --output="@workdir/anscombe3.png"   # guardada para el documento
gnuplot y4 x4 --output=display                    # en pantalla
gnuplot y4 x4 --output="@workdir/anscombe4.png"   # guardada para el documento
```

Enlace al guión: S11-Prct-D-anscombe.inp

Respuestas

1. *Cinco números.* $\hat{\beta}_2 = \sigma_{\boldsymbol{xy}}/\sigma_{\boldsymbol{x}}^2$ (lección 7) depende de la covarianza y de la varianza de x; $\hat{\beta}_1 = \mu_{\boldsymbol{y}} - \hat{\beta}_2\mu_{\boldsymbol{x}}$ añade las dos medias; $R^2 = \rho^2 = \sigma_{\boldsymbol{xy}}^2/(\sigma_{\boldsymbol{x}}^2\sigma_{\boldsymbol{y}}^2)$ (lección 8) usa la covarianza y las dos varianzas; $\text{STC} = n\sigma_{\boldsymbol{y}}^2$ y $\text{SRC} = (1 - R^2)\,\text{STC}$. Ninguna cantidad de la tabla depende de los datos uno a uno: todas son funciones de esos cinco resúmenes, y dos nubes que los compartan son indistinguibles para la regresión.

2. *Parábola sin dispersión.* Porque R^2 mide cuánto se acerca $\boldsymbol{y}$ al *plano* $\mathcal{L}(\mathbf{1}, \boldsymbol{x})$, es decir, a la mejor *recta*. Una parábola no está en ese plano: la distancia de $\boldsymbol{y}$ a la recta ajustada no es cero aunque la relación entre x e y sea exacta. El residuo es la parte de $\boldsymbol{y}$ que la recta no reproduce, y aquí esa parte es la curvatura. Es un caso de modelo mal especificado, no de datos dispersos; la lección 9 lo llamaría un fallo del primer supuesto.

3. *Quitar el punto de $x = 19$.* Los diez puntos restantes tienen todos $x = 8$: el regresor en desviaciones es el vector nulo, $\sigma_{\boldsymbol{x}}^2 = 0$, y la pendiente no está definida (Gretl no puede estimar el modelo). Esa única observación no influye en la recta: la determina por completo. El R^2 tampoco existe sin ella. Es la versión extrema de la actividad 6 de la práctica A de la sesión 14.

4. *El cuarto.* Allí una vivienda lejos del centro del rango y lejos de la recta movía el ajuste de forma visible; aquí una sola observación está tan lejos de las demás en el eje de x que determina por completo la recta. El tercer conjunto ilustra lo contrario: un punto lejos de la recta pero dentro del rango de x, que tira de la pendiente sin llegar a determinarla.