

Sesión 21 (B) — Dos regresores que no son significativos: uno a uno y a la vez

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

Cuando un modelo tiene dos regresores con t pequeños, la tentación es quitar los dos. La lección 13 avisó de que dos t pequeños no son un F pequeño: la pregunta “¿sobra esta variable?” y la pregunta “¿sobran estas dos?” son distintas, y solo la segunda se responde con el F de $q = 2$. Esta práctica hace las dos preguntas sobre unos datos pequeños y compara.

Volvemos a **data4-1** de Ramanathan, el fichero de catorce viviendas de la [actividad 1 \(html\)](#) de la práctica A de la sesión 14, con el modelo `price ~ sqft + bedrms + baths`: precio en miles de dólares, superficie en pies cuadrados, número de dormitorios y de baños. Con $n = 14$ y $k = 4$ quedan diez grados de libertad, y estos datos permiten decir poco.

Objetivos

1. Leer los t de **bedrms** y **baths** en el modelo completo y omitir los regresores de uno en uno.
2. Contrastar la exclusión conjunta con el F de $q = 2$, a mano y con **restrict**, y compararla con las exclusiones una a una.
3. Ver que el conjunto de pares $(\beta_{\text{bedrms}}, \beta_{\text{baths}})$ que el F no rechaza no es el rectángulo formado por los dos intervalos: contrastar las cuatro esquinas del rectángulo.
4. Distinguir “no se rechaza que sean cero” de “son cero”.

Comandos nuevos de esta práctica. Seguimos usando **ols** y sus accesorios, **critical** y **pvalue** (sesión 18) y **restrict** con los coeficientes nombrados por su variable (práctica A de esta sesión). Lo nuevo:

restrict --quiet hace el contraste sin imprimir las estimaciones restringidas. Sirve cuando solo queremos el estadístico.

\$test tras un contraste, el valor de su estadístico; aquí, el F que **restrict** acaba de calcular. Guardarlo en un escalar permite compararlo con el valor crítico o pasarlo a **pvalue**.

Escalares en una restricción a la derecha del igual, en lugar de un número, puede ir el nombre de un escalar: `b[bedrms] = iL`.

\$vcv la matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes del último modelo. Entre corchetes, `$vcv[3,4]`, se toma el elemento de la fila 3 y la columna 4: la covarianza entre el tercer y el cuarto coeficiente. Aparece en el guion completo de la Actividad 3.

Actividad 1 - El modelo completo y los regresores uno a uno

Abra **data4-1** (Archivo ->Abrir archivo de datos ->Archivo de muestra, pestaña Ramanathan) y estime **price** sobre **sqft**, **bedrms** y **baths** con Modelo ->Mínimos cuadrados ordinarios. Después omite **baths**, y después también **bedrms**, anotando en cada paso el t de lo que queda y la SRC.

Tres estimaciones seguidas con `ols`, sin `--quiet` para ver las tres tablas: el modelo completo, el modelo sin `baths` y el modelo con `sqft` solo. Cada `ols` sustituye al anterior como último modelo, así que los accesores se refieren siempre a la tabla que acaba de imprimirse. Tras la primera estimación se guardan tres escalares que harán falta en la Actividad 2: `SRC` (`$ess`), `df` (los grados de libertad, `$df`) y `s2`, la cuasivarianza `SRC/df`; tras la tercera, `SRCr`. El guion completo calcula además los `t` como cociente de `$coeff` y `$stderr`.

o bien teclee en línea de comandos:

```
open data4-1.gdt --quiet
```

```
ols price const sqft bedrms baths
scalar SRC = $ess
scalar df = $df
scalar s2 = SRC/df
printf "t_c al 5%% (%d g.l.) = %.3f\n", df, critical(t, df, 0.025)
ols price const sqft bedrms
ols price const sqft
scalar SRCr = $ess
```

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-14

Variable dependiente: price

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p
const	129,062	88,3033	1,462	0,1746
sqft	0,154800	0,0319404	4,847	0,0007 ***
bedrms	-21,5875	27,0293	-0,7987	0,4430
baths	-12,1928	43,2500	-0,2819	0,7838

Media de la vble. dep.	317,4929	D.T. de la vble. dep.	88,49816
Suma de cuad. residuos	16700,07	D.T. de la regresión	40,86572
R-cuadrado	0,835976	R-cuadrado corregido	0,786769
F(3, 10)	16,98894	Valor p (de F)	0,000299
Log-verosimilitud	-69,45391	Criterio de Akaike	146,9078
Criterio de Schwarz	149,4641	Crit. de Hannan-Quinn	146,6712

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 4 (baths)

t_c al 5% (10 g.l.) = 2,228

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-14

Variable dependiente: price

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p
const	121,179	80,1778	1,511	0,1589
sqft	0,148314	0,0212080	6,993	2,29e-05 ***
bedrms	-23,9106	24,6419	-0,9703	0,3527

Media de la vble. dep.	317,4929	D.T. de la vble. dep.	88,49816
Suma de cuad. residuos	16832,79	D.T. de la regresión	39,11846
R-cuadrado	0,834673	R-cuadrado corregido	0,804613
F(2, 11)	27,76736	Valor p (de F)	0,000050
Log-verosimilitud	-69,50933	Criterio de Akaike	145,0187
Criterio de Schwarz	146,9358	Crit. de Hannan-Quinn	144,8412

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1-14

Variable dependiente: price

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p
const	52,3509	37,2855	1,404	0,1857
sqft	0,138750	0,0187329	7,407	8,20e-06 ***

Media de la vble. dep.	317,4929	D.T. de la vble. dep.	88,49816
Suma de cuad. residuos	18273,57	D.T. de la regresión	39,02304
R-cuadrado	0,820522	R-cuadrado corregido	0,805565
F(1, 12)	54,86051	Valor p (de F)	8,20e-06
Log-verosimilitud	-70,08421	Criterio de Akaike	144,1684
Criterio de Schwarz	145,4465	Crit. de Hannan-Quinn	144,0501

Lo que debe observar

Los dos coeficientes son negativos y sus t están lejos de $t_c = 2,23$: con diez grados de libertad, no se detecta lo que los dormitorios o los baños añaden a lo que ya dice la superficie. Al quitar **baths**, el t de **bedrms** cambia de $-0,80$ a $-0,97$: cambia, porque la parte propia de **bedrms** ya no descuenta lo que compartía con **baths**, pero sigue sin acercarse al umbral.

Fíjese también en **sqft**: su coeficiente pasa de $0,155$ a $0,139$ y su error estándar de $0,032$ a $0,019$. Cada vez que se quita un regresor, los que quedan se miden con una parte propia más larga.

Actividad 2 - La exclusión conjunta

Estime el F de $H_0: \beta_{\text{bedrms}} = \beta_{\text{baths}} = 0$ con las dos SRC que ya tiene, y compruébelo con **restrict** (**Contrastes ->Restricciones lineales** en la ventana del modelo completo).

La primera línea construye el F con $q = 2$ a partir de los escalares **SRC**, **SRCr**, **s2** y **df** guardados en la actividad anterior. El **printf** imprime el F , el valor crítico y el valor p . Después se vuelve a estimar el modelo completo, porque **restrict** actúa sobre el último modelo estimado, y se imponen las dos restricciones.

en línea de comandos:

```
scalar Fj = ((SRCr - SRC)/2)/s2
printf "SRC completo = %.1f  SRC_r = %.1f  aumento = %.1f\n", SRC, SRCr, SRCr - SRC
printf "F(2,10) = %.3f  F_c = %.3f  valor p = %.4f\n", Fj, critical(F, 2, df, 0.05), pvalue(F, 2, df, Fj)
ols price const sqft bedrms baths --quiet
restrict
    b[bedrms] = 0
    b[baths] = 0
end restrict
```

```
SRC completo = 16700,1  SRC_r = 18273,6  aumento = 1573,5
F(2,10) = 0,471  F_c = 4,103  valor p = 0,6375
Conjunto de restricciones
1: b[bedrms] = 0
2: b[baths] = 0
```

Estadístico de contraste: $F(2, 10) = 0,471106$, con valor $p = 0,637492$

Estimaciones restringidas:

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p
const	52,3509	37,2855	1,404	0,1857
sqft	0,138750	0,0187329	7,407	8,20e-06 ***
bedrms	0,00000	0,00000	NA	NA
baths	0,00000	0,00000	NA	NA

Desviación típica de la regresión = 39,023

Lo que debe observar

$F = 0,47$ con $F_c(2, 10) = 4,10$: quitar los dos regresores a la vez sube la SRC en 1573, menos de la mitad de lo que vale una sola dimensión de ruido, $s^2 = 1670$. Aquí los dos veredictos coinciden: uno a uno, no significativos; a la vez, tampoco. La práctica A de esta sesión terminó con el caso contrario ([actividad 5 \(html\)](#)). La coincidencia de hoy ocurre porque los dos regresores comparten poco entre sí.

Actividad 3 - El rectángulo y las esquinas

Los intervalos al 95 % de **bedrms** y **baths** definen un rectángulo en el plano ($\beta_{\text{bedrms}}, \beta_{\text{baths}}$). Cabe pensar que el F no rechaza ningún par de valores dentro del rectángulo y rechaza todos los de fuera. Compruébelo en las cuatro esquinas: cada esquina es un par de valores que está, a la vez, en el borde de los dos intervalos.

Con **critical** se obtiene t_c , y con él los extremos de los dos intervalos al 95 %: **iL** e **iR** para **bedrms**, **jL** y **jR** para **baths**. **corrEst** es la correlación entre los dos estimadores, léida en **\$vcv** (filas y columnas 3 y 4, los coeficientes de **bedrms** y **baths**). Después, cuatro bloques **restrict --quiet** fijan a la vez los dos coeficientes en cada esquina del rectángulo, y **\$test** recoge el F de cada contraste en los escalares **F_LL**, **F_LR**, **F_RL** y **F_RR** (la primera letra es el extremo de **bedrms**, la segunda el de **baths**). El segundo bloque imprime los dos intervalos, el valor crítico de la F con 2 y 10 grados de libertad, el F y el valor p de cada esquina, y la correlación.

en línea de comandos:

```
ols price const sqft bedrms baths --quiet
scalar tc = critical(t, $df, 0.025)
scalar iL = $coeff(bedrms) - tc*$stderr(bedrms)
scalar iR = $coeff(bedrms) + tc*$stderr(bedrms)
scalar jL = $coeff(baths) - tc*$stderr(baths)
scalar jR = $coeff(baths) + tc*$stderr(baths)
scalar corrEst = $vcv[3,4]/sqrt($vcv[3,3]*$vcv[4,4])
restrict --quiet
    b[bedrms] = iL
    b[baths] = jL
end restrict
scalar F_LL = $test
restrict --quiet
    b[bedrms] = iL
    b[baths] = jR
end restrict
scalar F_LR = $test
restrict --quiet
    b[bedrms] = iR
    b[baths] = jL
end restrict
scalar F_RL = $test
restrict --quiet
    b[bedrms] = iR
    b[baths] = jR
end restrict
scalar F_RR = $test

printf "IC 95% bedrms: [%.2f ; %.2f]    IC 95% baths: [%.2f ; %.2f]\n", iL, iR, jL, jR
printf "F_c(2,10) al 5% = %.3f\n", critical(F, 2, 10, 0.05)
printf "Contraste conjunto de cada esquina del rectangulo:\n"
printf "  esquina (%.2f, %.2f): F = %.3f  valor p = %.3f\n", iL, jL, F_LL, pvalue(F, 2, 10, F_LL)
printf "  esquina (%.2f, %.2f): F = %.3f  valor p = %.3f\n", iL, jR, F_LR, pvalue(F, 2, 10, F_LR)
printf "  esquina (%.2f, %.2f): F = %.3f  valor p = %.3f\n", iR, jL, F_RL, pvalue(F, 2, 10, F_RL)
printf "  esquina (%.2f, %.2f): F = %.3f  valor p = %.3f\n", iR, jR, F_RR, pvalue(F, 2, 10, F_RR)
printf "Correlacion entre los estimadores de bedrms y baths (de la matriz de varianzas): %.3f\n", corrEst
```

```
IC 95% bedrms: [-81,81 ; 38,64]    IC 95% baths: [-108,56 ; 84,17]
F_c(2,10) al 5% = 4,103
Contraste conjunto de cada esquina del rectangulo:
  esquina (-81,81, -108,56): F = 7,142  valor p = 0,012
  esquina (-81,81, 84,17): F = 3,805  valor p = 0,059
  esquina (38,64, -108,56): F = 3,805  valor p = 0,059
  esquina (38,64, 84,17): F = 7,142  valor p = 0,012
Correlacion entre los estimadores de bedrms y baths (de la matriz de varianzas): -0,305
```

Lo que debe observar

Dos esquinas se rechazan ($F = 7,14 > 4,10$) y dos no ($F = 3,80$). Las cuatro están en el borde de los dos intervalos, así que el rectángulo no es la región que el F acepta. Esa región es el conjunto de pares (c_2, c_3)

para los que $H_0 : \beta_{\text{bedrms}} = c_2, \beta_{\text{baths}} = c_3$ no se rechaza al 5%, y tiene forma de elipse centrada en las estimaciones: es el intervalo de confianza en dos dimensiones. Gretl la dibuja desde la ventana del modelo, **Análisis ->Elipse de confianza**, eligiendo los dos coeficientes.

La elipse está inclinada porque los dos estimadores están correlados: $-0,31$, según la matriz de varianzas. Las esquinas rechazadas son las que dan a los dos coeficientes desvíos del mismo signo, y las no rechazadas las de signos contrarios: la muestra hace más verosímil que un coeficiente suba si el otro baja. Es lo que la lección 14 llamó compensación entre coordenadas, aquí en grado leve.

Preguntas de interpretación para la clase

1. En la Actividad 1, el t de `bedrms` pasa de $-0,80$ a $-0,97$ al quitar `baths`. ¿Qué dos cosas cambian en el cociente $t = \hat{\beta}/\text{ee}$ cuando se elimina un regresor?
2. La Actividad 2 da $F = 0,47$. ¿Qué diría un F menor que 1 sobre el aumento de la SRC comparada con el ruido de una dimensión?
3. El intervalo de `bedrms` va de -82 a 39 miles de dólares por dormitorio. ¿Es correcto decir que “el número de dormitorios no influye en el precio”? ¿Qué es lo que estos datos sí permiten decir?
4. En la Actividad 3, ¿qué relación hay entre la elipse y los dos intervalos? ¿Puede un par estar dentro de los dos intervalos y fuera de la elipse? ¿Y al revés?
5. Si las catorce viviendas fueran ciento cuarenta con la misma dispersión y los mismos coeficientes, ¿qué le pasaría a la elipse y a los intervalos? ¿Y a la correlación entre los dos estimadores?

Para profundizar

- Lección 13 ([lección 13](#)), secciones “La hipótesis conjunta” y “Conjunto $\neq$ individual: el caso de la apertura”.
- Lección 12 ([lección 12](#)), el intervalo de confianza como conjunto de valores que el contraste no rechaza.
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics*, cap. 4, sección 4.5, en particular la discusión “relación entre los contrastes F y t ”.
- Manual de Gretl: comando `restrict`, accesores `$test`, `$pvalue` y `$vcv`.

Código completo de la práctica

```
# -----
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# -----

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↪ directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#   DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↪ trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

set verbose off

open data4-1.gdt --quiet
outfile --quiet completo.txt
    ols price const sqft bedrms baths
    scalar SRC = $ess
    scalar df = $df
    scalar s2 = SRC/df
    printf "t_c al 5% (%d g.l.) = %.3f\n", df, critical(t, df, 0.025)
    ols price const sqft bedrms
    ols price const sqft
    scalar SRCr = $ess
end outfile

outfile --quiet conjunta.txt
    scalar Fj = ((SRCr - SRC)/2)/s2
    printf "SRC completo = %.1f   SRC_r = %.1f   aumento = %.1f\n", SRC, SRCr, SRCr - SRC
    printf "F(2,10) = %.3f   F_c = %.3f   valor p = %.4f\n", Fj, critical(F, 2, df, 0.05), pvalue(F, 2, df,
↪ Fj)
    ols price const sqft bedrms baths --quiet
    restrict
        b[bedrms] = 0
        b[baths] = 0
    end restrict
end outfile

ols price const sqft bedrms baths --quiet
scalar tc = critical(t, $df, 0.025)
scalar iL = $coeff(bedrms) - tc*$stderr(bedrms)
scalar iR = $coeff(bedrms) + tc*$stderr(bedrms)
scalar jL = $coeff(baths) - tc*$stderr(baths)
scalar jR = $coeff(baths) + tc*$stderr(baths)
scalar corrEst = $vcv[3,4]/sqrt($vcv[3,3]*$vcv[4,4])
restrict --quiet
    b[bedrms] = iL
    b[baths] = jL
end restrict
scalar F_LL = $test
restrict --quiet
    b[bedrms] = iL
    b[baths] = jR
end restrict
scalar F_LR = $test
restrict --quiet
```

```

        b[bedrms] = iR
        b[baths] = jL
    end restrict
    scalar F_RL = $test
    restrict --quiet
        b[bedrms] = iR
        b[baths] = jR
    end restrict
    scalar F_RR = $test
    outfile --quiet esquinas.txt
        printf "IC 95%% bedrms: [%.2f ; %.2f]    IC 95%% baths: [%.2f ; %.2f]\n", iL, iR, jL, jR
        printf "F_c(2,10) al 5%% = %.3f\n", critical(F, 2, 10, 0.05)
        printf "Contraste conjunto de cada esquina del rectangulo:\n"
        printf "  esquina (%.2f, %.2f): F = %.3f    valor p = %.3f\n", iL, jL, F_LL, pvalue(F, 2, 10, F_LL)
        printf "  esquina (%.2f, %.2f): F = %.3f    valor p = %.3f\n", iL, jR, F_LR, pvalue(F, 2, 10, F_LR)
        printf "  esquina (%.2f, %.2f): F = %.3f    valor p = %.3f\n", iR, jL, F_RL, pvalue(F, 2, 10, F_RL)
        printf "  esquina (%.2f, %.2f): F = %.3f    valor p = %.3f\n", iR, jR, F_RR, pvalue(F, 2, 10, F_RR)
        printf "Correlacion entre los estimadores de bedrms y baths (de la matriz de varianzas): %.3f\n",
            ↪ corrEst
    end outfile

```

Enlace al guión: [S21-Prct-B-ramanathan-conjunta.inp](#)

Respuestas

1. *Qué cambia en el t al quitar un regresor.* Numerador y denominador. El coeficiente de **bedrms** es una coordenada, y cambia porque cambia la base: pasa de $-21,6$ a $-23,9$ al quitar **baths**. El error estándar es $s/\|\tilde{\mathbf{x}}_j\|_e$ y cambia por dos vías: la parte propia de **bedrms** se alarga al no descontar lo que compartía con **baths**, y s se recalcula con un grado de libertad más: el error estándar baja de $27,0$ a $24,6$. El efecto neto es pequeño, porque **bedrms** y **baths** comparten poco.
2. *Un F menor que uno.* Por dimensión, el aumento de la SRC al imponer H_0 es menor que lo que aporta una dimensión de ruido. Bajo H_0 cierta, el numerador y el denominador del F estiman lo mismo, σ^2 , y el F oscila en torno a 1 (la [actividad 1 \(html\)](#) de la práctica C lo comprueba). Un F de $0,47$ es de los que salen cuando H_0 es cierta, no de los que exigen explicación.
3. *“No influye”.* No es correcto: el intervalo contiene valores tan distintos como -80 y $+30$ miles de dólares por dormitorio, y cualquiera de ellos es compatible con los datos. Lo que sí se puede decir es que, con la superficie ya en el modelo, catorce viviendas no permiten medir el efecto de un dormitorio adicional, y que ese efecto podría ser cero. No rechazar no es demostrar.
4. *La elipse y los intervalos.* No son la misma región ni una es la sombra de la otra. Un par puede estar dentro de los dos intervalos y fuera de la elipse: las esquinas rechazadas de la Actividad 3. Y al revés: la elipse se extiende sobre cada eje hasta $\pm\sqrt{2F_c} \cdot ee = \pm 2,86 ee$, más allá del $\pm 2,23 ee$ del intervalo, así que hay pares que el F no rechaza aunque una de las coordenadas se salga de su intervalo, porque la otra compensa. El intervalo responde a una pregunta sobre un coeficiente; la elipse, a una pregunta sobre los dos a la vez.
5. *Diez veces más viviendas.* Los regresores en desviaciones serían $\sqrt{10}$ veces más largos, los errores estándar $\sqrt{10}$ veces menores, y la elipse y los intervalos se encogerían en ese factor alrededor de las mismas estimaciones. La correlación entre los estimadores no cambiaría: depende del ángulo entre las partes propias de **bedrms** y **baths**, no de su longitud. La inclinación de la elipse es un rasgo de la muestra que el tamaño no corrige; la lección 14 lo dijo del VIF.