

## Índice general

|    |                                                                     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | De dónde venimos: $\ln x$ y $\ln \ln x$ eran dos formas funcionales | 2  |
| 2  | Variable explicativa y regresor: lineal en los regresores           | 3  |
| 3  | Cuatro formas, cuatro lecturas del coeficiente                      | 4  |
| 4  | Log-nivel: salarios y educación                                     | 6  |
| 5  | Nivel-log y log-log: la contaminación                               | 7  |
| 6  | La elasticidad: una decisión del modelo                             | 8  |
| 7  | Cobb–Douglas: elasticidades y rendimientos a escala                 | 10 |
| 8  | Previsión con y sin logaritmos                                      | 11 |
| 9  | Lo que cambia y lo que no                                           | 12 |
| 10 | Recapitulación y guiño a la lección siguiente                       | 14 |

# Lección 15. Formas funcionales con logaritmos: qué dice cada coeficiente

Marcos Bujosa

5 de octubre de 2026

## Resumen

Las lecciones 13 y 14 usaron `nox` y su logaritmo como dos regresores casi alineados. Hoy los leemos como dos formas funcionales de una misma variable explicativa. El modelo sigue siendo lineal en los regresores y la geometría del curso se aplica sin cambios; lo que cambia es qué significa cada coeficiente: un cambio absoluto, un cambio porcentual o una elasticidad. Cierran la función de producción de Cobb–Douglas y la previsión en niveles desde un modelo en logaritmos.

*“La geometría opera sobre los regresores; la lectura, sobre las variables.”*

- ([slides](#)) — ([html](#)) — ([pdf](#))

## 1 De dónde venimos: `nox` y `lnox` eran dos formas funcionales

Las lecciones 13 y 14 pusieron `nox` y `lnox` juntos en un modelo para ver qué pasa con dos regresores casi alineados. Hoy los separamos: cada uno, con `rooms`, es un modelo distinto del precio (`hprice2`,  $n = 506$ ).

| Regresando          | Contaminación     | coef.    | ee     | $t$    | $R^2$ |
|---------------------|-------------------|----------|--------|--------|-------|
| <code>price</code>  | <code>nox</code>  | −1884,7  | 253,6  | −7,43  | 0,535 |
| <code>price</code>  | <code>lnox</code> | −10951,4 | 1457,9 | −7,51  | 0,536 |
| <code>lprice</code> | <code>nox</code>  | −0,1233  | 0,0116 | −10,67 | 0,511 |
| <code>lprice</code> | <code>lnox</code> | −0,7177  | 0,0663 | −10,82 | 0,514 |

Cuatro modelos, cuatro coeficientes de distinto tamaño y las mismas conclusiones estadísticas: la contaminación acompaña precios menores, con  $t$  entre  $-7,4$  y  $-10,8$ . Los cuatro números dicen cosas distintas.

Hoy: qué significa cada coeficiente, por qué el logaritmo convierte cambios absolutos en porcentuales, y cómo se prevé en niveles con un modelo en logaritmos. Sin geometría nueva.

---

Esta obra está bajo una licencia [Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional \(CC BY-SA 4.0\)](#).

## De dónde venimos: **nox** y **lnox** eran dos formas funcionales

La lección 13 abrió con una tabla de tres regresiones del precio mediano de la vivienda sobre **rooms** y la contaminación, medida en niveles (**nox**), en logaritmos (**lnox**) o de las dos formas a la vez. La lección 14 explicó la tercera fila: dos regresores que forman un ángulo de  $6^\circ$  comparten casi toda su variación, así que la variación propia de cada uno es muy corta, y los dos errores estándar se multiplican. Las dos primeras filas quedaron sin comentar, y hoy son el punto de partida. A ellas añadimos otras dos, con el logaritmo del precio como regresando.

La tabla de la transparencia recoge las cuatro estimaciones. Los cuatro modelos tienen la misma variable explicativa de contaminación, la concentración de óxidos de nitrógeno, y el mismo segundo regresor, **rooms**. Difieren en la forma funcional: el precio o su logaritmo, la contaminación o su logaritmo. Los cuatro ajustan los datos de manera parecida en lo que cada uno mide, y en los cuatro el coeficiente de la contaminación es negativo y se separa con claridad de cero. Pero los cuatro coeficientes están en unidades distintas: dólares por unidad de **nox**, dólares por unidad de logaritmo, logaritmos por unidad de **nox** y logaritmos por logaritmo. Leerlos exige saber qué unidad es cada una.

Conviene decir desde el principio qué no cambia. El modelo de regresión lineal del curso es  $\mathbf{y} = \beta_1 \mathbf{1} + \beta_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + \beta_k \mathbf{x}_k + \mathbf{u}$ , y lo que hace mínimos cuadrados es proyectar el vector  $\mathbf{y}$  sobre el subespacio generado por las columnas. Que una columna sea el logaritmo de una variable, o que el vector proyectado sea el logaritmo del precio, no altera nada de lo demostrado en las lecciones 8 a 14: el ajuste, los residuos,  $R^2$ , los errores estándar, los contrastes  $t$  y  $F$  se calculan igual y significan lo mismo para las columnas que se le han dado. La ficha de esta lección en el plan del curso dice “sin anclaje geométrico fuerte”, y es así: hoy no hay un triángulo nuevo. Hay una tabla de lecturas.

Una precisión de notación: en todo lo que sigue,  $\log$  es el logaritmo natural, el único que se usa en econometría para estas transformaciones. Gretl lo llama **log** y antepone **l\_** al nombre de la variable transformada; en **hprice2** las variables **lprice** y **lnox** vienen ya calculadas.

*Para profundizar:* Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, sección 2.4 (“Units of measurement and functional form”) y cap. 6, sección 6.2 (“More on functional form”).

## 2 Variable explicativa y regresor: lineal en los regresores

*Variable explicativa:* una magnitud observada (**nox**, **educ**, el capital). *Regresor:* una columna del modelo, función de una o varias variables explicativas: **nox**,  $\log(\text{nox})$ ,  $\text{nox}^2$ , además de la constante.

El modelo es *lineal en los regresores*:  $\mathbf{y} = \beta_1 \mathbf{1} + \beta_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + \beta_k \mathbf{x}_k + \mathbf{u}$ . Esa linealidad en las columnas es lo único que mínimos cuadrados y la inferencia necesitan; toda la geometría del curso opera sobre las columnas.

Puede no ser *lineal en las variables explicativas*:  $\log(\text{price})$  sobre  $\log(\text{nox})$  describe una curva entre precio y contaminación. La lectura del coeficiente habla de la variable, y por eso depende de la forma funcional.

Mínimos cuadrados ve columnas. El economista lee variables.

## Variable explicativa y regresor: lineal en los regresores

Hasta ahora el curso ha usado “regresor” y “variable” casi como sinónimos, porque en casi todos los ejemplos cada columna del modelo era una variable observada tal cual. Hoy conviene separarlos. Una *variable explicativa* es una magnitud que se observa en cada unidad de la muestra y que se cree relacionada con el regresando: la concentración de contaminantes de un barrio, los años de educación de un trabajador, el capital de una industria. Un *regresor* es una columna de la matriz  $\mathbf{X}$ : un vector de  $\mathbb{R}^n$  que entra en el modelo con un coeficiente. Un regresor puede ser una variable explicativa sin transformar, su logaritmo, su cuadrado, el producto de dos variables, o la constante, que no proviene de ninguna. De una misma variable explicativa pueden salir varios regresores, y la lección 14 lo vio con `nox` y `lnox`.

El modelo del curso,  $\mathbf{y} = \beta_1 \mathbf{1} + \beta_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + \beta_k \mathbf{x}_k + \mathbf{u}$ , es lineal en los regresores: el regresando es una combinación lineal de las columnas más la perturbación, con los  $\beta_j$  como coeficientes. Esa linealidad es la que usa todo el curso. Mínimos cuadrados proyecta  $\mathbf{y}$  sobre el subespacio generado por las columnas (lecciones 8 y 10); la insesgadez, la varianza y las distribuciones  $t$  y  $F$  (lecciones 11 a 13) se refieren a los coeficientes de las columnas; la colinealidad (lección 14) es un ángulo entre columnas. Nada de eso pregunta de qué variable salió cada columna.

Que el modelo sea lineal en los regresores no obliga a que sea lineal en las variables explicativas.  $\log(\text{price}) = \beta_1 + \beta_2 \log(\text{nox}) + \beta_3 \text{rooms} + u$  es lineal en sus tres columnas y describe, entre el precio y la contaminación, una relación curva: el precio es proporcional a una potencia de `nox`. La distinción importa para la lectura. El coeficiente  $\beta_2$  multiplica a la columna  $\log(\text{nox})$ , y por tanto mide el efecto de una unidad más de *logaritmo* de contaminación. Traducirlo a la variable explicativa, a un 1 % más de contaminación, es el trabajo de esta lección.

Queda un tercer caso, fuera del curso: modelos que no son lineales en los parámetros, como  $y = \beta_1 x^{\beta_2} + u$ , donde ninguna transformación de las variables deja los  $\beta$  como coeficientes de una suma. Esos modelos no se estiman con la proyección de la lección 8. El caso de Cobb–Douglas,  $Q = AL^\alpha K^\gamma e^u$ , parece de este tipo y no lo es: tomando logaritmos se convierte en un modelo lineal en los regresores, y lo estimaremos con mínimos cuadrados en la transparencia “Cobb–Douglas: elasticidades y rendimientos a escala”.

*Para profundizar:* Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, sección 2.4, apartado “Meaning of linear regression”; cap. 3, sección 3.1 (el modelo con  $k$  regresores y la interpretación *ceteris paribus*).

## 3 Cuatro formas, cuatro lecturas del coeficiente

La herramienta es una aproximación: para un cambio relativo pequeño  $p$ ,  $\log(1 + p) \approx p$ . Un cambio de  $\Delta$  en  $\log y$  es un cambio relativo de  $y$  de aproximadamente  $\Delta$ , es decir, de 100  $\Delta$  por ciento.

| Forma       | Modelo                                      | $\beta_2$ es... | Lectura de $\beta_2$ (con lo demás fijo)              |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| nivel-nivel | $y = \beta_1 + \beta_2 x + \dots$           | cambio absoluto | una unidad más de $x$ , $\beta_2$ unidades más de $y$ |
| log-nivel   | $\log y = \beta_1 + \beta_2 x + \dots$      | semielasticidad | una unidad más de $x$ , un $100\beta_2$ % más de $y$  |
| nivel-log   | $y = \beta_1 + \beta_2 \log x + \dots$      | efecto del 1 %  | un 1 % más de $x$ , $\beta_2/100$ unidades más de $y$ |
| log-log     | $\log y = \beta_1 + \beta_2 \log x + \dots$ | elasticidad     | un 1 % más de $x$ , un $\beta_2$ % más de $y$         |

Con `hprice2` y `rooms` fijo: una unidad más de `nox` resta 1885 dólares (nivel-nivel) o un 12,3 % (log-nivel); un 1 % más de `nox` resta 110 dólares (nivel-log) o un 0,72 % (log-log).

### Cuatro formas, cuatro lecturas del coeficiente

Toda la lectura de los modelos con logaritmos se apoya en una propiedad del logaritmo natural: para un número  $p$  pequeño,  $\log(1 + p)$  es aproximadamente  $p$ . Con  $p = 0,01$ ,  $\log(1,01) = 0,00995$ ; con  $p = 0,05$ ,  $\log(1,05) = 0,0488$ ; con  $p = 0,10$ ,  $\log(1,10) = 0,0953$ . La aproximación es buena por debajo del 10 % y empeora deprisa después. Si una magnitud pasa de  $y$  a  $y'$ , su logaritmo cambia en  $\log y' - \log y = \log(y'/y) = \log(1 + p)$ , donde  $p = (y' - y)/y$  es el cambio relativo. Luego un cambio de  $\Delta$  en el logaritmo es, aproximadamente, un cambio relativo de  $\Delta$ , o de  $100 \Delta$  por ciento.

La tabla de la transparencia aplica esa aproximación a las cuatro combinaciones de niveles y logaritmos. En todas, “con lo demás fijo” significa lo mismo que en la lección 10: los otros regresores del modelo no cambian, y la lectura es la del efecto parcial.

*Nivel-nivel.* Es el modelo de las lecciones 7 a 14.  $\beta_2$  está en unidades de  $y$  por unidad de  $x$ : con `price` sobre `rooms` y `nox`,  $\hat{\beta}_{\text{nox}} = -1884,7$  dólares por cada parte por cien millones de óxidos de nitrógeno. El efecto de una unidad más es el mismo en un barrio limpio que en uno contaminado.

*Log-nivel.* El regresando es  $\log y$ , así que  $\beta_2$  es el cambio en  $\log y$  por unidad de  $x$ , y por la aproximación, el cambio relativo de  $y$ :  $100\beta_2$  por ciento por unidad de  $x$ . Con `lprice` sobre `rooms` y `nox`,  $\hat{\beta}_{\text{nox}} = -0,1233$ : una unidad más de `nox` va con un precio un 12,3 % menor. Esta cantidad se llama *semielasticidad*: un cambio porcentual de  $y$  por un cambio absoluto de  $x$ .

*Nivel-log.* El regresor es  $\log x$ , así que  $\beta_2$  es el cambio de  $y$  por unidad de  $\log x$ . Un 1 % más de  $x$  sube  $\log x$  en 0,01 aproximadamente, y por tanto  $y$  en  $0,01 \beta_2 = \beta_2/100$  unidades. Con `price` sobre `rooms` y `lnox`,  $\hat{\beta}_{\text{lnox}} = -10951,4$ : un 1 % más de contaminación va con 109,5 dólares menos de precio mediano, sea cual sea el nivel de partida.

*Log-log.* Las dos en logaritmos: un 1 % más de  $x$  sube  $\log x$  en 0,01,  $\log y$  en  $0,01\beta_2$ , e  $y$  en un  $\beta_2$  por ciento.  $\beta_2$  es la *elasticidad* de  $y$  respecto de  $x$ , la cantidad que la teoría económica usa para la demanda, la oferta o la producción. Con `lprice` sobre `rooms` y `lnox`,  $\hat{\beta}_{\text{lnox}} = -0,7177$ : un 1 % más de contaminación va con un 0,72 % menos de precio.

Los cuatro coeficientes se refieren a la misma relación entre precio y contaminación, y ninguno es “el verdadero”. Cada modelo impone una forma a esa relación y su coeficiente la resume en una unidad distinta. La transparencia “La elasticidad: una decisión del modelo” vuelve sobre esa idea: la forma funcional se impone, no se descubre.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, sección 2.4 (“Incorporating nonlinearities in simple regression”, con la tabla de las cuatro formas) y cap. 6, sección 6.2.

## 4 Log-nivel: salarios y educación

wage1 (Wooldridge; 526 trabajadores, salario por hora en dólares de 1976):

| Modelo           | coef. de educ | ee     | $R^2$ |
|------------------|---------------|--------|-------|
| wage sobre educ  | 0,541         | 0,053  | 0,165 |
| lwage sobre educ | 0,0827        | 0,0076 | 0,186 |

En niveles: un año más de educación, 54 centavos más por hora, igual para quien gana 3 que para quien gana 20 dólares. En log-nivel: un año más, un 8,3 % más de salario. El rendimiento de la educación se enuncia en porcentaje, con esta forma.

Exacto:  $100(e^{\hat{\beta}_2} - 1) = 8,63\%$ . Con cuatro años más: aproximado 33 %, exacto  $e^{4 \times 0,0827} - 1 = 39,2\%$ . La aproximación sirve para cambios pequeños.

Los dos  $R^2$  no son comparables: miden el ajuste a variables distintas, wage y lwage.

### Log-nivel: salarios y educación

El ejemplo clásico del modelo log-nivel es la ecuación de salarios. El fichero wage1 de Wooldridge recoge 526 trabajadores de la encuesta de población de Estados Unidos de 1976, con el salario por hora, los años de educación, de experiencia y de antigüedad en la empresa, y una serie de características del puesto que la lección 16 usará como variables ficticias.

El modelo en niveles, wage sobre educ, da una pendiente de 0,541: cada año de educación va con 54 centavos más por hora, con un intervalo al 95 % que va de 0,44 a 0,65. La lectura es la de la lección 12 y es la misma para todos: el modelo impone que el año decimotercero de educación aporte lo mismo que el octavo, en dólares, y que lo aporte igual a quien gana 3 dólares por hora que a quien gana 20.

El modelo log-nivel, lwage sobre educ, da 0,0827 con error estándar 0,0076, intervalo de 0,068 a 0,098. La lectura es porcentual: cada año de educación va con un salario un 8,3 % mayor, en todos los niveles salariales. Es la forma en que la economía del trabajo enuncia el rendimiento de la educación, porque un porcentaje es comparable entre países, décadas y monedas, y porque la hipótesis de que la educación multiplica el salario por un factor constante es más verosímil que la de que le suma una cantidad fija. El 8,3 % es la aproximación; el cambio exacto es  $100(e^{0,0827} - 1) = 8,63\%$ . La diferencia es pequeña para un año, pero crece con el tamaño del cambio: para cuatro años más de educación, la aproximación da  $4 \times 8,27 = 33\%$ , y el cálculo exacto,  $e^{4 \times 0,0827} - 1 = 0,392$ , un 39,2 %. El modelo predice un salario mediano de 4,84 dólares para doce años de educación y de 6,74 para dieciséis, y el cociente es 1,392. Cuando el coeficiente, o el cambio en  $x$  que interesa, es grande, la lectura exacta es la que hay que dar.

La constante también se lee:  $e^{\hat{\beta}_1} = e^{0,584} = 1,79$  dólares por hora es el salario predicho para cero años de educación, el nivel de escala del modelo. En los modelos con logaritmo en el regresando la constante es un factor multiplicativo, no una cantidad que se suma.

El último punto de la transparencia, que los dos  $R^2$  no se pueden comparar, es un aviso que vale para toda la lección. El  $R^2$  del modelo en niveles, 0,165, y el del modelo en logaritmos, 0,186, no se pueden comparar, por la definición de la lección 8:  $R^2$  es la fracción de la variación del regresando que recoge el ajuste, y el regresando es distinto en los dos modelos. Un  $R^2$  mayor con `lwage` no dice que el modelo en logaritmos prediga mejor el salario. Cómo comparar los dos modelos sobre la misma variable es el tema de la transparencia “Previsión con y sin logaritmos”.

*Para profundizar:* Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, ejemplo 2.10 (la ecuación de salarios en log-nivel) y cap. 6, sección 6.2, apartado “More on using logarithmic functional forms”; Mincer, J. (1974), *Schooling, Experience, and Earnings*, el origen de esta especificación.

## 5 Nivel-log y log-log: la contaminación

Nivel-log: `price` sobre `rooms` y `lnox`,  $\hat{\beta}_{\text{lnox}} = -10951$ : un 1 % más de contaminación, 109,5 dólares menos de precio mediano. El coeficiente se divide por 100.

Log-log: `lprice` sobre `rooms` y `lnox`,  $\hat{\beta}_{\text{lnox}} = -0,718$  (ee 0,066): elasticidad del precio respecto de la contaminación. Un 1 % más de `nox`, un 0,72 % menos de precio. El coeficiente se lee tal cual, sin dividir ni multiplicar por 100.

El modelo de Wooldridge (ejemplo 4.5): `lprice` sobre `lnox`, `log(dist)`, `rooms` y `stratio`. Elasticidad  $-0,954$  (ee 0,117), intervalo al 95 % de  $-1,18$  a  $-0,72$ ; `rooms`: 0,255, un 25,5 % más por habitación (29,0 % exacto).

La pregunta económica es  $H_0: \beta_{\text{lnox}} = -1$  (elasticidad unitaria), no  $\beta_{\text{lnox}} = 0$ :  $t = \frac{-0,954 - (-1)}{0,117} = 0,40$ . Datos como estos no serían raros si la elasticidad fuese  $-1$ .

### Nivel-log y log-log: la contaminación

Volvemos a `hprice2` para las dos formas con el regresor en logaritmos. El modelo nivel-log, `price` sobre `rooms` y `lnox`, es la segunda fila de la tabla de apertura. Su coeficiente,  $-10951,4$  dólares por unidad de `log(nox)`, no se lee directamente, porque nadie piensa en unidades de logaritmo. Se divide por 100: un 1 % más de contaminación va con un precio mediano 109,5 dólares menor. La lección 14 lo dijo con otras palabras al comparar los remedios para la colinealidad: con `nox` en niveles, cada unidad más resta lo mismo al precio; con `lnox`, resta cada vez menos, porque un aumento de una unidad es un porcentaje grande cuando `nox` vale 4 y pequeño cuando vale 8.

El modelo log-log, `lprice` sobre `rooms` y `lnox`, es el más usado cuando la teoría habla de elasticidades. Su coeficiente,  $-0,7177$  con error estándar 0,0663, es la elasticidad del precio respecto de la contaminación: un 1 % más de `nox` va con un 0,72 % menos de precio, con `rooms` fijo. El intervalo al 95 % va de  $-0,85$  a  $-0,59$ . Esta elasticidad es la misma en todos los barrios: el modelo lo impone.

Wooldridge estima, en su ejemplo 4.5, un modelo log-log algo más completo: el logaritmo del precio sobre el logaritmo de `nox`, el logaritmo de la distancia a los centros de empleo (`dist`), el número de habitaciones y la ratio alumnos-profesor (`stratio`). Con  $n = 506$ , el  $R^2$  es 0,584 y los cuatro coeficientes se leen con la tabla de la transparencia “Cuatro formas, cuatro lecturas del coeficiente”. La elasticidad respecto de la contaminación es  $-0,954$ , con error estándar 0,117

e intervalo de  $-1,18$  a  $-0,72$ . La elasticidad respecto de la distancia es  $-0,134$ . El coeficiente de **rooms** es una semielasticidad, porque **rooms** entra en niveles:  $0,255$ , una habitación más va con un precio un  $25,5$  % mayor según la aproximación, y un  $29,0$  % mayor según el cálculo exacto,  $e^{0,255} - 1$ . Aquí la aproximación ya se queda corta en más de tres puntos. El de **stratio** es otra semielasticidad: un alumno más por profesor, un  $5,2$  % menos de precio.

La transparencia termina cobrando una promesa de la lección 12: contrastar un coeficiente contra un valor distinto de cero. Allí se dijo que, cuando  $\beta_2$  es una elasticidad, la pregunta interesante rara vez es si vale cero, sino si es compatible con un valor concreto que la teoría sugiere; y que el estadístico  $t$  sirve para cualquier valor hipotético, no solo para el cero. Con el modelo de Wooldridge la pregunta natural es si la elasticidad es unitaria: si un  $1$  % más de contaminación va con un  $1$  % menos de precio. El estadístico es  $t = (\hat{\beta}_{\text{nox}} - (-1))/\text{ee}(\hat{\beta}_{\text{nox}}) = (-0,954 + 1)/0,117 = 0,40$ , muy por debajo del valor crítico  $1,96$ , y el valor  $p$  ronda  $0,69$ . Datos como estos no serían raros si la elasticidad fuese  $-1$ ; a la luz del contraste, no se rechaza. En cambio,  $H_0: \beta_{\text{nox}} = 0$  se rechaza con un  $t$  de  $-8,2$ , y ese rechazo es el poco informativo: nadie esperaba que la contaminación no afectase al precio.

*Para profundizar:* Wooldridge, J. M. (2020), cap. 4, ejemplo 4.5 (“Housing prices and air pollution”) y sección 4.2, apartado “Testing other hypotheses about  $\beta_j$ ”; Harrison, D. y Rubinfeld, D. L. (1978), “Hedonic housing prices and the demand for clean air”, *Journal of Environmental Economics and Management* 5, 81–102, el artículo del que proceden los datos.

## 6 La elasticidad: una decisión del modelo

En el modelo en niveles la elasticidad existe, pero cambia con  $x$ :  $\eta = \beta_2 x/\hat{y}$ . Con **price** sobre **nox** (regresión simple):  $-0,47$  en un barrio con **nox**  $3,9$ ;  $-0,82$  con  $5,5$ ;  $-2,5$  con  $8,7$ . En el modelo log-log es la misma en todos los barrios:  $-1,04$ .

Qué forma elegir lo decide la pregunta económica y el comportamiento esperado fuera de lo habitual, no el  $R^2$ : los ajustes son casi iguales donde hay datos.

### La elasticidad: una decisión del modelo

La elasticidad de  $y$  respecto de  $x$  es el cambio porcentual de  $y$  por cada  $1$  % de cambio en  $x$ . En el modelo log-log es el coeficiente, y es constante. Pero la elasticidad se puede calcular en cualquier modelo: en el nivel-nivel, un cambio de una unidad en  $x$  cambia  $y$  en  $\beta_2$  unidades, luego un cambio del  $1$  % en  $x$ , que son  $0,01x$  unidades, cambia  $y$  en  $0,01\beta_2x$ , y en términos relativos en  $0,01\beta_2x/y$ . La elasticidad en el punto  $(x, y)$  es  $\eta = \beta_2 x/y$ , evaluada habitualmente en el valor ajustado  $\hat{y}$ . Depende del punto: crece con  $x$  y decrece con  $y$ .

La transparencia lo muestra con la regresión simple de **price** sobre **nox** (la de la figura, sin **rooms**):  $\widehat{\text{price}} = 41308 - 3387 \text{nox}$ . En un barrio con **nox** igual a  $3,9$  el precio ajustado es  $28099$  dólares y la elasticidad  $-3387 \times 3,9/28099 = -0,47$ ; con **nox** igual a  $5,5$ , el precio ajustado es  $22680$  y la elasticidad  $-0,82$ ; con  $8,7$ , el precio ajustado baja a  $11842$  y la elasticidad llega a  $-2,5$ . El mismo modelo dice que la demanda de aire limpio es inelástica en los barrios limpios y muy elástica en los contaminados. El modelo log-log de la misma figura, **lprice** sobre **lnox**, dice que la elasticidad es  $-1,04$  en todos. Con **rooms** en el modelo las cifras cambian ( $-0,29$ ,  $-0,46$  y  $-0,99$




Figura 1: Los 506 barrios de `hprice2`. Izquierda: precio mediano (miles de dólares) frente a `nox`, con la recta del modelo nivel-nivel (`price` sobre `nox`, en azul) y la curva del modelo nivel-log (`price` sobre `lnnox`, en rojo). Donde hay muchos barrios, entre 4 y 7, la recta y la curva casi coinciden; se separan en los extremos, donde hay pocos datos: para `nox` 8,7 la recta predice 11,8 mil dólares y la curva 13,3. Derecha: logaritmo del precio frente a logaritmo de `nox`, con la recta del modelo log-log (en verde); su pendiente,  $-1,04$ , es la elasticidad, y es la misma en toda la nube. Los tres ajustes son regresiones simples, sin `rooms`, para que la figura sea plana.

en el modelo en niveles, frente a la elasticidad constante  $-0,72$  del log-log), pero el contraste es el mismo: una elasticidad que varía frente a una elasticidad fija.

Ninguno de los dos modelos descubre la elasticidad: cada uno la impone con su forma funcional, y después estima su tamaño. Que la forma de la relación se impone y no se descubre es la idea central de la lección. Elegir entre niveles y logaritmos es elegir qué tipo de relación se supone entre las variables, y esa elección la hace el economista antes de estimar, con dos criterios. El primero es la pregunta: si la teoría habla de elasticidades, o si el efecto que interesa se enuncia en porcentaje, el modelo en logaritmos la responde directamente. El segundo es el comportamiento fuera del rango habitual de los datos. La figura muestra por qué el ajuste no sirve de guía: entre `nox` 4 y 7, donde están casi todos los barrios, la recta y la curva pasan por los mismos puntos y los  $R^2$  son 0,18 en los dos casos. Se separan en los extremos, donde hay pocos datos: para el barrio más contaminado la recta predice 11,8 mil dólares y la curva 13,3, y si se extrapolara a `nox` 12, la recta daría un precio de 0,7 mil dólares y la curva, 7,0. La muestra apenas distingue las dos formas; lo que las distingue es lo que dicen fuera de la muestra, y eso es una decisión de modelización, no un resultado estadístico. La lección 14 ya dijo, al comparar `nox` y `lnnox` como remedios para la colinealidad, que las dos descripciones ajustan casi igual y se separan fuera de lo habitual.

Hay un tercer criterio, de forma del error, que se verá en la transparencia “Lo que cambia y lo que no”. Y hay un criterio que no sirve: el  $R^2$ , cuando los regresandos son distintos.

*Para profundizar:* Wooldridge, J. M. (2020), cap. 6, sección 6.2, apartado “Models with quadratics” (otra forma funcional en que el efecto depende del punto) y cap. 2, sección 2.4.

## 7 Cobb–Douglas: elasticidades y rendimientos a escala

$Q = AL^\alpha K^\gamma e^u$  no es lineal en nada. En logaritmos sí:  $\log Q = \beta_1 + \alpha \log L + \gamma \log K + u$ , con  $\beta_1 = \log A$ . Es un modelo log-log con dos regresores:  $\alpha$  y  $\gamma$  son las *elasticidades parciales* del producto;  $\alpha + \gamma$  mide los *rendimientos a escala*.

Datos de Zellner y Revankar (`greene9_1`): valor añadido, trabajo y capital de la industria del equipo de transporte en 25 estados de EE. UU., 1957.

| Regresor     | coef. | ee    | $t$  |
|--------------|-------|-------|------|
| constante    | 1,844 | 0,234 | 7,90 |
| log(labor)   | 0,805 | 0,126 | 6,37 |
| log(capital) | 0,245 | 0,107 | 2,30 |

$R^2 = 0,973$ ;  $\hat{\alpha} + \hat{\gamma} = 1,051$ .  $H_0: \alpha + \gamma = 1$  es una restricción lineal (lección 13):  $F(1, 22) = 1,54$ , valor  $p = 0,23$ . Datos como estos no serían raros con rendimientos constantes.

### Cobb–Douglas: elasticidades y rendimientos a escala

La función de producción de Cobb–Douglas es el ejemplo canónico del modelo log-log, y el que enlaza esta lección con la teoría económica. En su forma estocástica,  $Q = AL^\alpha K^\gamma e^u$ : el producto  $Q$  depende del trabajo  $L$  y del capital  $K$  a través de dos exponentes, de una constante de escala  $A$  y de un factor aleatorio  $e^u$  que recoge lo que la función no explica. Escrita así no es lineal en los parámetros ( $\alpha$  y  $\gamma$  son exponentes) ni en las variables. Tomando logaritmos,  $\log Q = \log A + \alpha \log L + \gamma \log K + u$ , que es el modelo del curso con regresando  $\log Q$ , regresores **1**,  $\log L$  y  $\log K$ , y perturbación  $u$ . Mínimos cuadrados lo estima como cualquier otro, y la inferencia de las lecciones 11 a 13 se aplica a  $\alpha$  y  $\gamma$ . Cobb–Douglas muestra por qué importa la distinción entre regresor y variable explicativa: la función es muy no lineal en las variables, y el modelo estimado es lineal en los regresores.

La lectura de los coeficientes es la del modelo log-log.  $\alpha$  es la elasticidad del producto respecto del trabajo con el capital fijo: un 1 % más de trabajo, un  $\alpha$  % más de producto.  $\gamma$  es la elasticidad respecto del capital con el trabajo fijo. Son *elasticidades parciales*, y en la teoría de la producción con competencia perfecta coinciden con las participaciones del trabajo y del capital en el producto. La suma  $\alpha + \gamma$  mide los rendimientos a escala: si los dos factores aumentan un 1 %, el producto aumenta un  $(\alpha + \gamma)$  %. Si la suma es 1, los rendimientos son constantes; mayor que 1, crecientes; menor, decrecientes.

Los datos de la transparencia son los que Zellner y Revankar usaron en 1969 y que Greene reproduce en su manual: el valor añadido, el trabajo y el capital de la industria del equipo de transporte en 25 estados de Estados Unidos en 1957. Gretl los incluye como `greene9_1` en la pestaña **Greene** de los ficheros de muestra. El modelo estimado es  $\widehat{\log Q} = 1,844 + 0,805 \log L + 0,245 \log K$ , con  $R^2 = 0,973$  y  $s = 0,236$ . La elasticidad respecto del trabajo es 0,81 con error estándar 0,13; la del capital, 0,25 con error estándar 0,11, y su  $t$  de 2,30 la separa de cero al 5 % con poco margen, porque con 25 observaciones y dos factores correlacionados la parte propia de cada regresor es corta (lección 14). La constante,  $e^{1,844} = 6,3$ , es el factor de escala  $A$ .

La pregunta de la teoría es si los rendimientos son constantes:  $H_0: \alpha + \gamma = 1$ . Es una restricción lineal sobre dos coeficientes, de las que la lección 13 enseñó a contrastar, y Gretl la contrasta con

**restrict.** La suma estimada es 1,051, con error estándar 0,041; el estadístico  $F(1, 22)$  vale 1,54, frente a un valor crítico de 4,30 al 5 %, y el valor  $p$  es 0,23. Datos como estos no serían raros si los rendimientos fuesen constantes; a la luz del contraste, no se rechaza. El modelo restringido se construye como en la lección 13: con  $\gamma = 1 - \alpha$ ,  $\log Q - \log L = \log A + \gamma (\log K - \log L) + u$ , la regresión del logaritmo del producto por trabajador sobre el logaritmo del capital por trabajador. Su coeficiente es 0,289, y las estimaciones restringidas quedan en  $\hat{\alpha} = 0,711$  y  $\hat{\gamma} = 0,289$ : al imponer la escala constante, el reparto entre trabajo y capital se desplaza hacia el capital. La SRC sube de 1,222 a 1,308, y esa diferencia, dividida por  $\mathfrak{s}^2$ , es el  $F$ .

Dos cautelas. La primera: con 25 observaciones el contraste tiene poca potencia, y “no se rechaza” no es “los rendimientos son constantes”. La segunda: en una regresión de corte transversal entre estados, la elasticidad estimada compara industrias de tamaños distintos en un mismo año, no el efecto de aumentar los factores en una misma industria; su lectura causal exige los supuestos de la lección 9 sobre la perturbación.

*Para profundizar:* Zellner, A. y Revankar, N. S. (1969), “Generalized production functions”, *Review of Economic Studies* 36, 241–250; Greene, W. H., *Econometric Analysis* (los datos figuran en la tabla 9.1 de la 4.<sup>a</sup> edición, y el ejemplo de Cobb–Douglas con el contraste de rendimientos constantes se repite en las ediciones posteriores); Wooldridge, J. M. (2020), cap. 4, sección 4.4 (contrastes de una combinación lineal de parámetros).

## 8 Previsión con y sin logaritmos

Con `lprice` sobre `rooms` y `lnox`, un barrio con 6 habitaciones y `nox` 5,5 tiene  $\widehat{\log(\text{price})} = 9,846$ . Deshacer el logaritmo,  $e^{9,846} = 18879$  dólares, *subestima* el precio medio:  $e^{\hat{y}}$  predice la mediana, no la media.

Con perturbación normal (lección 12),  $E(y \mid \text{regresores}) = e^{\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta}} e^{\sigma^2/2}$ . Previsión corregida:  $e^{\hat{y}} e^{\mathfrak{s}^2/2}$ ; aquí  $\mathfrak{s} = 0,286$  y el factor es 1,042: 19667 dólares. Enunciado, no demostrado.

En toda la muestra: la media de `price` es 22512; la media de  $e^{\hat{y}}$ , 21672; la de la previsión corregida, 22576.

Para comparar con un modelo en niveles hay que medir sobre la misma variable: el cuadrado de la correlación entre `price` y la previsión en niveles del modelo log-log es 0,595; el  $R^2$  de `price` sobre `rooms` y `lnox`, 0,536.

### Previsión con y sin logaritmos

Un modelo con el logaritmo del precio como regresando predice logaritmos. Para dar un precio hay que deshacer la transformación, y ese paso tiene una trampa. Tomemos el modelo log-log `lprice` sobre `rooms` y `lnox`,  $\widehat{\log(\text{price})} = 9,234 + 0,306 \text{rooms} - 0,718 \log(\text{nox})$ , y un barrio con seis habitaciones por vivienda y una concentración de 5,5: la previsión en logaritmos es 9,846. Lo inmediato es deshacer el logaritmo y tomar  $e^{9,846} = 18879$  dólares como previsión del precio. Pero  $e^{\hat{y}}$  no predice el precio medio de los barrios con esas características, sino algo menor.

La razón está en la forma de la perturbación. El modelo dice  $\log(\text{price}) = \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta} + u$ , es decir,  $\text{price} = e^{\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta}} e^u$ . Si  $u$  es simétrica alrededor de cero, la mitad de los barrios tiene  $e^u > 1$  y la otra

mitad  $e^u < 1$ , así que  $e^{x^\top \beta}$  es la mediana del precio para esos regresores. Pero la media de  $e^u$  es mayor que 1: los valores de  $u$  por encima de cero multiplican el precio por más de lo que los valores por debajo lo dividen. Con  $u$  normal de varianza  $\sigma^2$ , condicionando en los regresores, la media de  $e^u$  es  $e^{\sigma^2/2}$ , y por tanto  $E(\text{price} \mid \text{regresores}) = e^{x^\top \beta} e^{\sigma^2/2}$ . Es una propiedad de la distribución normal que enunciamos sin demostrar; el apéndice de geometría tampoco la cubre. La previsión de la media se obtiene multiplicando  $e^{\hat{y}}$  por  $e^{\mathfrak{s}^2/2}$ , con  $\mathfrak{s}^2 = \text{SRC}/(n - k)$  la cuasivarianza de los residuos de la lección 11. Aquí  $\mathfrak{s} = 0,286$ , el factor es  $e^{0,0409} = 1,042$ , y la previsión corregida del barrio es  $18879 \times 1,042 = 19667$  dólares. El modelo nivel-log, **price** sobre **rooms** y **lnox**, da para el mismo barrio 20065. Las tres cifras, 18879, 19667 y 20065, son previsiones razonables del precio de ese barrio; lo que no es razonable es tomar  $e^{\hat{y}}$  por la media sin corregirlo.

La corrección se nota en el conjunto de la muestra. El precio medio de los 506 barrios es 22512 dólares. La media de  $e^{\hat{y}}$  es 21672, un 3,7 % menos; la media de las previsiones corregidas, 22576, casi igual a la observada. Si la perturbación no fuese normal, el factor  $e^{\sigma^2/2}$  no sería el correcto, pero el problema sería el mismo, y hay una corrección sin supuesto de normalidad: multiplicar por la media muestral de  $e^{\hat{e}_i}$ , los residuos exponenciados. Con estos datos ese factor vale 1,043, frente al 1,042 de la fórmula con normalidad.

Con la previsión en niveles se puede responder la pregunta que la transparencia “Log-nivel: salarios y educación” dejó abierta: cómo comparar el ajuste de un modelo en logaritmos con el de uno en niveles. El  $R^2$  no sirve, porque mide ajustes a regresandos distintos. Lo que sí se puede comparar es cuánto se parecen las previsiones del precio, en dólares, al precio observado. Una medida es el cuadrado de la correlación entre **price** y la previsión en niveles, que para el modelo en niveles coincide con su  $R^2$  (lecciones 5 y 8:  $R^2$  es el coseno al cuadrado del ángulo entre el regresando y su ajuste en desviaciones, es decir, su correlación al cuadrado). Con el modelo log-log, la correlación al cuadrado entre **price** y  $e^{\hat{y}}$  es 0,595, y multiplicar por el factor de corrección no la cambia, porque una constante multiplicativa no altera la correlación. El modelo nivel-log, **price** sobre **rooms** y **lnox**, tiene  $R^2 = 0,536$ . Medidos sobre la misma variable, el modelo en logaritmos predice algo mejor el precio en dólares. No es una regla general: en otros datos el resultado se invierte, y por eso hay que calcularlo.

*Para profundizar:* Wooldridge, J. M. (2020), cap. 6, sección 6.4, apartado “Predicting  $y$  when  $\log(y)$  is the dependent variable” (incluye la corrección sin normalidad de Duan y la comparación de  $R^2$  entre modelos); Duan, N. (1983), “Smearing estimate: a nonparametric retransformation method”, *Journal of the American Statistical Association* 78, 605–610.

## 9 Lo que cambia y lo que no

*Unidades:* si **price** pasa a miles de dólares,  $\log(\text{price}/1000) = \log(\text{price}) - 6,908$ : solo cambia la constante ( $9,234 \rightarrow 2,326$ ); pendientes,  $R^2$  y  $\mathfrak{s}$ , iguales. En niveles, cambiar las unidades de  $y$  o de  $x$  reescala los coeficientes (lección 5).

*Solo variables positivas:* el logaritmo no admite ceros ni negativos. Con ceros, se deja la variable en niveles o se usa  $\log(1 + x)$  para  $x \geq 0$ . Las variables que ya son porcentajes o tasas suelen entrar en niveles; las dicotómicas, siempre (lección 16).

*La forma de la perturbación:* los precios y los salarios tienen asimetría a la derecha y una dispersión que crece con el nivel; el logaritmo los simetriza y estabiliza su varianza. Esa es la razón

estadística para preferir `lprice` y `lwage`, y vuelve en la lección 17.

Lo que no cambia nunca: la geometría. Columnas, proyección, residuos,  $t$  y  $F$  son los mismos para cualquier forma funcional lineal en los regresores.

## Lo que cambia y lo que no

Tres observaciones prácticas cierran la parte de lectura.

*Unidades.* La lección 5 estudió qué pasa con la media, la varianza y la correlación al trasladar o reescalar un vector, y la lección 12 avisó de que el tamaño de un coeficiente depende de las unidades. En un modelo en niveles, medir el precio en miles de dólares divide por mil todos los coeficientes y la constante; medir `nox` en partes por millón en lugar de por cien millones multiplica su coeficiente por cien. Las conclusiones no cambian, pero las cifras sí, y hay que saber en qué unidades está cada una. Con logaritmos la situación es más simple:  $\log(cx) = \log c + \log x$ , así que cambiar las unidades de una variable en logaritmos suma una constante a su columna, y eso solo mueve la constante del modelo. Con `lprice` sobre `rooms` y `lnox`, si el precio se mide en miles de dólares la constante pasa de 9,234 a  $9,234 - \log(1000) = 2,326$ , y las dos pendientes, el  $R^2$ ,  $s$  y todos los  $t$  quedan iguales. Lo mismo ocurre si se cambian las unidades de `nox`: su coeficiente, la elasticidad, no tiene unidades. Esta invariancia es una de las razones por las que las elasticidades son la forma habitual de enunciar resultados comparables entre estudios.

*Variables positivas.* El logaritmo de cero no existe, y el de un número negativo tampoco. Las variables candidatas a entrar en logaritmos son cantidades positivas con rango amplio: precios, salarios, rentas, producción, población, superficies. Cuando una variable positiva toma el valor cero en parte de la muestra (horas de formación, gasto en un bien que muchos no compran), se puede dejar en niveles o usar  $\log(1+x)$ , que vale cero en  $x=0$  y se parece a  $\log x$  para  $x$  grande; en ese caso la lectura porcentual es solo aproximada. Las variables que ya son tasas o porcentajes, como una tasa de paro o la ratio alumnos-profesor, suelen entrar en niveles: su coeficiente se lee por puntos porcentuales y no hace falta transformarlas. Las variables dicotómicas, que valen cero o uno, nunca se transforman; la lección 16 explicará cómo se leen, y en un modelo con el regresando en logaritmos su coeficiente será una diferencia porcentual.

*La forma de la perturbación.* Hay una razón estadística, además de la económica, para preferir el logaritmo en el regresando cuando se trata de precios, salarios o rentas. Estas variables tienen distribuciones asimétricas, con una cola larga a la derecha, y su dispersión crece con el nivel: entre viviendas caras hay más diferencias en dólares que entre viviendas baratas. En un modelo en niveles eso se traslada a la perturbación, que deja de tener la misma varianza en todas las observaciones, en contra del supuesto de homocedasticidad de la lección 11. El logaritmo comprime la cola derecha y convierte las diferencias en dólares en diferencias relativas, que suelen ser más parecidas entre niveles; con frecuencia el modelo en logaritmos cumple mejor los supuestos de las lecciones 11 y 12. La lección 17 tratará la heterocedasticidad y sus remedios; el cambio a logaritmos es el primero que se suele probar.

Y lo que no cambia. Toda esta lección ha hablado de lectura, y ninguna transparencia ha necesitado una figura nueva de  $\mathbb{R}^n$ . El modelo con logaritmos es el mismo modelo lineal en los regresores de las lecciones 8 a 14, con otras columnas. La proyección, el residuo, la descomposición de Pitágoras, el  $R^2$ , los errores estándar, los contrastes  $t$  y  $F$  y la colinealidad son los que eran.

La forma funcional decide qué columnas se construyen y cómo se leen sus coeficientes; una vez construidas, la geometría no distingue un logaritmo de un nivel.

*Para profundizar:* Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, sección 2.4 (“The effects of changing units of measurement on OLS statistics”) y cap. 6, sección 6.2 (ventajas y límites de los logaritmos, incluida la cuestión de los ceros); cap. 8 para la heterocedasticidad.

## 10 Recapitulación y guiño a la lección siguiente

| Pieza                      | Fórmula                                                | Lectura                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Regresor frente a variable | $x_j$ es función de las variables                      | la geometría ve columnas; la lectura, variables                      |
| Aproximación               | $\log(1 + p) \approx p$                                | un $\Delta$ en $\log y$ es un $100\Delta$ % en $y$                   |
| Las tres lecturas          | $100\beta_2$ %; $\beta_2/100$ ; $\beta_2$ %            | semielasticidad; efecto del 1 %; elasticidad                         |
| Cobb–Douglas               | $\log Q = \beta_1 + \alpha \log L + \gamma \log K + u$ | elasticidades parciales; $\alpha + \gamma = 1$ es un <b>restrict</b> |
| Previsión en niveles       | $e^{\hat{y}} e^{\hat{u}^2/2}$                          | $e^{\hat{y}}$ es la mediana; el factor corrige la media              |

Demostrado: las lecturas, a partir de  $\log(1 + p) \approx p$ . Enunciado:  $E(e^u) = e^{\sigma^2/2}$  con  $u$  normal. Sin geometría nueva.

*Lección 16:* variables dicotómicas e interacciones; en log-nivel, el coeficiente de una dicotómica es una diferencia porcentual.

### Recapitulación y guiño a la lección siguiente

La sesión no ha añadido ningún resultado geométrico ni probabilístico. Ha añadido una distinción, entre variable explicativa y regresor, y una tabla de lecturas. La distinción dice que el modelo del curso es lineal en los regresores y que eso es todo lo que mínimos cuadrados y la inferencia necesitan; los regresores pueden ser transformaciones de las variables explicativas, y entonces el modelo describe entre las variables una relación no lineal. La tabla dice cómo se lee el coeficiente en cada combinación de niveles y logaritmos: cambio absoluto, semielasticidad, efecto de un 1 % o elasticidad, siempre con la aproximación  $\log(1 + p) \approx p$  y con la versión exacta  $100(e^\Delta - 1)$  cuando el cambio es grande.

Lo que se ha demostrado es esa tabla, con la propiedad del logaritmo y las definiciones. Lo único que se ha enunciado sin demostrar es la media de  $e^u$  para  $u$  normal,  $e^{\sigma^2/2}$ , que sostiene la corrección de la previsión en niveles; no está en el apéndice de geometría, porque no es un resultado sobre proyecciones sino sobre la distribución normal. La lección 12 enunció también la propiedad de la normal de la que dependen las distribuciones  $t$  y  $F$ ; con esta son dos.

Dos cosas conviene retener para las lecciones siguientes. La primera es la idea de que la forma funcional es una decisión del economista: el modelo impone la forma de la relación y después estima su tamaño, y los datos ayudan poco a elegir entre formas que ajustan igual donde hay observaciones. La segunda es el aviso sobre el  $R^2$ : no compara modelos con regresandos distintos, y la comparación hay que hacerla sobre las previsiones en la misma variable.

La lección 16 continúa con la lectura de coeficientes en otro tipo de regresor: las variables dicotómicas, que valen cero o uno y que señalan a qué grupo pertenece cada observación. Su coeficiente es un desplazamiento del intercepto entre grupos; en un modelo con el regresando en logaritmos, ese desplazamiento es una diferencia porcentual, por la misma aproximación de hoy. Y las interacciones, producto de una dicotómica por otro regresor, permiten que una pendiente cambie de un grupo a otro. La lección 14 dejó para entonces una advertencia: dos indicadoras complementarias junto con la constante son colinealidad exacta, y la lección 16 dirá cómo se evita.

*Para profundizar:* Wooldridge, J. M. (2020), cap. 6, sección 6.2 (resumen de las formas funcionales con logaritmos) y cap. 7, sección 7.1 (anticipo de las variables dicotómicas).