

Índice general

1	El puente epistemológico: entre Eros y los datos	2
2	Un vector es una función; una variable aleatoria también lo es	4
3	El producto escalar de la probabilidad	5
4	La esperanza: dos caras de la misma moneda	7
5	Esperanza condicional: proyección sobre un espacio ENORME	8
6	El Modelo Clásico de Regresión Lineal (MCRL)	10
7	Cuidado: Esta descomposición ortogonal no implica causalidad	12
8	El salto: método de los momentos	14
9	Recapitulación y guiño a la lección siguiente	16

Lección 9. El puente: de los datos a las variables aleatorias

Marcos Bujosa

22 de agosto de 2026

Resumen

“Ninguno de los dioses filosofa ni desea hacerse sabio, porque ya lo es [...] Tampoco los ignorantes filosofan ni desean hacerse sabios [...] Eros está en el medio de la sabiduría y de la ignorancia.” (Platón, *El Banquete*, 203e–204a)

La econometría habita en ese mismo espacio intermedio: entre la ignorancia absoluta y el conocimiento total de la población. Esta lección da el salto desde la geometría de las muestras (lo que vemos) al espacio de las variables aleatorias (el modelo subyacente que queremos inferir).

- ([slides](#)) — ([html](#)) — ([pdf](#))

1 El puente epistemológico: entre Eros y los datos

“Ninguno de los dioses filosofa ni desea hacerse sabio, porque ya lo es [...] Tampoco los ignorantes filosofan ni desean hacerse sabios [...] Eros está en el medio de la sabiduría y de la ignorancia.” — Diotima a Sócrates (Platón, *El Banquete*)

- *El Dios*: Conoce toda la población (certeza absoluta). No necesita inferir nada.
- *El Ignorante*: No tiene datos ($n = 0$). No puede afirmar nada.
- *El Econometrista*: Como Eros, habita el espacio intermedio. Tiene una *muestra imperfecta* ($n < N$) y el *deseo de inferir* la estructura verdadera del mundo.

Hasta ahora: *geometría exacta* sobre una muestra finita $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. A partir de hoy: la muestra $\mathbf{y}$ se concibe como *una realización particular* (una “sombra sensible”) de un modelo abstracto superior: una *variable aleatoria* Y .

Advertencia, desde ya: lo que sigue es una **analogía**, no una demostración. Y solo es válida para variables aleatorias con esperanza y varianzas definidas — *no todas la tienen*.

El puente epistemológico: entre Eros y los datos

Esta analogía platónica encierra el problema epistemológico de la econometría. En las primeras lecciones de este curso nos hemos dedicado a describir muestras: hemos calculado medias, varianzas

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

y rectas de regresión para conjuntos de datos concretos ($\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$). En ese nivel, no había incertidumbre: si medimos la covarianza de nuestra muestra, el número que obtenemos es un hecho geométrico exacto.

Sin embargo, en economía y política rara vez nos interesa la muestra por sí misma. Si analizamos una muestra de 1.000 salarios, no lo hacemos porque nos importen exclusivamente esos 1.000 trabajadores concretos; lo hacemos porque queremos descubrir el mecanismo subyacente que determina los salarios en *toda la población* o en el *proceso de generación de salarios*. Queremos descubrir la idea abstracta detrás de los datos concretos.

El dios que conociera el mecanismo exacto no necesitaría la estadística. El ignorante absoluto sin datos no podría aplicarla. El econometrista actúa en el medio: usa datos contingentes (la muestra) para aproximarse racionalmente al mecanismo necesario (el modelo poblacional).

El vector de datos $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ que hemos usado hasta ahora es un conocimiento cerrado, sin resquicios de ignorancia — sabemos exactamente cuánto vale cada y_i , y por tanto sabemos exactamente cuánto vale $\mu_{\mathbf{y}}$, $\sigma_{\mathbf{y}}^2$, o cualquier otra cantidad calculada a partir de él; pero es un conocimiento incompleto, limitado a la muestra de datos de que disponemos. Cuando aspiramos a decir algo sobre el salario “en general”, o sobre el precio de la vivienda “en general” — no solo de los pocos casos que observamos, sino de la relación subyacente que sospechamos que existe y que ni observamos ni observaremos jamás en su totalidad —, no estamos en la posición del sabio. Pero tampoco estamos en la del ignorante total: no partimos de la nada, tenemos una muestra, un vector concreto, una teoría económica que orienta la búsqueda. Estamos, como Eros, en el medio: con datos parciales pero con el deseo (y las herramientas) de inferir algo que va más allá de una colección de datos parciales.

La *variable aleatoria* es, precisamente, el objeto matemático que formaliza esa posición intermedia. A partir de esta lección, el vector de datos $\mathbf{y}$ deja de ser nuestro único objeto de estudio. Pasaremos a considerarlo como una *realización particular*, una “fotografía” momentánea, de un ente matemático abstracto superior: una *variable aleatoria* Y . Asumiremos que nuestros n datos son el resultado de observar n copias idénticas e independientes de esa variable Y . Y la esperanza matemática $E(Y)$ no es, como veremos, algo que calculemos con exactitud a partir de una tabla de números: es un número teórico, generalmente desconocido, que solo podemos *inferir* —nunca poseer del todo— a partir de nuestra muestra. Ahí radica el “deseo filosófico” del econometrista: no tiene la certeza del sabio (no conoce $E(Y)$), pero tampoco actúa a ciegas como el ignorante (tiene un vector de datos y un método, la geometría que hemos construido, para acercarse a esa certeza inalcanzable).

Al dar este paso, la intuición geométrica que hemos construido en $\mathbb{R}^n$ no desaparece; todo lo que sigue en esta sesión es una *analogía*, deliberadamente construida en paralelo con la geometría de las lecciones 4 a 8, pero *no* es una demostración de que las variables aleatorias se comporten como los vectores de $\mathbb{R}^n$. Hay claras diferencias y excepciones, que iremos señalando conforme aparezcan. Y hay, además, una restricción teórica muy importante que conviene decir en voz alta desde ya: no todas las variables aleatorias tienen esperanza matemática definida, y entre las que la tienen, no todas tienen además varianza definida. Aquí trabajaremos exclusivamente con variables aleatorias con esperanza y varianza definidas, pues son solo estas las que permiten replicar la estructura geométrica de las lecciones anteriores.

Para quien quiera ver hasta qué punto la intuición cotidiana sobre “el valor esperado” puede fallar cuando la esperanza no está bien definida, recomiendo el vídeo [“The Two Envelope Problem — a Mystifying Probability Paradox”](#): un ejercicio mental sencillo de enunciar, y sorprendentemente resbaladizo, precisamente porque la esperanza matemática involucrada no está bien definida.

Para profundizar:

- Platón, *Banquete*, 203e–204a (discurso de Diotima sobre la naturaleza de Eros).
- Wooldridge, J. M. (2020), Apéndice C.1–C.2: repaso de variable aleatoria, función de distribución y esperanza matemática desde la estadística clásica.

2 Un vector es una función; una variable aleatoria también lo es

Un vector $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ (lista ordenada de números —Lección 2) es una *función* que asigna un número a cada índice $i \in \{1, \dots, n\}$.

Una *variable aleatoria* Y es también una función — pero definida sobre un conjunto Ω (de “sucesos elementales”), generalmente más grande y sin una descripción explícita.

$\mathbb{R}^n$	Variables aleatorias
dominio $\{1, \dots, n\}$	dominio Ω
$\mathbf{y}(i) = y_i$	$Y(\omega)$
vector = lista de n números	v.a. = función sobre Ω

Lo que *sobrevive* al cambio:

La *combinación lineal* (lección 2) de variables aleatorias $\beta_1 1 + \beta_2 X$ sigue siendo una variable aleatoria, exactamente como $\beta_1 \mathbf{1} + \beta_2 \mathbf{x}$ era un vector.

Un vector es una función; una variable aleatoria también lo es

En la lección 2 definimos un vector $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ como una lista ordenada de números; pero esta definición nos permite afirmar que un vector de $\mathbb{R}^n$ es, sencillamente, una *función* que asigna a cada índice i , del conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$, un número real y_i .

Una *variable aleatoria* Y es, formalmente, el mismo tipo de objeto: una función que asigna un número real a cada elemento de un conjunto. La diferencia está en el dominio. En $\mathbb{R}^n$, el dominio es el conjunto finito y perfectamente conocido $\{1, \dots, n\}$ (los índices de nuestras n observaciones). En el caso de una variable aleatoria, el dominio es un conjunto Ω —llamado convencionalmente “espacio de sucesos elementales”— que puede ser enorme, incluso infinito, y cuyos elementos concretos casi nunca se describen (salvo en los cursos de probabilidad para presentar ejemplos triviales como el lanzamiento de un dado o una moneda). $Y(\omega)$ denota el valor numérico que la variable aleatoria Y asigna al elemento $\omega \in \Omega$. Como las variables aleatorias pueden sumarse y multiplicarse por escalares para obtener nuevas variables aleatorias, también forman un espacio vectorial (aunque ya no es el espacio $\mathbb{R}^n$ de las primeras lecciones).

Aquí aparece ya la primera diferencia real entre ambos mundos, y conviene señalarla sin rodeos: mientras que en $\mathbb{R}^n$ conocemos perfectamente el dominio (los índices $1, \dots, n$), en el caso de las variables aleatorias casi nunca sabemos, ni necesitamos saber, qué es exactamente Ω . Cuando decimos

“el precio de una vivienda, P , es una variable aleatoria”, no estamos pensando en un Ω concreto con sucesos elementales identificables uno a uno; estamos usando la maquinaria matemática de las variables aleatorias para modelizar de manera abstracta nuestra incertidumbre sobre ese precio, sin necesidad de precisar más.

Pese a esta diferencia importante, lo que sobrevive intacto a este cambio es precisamente lo que permite mantener la maquinaria que hemos usado hasta hoy: la *combinación lineal*, introducida ya en la lección 2. Del mismo modo que $\beta_1 \mathbf{1} + \beta_2 \mathbf{x}$ era, en $\mathbb{R}^n$, otro vector (obtenido sumando dos vectores tras multiplicarlos por escalares), la expresión $\beta_1 \cdot 1 + \beta_2 X$ —donde 1 denota la variable aleatoria *constante* igual a 1 en todo Ω ,¹ y X es otra variable aleatoria— es otra una variable aleatoria. Esta es la observación que permitirá, en unas transparencias, escribir el modelo de regresión $Y = \beta_1 \cdot 1 + \beta_2 X + U$ con total naturalidad: es la misma operación algebraica de siempre, solo que ahora los objetos que combinamos ya no son listas de n números, sino funciones sobre un dominio Ω (casi nunca especificado explícitamente).

Para profundizar:

- Wooldridge, J. M. (2020), Apéndice B.3: propiedades de linealidad de la esperanza matemática.

3 El producto escalar de la probabilidad

En $\mathbb{R}^n$: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_s = \frac{1}{n}(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})$.

Con variables aleatorias, el papel de $\langle \cdot, \cdot \rangle_s$ lo juega la *esperanza del producto*:

$$\langle X, Y \rangle_P = E(XY).$$

Advertencia honesta: $\langle \cdot, \cdot \rangle_P$ es solo un *semi*-producto escalar. $E(X^2) = \|X\|_P^2 = 0$ NO implica $X = 0$ (puede ser cero “casi seguro”; no lo desarrollaremos).

Nota: 0 es la variable aleatoria constante que asigna 0 a todo suceso elemental de Ω .

Pero Pitágoras, Cauchy–Schwarz y la desigualdad triangular (lección 3) solo exigían simetría, linealidad y positividad —no positividad estricta. Así que *siguen siendo válidos*, sin cambiar una coma.

El producto escalar de la probabilidad

Toda la geometría que hemos construido desde la lección 3 —ortogonalidad, ángulos, Pitágoras, proyecciones— dependía de un único ingrediente: un producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ con tres propiedades abstractas (simetría, linealidad en cada argumento, positividad). En la lección 4 vimos que, para hacer estadística en $\mathbb{R}^n$, se usa el producto escalar $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_s = \frac{1}{n}(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})$, con el factor $\frac{1}{n}$ elegido precisamente para que $\|\mathbf{1}\|_s = 1$.

Para dar el salto de hoy necesitamos el mismo tipo de ingrediente: un producto escalar entre variables aleatorias. La elección natural —y la que hace que todo el paralelismo funcione— es la

¹es decir, $1(\omega) = 1$ para todo ω del dominio Ω .

esperanza del producto:

$$\langle X, Y \rangle_P = E(XY),$$

donde XY denota el producto *punto a punto* de las dos funciones X y Y (es decir, la función que a cada $\omega \in \Omega$ le asigna $X(\omega) \cdot Y(\omega)$): que es el análogo, en el mundo de las variables aleatorias, del producto componente a componente $\mathbf{x} \odot \mathbf{y}$ que en la lección 7 usamos para escribir la “fórmula de cálculo” de la varianza y la covarianza.

- En cuanto a las propiedades relacionadas con la probabilidad, si denotamos con 1 la variable aleatoria constante 1 (aquella que asigna el valor 1 a todo suceso ω : $1(\omega) = 1$), también ocurre que $\|1\|_P = 1$, puesto que $\|1\|_P^2 = \langle 1, 1 \rangle_P = E(1^2) = E(1) = 1$.
- En cuanto a las propiedades relevantes que permiten replicar el esquema geométrico: $\langle \cdot, \cdot \rangle_P$ hereda (aquí solo las enunciamos sin demostración alguna):
 - *Simetría*: $E(XY) = E(YX)$, ya que, como el producto de números reales es conmutativo: $X(\omega)Y(\omega) = Y(\omega)X(\omega)$.
 - *Linealidad*: $E((aX + bZ)Y) = aE(XY) + bE(ZY)$, pues la esperanza matemática es una operación lineal.
 - *Positividad*: $E(X^2) \geq 0$, porque $X^2(\omega) \geq 0$ para todo ω , y la esperanza de una función no negativa no puede ser negativa.

Las tres se cumplen, pero hay una diferencia real, y conviene señalarla con la misma honestidad con que hemos señalado cada diferencia entre los dos mundos a lo largo de esta sesión: en $\mathbb{R}^n$, un producto escalar propio exige además que $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0$ si y solo si $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (positividad *estricta*); y en efecto, $\frac{1}{n}(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}) = 0$ obliga a que cada componente de $\mathbf{x}$ sea cero. Con $\langle \cdot, \cdot \rangle_P$ esto ya no es cierto: $E(X^2) = 0$ no implica que X sea la variable aleatoria nula en todo Ω ; solo implica que X vale cero *con probabilidad uno* —es decir, que el conjunto de ω para los que $X(\omega) \neq 0$ tiene, en el sentido de la probabilidad, “tamaño” cero, aunque pudiera no estar vacío—. A un objeto así, que cumple simetría, linealidad y positividad pero no positividad estricta, se le llama *semi*-producto escalar (o semi-norma, cuando hablamos de $\sqrt{E(X^2)}$). No desarrollaremos esta sutileza —pertenece a un curso de probabilidad más formal—, pero es importante saber que existe, para no dar por sentado que el paralelismo con $\mathbb{R}^n$ es perfecto en todos sus detalles.

¿Qué salvamos, entonces, de todo el edificio construido en la lección 3? La buena noticia es que *todo*. Repasando las demostraciones de la lección 3 —Pitágoras, la desigualdad de Cauchy–Schwarz, la desigualdad triangular—, ninguna de ellas usó en ningún momento la propiedad de positividad *estricta*. Todas se apoyaban únicamente en simetría, linealidad y positividad (no estricta). Por tanto, esas tres demostraciones siguen siendo válidas, palabra por palabra, con $\langle \cdot, \cdot \rangle_P$ en lugar de $\langle \cdot, \cdot \rangle_s$: seguiremos pudiendo hablar de vectores ortogonales ($\langle X, Y \rangle_P = E(XY) = 0$), de la norma de una variable aleatoria ($\|X\|_P = \sqrt{E(X^2)}$), y de proyecciones ortogonales, con exactamente el mismo aparato geométrico.

Para no sobrecargar la notación, se suele escribir sencillamente $E(XY)$ en lugar de $\langle X, Y \rangle_P$ (así lo hace, de hecho, toda la literatura econométrica): pero conviene tener presente, que la operación $E(XY)$ tiene el mismo papel que $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_s$ en $\mathbb{R}^n$.

Para profundizar:

- Wooldridge, J. M. (2020), Apéndice B.3: propiedades de linealidad de la esperanza.

4 La esperanza: dos caras de la misma moneda

En $\mathbb{R}^n$, el vector constante uno, $\mathbf{1}$, tuvo un papel especial; ahora lo tiene la v.a. cte. 1 .

	$\mathbb{R}^n$	Variables aleatorias
Escalar	$\mu_{\mathbf{y}} = \langle \mathbf{y}, \mathbf{1} \rangle_s$	$E(Y) = \langle Y, 1 \rangle_P$
Proyección	$\bar{\mathbf{y}} = \mu_{\mathbf{y}} \mathbf{1}$ (vector <i>constante</i>)	$E[Y 1] = E(Y) \cdot 1$ (función <i>constante</i>)




Figura 1: Proyección de la variable aleatoria Y sobre el subespacio generado por la variable constante 1 . El escalar de la proyección es $E(Y)$ (la esperanza matemática o valor esperado), y el vector proyectado es la v.a. constante $E[Y|1] = E(Y)1$ (la esperanza condicional).

Por Pitágoras (igual que en la lección 5):

$$\text{Var}(Y) = \|Y - E[Y|1]\|_P^2 = E(Y^2) - (E(Y))^2$$

La esperanza: dos caras de la misma moneda

Empecemos por el concepto más simple: la proyección sobre las variables aleatorias constantes.

En la lección 4 proyectamos el vector de datos $\mathbf{y}$ sobre la recta generada por $\mathbf{1}$. Aquí hacemos lo mismo: proyectamos la variable aleatoria Y sobre el subespacio unidimensional generado por 1 (la variable aleatoria que siempre toma el valor 1).

Cuidado con la notación: En muchos manuales de estadística se usa el símbolo $E(Y)$ tanto para referirse al *número* (el valor esperado, un escalar) como a la *variable aleatoria constante* (el vector proyectado). Para no perder el rigor geométrico que tanto nos ha costado construir, haremos una distinción crucial:

- Usaremos $E(Y)$ estrictamente como *un número* (el escalar que resulta del producto escalar $\langle Y, 1 \rangle_P$).
- Usaremos $E[Y|1]$ como la *variable aleatoria proyectada* (el vector en el espacio).

La relación algebraica es idéntica a la que teníamos en el espacio euclídeo ($\bar{\mathbf{y}} = \mu_{\mathbf{y}} \mathbf{1}$): la variable proyectada es igual al escalar multiplicado por el vector generador; es decir, es una variable aleatoria constante:

$$E[Y|1] = E(Y) \cdot 1$$

La diferencia entre el vector Y y su proyección es ortogonal al vector constante 1 , lo que significa que *su esperanza es cero* ($E(Y - E[Y|1]) = 0$).

Y exactamente igual que hicimos en las lecciones 4 y 5, si aplicamos el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo, vemos que el cuadrado de la hipotenusa, $E(Y^2)$, es la suma de los cuadrados de los catetos, $(E(Y))^2 + \text{Var}(Y)$. Despejando, obtenemos la fórmula clásica de la varianza de la variable aleatoria Y (también llamada varianza poblacional): $\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2$.

La geometría no ha cambiado; solo hemos cambiado de espacio (ahora los objetos son variables aleatorias en lugar de listas de números).

Para profundizar:

- Wooldridge, J. M. (2020), Apéndice B.3: definición y propiedades básicas de $E(Y)$.

5 Esperanza condicional: proyección sobre un espacio ENORME

La *Esperanza Condicional*, $E[Y|X]$, es la proyección ortogonal de Y sobre el subespacio generado por las funciones de la variable X (¡Un espacio enorme!).




Figura 2: Proyección de Y sobre el espacio vectorial generado por las funciones de 1 y X . La perturbación U es ortogonal a dichas funciones. A la izquierda, el triángulo rectángulo de Pitágoras para las varianzas.

Descomposición del vector de datos $\mathbf{y}$	Descomposición variable aleatoria Y
Vector ajustado: $\hat{\mathbf{y}}$	Esperanza Condicional: $E[Y X]$
Residuo: $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$	Perturbación: $U = Y - E[Y X]$

La esperanza condicional: proyección sobre un espacio ENORME

La regresión lineal simple que vimos en las lecciones 6, 7 y 8 consistía en proyectar los datos sobre el plano $\mathcal{L}(1, \mathbf{x})$. El análogo poblacional es proyectar la variable Y sobre el espacio de funciones de

las variables aleatorias X y 1 . El vector resultante es la *Esperanza Condicional*, $E[Y|X]$; es decir, la variable aleatoria (de dicho espacio) más próxima a Y .

¡Atención, un abismo geométrico! En las primeras lecciones solo teníamos dos vectores de $\mathbb{R}^n$ ($\mathbf{1}$ y $\mathbf{x}$) que formaban un plano “muy dócil” de dos dimensiones. Pero en el mundo de las variables aleatorias, el subespacio sobre el que proyectamos no contiene únicamente las combinaciones lineales de 1 y X correspondientes al modesto plano bidimensional $\mathcal{L}(1, X)$.² También incluye todas las combinaciones lineales de toda una gigantesca familia de funciones que incluyen: X^2 , $\log(X)$, e^X , $-\frac{1}{2} \exp\left(\sqrt{1 + \frac{\pi}{7} \ln X + 5 \sin^3(e^X)}\right)$, funciones a trozos, o cualquier inimaginable transformación punto a punto de X , siempre y cuando tenga varianza finita.... en los cursos de probabilidad se dice que contiene a *cualquier “función medible”* de X .

Consecuentemente, el subespacio sobre el que proyectamos para obtener $E[Y|X]$ no es un plano; es ¡un monstruo de dimensión infinita!

La *esperanza condicional* $E[Y|X]$ (la “sombra” de Y sobre dicho espacio) es, por definición, la función de X y de 1 (de entre todas las de ese enorme espacio) que resulta más próxima a Y en la norma $\|\cdot\|_P$ — es decir, la que hace mínima $E[(Y - g(X))^2]$ entre todas las funciones g posibles. Y aquí está la consecuencia que conviene subrayar con toda claridad: como el espacio sobre el que proyectamos es tan vasto, *no hay ninguna razón, en general, para que esa función más próxima sea una recta*. $E[Y|X]$ puede ser, en principio, cualquier curva: puede subir y luego bajar, puede tener escalones, puede curvarse de maneras arbitrariamente complicadas. La única propiedad que le exigimos, por definición, es ser la función de X que minimiza la distancia a Y — no que sea una combinación lineal de 1 y X .

La figura de la transparencia ilustra esta idea con el lenguaje visual que ya hemos usado en las lecciones 6 y 8: la variable aleatoria Y (verde) se descompone en dos partes ortogonales, su proyección $E[Y|X]$ (rojo) sobre el espacio de funciones de X , y $U = Y - E[Y|X]$ (gris), la componente perpendicular a dicha proyección — marcado, como en aquellas figuras, con un ángulo recto— y que llamaremos *perturbación*. La diferencia esencial respecto a aquellas figuras es que aquí el “plano” sobre el que proyectamos ya no es un plano de dos direcciones: es, informalmente, un espacio con tantísimas direcciones que ni siquiera podemos dibujarlo con fidelidad geométrica; la figura debe leerse, por tanto, como un esquema conceptual, no como una representación literal.

Esta observación no es un mero tecnicismo: es, precisamente, la que da sentido genuino al *primer supuesto* del Modelo Clásico de Regresión, que presentaremos en la próxima transparencia. Decir que “ $E[Y|X]$ es una función *lineal* de X ” —es decir, que $E[Y|X] = \beta_1 1 + \beta_2 X$ — no es una trivialidad, como podría parecer si pensáramos (erróneamente) que $E[Y|X]$ vive por definición en el plano $\mathcal{L}(1, X)$ de las combinaciones lineales 1 y X . Es, por el contrario, un supuesto sustantivo: estamos afirmando que, de entre todas las infinitas formas funcionales posibles que $E[Y|X]$ podría tener, la función de X y 1 que mejor se aproxima a Y resulta ser, precisamente, la recta $\beta_1 1 + \beta_2 X$.

Para profundizar:

- Bujosa, M., sección “[Esperanza condicional](#)”: definición de $E[Y|X]$ como proyección ortogonal

² Al escribir $\mathcal{L}(1, X)$ estamos reutilizando la misma notación de lecciones anteriores, $\mathcal{L}(\cdot)$; pero ahora para denotar el subespacio vectorial formado por las combinaciones lineales de las variables aleatorias 1 y X (en lugar de por vectores de $\mathbb{R}^n$).

sobre el subespacio probabilístico generado por X , con la advertencia (que aquí simplificamos) de que dicha proyección es una *clase de equivalencia* de variables aleatorias.

- Wooldridge, J. M. (2020), Apéndice B.4 y capítulo 2, sección 2.6: introducción intuitiva a la esperanza condicional y su papel en la especificación del modelo de regresión.

6 El Modelo Clásico de Regresión Lineal (MCRL)

El MCRL consiste en *imponer cuatro supuestos* para que el modelo sea manejable:

1. *Linealidad de la esperanza condicional*: $E[Y|X]$ cae en el plano $\mathcal{L}(1, X)$:

$$E[Y|X] = \beta_1 1 + \beta_2 X.$$

2. *Exogeneidad estricta* ($E[U|X]$ es cero): es decir, $U \perp$ a las funciones de 1 y X .

Como corolario de 1. y 2.:
$$Y = \underbrace{\beta_1 1 + \beta_2 X}_{\text{esperanza condicional}} + \underbrace{U}_{\text{perturbación}}$$

donde U tiene esperanza cero y $\text{Cov}(U, X) = 0$.

3. *Independencia lineal de los regresores* ($\text{Var}(X) \neq 0$): la variable aleatoria X NO toma siempre el mismo valor a .
4. *Homocedasticidad (varianza condicional constante)*: la “dispersión” de U no depende de X .

$$\text{Var}[U|X] = E[U^2|X] = \sigma^2 \cdot 1$$

Nomenclatura:

- Y regresando
- X y 1 regresores
- U perturbación (“otras cosas”).

Parámetros: Nótese que en el modelo no hay “sombrosos”

- β_1 y β_2 son parámetros poblacionales desconocidos

(no son los $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$ de la lección 7).

El Modelo Clásico de Regresión Lineal (MCRL)

Esta es una de las transparencias nucleares del curso. El “Modelo Clásico de Regresión Lineal” es simplemente un conjunto de reglas de juego geométricas que imponemos sobre el mecanismo poblacional desconocido.

Hemos definido la *perturbación* $U = Y - E[Y|X]$ como la diferencia entre Y y su proyección sobre el espacio (enorme) de las funciones de X . Por construcción, U es ortogonal (en el sentido de

$\langle \cdot, \cdot \rangle_P$) a $E[Y|X]$, y a cualquier función de X . Con esta definición, podemos escribir siempre, sin ningún supuesto adicional:

$$Y = E[Y|X] + U.$$

Esta descomposición es, como todas las que hemos hecho en $\mathbb{R}^n$, puramente algebraica: se cumple *siempre*, sea $E[Y|X]$ una recta, una curva, o lo que sea. Ahora bien, el *Modelo Clásico de Regresión Lineal* consiste en añadir cuatro supuestos que, cuando se cumplen, simplifican radicalmente esta descomposición general y la reducen a algo mucho más manejable.

1. *Linealidad*: Suponemos que

$$E[Y|X] = \beta_1 1 + \beta_2 X,$$

para ciertos números β_1, β_2 . Con esto la descomposición $Y = E[Y|X] + U$ se convierte en

$$Y = \beta_1 1 + \beta_2 X + U.$$

Adviértase la ausencia de sombrero sobre β_1 y β_2 . En la lección 7 calculamos $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ a partir de un vector de datos concreto $\mathbf{y}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, mediante las condiciones de ortogonalidad muestrales. Aquí, β_1 y β_2 son *parámetros poblacionales*: números fijos, pero *desconocidos*, que describen la relación teórica subyacente entre las variables aleatorias X e Y .

¿Cómo de realista es este supuesto?: Recuerde que el espacio sobre el que se proyecta Y es de dimensión infinita, así que la esperanza condicional $E[Y|X]$ podría ser casi cualquier función de X (por muy extraña o complicada que fuera). El Supuesto 1 impone que, “milagrosamente”, la sombra de Y (la variable aleatoria función de X más próxima a Y) cae sobre el plano formado por la constante 1 y la variable X . Es decir, que $E[Y|X]$ es sencillamente la combinación lineal $\beta_1 1 + \beta_2 X$. ¿Es esto realista? Depende. Si sabemos (teorema en los cursos de probabilidad) que X e Y provienen de una distribución conjunta Normal, la matemática garantiza que la esperanza condicional siempre es lineal. Si no lo son, este supuesto supone una restricción fortísima (estamos imponiendo un corsé lineal a la realidad, pues estamos imponiendo que de todas las funciones posibles entre 1 y X , la que mejor se aproxima a Y es una combinación lineal de los regresores).

2. *Exogeneidad estricta* ($E[U|X] = 0$)³: Puesto que $U = Y - E[Y|X]$, asumimos que U es aquello que queda tras proyectar ortogonalmente Y sobre las funciones de 1 y X . Así, dado que U es simultáneamente ortogonal a X y a 1 .

- Que $U \perp 1$ implica que $E(U) = 0$.
- Y, recordando *el truco del vector de media nula* que vimos en la lección 6 para $\mathbb{R}^n$: si un vector tiene media cero, su producto escalar con otro vector es directamente la *covarianza* entre ambos. Y como U tiene media cero y es ortogonal a X ($E(UX) = 0$), tenemos que $\text{Cov}(U, X) = E(UX) - E(U)E(X) = 0$. La perturbación no está correlada con los regresores.

3. *Independencia lineal de los regresores con probabilidad 1* ($\text{Var}(X) \neq 0$): Este supuesto impone que X no toma un único valor con probabilidad 1, es decir, que X en desviaciones no es cero,

³Donde 0 es la variable aleatoria constante cero: $0 = 0 \cdot 1$ (i.e., a todo suceso elemental le asigna el valor 0).

y por tanto $\|X - E(X) \cdot 1\|_p^2 = \text{Var}(X) \neq 0$ ⁴

Con un único regresor, esta es toda la sustancia del cuarto supuesto: una condición sobre la varianza de una sola variable. En la lección 10, al generalizar el modelo a varios regresores, significará algo más que eso, pues: dos o más regresores pueden tener cada uno varianza no nula por separado y, aun así, ser linealmente dependientes entre sí.

4. *Homocedasticidad*: Asumimos que la varianza de U , condicionada a X , es una función constante $\sigma^2 1$. Por tanto, la dispersión de U no depende de X . Este supuesto no es estrictamente necesario para encontrar la recta (como veremos), pero será fundamental más adelante para poder hacer inferencia y construir intervalos de confianza de forma sencilla.

Fíjese que, usando $E[U|X] = 0$ (del supuesto 2), tenemos que $\text{Var}[U|X] = E[(U - E[U|X])^2|X] = E[U^2|X]$, que es lo que aparece en la transparencia.

El cuarto supuesto asume algo que NO está garantizado en general: que la variable aleatoria U^2 tiene esperanza (recuerde que no toda variable aleatoria tiene esperanza definida).

Para profundizar:

- Wooldridge, J. M. (2020), capítulo 2, secciones 2.1 y 2.5: presentación clásica del modelo de regresión simple y sus supuestos.

7 Cuidado: Esta descomposición ortogonal no implica causalidad

La descomposición $Y = E[Y|X] + U$ es un hecho algebraico (una proyección ortogonal). *Siempre existe* (si las varianzas de X e Y son finitas).

Que el álgebra permita proyectar Y sobre las funciones de X NO significa que X cause o “explique” Y .

- *Sentido económico razonable*: $\text{Consumo} = f(\text{Renta}) + U$. Tiene sentido pensar que la Renta determina el Consumo, y que U agrupa otros factores (gustos, necesidades).
- *Causalidad absurda (pero aceptable algebraicamente)*: $\text{Superficie} = f(\text{Precio}) + U$. Podemos proyectar la superficie de una casa sobre su precio. La matemática funcionará perfectamente. Pero asumir que “variaciones del precio cambian el tamaño de la casa” es absurdo.

La causalidad NO emana de los datos ni de la geometría. Debe provenir de una Teoría (Económica, Política, Sociológica, etc.) previa.

⁴Técnicamente se debería precisar qué significa exactamente esta condición, porque aquí es fácil cometer un desliz. Podría parecer natural traducirla como “ X no es un múltiplo de 1 ”, es decir, que X no sea, literalmente, la función constante $a \cdot 1$ sobre todo el dominio Ω . Pero esa traducción es demasiado permisiva: recordemos la advertencia hecha al introducir $\langle \cdot, \cdot \rangle_P$ (transparencia “El producto escalar de la probabilidad”), sobre variables aleatorias iguales “casi seguro” pero no idénticas en todo punto. Una variable aleatoria puede coincidir con un valor fijo a con probabilidad uno —y por tanto tener varianza exactamente cero— sin ser, en sentido estricto, la función constante $a \cdot 1$; basta con que difiera de a en un conjunto de sucesos elementales de probabilidad nula. La condición rigurosa, por tanto, nunca es “no ser literalmente un múltiplo de 1 ”, sino, sin rodeos, $\text{Var}(X) \neq 0$: que X no sea igual, con probabilidad uno, a ningún valor fijo.

Cuidado: Esta descomposición ortogonal no implica causalidad

Esta es la advertencia más importante de todo el curso, y el motivo principal por el que hemos pospuesto hablar de modelos y causalidad hasta la novena lección.

La descomposición de una variable aleatoria en su proyección ortogonal $E[Y|X]$ y la perturbación U es un *hecho geométrico* sin interpretación *per se*. Pasa siempre. Y como tal, es completamente mudo respecto a la dirección de la causalidad.

En econometría se utilizan nombres muy sugerentes que pueden llevar a engaño: a Y se la llama “variable explicada” y a X “variable explicativa”. Si hacemos una regresión del Consumo sobre la Renta Disponible, los nombres encajan con nuestra intuición macroeconómica: la renta “causa” (explica) el consumo.

Pero si invertimos el papel de las variables —buscando, por ejemplo, explicar la superficie de una vivienda en función de su precio, en lugar de al revés—, la maquinaria de proyección ortogonal calculará igualmente una recta, hallará un residuo perfectamente ortogonal al precio, y nos devolverá un R^2 positivo. Sin embargo, defender la relación causal en esa dirección (implicando que las alteraciones en el precio modifican la superficie de la vivienda) es ridículo. Es, de hecho, el mismo ejemplo —deliberadamente absurdo pero algebraicamente impecable— que ya vimos en la lección 8.

La estadística es ciega a la dirección temporal o lógica del universo. Consideremos cualquiera de estos cuatro casos:

- X “causa” Y ;
- Y “causa” X ;
- una tercera variable causa ambas;
- o no hay ninguna relación sustantiva entre X e Y .

Pues bien, la descomposición algebraica, por sí sola, es completamente indiferente a cuál de esos escenarios describe realmente el fenómeno que estamos estudiando.

Esta es, precisamente, la razón por la que en la lección 6 pospusimos deliberadamente la distinción entre “regresor” (una noción que atañe a la estructura del modelo, pero sin ningún compromiso causal) y “variable explicativa” (un concepto que sí lleva, implícita, la pretensión de que X desempeña algún papel explicativo o causal, aunque sea parcial, en la generación de Y). Cobramos hoy esa promesa: podemos llamar a X “regresor” con toda tranquilidad, en cualquier circunstancia, porque es una etiqueta puramente algebraica; pero solo deberíamos llamarlo “variable explicativa” —con esa carga causal— cuando dispongamos de alguna razón, *externa a la propia matemática*, que justifique semejante lectura.

¿De dónde puede venir dicha lectura? No de la geometría, ni del álgebra: únicamente de una *teoría económica previa*. Si, antes de mirar ningún dato, tenemos razones teóricas sólidas para pensar que la renta disponible de un consumidor influye en cuánto consume —y no al revés, ni por alguna tercera vía—, entonces sí podemos aventurar una lectura causal de la descomposición $\text{Consumo} = E[\text{Consumo} | \text{Renta}] + U$. Pero si, por el contrario, no tenemos ninguna teoría previa que distinga qué variable debería hacer de X y cuál de Y —como en el ejemplo, deliberadamente absurdo

pero matemáticamente impecable, de regresar la superficie de una vivienda sobre su precio—, entonces la descomposición algebraica sigue siendo perfectamente válida, pero carece de cualquier interpretación causal razonable.

Cerramos esta advertencia recuperando, de forma explícita, el mantra con el que abrimos el curso en la lección 1: *correlación no implica causalidad*. Hoy, con el aparato construido en esta sesión, podemos precisar ese mantra con mayor rigor: tampoco la existencia de una esperanza condicional bien definida —ni, por supuesto, el cumplimiento de los cuatro supuestos del modelo clásico que hemos presentado— implica, por sí sola, ninguna relación causal. Los cuatro supuestos garantizan que $\beta_1 + \beta_2 X$ es una buena *descripción estadística* de cómo varía Y en promedio según X ; no garantizan, en ningún caso, que esa variación sea el reflejo de una relación de causa a efecto.

La econometría proporciona el método para *cuantificar* la magnitud un efecto, pero dicho método solo es útil si el efecto corresponde a una relación teóricamente válida. La justificación sobre la dirección causal del efecto solo puede provenir de un modelo teórico previo.

Para profundizar:

- Angrist, J. y Pischke, J.-S. (2014), *Mastering ‘Metrics’*, capítulo 1: discusión accesible sobre la distinción entre asociación estadística y causalidad, con ejemplos económicos.
- Bujosa, M., sección “[Regresión como descomposición ortogonal](#)”: discusión, con los mismos ejemplos, de por qué la descomposición ortogonal por sí sola no valida ninguna teoría causal.

8 El salto: método de los momentos

En el modelo poblacional, los verdaderos parámetros β_2 y β_1 dependen de la geometría de la *población* (el producto escalar probabilístico $\langle \cdot, \cdot \rangle_P$):

$$\beta_2 = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}, \quad \beta_1 = E(Y) - \beta_2 E(X).$$

Problema: Eros no conoce la población entera; aunque conoce algunos datos.

Solución (El Método de los Momentos): Sustituir los momentos poblacionales desconocidos ($E[\cdot]$) por sus análogos muestrales ($\frac{1}{n} \sum$, es decir, usando el producto escalar estadístico $\langle \cdot, \cdot \rangle_s$ sobre los datos).

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}, \quad \hat{\beta}_1 = \mu_y - \hat{\beta}_2 \mu_x.$$

¡Son las mismas fórmulas que derivamos en la lección 7! Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) equivale al Método de los Momentos en el Modelo Clásico de Regresión Lineal.

El salto: método de los momentos

Llegamos al momento en que todo el andamiaje construido hoy se pone al servicio de algo muy concreto: entender, con una mirada nueva, las fórmulas que ya calculamos en la lección 7.

Bajo el Modelo Clásico de Regresión, hemos asumido que la “sombra” cae en el plano: $E[Y|X] = \beta_1 1 + \beta_2 X$. Partamos de las dos condiciones poblacionales que obtuvimos en la transparencia sobre las consecuencias de $E[U | X] = 0$: $E(U) = 0$ y $\text{Cov}(U, X) = 0$. Sustituyamos en ellas $U = Y - \beta_1 1 - \beta_2 X$ (el primer supuesto del modelo, despejando U) y resolvamos el sistema resultante⁵ para β_1, β_2 .

De $\text{Cov}(U, X) = 0$, usando la linealidad de la covarianza y que $\text{Cov}(\beta_1 1, X) = 0$ (una variable aleatoria constante no covaría con nada):

$$\text{Cov}(U, X) = \text{Cov}(Y - \beta_1 1 - \beta_2 X, X) = \text{Cov}(Y, X) - \beta_2 \text{Var}(X) = 0,$$

de donde

$$\beta_2 = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}.$$

Y de $E(U) = 0$:

$$E(U) = E(Y) - \beta_1 - \beta_2 E(X) = 0 \implies \beta_1 = E(Y) - \beta_2 E(X).$$

Estas dos fórmulas son, letra por letra, el análogo poblacional exacto de las que obtuvimos en la lección 7: $\hat{\beta}_2 = \sigma_{xy}/\sigma_x^2$ y $\hat{\beta}_1 = \mu_y - \hat{\beta}_2 \mu_x$, con $E[\cdot]$, $\text{Cov}(\cdot, \cdot)$ y $\text{Var}(\cdot)$ en el lugar de $\mu_\cdot$, $\sigma_\cdot$ y $\sigma_\cdot^2$.

Aquí topamos, sin embargo, con un problema real, y precisamente el que da nombre a esta transparencia. Las cantidades $\text{Cov}(X, Y)$, $\text{Var}(X)$, $E(Y)$ y $E(X)$ son *momentos poblacionales*: describen a las variables aleatorias X e Y en su totalidad, no a ninguna muestra concreta. Y, en general, *no los conocemos*; citando a Platón, no somos dioses ni sabios: no conocemos $E[\cdot]$, no conocemos la covarianza poblacional $\text{Cov}(X, Y)$ ni la varianza poblacional $\text{Var}(X)$. Pero tampoco somos completos ignorantes: tenemos una muestra de tamaño n .

Así pues, esta es, precisamente, la situación filosófica que anunciamos al abrir la sesión con la cita de Diotima: no poseemos β_1, β_2 (la “verdad” poblacional, que sería el conocimiento del sabio); pero tampoco carecemos de todo (no somos el ignorante que no sabe ni que le falta algo): tenemos una muestra, un vector concreto, con el que podemos intentar *aproximarnos* a esos parámetros desconocidos para nosotros.

El “salto” que da nombre a esta transparencia consiste, precisamente, en resolver este problema del modo más directo posible: *sustituir cada momento poblacional (desconocido) por su análogo muestral (calculable)*. Donde aparecía $E(X)$ (desconocido), escribimos μ_x (calculable a partir de la muestra); donde aparecía $\text{Cov}(X, Y)$, escribimos σ_{xy} ; donde aparecía $\text{Var}(X)$, escribimos σ_x^2 ; y donde aparecía $E(Y)$, escribimos μ_y . El resultado de esta sustitución, aplicada a las dos fórmulas de más arriba, es:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}, \quad \hat{\beta}_1 = \mu_y - \hat{\beta}_2 \mu_x.$$

¡Pero estas son, exactamente, las fórmulas que ya obtuvimos en la lección 7! No como consecuencia de ninguna casualidad, sino porque la ruta que hemos seguido —resolver las condiciones

⁵Es *exactamente* la misma álgebra que hicimos en la lección 7 para obtener $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ a partir de las dos condiciones de ortogonalidad muestrales, solo que ahora con esperanzas en lugar de medias muestrales.

poblacionales y sustituir momentos poblacionales por muestrales— reproduce, paso a paso, la misma estructura algebraica que allí seguimos —resolver las dos condiciones de ortogonalidad muestral directamente sobre $\hat{e}$ —. A esta estrategia general, de sustituir momentos teóricos desconocidos por sus análogos muestrales para obtener un estimador, se le llama *método de los momentos*, y es, en este caso concreto, exactamente equivalente a la estimación por mínimos cuadrados ordinarios.

Lo que ha cambiado, entre la lección 7 y hoy, no es la fórmula —es idéntica—, sino su *interpretación*. En la lección 7, $\hat{\beta}_2$ era, sencillamente, la pendiente del ajuste que mejor se acomodaba a un vector de datos concreto: un hecho geométrico sobre ese vector, sin ninguna pretensión más allá de él. Hoy, con el modelo poblacional $Y = \beta_1 + \beta_2 X + U$ ya construido, $\hat{\beta}_2$ pasa a ser algo distinto: un *estimador* del parámetro poblacional (desconocido) β_2 —una aproximación, calculada a partir de nuestra muestra, a una cantidad que presumimos que existe en el mundo económico subyacente pero que nunca observaremos directamente—.

Como ejemplo concreto, y para no perder el contacto con el trabajo empírico ya realizado en el laboratorio de regresión simple con datos reales: si escribimos el modelo poblacional $\text{price} = \beta_1 \cdot 1 + \beta_2 \cdot \text{rooms} + U$, con la interpretación (bajo el segundo supuesto, y con las reservas causales de la transparencia anterior) de que β_2 mide cómo varía, en promedio, el precio de una vivienda cualquiera —no solo las 506 del Boston metropolitano que observamos— ante un incremento de una habitación, entonces el coeficiente $\hat{\beta}_2$ que Gretl calculó en aquella práctica no es solo “la pendiente de la recta que mejor se ajusta a esos 506 puntos”; es, además, nuestra mejor *estimación*, con los datos disponibles, de ese parámetro poblacional desconocido.

Para profundizar:

- Bujosa, M., sección “[Estimación del Modelo Clásico de Regresión Lineal](#)”: discusión extensa (con el ejemplo detallado del precio de la vivienda) de por qué sustituir momentos poblacionales por muestrales constituye “un salto audaz”, y de la relación exacta entre $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_s)$ y un espacio de probabilidad.
- Wooldridge, J. M. (2020), Apéndice C.1: introducción al método de los momentos como principio general de estimación.

9 Recapitulación y guiño a la lección siguiente

$\mathbb{R}^n$ (dato conocido)	Variables aleatorias (a inferir)
vector de datos $\mathbf{y}$	variable aleatoria Y
$\mu_{\mathbf{y}} = \langle \mathbf{y}, \mathbf{1} \rangle_s$	$E(Y) = \langle Y, \mathbf{1} \rangle_P$
$\bar{\mathbf{y}}$ (vector constante)	$E[Y \mid \mathbf{1}]$ (función constante)
$\hat{\mathbf{y}}$ (proyección sobre $\mathcal{L}(\mathbf{1}, \mathbf{x})$)	$E[Y \mid X]$ (proyección sobre las func. de X y $\mathbf{1}$)
$\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$	$U = Y - E[Y \mid X]$
$\sigma_{\mathbf{y}}^2 = \ \mathbf{y} - \bar{\mathbf{y}}\ _s^2$	$\text{Var}(Y) = \ Y - E[Y \mid \mathbf{1}]\ _P^2$
$\sigma_{\mathbf{y}}^2 = \sigma_{\hat{\mathbf{y}}}^2 + \sigma_{\hat{\mathbf{e}}}^2$	$\text{Var}(Y) = \text{Var}(E[Y \mid X]) + \text{Var}(U)$
$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ (ajuste de una muestra)	β_1, β_2 (parámetros poblacionales, a estimar)

Próximos pasos:

- Hasta ahora la variable X era un único regresor (Regresión Simple).

- En economía real intervienen múltiples factores a la vez ($X_1, X_2, \dots, X_k$).
- *Lección 10 (Regresión Múltiple)*: Ampliaremos la proyección del plano 2D a subespacios de mayor dimensión. Para manejar tantas condiciones de ortogonalidad, introduciremos una notación muy elegante: las *matrices*.

Recapitulación y guiño a la lección siguiente

Cerramos esta lección con la tabla-diccionario que resume, de un vistazo, todo el camino recorrido. Conviene leerla despacio, fila por fila, porque cada línea condensa una transparencia entera de la sesión.

La primera fila recoge la idea de partida (transparencia 2): tanto el vector de datos $\mathbf{y}$ como la variable aleatoria Y son, en el fondo, funciones —solo que definidas sobre dominios de naturaleza radicalmente distinta: uno finito y perfectamente conocido ($\{1, \dots, n\}$), el otro potencialmente inmenso y, en la práctica, nunca descrito en detalle (Ω).

La segunda y tercera filas recogen la distinción, cuidadosamente mantenida durante toda la sesión, entre el valor esperado como número y la esperanza condicional como función constante (transparencia 4): $E(Y)$ es un escalar, como también lo era $\mu_{\mathbf{y}}$; $E[Y|1]$ es una función constante (en particular la variable aleatoria constante más próxima a Y), como lo era $\bar{\mathbf{y}}$ (en particular el vector constante más próximo a $\mathbf{y}$).

La cuarta fila recoge, quizá, la diferencia más profunda de toda la sesión (transparencia 5): mientras que $\hat{\mathbf{y}}$ era la proyección sobre un plano de solo dos direcciones linealmente independientes, $E[Y|X]$ es la proyección sobre un espacio de funciones que, en general, tiene infinitas direcciones linealmente independientes —razón por la cual la linealidad de $E[Y|X]$ es un supuesto sustantivo, y no una consecuencia automática de la definición.

La quinta fila es la descomposición fundamental que ambos mundos comparten: en $\mathbb{R}^n$, $\mathbf{y} = \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{e}}$; con variables aleatorias, $Y = E[Y|X] + U$. Ambas son descomposiciones ortogonales que existen *siempre*, sin necesidad de ningún supuesto adicional — y, por eso mismo, ninguna de las dos implica, por sí sola, ninguna relación de causalidad (transparencia 7).

La sexta fila recuerda que la varianza, en ambos mundos, mide lo mismo: la dispersión como el cuadrado del tamaño de la componente no constante.

La séptima fila recuerda que identidad pitagórica permite descomponer la varianza (cuadrado de la hipotenusa $Y - E[Y|1]$), como suma de varianzas (cuadrados de los catetos horizontal: $E[Y|X] - E[Y|1]$ y vertical: U) —véase la figura de la transparencia 5.

Y la octava, finalmente, recoge la diferencia epistemológica más importante de todas, la que hemos intentado transmitir con la imagen de Diotima: $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ son cantidades *exactas*, conocidas sin margen de error para un vector de datos concreto, el correspondiente a nuestra muestra incompleta (lección 7); β_1, β_2 son cantidades características de la *población* completa, pero desconocidas para nosotros, que solo podemos tratar de *estimar* —nunca conocer con certeza— a partir una muestra incompleta. El salto de la última transparencia consistió, precisamente, en mostrar que ambas cantidades, la exacta y la inferida, comparten exactamente la misma fórmula.

El mensaje que debe quedar de esta sesión, por encima de cualquier fórmula concreta, es el

siguiente: el lenguaje geométrico que hemos construido con tanto cuidado durante las lecciones 1 a 8 —vectores, producto escalar, proyección ortogonal, ángulos— no era exclusivo de $\mathbb{R}^n$. Es, más bien, un lenguaje general para la *aproximación óptima*, que se puede trasladar —con las honestas advertencias que hemos ido señalando en cada paso— a cualquier conjunto de objetos donde exista una noción razonable de producto escalar. Las variables aleatorias, con la esperanza del producto como su propio producto escalar, son uno de esos conjuntos; y por eso la esperanza condicional $E[Y|X]$ hereda, con toda naturalidad, el papel que en $\mathbb{R}^n$ jugaba la proyección $\hat{\mathbf{y}}$.

Quedan, sin embargo, varias tareas pendientes que las próximas lecciones deberán resolver. La primera, inmediata: hasta ahora hemos trabajado con un único regresor X (si la Renta influye en el Consumo, también lo hacen los tipos de interés, las expectativas de inflación, la edad de los consumidores o su número de hijos). En la *Lección 10 (Regresión Múltiple)* proyectaremos sobre subespacios generados por k regresores a la vez. La lógica geométrica será *exactamente la misma* (una condición de ortogonalidad por cada regresor), pero escribir un sistema de k ecuaciones con sus sumatorios correspondientes resultaría extenuante. Para comprimir esa información y hacerla manejable introduciremos el uso de *matrices* ($\mathbf{X}$). Las matrices, como veréis, no son más que un truco de notación brillante para hacer múltiples productos escalares de una sola vez.

Para profundizar:

- Wooldridge, J. M. (2020), capítulo 2, sección 2.6: resumen de los supuestos del modelo de regresión simple.