

Sesión 18 (C) — ¿Cubre de verdad el 95 por ciento? La cobertura del intervalo y la frecuencia de detección

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

La lección 12 distinguió lo que el intervalo de confianza *dice* y lo que *no dice*: dice que el suceso “el intervalo contiene a β_2 ” tiene probabilidad 0,95, con los extremos del intervalo como variables aleatorias; no dice que β_2 esté en *este* intervalo con probabilidad 0,95. Una probabilidad se manifiesta como frecuencia al repetir, y esta práctica repite.

Reutilizamos el mundo artificial de la práctica B ([actividad 2 \(html\)](#)): el panel disperso de la lección 12: doce valores del regresor de 22,5 a 77,5, $\beta_1 = 10$, $\beta_2 = 0,5$ y perturbaciones normales con $\sigma = 1,1$ y la mecánica del `loop` de la práctica A de la sesión 16 ([actividad 3 \(html\)](#)). En cada réplica sorteamos doce perturbaciones nuevas, estimamos, construimos el intervalo y anotamos si contiene al 0,5 verdadero. Después contamos.

Los datos son *simulados* porque solo conociendo la verdad se puede saber si el intervalo la contiene.

Objetivos

1. Comprobar que el intervalo al 95 % contiene al verdadero β_2 en (aproximadamente) el 95 % de las réplicas, y ver, réplica a réplica, cuáles fallan.
2. Medir el *precio de estimar* σ : qué cobertura se obtiene si se usa 1,96 en lugar del valor crítico de la t_{10} .
3. Contrastar una hipótesis *falsa por poco* con $n = 12$ y con $n = 120$: el mismo desvío, medido con un regresor $\sqrt{10}$ veces más largo.
4. (Apéndice) Ver qué ocurre con la cobertura cuando las perturbaciones no son normales.

Comandos nuevos de esta práctica. La mecánica de `loop R --progressive --quiet` con `store`, y la reapertura del fichero de réplicas con `open`, son las de la práctica A de la sesión 16; `critical`, `$coeff` y `$stderr`, las de las prácticas A y B de hoy; `randgen(X, 1)`, la de la práctica C de la sesión 16. Lo nuevo:

`quantile(x, p)` el cuantil de orden `p` de la serie: el valor que deja por debajo una fracción `p` de los datos.

`%` resto de la división entera: `(index - 1) % 12` toma los valores 0, 1, ..., 11 y vuelve a empezar.

`rech + expresión=` suma la expresión al escalar y guarda el resultado en él; es la forma abreviada de `rech = rech + expresión`. Como aquí la expresión vale 1 o 0, el escalar cuenta las réplicas que cumplen la condición.

`smpl 1 12` restringe la muestra a las observaciones 1 a 12; `smpl full` la devuelve entera (sesión 14).

`gnuplot ... --time-series --with-lines` dibuja las series frente al número de observación y con líneas en lugar de puntos.

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Actividad 1 - ¿Cubre el 95 por ciento?

Construimos el mundo, fijamos el valor crítico de la t con $n - k = 10$ grados de libertad, y repetimos el experimento 4000 veces guardando, en cada réplica, la estimación, su error estándar, los dos extremos del intervalo, un indicador de si contiene al verdadero β_2 y el estadístico t para la hipótesis cierta $H_0: \beta_2 = 0,5$.

Tres bloques. El primero construye el mundo (doce observaciones, el regresor disperso de la práctica B, los parámetros y el número de réplicas R) y guarda los dos valores críticos: el de la t_{10} y el 1,96 de la normal. Sigue el bucle: en cada vuelta sortea doce perturbaciones, forma y , estima con `--quiet` y guarda en escalares la estimación, su error estándar, los dos extremos del intervalo, el indicador `dentro` (vale 1 si el verdadero β_2 está entre los dos extremos; `&&` une las dos desigualdades), el estadístico t de la hipótesis cierta y el indicador análogo construido con 1,96; `store` añade al fichero de réplicas una fila con esos siete valores. El segundo bloque abre ese fichero, que tiene una observación por réplica, y vuelve a definir `tc` y `zc`. El tercero imprime el número de réplicas y dos medias: la de `dentro`, que es la fracción de intervalos que contienen a β_2 , y la de la condición $|t| > t_c$, que es la fracción de rechazos.

en línea de comandos:

```
nulldata 12
setobs 1 1 --cross-section
series x = 22.5 + 5*(index - 1)           # el regresor disperso de la leccion 12
scalar b1 = 10
scalar b2 = 0.5
scalar sig = 1.1
scalar R = 4000
scalar tc = critical(t, 10, 0.025)         # valor critico de la t_10 al 5%
scalar zc = 1.96                          # el de la normal, para la Actividad 2

set seed 20261113
loop R --progressive --quiet
  series u = normal(0, sig)
  series y = b1 + b2*x + u
  ols y const x --quiet
  scalar b2hat = $coeff(x)
  scalar ee = $stderr(x)
  scalar cL = b2hat - tc*ee                # extremos del IC al 95%
  scalar cR = b2hat + tc*ee
  scalar dentro = (cL <= b2 && b2 <= cR)    # 1 si el IC contiene al verdadero beta_2
  scalar tstat = (b2hat - b2)/ee           # t para la H0 CIERTA beta_2 = 0,5
  scalar dentroZ = (b2hat - zc*ee <= b2 && b2 <= b2hat + zc*ee) # con 1,96 en vez de t_c
  store "@workdir/replicasIC.gdt" b2hat ee cL cR dentro tstat dentroZ
endloop

open "@workdir/replicasIC.gdt" --quiet
scalar tc = critical(t, 10, 0.025)         # al abrir otro fichero Gretl olvida los escalares
scalar zc = 1.96

printf "Replicas" : %d\n", $nobs
printf "Intervalos que contienen al verdadero b2" : %.4f (objetivo: 0,95)\n", mean(dentro)
printf "Rechazos de la H0 cierta al 5%" : %.4f (objetivo: 0,05)\n", mean(abs(tstat) > tc)
```

```
Replicas : 4000
Intervalos que contienen al verdadero b2 : 0,9520 (objetivo: 0,95)
Rechazos de la H0 cierta al 5% : 0,0480 (objetivo: 0,05)
```

Atención a un detalle práctico ya conocido de la práctica A de la sesión 16 ([actividad 4 \(html\)](#)): al abrir el fichero de réplicas, Gretl descarta los escalares que teníamos definidos; por eso `tc` y `zc` se vuelven a definir después de abrirlo.

Los intervalos, uno a uno

Un porcentaje es un resumen. Para *ver* qué significa, dibujamos los cien primeros intervalos: sus dos extremos como dos líneas, y el verdadero β_2 como una línea horizontal. Cada vez que la banda inferior sube por encima de 0,5, o la superior baja por debajo, ese intervalo ha fallado.

`smpl 1 100` se queda con las cien primeras réplicas. `B2` es una serie constante igual a 0,5, para dibujarla como línea horizontal. `gnuplot` dibuja los dos extremos y esa constante frente al número de réplica, con líneas. `100 - sum(dentro)` cuenta los intervalos que fallan entre esos cien, y `smpl full` recupera las 4000 réplicas.

en línea de comandos:

```
smpl 1 100
series B2 = 0.5
gnuplot cL cR B2 --time-series --with-lines
printf "Intervalos que fallan entre los 100 primeros: %d\n", 100 - sum(dentro)
smpl full
```




Figura 1: Los cien primeros intervalos de confianza al 95 %: extremo inferior y superior de cada uno, frente al verdadero $\beta_2 = 0,5$ (línea horizontal). Los intervalos que no lo contienen son aquellos en los que una de las dos líneas cruza la horizontal.

Intervalos que fallan entre los 100 primeros: 7

Lo que debe observar

La frecuencia empírica de cobertura queda muy cerca de 0,95, y la de rechazos de la hipótesis cierta muy cerca de 0,05: son la misma cosa vista desde dos lados. Con 4000 réplicas no cabe esperar exactamente 0,9500, porque la frecuencia observada es a su vez una variable aleatoria, pero sí una distancia pequeña. Cada réplica es una columna de la matriz de copias ([apéndice, sección 3 \(html\)](#)); la cobertura 0,95 es la fracción de columnas en las que ocurre el suceso “el intervalo contiene a β_2 ”, y el [apéndice \(sección 9\) \(html\)](#) muestra que ese suceso tiene probabilidad $1 - \alpha$ sea cual sea el regresor.

La figura muestra lo que hay detrás de la frecuencia. El intervalo *cambia* de una réplica a otra: sus extremos son variables aleatorias, funciones de la muestra. El β_2 verdadero, en cambio, no se mueve. Esa es la razón de la lectura correcta de la lección 12: lo aleatorio es el intervalo, no el parámetro, y el 0,95 es la probabilidad de que el intervalo aleatorio contenga al parámetro fijo, que aquí vemos como frecuencia. Mirando un solo intervalo, cualquiera de los cien, no hay forma de saber si es de los que aciertan.

Actividad 2 - El precio de estimar σ

La lección 12 explicó por qué el estadístico sigue una t_{n-k} y no una normal: en el denominador va s , que fluctúa de muestra en muestra, y eso ensancha las colas (la demostración está en el [apéndice, sección 9 \(html\)](#)). Con $n - k = 10$ la diferencia entre $t_c = 2,228$ y 1,96 es del 14 %. Ya hemos guardado, en cada réplica, si el intervalo construido con 1,96 contenía al verdadero β_2 ; y tenemos los 4000 estadísticos t bajo la hipótesis cierta, cuya distribución podemos mirar directamente.

Seis `printf`. Los dos primeros comparan la cobertura con `tc` y con 1,96 (medias de `dentro` y de `dentroZ`). El tercero es la cabecera de los cuantiles; el cuarto y el quinto imprimen los cuantiles empíricos del 2,5 % y del 97,5 % de los 4000 estadísticos, calculados con `quantile`, junto a los valores que predicen la t_{10} y la normal. El sexto calcula la fracción de $|t|$ mayores que 1,96. `freq tstat` dibuja el histograma de los estadísticos.

en línea de comandos:

```
printf "Cobertura del intervalo con t_c = %.3f : %.4f\n", tc, mean(dentro)
printf "Cobertura del intervalo con 1,96      : %.4f\n", mean(dentroZ)
printf "\nCuantiles empiricos del estadistico t bajo la H0 cierta:\n"
printf "  2,5%% -> %.3f      (la t_10 predice %.3f; la normal, %.3f)\n", quantile(tstat, 0.025), -tc, -zc
printf "  97,5%% -> %.3f      (la t_10 predice %.3f; la normal, %.3f)\n", quantile(tstat, 0.975), tc, zc
printf "Fraccion de |t| > 1,96      : %.4f      (con 1,96 se rechazaria la H0 cierta mas del 5%)\n",
  ↪ mean(abs(tstat) > zc)
freq tstat
```

Cobertura del intervalo con t_c = 2,228 : 0,9520

Cobertura del intervalo con 1,96 : 0,9188

Cuantiles empiricos del estadistico t bajo la H0 cierta:

2,5% -> -2,176 (la t_10 predice -2,228; la normal, -1,960)

97,5% -> 2,236 (la t_10 predice 2,228; la normal, 1,960)

Fraccion de |t| > 1,96 : 0,0812 (con 1,96 se rechazaria la H0 cierta mas del 5%)




Figura 2: Histograma de los 4000 estadísticos $t = (\hat{\beta}_2 - 0,5)/ee(\hat{\beta}_2)$, calculados bajo la hipótesis cierta. Sus cuantiles del 2,5 % y del 97,5 % caen donde los sitúa la t_{10} , no donde los sitúa la normal.

Lo que debe observar

Con 1,96 el intervalo cubre bastante menos del 95 %, y el contraste rechaza la hipótesis cierta bastante más del 5 %. Los cuantiles empíricos del estadístico lo confirman: se sitúan en $-2,18$ y $2,24$, no en $\pm 1,96$. Esa diferencia es lo que la lección 12 llamó “el precio de estimar σ ”: el s del denominador fluctúa, el cociente se dispersa más que una normal, y la t_{n-k} lo tiene en cuenta. Con diez grados de libertad el precio se paga; con quinientos, como en la práctica A, t_c y 1,96 son casi lo mismo.

Actividad 3 - Una hipótesis falsa por poco, con $n = 12$ y con $n = 120$

Hasta aquí hemos contrastado una hipótesis cierta. Ahora contrastamos una *falsa por poco*: $H_0: \beta_2 = 0,47$, cuando el verdadero es 0,5. ¿Con qué frecuencia la detecta el contraste? Lo hacemos dos veces: con las doce observaciones de siempre, y con ciento veinte: el mismo patrón de regresor repetido diez veces, el mismo σ , la misma hipótesis. Lo único que cambia es el tamaño de la muestra.

Tres bloques. El primero crea un conjunto de 120 observaciones (`--preserve` conserva los escalares) con el patrón del regresor repetido diez veces gracias al `resto% 12`, y vuelve a fijar los parámetros y el valor falso `c_falsa`. El segundo restringe la muestra a las doce primeras, calcula el valor crítico con los grados de libertad `$nobs - 2`, fija la semilla, pone a cero dos contadores y repite `R` veces: sortear, estimar, y sumar a `rech` un 1 si el estadístico de la hipótesis falsa supera el valor crítico y a `cov` un 1 si el intervalo contiene al verdadero β_2 . Este bucle no lleva `--progressive` ni `store`: solo acumula en los dos escalares, y el `printf` final los divide por `R`. El tercero repite lo mismo con `smpl full`, es decir, con las 120 observaciones.

en línea de comandos:

```
nulldata 120 --preserve
setobs 1 1 --cross-section
series x = 22.5 + 5*((index - 1) % 12)      # el mismo patron, diez veces
scalar b1 = 10                             # los parametros del mundo, de nuevo
scalar b2 = 0.5
scalar sig = 1.1
scalar R = 4000
scalar c_falsa = 0.47
```

```
smpl 1 12                                # una sola vuelta del patron: n = 12
scalar tc = critical(t, $nobs - 2, 0.025)
set seed 20261113
scalar rech = 0
scalar cov = 0
loop R --quiet
  series u = normal(0, sig)
  series y = b1 + b2*x + u
  ols y const x --quiet
  rech += (abs(($coeff(x) - c_falsa)/$stderr(x)) > tc)
  cov += ($coeff(x) - tc*$stderr(x) <= b2 && b2 <= $coeff(x) + tc*$stderr(x))
endloop
printf "n = %3d:  t_c = %.3f  rechazos de la H0 falsa (0,47) = %.3f  cobertura del IC = %.3f\n", $nobs, tc, rech/R, cov/R
```

n = 12: t_c = 2,228 rechazos de la H0 falsa (0,47) = 0,319 cobertura del IC = 0,952

```
smpl full                                # las diez vueltas: n = 120
scalar tc = critical(t, $nobs - 2, 0.025)
set seed 20261113
scalar rech = 0
scalar cov = 0
loop R --quiet
  series u = normal(0, sig)
  series y = b1 + b2*x + u
  ols y const x --quiet
  rech += (abs(($coeff(x) - c_falsa)/$stderr(x)) > tc)
  cov += ($coeff(x) - tc*$stderr(x) <= b2 && b2 <= $coeff(x) + tc*$stderr(x))
endloop
printf "n = %3d:  t_c = %.3f  rechazos de la H0 falsa (0,47) = %.3f  cobertura del IC = %.3f\n", $nobs, tc, rech/R, cov/R
```

n = 120: t_c = 1,980 rechazos de la H0 falsa (0,47) = 0,999 cobertura del IC = 0,946

Lo que debe observar

La cobertura del intervalo es la misma en los dos casos, en torno al 95 %, como debe: el intervalo cumple su garantía con doce datos y con ciento veinte. Lo que cambia es la *detección*: con $n = 12$ la hipótesis falsa se rechaza menos de una vez de cada tres; con $n = 120$, prácticamente siempre.

Es el mecanismo de la lección 12: con diez copias del patrón, el regresor en desviaciones es $\sqrt{10}$ veces más largo, el error estándar $\sqrt{10}$ veces menor, y el mismo desvío de 0,03 vale $\sqrt{10}$ veces más errores estándar. La relación entre x e y es la misma en los dos mundos, el ruido es el mismo y la hipótesis es igual de falsa; lo único que ha crecido es la longitud del regresor, y con ello la frecuencia con la que un efecto real se hace visible. (Los manuales llaman *potencia* del contraste a esa frecuencia de detección.)

Y ese resultado tiene una lectura inmediata para la práctica A ([actividad 5 \(html\)](#)), donde con doce viviendas el intervalo iba de 1 900 a 20 000: con doce observaciones, en un diseño como este, dos de cada tres veces *no se rechaza* una hipótesis que es falsa. “No rechazar” no era “aceptar”: era, la mayoría de las veces, no tener evidencia suficiente para decidir.

Apéndice - ¿Y si las perturbaciones no son normales?

Material complementario, con el mismo estatus que el [apéndice matricial \(html\)](#) de la práctica A de la sesión 16: va más allá de lo que da tiempo en clase y queda aquí para quien quiera completarlo.

La lección 12 fue explícita: la normalidad es el único supuesto nuevo, y su cometido es dar *forma* a la distribución de $\hat{\beta}_2$. La práctica C de la sesión 16 ([actividad 1 \(html\)](#)) mostró que insesgadez y varianza no la necesitan; la pregunta natural es si la cobertura del intervalo, que sí depende de la forma, la necesita. Repetimos la Actividad 1 con perturbaciones χ^2 de un grado de libertad, centradas y reescaladas a la misma σ : una distribución muy asimétrica, la misma con la que la práctica C de la sesión 16 obtuvo ([actividad 2 \(html\)](#)), con $n = 12$, un histograma que el contraste de normalidad rechazaba.

Dos bloques con la misma estructura que los dos últimos bloques de la Actividad 3, cambiando la perturbación: `randgen(X, 1)` sortea una χ^2 con un grado de libertad, que tiene media 1 y varianza 2; restar 1 y dividir por $\sqrt{2}$ la centra y le da desviación típica 1, y multiplicar por `sig` le da la de nuestro mundo. Los contadores son ahora la cobertura y los rechazos de la hipótesis cierta.

en línea de comandos:

```
smpl 1 12
scalar tc = critical(t, $nobs - 2, 0.025)
set seed 20261113
scalar cov = 0
scalar rech0 = 0
loop R --quiet
    series u = (randgen(X, 1) - 1)/sqrt(2) * sig # chi2(1) centrada, con desviacion tipica sig
    series y = b1 + b2*x + u
    ols y const x --quiet
    cov += ($coeff(x) - tc*$stderr(x) <= b2 && b2 <= $coeff(x) + tc*$stderr(x))
    rech0 += (abs(($coeff(x) - b2)/$stderr(x)) > tc)
endloop
printf "chi2(1) centrada, n = %3d:  cobertura del IC = %.4f  rechazos de la H0 cierta = %.4f\n", $nobs, cov/R, rech0/R
```

chi2(1) centrada, n = 12: cobertura del IC = 0,9620 rechazos de la H0 cierta = 0,0380

```
smpl full
scalar tc = critical(t, $nobs - 2, 0.025)
set seed 20261113
scalar cov = 0
scalar rech0 = 0
loop R --quiet
```

```

series u = (randgen(X, 1) - 1)/sqrt(2) * sig
series y = b1 + b2*x + u
ols y const x --quiet
cov  += ($coeff(x) - tc*$stderr(x) <= b2 && b2 <= $coeff(x) + tc*$stderr(x))
rech0 += (abs(($coeff(x) - b2)/$stderr(x)) > tc)
endloop
printf "chi2(1) centrada, n = %3d:  cobertura del IC = %.4f  rechazos de la H0 cierta = %.4f\n", $nobs, cov/R, rech0/R

```

```
chi2(1) centrada, n = 120:  cobertura del IC = 0,9478  rechazos de la H0 cierta = 0,0523
```

Lo que debe observar

Con $n = 12$ la cobertura y la tasa de rechazo se apartan de sus valores nominales, y lo hacen hacia el lado conservador: el intervalo cubre *más* del 95 % y el contraste rechaza *menos* del 5 %. El aparato de la lección 12, construido bajo normalidad, se vuelve conservador con estas perturbaciones y esta muestra. El 5 % que imprime el programa ya no es el 5 % real.

Con $n = 120$ la desviación prácticamente desaparece. Es el cierre de la lección 12: en muestras grandes, el teorema central del límite devuelve a $\hat{\beta}_2$ una distribución aproximadamente normal aunque U no lo sea, y los contrastes e intervalos vuelven a ser aproximadamente válidos sin el supuesto. En muestras pequeñas, la normalidad es el supuesto que sostiene el resultado exacto; cuando falla, lo que falla es la calibración del nivel.

Preguntas de interpretación para la clase

1. En la Actividad 1, la frecuencia de cobertura no ha salido exactamente 0,95. ¿Qué esperarías que ocurriese con la diferencia si el experimento se repitiera con 400 000 réplicas en lugar de 4 000? ¿Y si se repitiera con otras 4 000, cambiando la semilla?
2. Escoja uno de los intervalos de la figura que *no* contiene a 0,5. Si ese fuera el único que tuviera, como ocurre siempre con datos reales, ¿qué diría de él? ¿Habría alguna forma de saber que es de los que fallan?
3. En la Actividad 2, ¿por qué usar 1,96 con $n - k = 10$ hace que el contraste rechace la hipótesis cierta *más* del 5 % de las veces, y no menos?
4. En la Actividad 3, la cobertura es la misma con doce y con ciento veinte observaciones, pero la detección no. ¿Qué propiedad del intervalo se conserva al cambiar n , y cuál cambia? Relaciónelo con la anchura de los intervalos de la práctica A.
5. Tras el Apéndice: si en un estudio con muestra pequeña las perturbaciones fueran claramente asimétricas, ¿en qué sentido habría que tomar con cautela un valor p de 0,04? ¿Y uno de 0,0001?

Para profundizar

- Lección 12 ([lección 12](#)), secciones “El intervalo de confianza” y “Por qué el valor crítico depende de $n - k$ ”.
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics*, cap. 4, sección 4.3 (intervalos de confianza) y cap. 5, sección 5.2 (validez aproximada de los contrastes en muestras grandes sin normalidad).
- Manual de Gretl, capítulo sobre *loop constructs*; funciones `quantile` y `randgen`.

Código completo de la práctica

```
# -----
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# -----

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
# ↪ directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#   DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
# ↪ trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

set verbose off

nulldata 12
setobs 1 1 --cross-section
series x = 22.5 + 5*(index - 1)           # el regresor disperso de la lección 12
scalar b1 = 10
scalar b2 = 0.5
scalar sig = 1.1
scalar R = 4000
scalar tc = critical(t, 10, 0.025)        # valor crítico de la t_10 al 5%
scalar zc = 1.96                          # el de la normal, para la Actividad 2

set seed 20261113
loop R --progressive --quiet
  series u = normal(0, sig)
  series y = b1 + b2*x + u
  ols y const x --quiet
  scalar b2hat = $coeff(x)
  scalar ee = $stderr(x)
  scalar cL = b2hat - tc*ee                # extremos del IC al 95%
  scalar cR = b2hat + tc*ee
  scalar dentro = (cL <= b2 && b2 <= cR)    # 1 si el IC contiene al verdadero beta_2
  scalar tstat = (b2hat - b2)/ee           # t para la H0 CIERTA beta_2 = 0,5
  scalar dentroZ = (b2hat - zc*ee <= b2 && b2 <= b2hat + zc*ee) # con 1,96 en vez de t_c
  store "@workdir/replicasIC.gdt" b2hat ee cL cR dentro tstat dentroZ
endloop
open "@workdir/replicasIC.gdt" --quiet
scalar tc = critical(t, 10, 0.025)        # al abrir otro fichero Gretl olvida los escalares
scalar zc = 1.96
outfile --quiet cobertura.txt
  printf "Replicas" : %d\n", $nobs
  printf "Intervalos que contienen al verdadero b2" : %.4f (objetivo: 0,95)\n", mean(dentro)
  printf "Rechazos de la H0 cierta al 5%" : %.4f (objetivo: 0,05)\n", mean(abs(tstat) > tc)
end outfile

smpl 1 100
series B2 = 0.5
gnuplot cL cR B2 --time-series --with-lines --output="@workdir/baile.png"
outfile --quiet baile.txt
  printf "Intervalos que fallan entre los 100 primeros: %d\n", 100 - sum(dentro)
end outfile
smpl full

outfile --quiet precioSigma.txt
```

```

printf "Cobertura del intervalo con t_c = %.3f : %.4f\n", tc, mean(dentro)
printf "Cobertura del intervalo con 1,96      : %.4f\n", mean(dentroZ)
printf "\nCuantiles empiricos del estadistico t bajo la H0 cierta:\n"
printf "  2,5%% -> %.3f      (la t_10 predice %.3f; la normal, %.3f)\n", quantile(tstat, 0.025), -tc,
↳ -zc
printf "  97,5%% -> %.3f      (la t_10 predice %.3f; la normal, %.3f)\n", quantile(tstat, 0.975),
↳ tc, zc
printf "Fraccion de |t| > 1,96      : %.4f      (con 1,96 se rechazaria la H0 cierta mas del
↳ 5%%)\n", mean(abs(tstat) > zc)
end outfile
freq tstat --plot="@workdir/histT.png"

nulldata 120 --preserve
setobs 1 1 --cross-section
series x = 22.5 + 5*((index - 1) % 12)      # el mismo patron, diez veces
scalar b1 = 10                             # los parametros del mundo, de nuevo
scalar b2 = 0.5
scalar sig = 1.1
scalar R = 4000
scalar c_falsa = 0.47
outfile --quiet deteccion.txt
  smpl 1 12                                # una sola vuelta del patron: n = 12
  scalar tc = critical(t, $nobs - 2, 0.025)
  set seed 20261113
  scalar rech = 0
  scalar cov = 0
  loop R --quiet
    series u = normal(0, sig)
    series y = b1 + b2*x + u
    ols y const x --quiet
    rech += (abs(($coeff(x) - c_falsa)/$stderr(x)) > tc)
    cov += ($coeff(x) - tc*$stderr(x) <= b2 && b2 <= $coeff(x) + tc*$stderr(x))
  endloop
  printf "n = %3d:  t_c = %.3f  rechazos de la H0 falsa (0,47) = %.3f  cobertura del IC = %.3f\n",
↳ $nobs, tc, rech/R, cov/R
end outfile

outfile --quiet deteccionN120.txt
  smpl full                                # las diez vueltas: n = 120
  scalar tc = critical(t, $nobs - 2, 0.025)
  set seed 20261113
  scalar rech = 0
  scalar cov = 0
  loop R --quiet
    series u = normal(0, sig)
    series y = b1 + b2*x + u
    ols y const x --quiet
    rech += (abs(($coeff(x) - c_falsa)/$stderr(x)) > tc)
    cov += ($coeff(x) - tc*$stderr(x) <= b2 && b2 <= $coeff(x) + tc*$stderr(x))
  endloop
  printf "n = %3d:  t_c = %.3f  rechazos de la H0 falsa (0,47) = %.3f  cobertura del IC = %.3f\n",
↳ $nobs, tc, rech/R, cov/R
end outfile

outfile --quiet apendice.txt
  smpl 1 12
  scalar tc = critical(t, $nobs - 2, 0.025)
  set seed 20261113
  scalar cov = 0
  scalar rech0 = 0
  loop R --quiet
    series u = (randgen(X, 1) - 1)/sqrt(2) * sig      # chi2(1) centrada, con desviacion tipica sig
    series y = b1 + b2*x + u
    ols y const x --quiet
    cov += ($coeff(x) - tc*$stderr(x) <= b2 && b2 <= $coeff(x) + tc*$stderr(x))
    rech0 += (abs(($coeff(x) - b2)/$stderr(x)) > tc)
  endloop

```

```

    printf "chi2(1) centrada, n = %3d:  cobertura del IC = %.4f  rechazos de la H0 cierta = %.4f\n",
    ↪ $nobs, cov/R, rech0/R
end outfile

outfile --quiet apendiceN120.txt
    smpl full
    scalar tc = critical(t, $nobs - 2, 0.025)
    set seed 20261113
    scalar cov = 0
    scalar rech0 = 0
    loop R --quiet
        series u = (randgen(X, 1) - 1)/sqrt(2) * sig
        series y = b1 + b2*x + u
        ols y const x --quiet
        cov += ($coeff(x) - tc*$stderr(x) <= b2 && b2 <= $coeff(x) + tc*$stderr(x))
        rech0 += (abs(($coeff(x) - b2)/$stderr(x)) > tc)
    endloop
    printf "chi2(1) centrada, n = %3d:  cobertura del IC = %.4f  rechazos de la H0 cierta = %.4f\n",
    ↪ $nobs, cov/R, rech0/R
end outfile

```

Enlace al guión: [S18-Prct-C-cobertura.inp](#)

Respuestas

1. *Más réplicas, otra semilla.* La frecuencia de cobertura observada es la media de R indicadores 0/1 independientes, cada uno con probabilidad 0,95 de valer 1; su desviación típica es $\sqrt{0,95 \cdot 0,05/R}$, unos 0,0034 con $R = 4000$ y diez veces menos con $R = 400\,000$. Cabe esperar, por tanto, que la distancia a 0,95 se reduzca a la décima parte. Con otra semilla y las mismas 4000 réplicas, la frecuencia sería otra, distinta de la obtenida en el mismo orden de magnitud (unas milésimas): la propia frecuencia empírica tiene su dispersión.
2. *Un intervalo que falla, visto en solitario.* Nada lo distingue de los que aciertan: tiene el mismo aspecto, la misma anchura aproximada, se ha construido con la misma receta. Con datos reales no hay forma de saber si el intervalo que tenemos delante es uno de los del 5 %. Eso es lo que significa que la garantía sea sobre el procedimiento y no sobre el intervalo concreto: sabemos cuántas veces acierta el método, no si ha acertado esta vez.
3. *Por qué 1,96 rechaza de más.* Porque $1,96 < 2,228$: la región crítica “ $|t| > 1,96$ ” es más grande que “ $|t| > 2,228$ ”, y el estadístico, que sigue una t_{10} , con colas más gruesas que la normal, cae en ella con más frecuencia que el 5 %. Usar el valor crítico de la normal es actuar como si σ fuese conocida; como no lo es y se estima, el estadístico se dispersa más de lo que la normal supone, y el contraste, calibrado para una normal, se vuelve demasiado laxo.
4. *Lo que se conserva y lo que cambia con n .* Se conserva la cobertura: sea cual sea n , el intervalo al 95 % contiene al parámetro el 95 % de las veces, porque su valor crítico se ajusta a los grados de libertad. Cambia la *anchura*: con más observaciones el error estándar es menor (el regresor en desviaciones es más largo) y el intervalo, más estrecho; por eso un valor falso por poco queda fuera de él con más frecuencia. Es lo que se veía en la práctica A al pasar de doce viviendas a quinientas: la misma garantía del 95 %, con un intervalo diez veces más estrecho y, en consecuencia, mucho más informativo.
5. *Valores p con muestra pequeña y perturbaciones asimétricas.* El Apéndice muestra que, en ese caso, el nivel real del contraste no coincide con el nominal: aquí el contraste resultó conservador, pero con otras distribuciones podría ser lo contrario, y en cualquier caso el 0,05 del programa deja de ser una cifra fiable. Un valor p de 0,04 está tan cerca del umbral que esa descalibración puede cambiar el veredicto: hay que tomarlo como “en el límite”, no como “significativo”. Uno de 0,0001 está tan lejos del umbral que ninguna descalibración razonable lo convierte en no significativo: la decisión de rechazar es robusta aunque la cifra exacta no lo sea. La regla práctica es que la cautela hace falta cerca del umbral, y que con muestras grandes el problema se desvanece.