

Índice general

1	De dónde venimos: nos falta la forma	2
2	El supuesto nuevo: normalidad	3
3	El error estándar, y el precio de estimar σ	6
4	El contraste t	8
5	Lectura geométrica: la razón de catetos	10
6	Por qué el valor crítico depende de $n - k$	12
7	El intervalo de confianza	15
8	Cómo se lee una tabla de resultados	17
9	Significación estadística $\neq$ relevancia económica	19
10	Recapitulación y guiño a las sesiones siguientes	21

Lección 12. Inferencia: error estándar, intervalo de confianza y contraste t

Marcos Bujosa

25 de septiembre de 2026

Resumen

La lección 11 dejó a $\hat{\beta}_2$ bien centrado y con una varianza conocida, pero le faltaba lo esencial para contrastar hipótesis: la *forma* de su distribución. Hoy la obtenemos suponiendo normalidad de la perturbación.

Con ella construimos el error estándar, el intervalo de confianza y el contraste t —que no mide nada que el R^2 no midiera ya— y aprendemos a *leer* una tabla de resultados.

“Significativo” no quiere decir “grande”, ni “importante”, ni “verdadero”.

- ([slides](#)) — ([html](#)) — ([pdf](#))

1 De dónde venimos: nos falta la forma

De la lección 11 nos traemos dos resultados sobre el modelo lineal simple ($k = 2$: la constante 1 y un único regresor no constante X):

$$E(\hat{\beta}_2) = \beta_2, \quad Var[\hat{\beta}_2 | \mathbf{X}] = \frac{\sigma^2}{\sum_i (X_i - \bar{X})^2} = \frac{\sigma^2}{nS^2}.$$

Y nos traemos también una limitación reconocida en voz alta: eso *no basta* para responder a

- ¿es compatible con estos datos que β_2 valga cero?
- ¿en qué rango de valores puedo confiar razonablemente que está β_2 ?

Saber dónde está centrada una distribución y cuánto se dispersa no permite responder a esas preguntas: necesitamos la **forma** de la distribución de probabilidad.

Hoy: un supuesto nuevo, tres herramientas (error estándar, intervalo, contraste) — y, sobre todo, aprender a *leerlas*.

Esta obra está bajo una licencia [Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional](#) (CC BY-SA 4.0).

De dónde venimos: nos falta la forma

La lección 11 terminó reconociendo un límite. Allí demostramos que $\hat{\beta}_2$ está bien centrado en β_2 (insesgadez) y calculamos exactamente cuánto se dispersa alrededor de ese centro ($\text{Var}[\hat{\beta}_2 \mid \mathbf{X}]$). Con esas dos cantidades sabemos mucho, pero desconocemos aquello que permite hacer *inferencia*: cuánta probabilidad acumula la distribución de $\hat{\beta}_2$ a partir de un valor dado.

Un ejemplo elemental lo deja claro. Imagine dos variables aleatorias con la misma media, 0, y la misma varianza, 1. La primera es normal estándar; la segunda toma solo los valores -1 y $+1$, con probabilidad $1/2$ cada uno. Ambas tienen idénticos los dos primeros momentos, y sin embargo la probabilidad de superar el valor 1,5 es de aproximadamente 0,067 en la primera y exactamente 0 en la segunda. Media y varianza no determinan la distribución; y las preguntas de la inferencia —“¿cuán raro sería observar una estimación tan alejada de cero como la que tengo delante, si en realidad β_2 fuese cero?”— son preguntas sobre probabilidades de colas, no sobre momentos.

Conviene señalar también que la lección 11 ya nos dio, sin que lo pareciera, la pieza que hoy resultará decisiva. Allí escribimos $\hat{\beta}_2 = \beta_2 \mathbf{1} + \sum_i W_i U_i$, y esa descomposición no era un paso intermedio prescindible: dice que el error de estimación $\hat{\beta}_2 - \beta_2 \mathbf{1}$ es una *suma ponderada de las perturbaciones*. Si supiéramos qué forma tiene la distribución de las U_i , sabríamos qué forma tiene la de $\hat{\beta}_2$ condicionada a $\mathbf{X}$. Eso es lo que vamos a hacer: suponer una forma para U y leer la consecuencia.

Sobre el reparto de la sesión: las cuatro primeras transparencias construyen el aparato; la quinta y la sexta lo traducen a geometría; las cuatro últimas lo interpretan. Esa segunda mitad es la parte del curso que usted usará más veces, cada vez que lea un cuadro de resultados.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 4, introducción y sección 4.1 (por qué la distribución muestral, y no solo sus momentos, es lo que hace falta para contrastar hipótesis).

2 El supuesto nuevo: normalidad

Condicionada a $\mathbf{X}$, cada perturbación U_i es *normal* de media 0 y varianza σ^2 .

La descomposición de la lección 11 hace todo el trabajo:

$$\hat{\beta}_2 = \beta_2 \mathbf{1} + \sum_i W_i U_i.$$

Los W_i son funciones de $\mathbf{X}$; por el Lema de la lección 11 salen fuera de todo momento condicionado, y la suma ponderada hereda la normalidad de las U_i (como una combinación lineal de normales independientes):

$$\boxed{\hat{\beta}_2 \mid \mathbf{X} \sim N\left(\beta_2, \frac{\sigma^2}{\sum_i (X_i - \bar{X})^2}\right)}.$$

Lo *nuevo* es el símbolo “ N ”; y es un supuesto genuino: el laboratorio anterior mostró que insesgadez y varianza no la necesitan.

Geométricamente: la *normalidad* hace el ruido *isótropo*, sin dirección privilegiada en $\mathbb{R}^n$.

El supuesto nuevo: normalidad

El Modelo Clásico de Regresión Lineal de la lección 9 constaba de tres supuestos —linealidad, independencia lineal de los regresores y homocedasticidad—, a los que la lección 11 añadió el muestreo aleatorio. Hoy incorporamos un supuesto más, la *normalidad* de la perturbación, y conviene decir qué añade y qué no. Formalmente, suponemos que, condicionada a la matriz aleatoria de regresores $\mathbf{X}$, cada U_i tiene distribución normal:

$$U_i \mid \mathbf{X} \sim N(0, \sigma^2), \quad i = 1, \dots, n.$$

Hasta ahora solo hemos condicionado momentos: una esperanza y una varianza. Una distribución es más que sus momentos, así que conviene decir qué significa aquí “condicionada a $\mathbf{X}$ ”. La lección 9 nos dio la herramienta: condicionar en $\mathbf{X}$ es proyectar sobre el espacio de las funciones de $\mathbf{X}$. Falta elegir *qué* proyectar. La distribución de U_i queda descrita por las probabilidades $P(U_i \leq u)$, una para cada número u . Para escribirlas como esperanzas usamos la *indicadora* de un suceso A : la variable aleatoria $\mathbb{I}_A$ que vale 1 en los sucesos elementales de A y 0 en los demás, es decir, $\mathbb{I}_A(\omega) = 1$ si $\omega \in A$ y $\mathbb{I}_A(\omega) = 0$ si $\omega \notin A$. Su esperanza es la probabilidad del suceso, $E(\mathbb{I}_A) = 1 \cdot P(A) + 0 \cdot P(A^c) = P(A)$. Fíjese que la variable constante 1 de la lección 9 es la indicadora del suceso seguro, $1 = \mathbb{I}_\Omega$. Así,

$$P(U_i \leq u) = E(\mathbb{I}_{\{U_i \leq u\}}),$$

es el escalar de la proyección de la indicadora sobre 1. Condicionar es sustituir la recta $\mathcal{L}(1)$ por el espacio de las funciones de $\mathbf{X}$:

$$P[U_i \leq u \mid \mathbf{X}] = E[\mathbb{I}_{\{U_i \leq u\}} \mid \mathbf{X}].$$

El resultado es una función de $\mathbf{X}$: la sombra de la indicadora sobre ese espacio. Como toda esperanza condicional, $P[\cdot \mid \mathbf{X}]$ es una variable aleatoria, no un número; el número $P(A)$ se recupera por la ley de las esperanzas iteradas, $P(A) = E(P[A \mid \mathbf{X}])$. Dos comprobaciones justifican llamarla probabilidad. Si A y B son incompatibles, $\mathbb{I}_{A \cup B} = \mathbb{I}_A + \mathbb{I}_B$ (en cada ω a lo sumo una de las dos vale 1); como la proyección es lineal, $P[A \cup B \mid \mathbf{X}] = P[A \mid \mathbf{X}] + P[B \mid \mathbf{X}]$: las sombras de dos sucesos incompatibles se suman, como sus probabilidades. Y la indicadora del suceso seguro, 1, ya es una función de $\mathbf{X}$ (la constante), así que su sombra es ella misma: $P[\Omega \mid \mathbf{X}] = E[1 \mid \mathbf{X}] = 1$, cuya esperanza es el número $P(\Omega) = 1$.

El supuesto de normalidad dice dos cosas. La primera es que, para *todo* u , la sombra $P[U_i \leq u \mid \mathbf{X}]$ es una variable aleatoria constante: la distribución de U_i no depende de $\mathbf{X}$. Eso no es exclusivo de la normal; lo diría igualmente suponer cualquier otra distribución fija, una uniforme por ejemplo. La segunda fija *cuáles* son esas constantes:

$$P[U_i \leq u \mid \mathbf{X}] = \Phi(u/\sigma) 1,$$

donde Φ es la función de distribución de la normal estándar. El argumento es u medido en desviaciones típicas: como U_i/σ es normal estándar, $P(U_i \leq u) = P(U_i/\sigma \leq u/\sigma) = \Phi(u/\sigma)$. Es decir: para cada u , $P[U_i \leq u \mid \mathbf{X}]$ es una variable aleatoria constante, y por la ley de las esperanzas iteradas (lección 11) esa constante es la probabilidad sin condicionar, $P(U_i \leq u) = \Phi(u/\sigma)$. Condicionar en los regresores no cambia la probabilidad de ningún suceso $\{U_i \leq u\}$: la distribución de U_i es la misma sea cual sea $\mathbf{X}$, y es la $N(0, \sigma^2)$. Los dos supuestos que ya teníamos siguen el mismo

patrón: $E[U_i | \mathbf{X}] = 0$ y $E[U_i^2 | \mathbf{X}] = \sigma^2$ 1 dicen que dos funciones concretas de U_i tienen sombra constante. Hoy lo pedimos para todas las indicadoras a la vez y fijamos qué constantes son.

Obsérvese que este supuesto no cambia ninguno de los momentos que ya teníamos: la media condicional sigue siendo $E[U_i | \mathbf{X}] = 0$ y la varianza condicional sigue siendo $Var[U_i | \mathbf{X}] = \sigma^2$ 1, exactamente como en la lección 11. Lo único que añade es *de qué forma* se reparte la probabilidad alrededor de esa media, con esa varianza.¹

De aquí a la distribución de $\hat{\beta}_2$ no hace falta ninguna cuenta nueva: basta releer lo que ya escribimos en la lección 11. Allí obtuvimos, por álgebra pura y sin tomar esperanzas,

$$\hat{\beta}_2 = \beta_2 + \sum_i W_i U_i, \quad \text{con} \quad W_i = \frac{X_i - \bar{X}}{\sum_j (X_j - \bar{X})^2}.$$

Los pesos W_i son funciones de $\mathbf{X}$. Como advertimos en la lección 11, condicionar en $\mathbf{X}$ *no* los convierte en números: siguen siendo variables aleatorias (funciones de ω) antes y después de condicionar. Lo que ocurre es que el Lema de aquella lección los saca fuera del operador $E[\cdot | \mathbf{X}]$. Ya lo hicimos con la media y con la varianza:

$$E\left[\sum_i W_i U_i \mid \mathbf{X}\right] = \sum_i W_i E[U_i \mid \mathbf{X}] \quad \text{y} \quad Var\left[\sum_i W_i U_i \mid \mathbf{X}\right] = \sum_i \sum_j W_i W_j E[U_i U_j \mid \mathbf{X}].$$

Para la distribución hace falta lo mismo, pero para todas las indicadoras a la vez: que los W_i se comporten como números también dentro de $E[\mathbb{I}_{\{\sum_i W_i U_i \leq u\}} \mid \mathbf{X}]$. Es así, por la misma razón que el Lema: los W_i son funciones de $\mathbf{X}$, y las U_i son independientes de $\mathbf{X}$ (todas sus sombras son constantes, como acabamos de ver) e independientes entre sí (muestreo aleatorio, lección 11). Aceptado eso, lo que queda es un resultado de su curso de probabilidad, que no demostraremos: una combinación lineal de normales independientes con coeficientes numéricos es normal. Por tanto, condicionando en $\mathbf{X}$, $\sum_i W_i U_i$ es normal, y $\hat{\beta}_2$ también, con la media y la varianza que ya calculamos en la lección 11:

$$\hat{\beta}_2 \mid \mathbf{X} \sim N\left(\beta_2, \frac{\sigma^2}{\sum_i (X_i - \bar{X})^2}\right).$$

Esta expresión es una afirmación sobre la distribución *condicional* en el sentido precisado más arriba: para cada u ,

$$P[\hat{\beta}_2 \leq u \mid \mathbf{X}] = \Phi\left(\frac{u - \beta_2}{\sigma / \sqrt{\sum_i (X_i - \bar{X})^2}}\right).$$

Esta sombra es una función de $\mathbf{X}$ y, a diferencia de lo que ocurría con las U_i , *no* es constante. La forma de la distribución de $\hat{\beta}_2$ depende de los regresores a través de su varianza condicional $\sigma^2 / \sum_i (X_i - \bar{X})^2$, que es una variable aleatoria, función de $\mathbf{X}$, como en la lección 11. En la transparencia siguiente evaluaremos esa varianza sobre los datos observados $\mathbf{x}$ y obtendremos un número:

¹ Una *precisión notacional*. Dentro del símbolo $N(0, \sigma^2)$, los argumentos 0 y σ^2 son *parámetros* de una distribución —dos números—, no variables aleatorias. Por eso aquí escribimos 0 a secas, y no θ : la regla del curso que obliga a escribir $\beta_1 + 1$ en lugar de β_1 se aplica cuando un escalar se *combina* (se suma, se multiplica) con variables aleatorias, para mantener el paralelismo dimensional; no se aplica a los argumentos de una distribución. Compárese: $E[U_i \mid \mathbf{X}] = 0$ es una igualdad entre variables aleatorias (la esperanza condicional lo es), mientras que “la media de esa normal es 0” es una afirmación sobre el valor numérico de un parámetro.

es el paso de estimador a estimación de la lección 11. La aleatoriedad que cuenta aquí es la de la perturbación, con los regresores en el papel de aquello sobre lo que se proyecta.

La normalidad es un supuesto *añadido*, no una consecuencia de los anteriores, y el laboratorio anterior lo mostró. Allí se repitió el experimento de Monte Carlo con perturbaciones uniformes y con perturbaciones χ^2 centradas —claramente no normales— y el resultado fue que la media de las estimaciones seguía cayendo sobre β_2 y su varianza empírica seguía coincidiendo con la fórmula de la lección 11. No podía ser de otro modo: aquella demostración nunca usó la normalidad. Lo que *sí* cambiaba era la forma del histograma. Y cambiaba de una manera instructiva: con $n = 506$ el histograma parecía normal aunque U no lo fuese; con $n = 12$ y una χ^2 de un grado de libertad el contraste de normalidad rechazaba, y cuando una observación dominaba el regresor el histograma heredaba la asimetría de U . Volveremos sobre esto al final de la sesión, porque es la razón por la que la inferencia que hoy construimos sigue siendo aproximadamente válida en muestras grandes incluso cuando la normalidad falla.

Queda la lectura geométrica, que es la que conecta este supuesto con el resto del curso. Pensemos en el vector aleatorio de perturbaciones $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_n)$, cuyas realizaciones son puntos de $\mathbb{R}^n$. La homocedasticidad dice que todas sus componentes tienen la misma varianza; el muestreo aleatorio de la lección 11 dice que son *independientes* entre sí —no solo incorreladas, y aquí el matiz importa—. Las dos cosas juntas, *más* la normalidad de cada componente, dan algo más fuerte que la suma de sus partes: que la distribución de $\mathbf{U}$ es *esféricamente simétrica*, es decir, que no privilegia ninguna dirección de $\mathbb{R}^n$. Dicho de otro modo: la *dirección* en la que apunta el ruido es completamente uniforme, y su distribución no cambia si giramos los ejes. A esa propiedad la llamaremos *isotropía*,² y es lo que hará que, en la sección “Por qué el valor crítico depende de $n - k$ ”, tenga sentido hablar de “la distribución del ángulo”. Sin normalidad seguimos suponiendo homocedasticidad e independencia, pero esas dos propiedades solas no bastan: la nube de ruido puede tener direcciones preferentes (el cubo de la nota al pie), y entonces el ángulo ya no tiene una distribución conocida.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 4, sección 4.1 (supuesto MLR.6 de normalidad y distribuciones muestrales normales de los estimadores MCO).

3 El error estándar, y el precio de estimar σ

Esa varianza contiene σ^2 , que *no conocemos*: la estimamos con la cuasivarianza de los residuos (lección 11), $\mathfrak{s}^2 = \text{SRC}/(n - k)$.

Sustituyendo σ por $\mathfrak{s}$ sobre los datos observados, el *error estándar* de $\hat{\beta}_2$:

$$\text{ee}(\hat{\beta}_2) = \frac{\mathfrak{s}}{\sqrt{\sum_i (x_i - \mu_x)^2}} = \frac{\mathfrak{s}}{\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_e}.$$

Un cociente de longitudes: *tamaño estimado del ruido por unidad de longitud del regresor en desviaciones.*

²El término de los manuales, “perturbaciones esféricas”, no es sinónimo: significa solo que la matriz de varianzas y covarianzas de $\mathbf{U}$ es σ^2 por la identidad (homocedasticidad más incorrelación) y no dice nada sobre la forma de la distribución. Unas perturbaciones uniformes independientes son esféricas en ese sentido y no son isotrópicas: sus realizaciones llenan un cubo, y un cubo tiene direcciones privilegiadas, sus diagonales. La isotropía es más fuerte: la distribución entera es invariante por giros, no solo sus segundos momentos. Con componentes independientes equivale exactamente a la normalidad (teorema de Maxwell). Por eso “isotropía” es el nombre geométrico del supuesto de hoy.

El precio de estimar σ : la normal se convierte en una *t de Student* con $n - k$ grados de libertad (enunciado, no demostrado):

$$\frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{\text{ee}(\hat{\beta}_2)} \sim t_{n-k}.$$

El error estándar, y el precio de estimar σ

La varianza de $\hat{\beta}_2$ que aparece en la distribución de la transparencia anterior, $\sigma^2 / \sum_i (X_i - \bar{X})^2$, tiene un problema práctico evidente: contiene σ^2 , la varianza de la perturbación poblacional, que es una cantidad desconocida —como toda cantidad poblacional—. La lección 11 ya nos dejó resuelto ese punto: σ^2 se estima mediante la cuasivarianza de los residuos, $\mathfrak{s}^2 = \text{SRC}/(n - k)$, que es el tercer miembro de la familia de productos escalares del curso, el de divisor $n - k$. Recordemos que ese divisor no era caprichoso: los residuos viven en el subespacio ortogonal a las columnas de $\mathbf{X}$, de dimensión $n - k$, y dividir por esa dimensión es lo que hace insesgado al estimador.

Sustituyendo σ por $\mathfrak{s}$ en la raíz cuadrada de la varianza, y escribiendo la expresión sobre los *datos observados* en lugar de sobre la muestra aleatoria, obtenemos el *error estándar* de $\hat{\beta}_2$:

$$\text{ee}(\hat{\beta}_2) = \frac{\mathfrak{s}}{\sqrt{\sum_i (x_i - \mu_x)^2}} = \frac{\mathfrak{s}}{\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_e}.$$

La notación merece un comentario, porque el término “error estándar” es una de las fuentes de confusión más frecuentes al leer resultados. Un error estándar mide la dispersión de un *estimador*: cuánto variaría el número que hemos calculado si volviéramos a tomar otra muestra. No mide la dispersión de unos datos. Y el objeto que acabamos de escribir es, estrictamente, un *número* —se calcula con los datos que tenemos—, aunque sea la realización de una variable aleatoria (la que resultaría de evaluar esa misma fórmula sobre la muestra aleatoria). Es el mismo abuso de lenguaje, cómodo y universal, que ya hicimos en la lección 11 al llamar “sesgado” a SRC/n e “insesgado” a $\mathfrak{s}^2$: fórmulas escritas con los residuos observados, para hablar de propiedades que son del estimador subyacente.³

Escrito así, el error estándar es un *cociente de dos longitudes*, y esa es su lectura más útil. En el numerador, $\mathfrak{s} = \sqrt{\langle \hat{\mathbf{e}}, \hat{\mathbf{e}} \rangle_{n-k}}$ es la longitud del vector de residuos, medida con el producto escalar de divisor $n - k$ de la lección 11; es lo que tenemos en lugar de σ , la desviación típica de la perturbación. Llamaremos *ruido* a la perturbación, como ya hicimos en la lección 11 al leer la fórmula de la varianza, y *tamaño estimado del ruido* a $\mathfrak{s}$. En el denominador, $\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_e$ mide cuánto se separa el regresor de su propia media: es, literalmente, la longitud euclídea del vector en desviaciones de la lección 4. Por tanto: *el error estándar es el tamaño estimado del ruido por unidad de longitud del regresor en desviaciones*. Un regresor con mucha variación —un vector en desviaciones largo— permite estimar su coeficiente con precisión; un regresor cuyos valores apenas cambian dentro de la muestra —un vector en desviaciones corto— no, por pequeño que sea $\mathfrak{s}$. Es la lectura geométrica de algo que en la lección 11 aparecía como “más dispersión en X , más precisión”, y la veremos dibujada en la transparencia del intervalo de confianza.

³La confusión se agrava con la traducción. En inglés, la salida de un programa como Gretl distingue “S.D. dependent var” (*standard deviation*: dispersión de los datos del regresando) de “S.E. of regression” (*standard error*) y de la columna “Std. Error” de cada coeficiente. En español, las tres suelen aparecer rotuladas con alguna variante de “desviación típica”, de modo que tres cantidades conceptualmente distintas comparten etiqueta. Volveremos sobre ello en la transparencia dedicada a leer una tabla de resultados.

Queda el segundo asunto de esta transparencia. Si conociéramos σ , de la distribución normal de la transparencia anterior se seguiría inmediatamente que

$$\frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{\sqrt{\sigma^2 / \sum_i (X_i - \bar{X})^2}} \sim N(0, 1),$$

porque restar la media y dividir por la desviación típica convierte cualquier normal en la normal estándar. Pero no conocemos σ : en su lugar usamos $\mathfrak{s}$. Y $\mathfrak{s}$, como $\hat{\beta}_2$, es la realización de un estimador: la variable aleatoria que resulta de evaluar $\sqrt{\text{SRC}/(n-k)}$ sobre el vector aleatorio de residuos $\hat{\mathbf{E}}$ de la lección 11, y que denotamos con el mismo símbolo. Al dividir por una cantidad que también fluctúa de muestra en muestra, el cociente resultante se dispersa más que una normal estándar: puede salir grande porque el numerador sea grande, pero también porque el denominador haya salido pequeño por azar. El resultado exacto —que *enunciamos sin demostrar*, porque su prueba exige la distribución χ^2 y un argumento de independencia entre $\hat{\beta}_2$ y $\mathfrak{s}^2$ que este curso no desarrolla— es que ese cociente sigue una distribución conocida, la *t de Student con $n - k$ grados de libertad*:

$$\frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{\text{ee}(\hat{\beta}_2)} \sim t_{n-k}.$$

La distribución t_{n-k} es simétrica y acampanada como la normal, pero con colas más gruesas, y tanto más gruesas cuanto menor sea $n - k$; a medida que $n - k$ crece, se acerca a la normal estándar hasta hacerse indistinguible de ella en la práctica (con $n - k$ del orden de unas decenas, la diferencia ya es pequeña). Que el número de grados de libertad sea exactamente $n - k$ —el mismo que aparecía en el divisor de $\mathfrak{s}^2$ — no es casualidad, y en la sección “Por qué el valor crítico depende de $n - k$ ” veremos que tiene un significado geométrico muy concreto: es la dimensión del subespacio donde vive el residuo.

Nota de coherencia: en este curso, k cuenta *todos* los regresores, incluida la constante. Por eso los grados de libertad se escriben siempre $n - k$ y nunca $n - k - 1$. En el modelo lineal simple de hoy, $k = 2$ y los grados de libertad son $n - 2$.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 4, sección 4.2 (el estadístico t y su distribución); y cap. 3, sección 3.6 (errores estándar de los coeficientes).

4 El contraste t

Hipótesis nula: $H_0: \beta_2 = 0$ (“el regresor no aporta nada”), frente a $H_1: \beta_2 \neq 0$.

Estadístico (bajo H_0 , sustituyendo $\beta_2 = 0$ en la transparencia anterior):

$$t = \frac{\hat{\beta}_2}{\text{ee}(\hat{\beta}_2)} \sim t_{n-k}.$$

Decisión al nivel α (habitualmente 0,05): se rechaza H_0 si $|t| > t_c$, el valor crítico de la t_{n-k} que deja $\alpha/2$ en cada cola.

Valor p : probabilidad de un $|t|$ al menos tan grande como el obtenido, si H_0 fuese cierta. Se rechaza si es menor que α .

Nada obliga a contrastar contra cero: para $H_0: \beta_2 = c$ (p. ej. una elasticidad unitaria), $t = (\hat{\beta}_2 - c)/\text{ee}(\hat{\beta}_2)$.

El contraste t

Con la distribución de la transparencia anterior en la mano, el contraste se construye solo. La hipótesis que interesa con más frecuencia es $H_0: \beta_2 = 0$, que en términos del modelo poblacional dice que el regresor no interviene: si $\beta_2 = 0$, entonces $Y = \beta_1 I + U$ y X no aparece. La alternativa habitual es $H_1: \beta_2 \neq 0$, que no especifica ningún valor concreto y admite desviaciones en los dos sentidos (de ahí que el contraste se llame *de dos colas*).

El razonamiento es el de todo contraste de hipótesis, y conviene enunciarlo con cuidado porque es donde se cometen los errores de interpretación. *Suponemos provisionalmente* que H_0 es cierta. Bajo ese supuesto, sustituyendo $\beta_2 = 0$ en el resultado de la transparencia anterior, sabemos exactamente cómo se distribuye el cociente

$$t = \frac{\hat{\beta}_2}{\text{ee}(\hat{\beta}_2)} \sim t_{n-k}.$$

Este cociente es la distancia entre la estimación y el valor 0, expresada en una unidad de medida nueva: el error estándar. Dividir una longitud por otra dice cuántas veces cabe la segunda en la primera (seis metros entre metro y medio son cuatro), de modo que $t = 3$ significa que $\hat{\beta}_2$ dista de cero tres errores estándar. Con esa unidad, la pregunta “¿está lejos de cero?” ya no depende de las unidades de X e Y : se compara con la imprecisión propia del estimador. Por eso t no cambia al cambiar las unidades, como veremos al leer la tabla de resultados. Si el valor que obtenemos con nuestros datos es de los que la t_{n-k} produce con facilidad, los datos son compatibles con H_0 y no hay nada que objetar. Si es un valor que la t_{n-k} produciría muy raramente, tenemos un conflicto: o bien hemos tenido muy mala suerte, o bien el supuesto provisional era falso. El contraste opta por lo segundo, y al hacerlo acepta un riesgo cuantificado de equivocarse.

Ese riesgo es el *nivel de significación* α , la probabilidad de rechazar H_0 siendo cierta, que se fija de antemano (por convención, $\alpha = 0,05$; también se usan 0,10 y 0,01). Fijado α , el *valor crítico* t_c es el número que deja una probabilidad $\alpha/2$ en cada cola de la t_{n-k} , y la regla es: rechazar H_0 si $|t| > t_c$. El conjunto de valores que llevan a rechazar se llama *región crítica*. Nótese que t_c depende de dos cosas: del nivel α que hayamos elegido y de los grados de libertad $n - k$. Esta segunda dependencia es la que tiene una lectura geométrica sorprendente, y le dedicaremos una transparencia entera.

Una forma equivalente y, en la práctica, más informativa de presentar la misma decisión es el *valor p* : la probabilidad de que la t_{n-k} produzca un valor tan alejado de cero, o más, que el t que hemos obtenido —siempre, se insiste, bajo el supuesto de que H_0 es cierta—. Con él, la regla de decisión se vuelve inmediata: se rechaza H_0 si el valor p es menor que α . Su ventaja es que no obliga a comprometerse con un α antes de mirar los datos y permite al lector aplicar el suyo: un valor p de 0,048 y otro de 0,000001 llevan ambos a “rechazar al 5%”, pero no dicen lo mismo. Su inconveniente es que se malinterpreta con enorme facilidad, y a eso dedicaremos parte de la sección “Significación estadística $\neq$ relevancia económica”.

Conviene, por último, deshacer una asociación demasiado automática entre “contraste t ” y “contrastar contra cero”. El cero tiene un lugar privilegiado porque corresponde a la pregunta

“¿interviene este regresor?”, pero la construcción vale para cualquier valor de referencia: para contrastar $H_0: \beta_2 = c$ basta usar

$$t = \frac{\hat{\beta}_2 - c}{\text{ee}(\hat{\beta}_2)},$$

que bajo esa H_0 sigue igualmente una t_{n-k} . Y hay preguntas económicas que exigen precisamente eso. Si el modelo está escrito en logaritmos y β_2 es una elasticidad (algo que veremos con detalle más adelante en el curso), la pregunta interesante rara vez es “¿es la elasticidad distinta de cero?” —casi siempre lo es— sino “¿es compatible con ser unitaria?”, es decir, $H_0: \beta_2 = 1$. Del mismo modo, si la teoría predice un valor concreto, contrastar contra ese valor es lo que pone a prueba la teoría; contrastar contra cero, no.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 4, secciones 4.2a-4.2e (contrastes de una y dos colas, valores críticos, valores p , y contrastes de hipótesis con valores de referencia distintos de cero).

5 Lectura geométrica: la razón de catetos

Con $\hat{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{y}} = \hat{\beta}_2(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})$ y $s^2 = \text{SRC}/(n - k)$, el estadístico queda:

$$t^2 = (n - k) \frac{\text{SEC}}{\text{SRC}}, \quad \text{es decir} \quad |t| = \sqrt{n - k} \frac{\|\hat{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{y}}\|_e}{\|\hat{\mathbf{e}}\|_e}.$$




Figura 1: El triángulo rectángulo de la lección 8, con los dos catetos medidos. En verde, el vector de datos en desviaciones (la hipotenusa, de longitud $\sqrt{\text{STC}}$); en violeta, el ajuste en desviaciones (el cateto explicado, de longitud $\sqrt{\text{SEC}}$), rotulado a la derecha de su punta, que es un múltiplo del regresor en desviaciones (en azul, medido bajo el eje); en gris, el residuo (el cateto residual, de longitud $\sqrt{\text{SRC}}$). El ángulo θ es el mismo de $R^2 = \cos^2 \theta$. El estadístico t compara los dos catetos.

Y como $\text{STC} = \text{SEC} + \text{SRC}$, también $t^2 = (n - k)R^2/(1 - R^2)$: *el contraste t no mide nada que el R^2 no midiera ya.*

Lectura geométrica: la razón de catetos

Hasta aquí, la construcción del contraste ha sido puramente probabilística. Esta transparencia y la siguiente la traducen al lenguaje geométrico del curso: el estadístico t es un objeto que ya conocíamos desde la lección 8, mirado con otra escala.

Empecemos por la pieza que hace posible la traducción. En el modelo lineal simple, el ajuste es $\hat{\mathbf{y}} = \hat{\beta}_1 \mathbf{1} + \hat{\beta}_2 \mathbf{x}$, y sabemos desde la lección 7 que el ajuste y los datos tienen la misma media, $\mu_{\hat{\mathbf{y}}} = \mu_{\mathbf{y}}$. Recordando además la notación de la lección 4 —la barra sobre un vector denota el vector constante formado por su media, $\bar{\mathbf{v}} = \mu_{\mathbf{v}} \mathbf{1}$ —, y usando $\mu_{\hat{\mathbf{y}}} = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \mu_{\mathbf{x}}$, se obtiene

$$\hat{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{y}} = (\hat{\beta}_1 \mathbf{1} + \hat{\beta}_2 \mathbf{x}) - (\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \mu_{\mathbf{x}}) \mathbf{1} = \hat{\beta}_2 (\mathbf{x} - \mu_{\mathbf{x}} \mathbf{1}) = \hat{\beta}_2 (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}).$$

Es decir: el cateto explicado del triángulo de la lección 8 es el regresor en desviaciones multiplicado por $\hat{\beta}_2$. Esto es propio de la regresión simple —con dos o más regresores no constantes el ajuste en desviaciones ya no está alineado con ningún regresor individual, como advertimos en la lección 10—, y es la razón por la que hoy trabajamos con $k = 2$.

Tomando normas euclídeas al cuadrado en esa igualdad obtenemos $\text{SEC} = \hat{\beta}_2^2 \|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_e^2$. A partir de aquí la cuenta es mecánica. Partimos del estadístico, escribimos el error estándar como el cociente de longitudes de la transparencia anterior y elevamos al cuadrado:

$$t = \frac{\hat{\beta}_2}{\text{ee}(\hat{\beta}_2)} = \frac{\hat{\beta}_2 \|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_e}{s}, \quad t^2 = \frac{\hat{\beta}_2^2 \|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_e^2}{s^2} = \frac{\text{SEC}}{\text{SRC}/(n-k)} = (n-k) \frac{\text{SEC}}{\text{SRC}},$$

que es la identidad anunciada. ■

A la izquierda, un estadístico de contraste, construido con supuestos probabilísticos, normalidad y la distribución del estimador. A la derecha, dos sumas de cuadrados que calculamos en la lección 8 sin la menor referencia a la probabilidad, y un número entero, $n - k$, que también es geometría: la dimensión del subespacio donde vive el residuo (lección 11). Nada de lo que hay a la derecha es probabilístico. La lectura es directa: el estadístico t compara la longitud del cateto explicado con la del cateto residual. Un cateto explicado largo frente a un residuo corto —es decir, un ángulo θ pequeño— da un $|t|$ grande; un cateto explicado corto frente a un residuo largo —un ángulo próximo a 90° — da un $|t|$ pequeño.

Nótese que la identidad está escrita para $|t|$, no para t : el cociente de longitudes es siempre positivo, mientras que t hereda el signo de $\hat{\beta}_2$. Si $\hat{\beta}_2$ es negativo, el cateto explicado apunta en el sentido opuesto sobre la misma recta $\mathcal{L}(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})$ (el conjunto de todos los múltiplos del regresor en desviaciones; geométricamente, una recta de $\mathbb{R}^n$), y nada más cambia: las longitudes, el ángulo y el valor de $|t|$ son los mismos. Por eso la figura está dibujada con $\hat{\beta}_2 > 0$ sin pérdida de generalidad.

La segunda forma de la identidad se obtiene recordando dos cosas de la lección 8: que $R^2 = \text{SEC}/\text{STC}$ y que $\text{STC} = \text{SEC} + \text{SRC}$ (el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo de la figura, en su versión con norma euclídea, sin el factor $1/n$ del producto escalar estadístico). De la segunda, $\text{SRC} = \text{STC} - \text{SEC}$, y dividiendo numerador y denominador por STC :

$$\frac{\text{SEC}}{\text{SRC}} = \frac{\text{SEC}/\text{STC}}{1 - \text{SEC}/\text{STC}} = \frac{R^2}{1 - R^2}, \quad \text{luego} \quad t^2 = (n-k) \frac{R^2}{1 - R^2}.$$

Y como $R^2 = \cos^2 \theta$, donde $\theta = \angle((\mathbf{y} - \bar{\mathbf{y}}), (\hat{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{y}}))$, resulta que $|t|$ es una función únicamente del ángulo θ y del número $n - k$. No hay ninguna otra información en el estadístico t : dado el ángulo y dados los grados de libertad, $|t|$ está determinado.

Esto tiene una consecuencia práctica que conviene retener, y que reaparecerá en la sección “Significación estadística $\neq$ relevancia económica”: un R^2 alto y un $|t|$ alto no son dos evidencias independientes que se refuerzan mutuamente. Son la misma medida, expresada dos veces. Lo que $|t|$ añade al R^2 no es información sobre la relación, sino el factor $\sqrt{n - k}$: cuántas observaciones respaldan ese ángulo.

Podemos comprobar la identidad con el ejemplo numérico de la lección 8, donde $\text{STC} = 100$, $\text{SEC} = 90$, $\text{SRC} = 10$ y $n = 5$ (con $k = 2$, luego $n - k = 3$):

$$t^2 = 3 \cdot \frac{90}{10} = 27, \quad |t| = 5,20.$$

Y, por la otra vía, $R^2 = 0,9$ da $t^2 = 3 \cdot \frac{0,9}{0,1} = 27$, el mismo número.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 4, sección 4.5 (donde aparece, para el contraste F , la misma relación entre estadísticos de contraste y sumas de cuadrados que aquí hemos obtenido para t).

6 Por qué el valor crítico depende de $n - k$

La identidad anterior separa la significación en *dos* factores: $|t| = \sqrt{n - k} \times \sqrt{\text{SEC}/\text{SRC}} = \sqrt{n - k} \times \sqrt{R^2/(1 - R^2)}$, es decir, *cuánta evidencia $\times$ qué fuerza tiene la relación*.




Figura 2: El mismo triángulo con tres aberturas del ángulo θ , con su $R^2 = \cos^2 \theta$ y el $|t|$ que resulta con $n = 5$ ($n - k = 3$), cuyo valor crítico al 5% es 3,18. La hipotenusa mide lo mismo en los tres paneles: lo único que cambia es el ángulo. Solo el primero resulta significativo. Bajo H_0 los tres paneles son posibles: la hipótesis nula no fija el ángulo, sino su distribución (apuntes de esta transparencia).

Con pocas observaciones un ángulo pequeño no prueba nada: en $\mathbb{R}^2$ *todo* par de vectores en desviaciones está alineado ($R^2 = 1$ siempre, $n - k = 0$). En $\mathbb{R}^n$ con n grande, un vector tomado al azar forma, con probabilidad alta, un ángulo próximo a 90° con cualquier dirección fija. Por eso el mismo ángulo de 45° es compatible con el azar con $n = 5$ y no lo es con $n = 500$.

Por qué el valor crítico depende de $n - k$

La identidad de la transparencia anterior descompone la significación estadística en dos factores. Uno es geométrico y describe *la relación*: la razón entre los dos catetos, equivalentemente el ángulo θ , equivalentemente el R^2 . El otro es aritmético y describe *la evidencia*: el factor $\sqrt{n - k}$, que solo cuenta observaciones. Un mismo ángulo, con más observaciones, produce un $|t|$ mayor; un mismo número de observaciones, con un ángulo más cerrado, también. La significación es el producto de ambas cosas, y por eso —como veremos— no puede leerse como si midiera solo una de las dos.

¿Por qué hay que corregir por los grados de libertad? ¿Por qué un ángulo pequeño no es, por sí solo, evidencia suficiente? La respuesta ya está demostrada en este curso: es el resultado de la lección 5 según el cual *en $\mathbb{R}^2$ la correlación es siempre ± 1* . Recordemos el argumento: el subespacio $\mathcal{L}(\mathbf{1})^\perp$ —donde viven todos los vectores en desviaciones— tiene dimensión $n - 1$, de modo que en $\mathbb{R}^2$ es una simple recta; y dos vectores cualesquiera sobre una recta están forzosamente alineados.

Traduzcamos eso al lenguaje de hoy. Con $n = 2$ observaciones y $k = 2$ coeficientes, la recta de regresión pasa exactamente por los dos puntos: el residuo es nulo, $\text{SRC} = 0$, el ángulo θ es 0° y $R^2 = 1$. Un ajuste perfecto. ¿Es eso evidencia de una relación entre las variables? Evidentemente no: es evidencia de que dos puntos determinan una recta. Y el aparato que hemos construido lo detecta sin necesidad de que se lo advirtamos: los grados de libertad son $n - k = 2 - 2 = 0$, la cuasivarianza $\mathfrak{s}^2 = \text{SRC}/(n - k)$ es un cociente de la forma $0/0$, el error estándar no está definido y el estadístico t no existe. No es que el contraste dé un resultado ambiguo: es que *no hay contraste posible*. Con $n = 3$ ya hay un grado de libertad, y el contraste existe, pero su valor crítico al 5 % es 12,71: H_0 es difícil de rechazar, porque con tres puntos un ángulo pequeño sigue siendo fácil de obtener por azar.

Con esto en mente, la figura de la transparencia se lee así. Los tres paneles tienen la misma hipotenusa y solo cambia el ángulo: con $\theta = 15^\circ$ el R^2 es de 0,93 y $|t| = 6,46$, por encima de 3,18, el valor crítico de la t_3 al 5 %; con $\theta = 45^\circ$, un R^2 de 0,50 ya no basta ($|t| = 1,73$); y con $\theta = 80^\circ$ el cateto explicado es casi nulo. Conviene no confundir el tercer panel con la hipótesis nula. $H_0: \beta_2 = 0$ habla del parámetro poblacional, no de la muestra: bajo H_0 pueden salir los tres paneles, con distinta probabilidad. Lo que H_0 fija es el centro: $E[\hat{\beta}_2 | \mathbf{X}] = 0$ (lección 11), es decir, cateto explicado nulo y ángulo de 90° en promedio. El contraste mide cuánto se aleja la muestra de ese centro.

Hay una propiedad de los espacios de dimensión alta que enunciamos sin demostrar: *en $\mathbb{R}^n$ con n grande, dos direcciones tomadas sin relación entre sí son casi ortogonales*. Dicho de otra forma: si el vector de datos en desviaciones apunta “a un sitio cualquiera”, lo esperable es que forme con la dirección del regresor un ángulo próximo a 90° , y tanto más próximo cuanto mayor sea n . Por eso un ángulo de, digamos, 45° es poco informativo con cinco observaciones —cabe fácilmente en el azar— y muy informativo con quinientas.

Ahora podemos decir qué aporta la normalidad. El resultado lo enunciamos sin demostrar. Bajo H_0 el modelo es $Y_i = \beta_1 1 + U_i$, así que el vector de datos en desviaciones es el vector de perturbaciones en desviaciones: la hipotenusa del triángulo es ruido puro. Si el ruido es isótropo, ese vector no prefiere ninguna dirección dentro de $\mathcal{L}(\mathbf{1})^\perp$. El ángulo θ que forma con la dirección del regresor en desviaciones, fija porque condicionamos en $\mathbf{X}$, es entonces una variable aleatoria cuya distribución depende de una sola cosa: cuántas direcciones tiene $\mathcal{L}(\mathbf{1})^\perp$ además de la del regresor.

$\mathcal{L}(\mathbf{1})^\perp$ tiene dimensión $n - 1$ (lección 4); descontada la dirección del regresor quedan $n - 2$, que con $k = 2$ es $n - k$: la dimensión del subespacio donde vive el residuo. Como $|t|$ es una función de θ y de $n - k$ (identidad de la transparencia anterior), *la distribución t_{n-k} es la distribución del ángulo bajo H_0* . Sin normalidad el ruido puede preferir direcciones, y el ángulo deja de tener una distribución conocida.

Esto permite mirar la región crítica con otros ojos. Rechazar H_0 cuando $|t| > t_c$ equivale, por la identidad, a rechazarla cuando el ángulo es menor que un cierto ángulo crítico θ_c . Es decir: la región crítica es un *cono* alrededor de la recta generada por el regresor en desviaciones, y el valor crítico t_c no es más que la *abertura* de ese cono. Lo que hace el contraste es preguntar si el vector de datos en desviaciones ha caído dentro del cono.




Figura 3: La región crítica al 5 % (sombreada) como un cono alrededor de la recta generada por el regresor en desviaciones, vista dentro del plano de las desviaciones. El nivel es el mismo en los dos paneles. A la izquierda, con $n = 5$: la abertura es de $28,6^\circ$. A la derecha, con $n = 1002$: la abertura es de $86,5^\circ$, casi todo el espacio. El vector de datos en desviaciones forma en los dos paneles el mismo ángulo de 45° con el regresor, y el veredicto es opuesto.

La figura pone números a la idea. La abertura del cono se obtiene de la identidad: el ángulo crítico es aquel cuya razón de catetos vale $t_c / \sqrt{n - k}$, con t_c el valor crítico de la t_{n-k} al 5 %. Con $n = 5$ ($n - k = 3$, $t_c = 3,18$) sale $\theta_c = 28,6^\circ$: el cono es estrecho, y hace falta que los datos se alineen mucho con el regresor para rechazar. Con $n = 1002$ ($n - k = 1000$, $t_c = 1,96$) sale $\theta_c = 86,5^\circ$: el cono ocupa casi todo el espacio, y basta un ángulo apenas distinto de la ortogonalidad para rechazar. Los dos paneles muestran el *mismo* vector de datos, a 45° del regresor: fuera del cono en el primer caso (no se rechaza, $|t| = 1,73$), dentro en el segundo (se rechaza, $|t| = 31,6$).

Hay que ser cuidadoso al interpretar ese contraste, porque admite dos lecturas y solo una es correcta. La lectura *incorrecta* sería: “con muchas observaciones el contraste es más laxo, rechaza con menos exigencia”. No: el contraste mantiene, en los dos paneles, la misma probabilidad de error

de tipo I, el 5 % —eso es lo que significa haber calculado la abertura con t_c —. Lo que cambia es que, con mil observaciones, el azar solo produce ángulos muy próximos a 90° : ese cono enorme es el 5 % de los casos porque casi toda la probabilidad se concentra en la rendija que queda fuera de él. La lectura correcta es, entonces: con muchas observaciones, una desviación pequeñísima de la ortogonalidad ya es estadísticamente detectable. Que sea *económicamente relevante* es otra cuestión, y a ella dedicaremos una transparencia entera.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 4, sección 4.2b (dependencia del valor crítico respecto de los grados de libertad). Fisher, R. A. (1915), “Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population”, *Biometrika* 10, 507-521: el artículo donde la distribución del coeficiente de correlación se obtiene, originalmente, por un argumento geométrico sobre ángulos como el que aquí solo hemos enunciado.

7 El intervalo de confianza

Un *rango* de valores compatibles con los datos, en vez de un veredicto:

$$\left[\hat{\beta}_2 - t_c \cdot ee(\hat{\beta}_2), \hat{\beta}_2 + t_c \cdot ee(\hat{\beta}_2) \right]$$

con el mismo t_c del contraste; semiamplitud $t_c \cdot s / \|x - \bar{x}\|_e$.




Figura 4: Dos ajustes con *la misma* muestra de perturbaciones, el mismo $n = 12$ y el mismo residuo —y por tanto el mismo $s = 1,10$ —. Lo único distinto es cuánto se separan los valores del regresor. La zona sombreada es el haz de rectas cuyas pendientes caen en el intervalo de confianza al 95 %, dibujadas pivotando sobre el centroide, por donde la recta de regresión pasa siempre. Diez veces más largo el regresor en desviaciones, diez veces más estrecho el haz.

Dice: el 95 % de las muestras dan un intervalo que contiene a β_2 . *No dice:* que β_2 esté en *este* con probabilidad 0,95; β_2 no es aleatorio, el intervalo sí.

El intervalo de confianza

El contraste de hipótesis responde a una pregunta muy pobre: sí o no. El intervalo de confianza responde a una mejor —“¿qué valores de β_2 son compatibles con estos datos?”— y con la misma

maquinaria, sin ningún ingrediente adicional. Su construcción sale de despejar en la distribución de la sección “El error estándar, y el precio de estimar σ ”: si $(\hat{\beta}_2 - \beta_2)/\text{ee}(\hat{\beta}_2)$ sigue una t_{n-k} , entonces ese cociente cae entre $-t_c$ y $+t_c$ con probabilidad $1 - \alpha$, y despejando β_2 de esa doble desigualdad se obtiene

$$\left[\hat{\beta}_2 - t_c \cdot \text{ee}(\hat{\beta}_2) , \hat{\beta}_2 + t_c \cdot \text{ee}(\hat{\beta}_2) \right].$$

Es, por tanto, el mismo objeto que el contraste, presentado del revés. Y esa equivalencia es exacta y conviene tenerla clara: un valor c queda *fuera* del intervalo de confianza al 95 % si y solo si el contraste de $H_0: \beta_2 = c$ se rechaza al 5 %. El intervalo es, literalmente, el conjunto de las hipótesis que *no* se rechazarían. Por eso contiene toda la información del contraste y algo más: no solo dice si el cero se rechaza, sino qué otros valores también, y con qué margen.

La semiamplitud del intervalo, $t_c \cdot \mathfrak{s} / \|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_e$, es el error estándar multiplicado por t_c , y hereda su lectura como cociente de longitudes: tamaño estimado del ruido por unidad de longitud del regresor en desviaciones. La figura la hace visible. En la figura, esa semiamplitud es la abertura de la zona sombreada: el haz de todas las rectas cuya pendiente cae dentro del intervalo, dibujadas pivotando sobre el centroide (μ_x, μ_y) , por el que la recta de regresión pasa siempre. Los dos paneles de la figura comparten absolutamente todo excepto la dispersión del regresor: los mismos parámetros ($\beta_1 = 10$, $\beta_2 = 0,5$), las mismas doce perturbaciones y —esto es lo que hace la comparación tan limpia— el mismo vector de residuos, porque el regresor en desviaciones apunta en la misma dirección en los dos casos y solo cambia su longitud.⁴ En consecuencia $\mathfrak{s} = 1,10$ en ambos, y toda la diferencia procede del denominador: $\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_e$ vale 5,98 en el panel izquierdo y 59,79 en el derecho. Diez veces más largo el regresor en desviaciones, diez veces más pequeño el error estándar (0,184 frente a 0,018) y diez veces más estrecho el intervalo: [0,08; 0,90] frente a [0,46; 0,54].

Y no es solo el intervalo lo que se estrecha: el error de estimación efectivamente cometido también se divide por diez. La pendiente verdadera es $\beta_2 = 0,5$; con el regresor concentrado se estima 0,4931 (error de $-0,0069$) y con el regresor disperso, 0,4993 (error de $-0,00069$). Exactamente un factor de diez, el mismo que separa las longitudes. La lectura sustantiva es la que importa: *para estimar bien el efecto de una variable hace falta que esa variable varíe*. Si en su muestra todo el mundo tiene aproximadamente la misma educación, no podrá medir con precisión el efecto de la educación sobre el salario, por muy limpios que sean sus datos y por muchas observaciones que tenga. Esta idea reaparecerá, con otro disfraz, cuando estudiemos la colinealidad.

Vale la pena señalar que el panel izquierdo es un buen ejemplo de una situación incómoda pero frecuente: el contraste rechaza $H_0: \beta_2 = 0$ (el cero no está en el intervalo, $|t| = 2,68$ frente a un crítico de 2,23), y sin embargo el intervalo es tan ancho —de 0,08 a 0,90— que apenas informa sobre la magnitud del efecto. Si un resultado así se comunica diciendo solo “el efecto es significativo”, se está ocultando lo esencial: que el rango de valores compatibles con los datos es tan amplio que no sabemos, ni aproximadamente, cuánto vale β_2 . Es el argumento principal para preferir el intervalo al veredicto, sobre todo al leer o escribir un informe.

Queda la cuestión de la interpretación, donde es fácil equivocarse. La afirmación correcta es

⁴En los dos paneles el regresor toma valores igualmente espaciados alrededor de 50; lo único que cambia es el paso (0,5 frente a 5). Al ser el mismo patrón multiplicado por una constante, el vector en desviaciones tiene la misma dirección y una longitud diez veces mayor, y la proyección del ruido sobre esa dirección —y por tanto el residuo— es idéntica. De ahí que SRC y $\mathfrak{s}$ coincidan exactamente en ambos paneles, y que toda la diferencia recaiga sobre el denominador del error estándar.

sobre el *procedimiento*, no sobre este intervalo concreto: si repitiéramos el muestreo muchas veces y en cada muestra construyéramos el intervalo con esta receta, el 95 % de esos intervalos contendrían al verdadero β_2 . La afirmación incorrecta, y muy tentadora, es “hay un 95 % de probabilidad de que β_2 esté entre 0,46 y 0,54”. No tiene sentido en este marco: β_2 es un número fijo y desconocido, no una variable aleatoria, así que no hay ninguna distribución de probabilidad sobre sus valores posibles. Lo aleatorio es el intervalo —sus dos extremos son variables aleatorias, funciones de la muestra—, no el parámetro. Este intervalo concreto, el que tenemos delante, o contiene a β_2 o no lo contiene; el 95 % describe con qué frecuencia acierta el método, no con qué probabilidad acierta esta vez.⁵ La cobertura de los intervalos —qué fracción de ellos acierta realmente— es lo que comprobaremos con datos simulados en el laboratorio que sigue a esta lección.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 4, sección 4.3 (intervalos de confianza y su relación con los contrastes de dos colas).

8 Cómo se lee una tabla de resultados

Toda salida de estimación tiene, para cada regresor, las mismas cuatro columnas:

Columna	Qué es	A qué pregunta responde
Coefficiente	$\hat{\beta}_j$	¿de qué <i>tamaño</i> es el efecto, en las unidades del problema?
Desv. típica	$ee(\hat{\beta}_j)$	¿con cuánta <i>precisión</i> lo hemos medido?
Estadístico t	el cociente de las dos anteriores	¿a cuántos errores estándar del cero está?
Valor p	$P(t_{n-k} > t)$	¿cuán raro sería esto si el efecto fuese nulo?

Las dos últimas son *derivadas*: no añaden información, reordenan la de las dos primeras. La comprobación a mano — t = coeficiente / desviación típica— conviene hacerla siempre.

Aviso terminológico: en la salida en español de Gretl, “desviación típica” rotula **tres** cantidades distintas: la de la variable dependiente (dispersión de los datos), la de la regresión (**s**) y la de cada coeficiente (su error estándar). En inglés solo la primera es *standard deviation*; las otras dos son *standard error*.

Cómo se lee una tabla de resultados

Todo lo construido hasta aquí se presenta, en la práctica, en forma de tabla: cuatro columnas por regresor, más unas pocas líneas de resumen del modelo. Conviene saber leerla despacio una vez para poder leerla rápido siempre. Tomemos como ejemplo el panel derecho de la figura de la transparencia anterior —el del regresor disperso—, cuya estimación completa es esta:

⁵La distinción no es una pedantería: hay enfoques de la estadística —los llamados bayesianos— en los que sí tiene sentido asignar una distribución de probabilidad a un parámetro desconocido, y en los que existe un objeto (el *intervalo de credibilidad*) del que sí puede decirse “contiene a β_2 con probabilidad 0,95”. Son objetos distintos, contruidos con supuestos distintos, y a veces numéricamente parecidos. El de este curso es el intervalo de confianza clásico, y su garantía es la que se ha descrito: sobre el procedimiento.

Regresor	Coficiente	Desv. típica	Estadístico t	Valor p
constante	10,0343	0,9732	10,31	$1,2 \cdot 10^{-6}$
x	0,4993	0,0184	27,14	$1,1 \cdot 10^{-10}$

con $n = 12$, $k = 2$, $\text{STC} = 903,40$, $\text{SEC} = 891,30$, $\text{SRC} = 12,10$, $\mathfrak{s} = 1,1001$ y $R^2 = 0,9866$.

La *primera columna* es la única que contiene información sustantiva nueva: el tamaño del efecto estimado, en las unidades del problema. Aquí, $\hat{\beta}_2 = 0,4993$ significa que a un aumento de una unidad de x le corresponde, en el ajuste, un aumento de 0,4993 unidades de y . Toda interpretación económica empieza —y muchas veces acaba— aquí. Es también la única columna cuyo valor cambia si cambian las unidades de medida: si midiéramos x en centenares (es decir, $x/100$), el coeficiente se multiplicaría por cien (si un metro cuadrado más sube el precio 2000 euros, cien metros cuadrados más lo suben 200 000).

La *segunda columna* es el error estándar, y responde a una pregunta distinta: no cuánto vale el efecto, sino con cuánta precisión lo hemos medido. Es la columna que se ignora con más frecuencia y la que más falta hace: un coeficiente sin su error estándar es un número sin unidades de incertidumbre, y no se puede evaluar.

La *tercera y la cuarta columnas son derivadas*: se calculan a partir de las dos primeras y no añaden ninguna información que no estuviera ya en ellas. El estadístico t es el cociente de la primera entre la segunda, y el valor p es una transformación monótona de $|t|$ una vez fijados los grados de libertad. Esto tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que conviene hacer la división a mano de vez en cuando: $0,4993/0,0184 = 27,14$, que es el t de la tabla. Es la comprobación más barata que existe contra un error de lectura de columna o contra una tabla mal transcrita en un artículo. La segunda es que, a diferencia del coeficiente, el estadístico t y el valor p *no* cambian si cambian las unidades de medida: el coeficiente y su error estándar se multiplican por el mismo factor y el cociente se conserva. Eso los hace cómodos para comparar y, al mismo tiempo, inservibles para valorar la magnitud del efecto.

El pie de la tabla también informa. El $R^2 = 0,9866$ dice, como sabemos desde la lección 8, que el ajuste reproduce el 98,66 % de la variación total de y —o, equivalentemente, que el ángulo θ es de unos $6,6^\circ$ —. Y $\mathfrak{s} = 1,1001$ es la estimación de la desviación típica de la perturbación, expresada en las mismas unidades que y : un dato útil, porque permite juzgar si el ruido es grande o pequeño *en términos del problema*, algo que el R^2 , al ser un número adimensional, no dice. Podemos comprobar aquí la identidad de la sección “Lectura geométrica: la razón de catetos”: $\sqrt{(n - k)} \text{SEC} / \text{SRC} = \sqrt{10 \cdot 891,30 / 12,10} = 27,14$, que es exactamente el $|t|$ de la tabla.

Queda el aviso terminológico, que en español es más necesario que en inglés. En la salida original de Gretl aparecen, en sitios distintos, “S.D. dependent var” (la desviación típica de la variable dependiente: una dispersión de *datos*), “S.E. of regression” (nuestra $\mathfrak{s}$: una estimación de la desviación típica de la *perturbación*) y la columna “Std. Error” de cada coeficiente (el error estándar propiamente dicho: la dispersión de un *estimador*). Son tres cantidades conceptualmente distintas, y la traducción española tiende a rotular las tres con alguna variante de “desviación típica”, de modo que la distinción entre *desviación típica* y *error estándar* —que en inglés está en el propio nombre— se pierde. Al leer una salida en español conviene identificar cada una por su posición, no por su etiqueta.⁶

⁶Hay, de hecho, una relación bonita entre las dos primeras. La “desviación típica de la variable dependiente” que

Una última observación sobre los artículos y los informes ajenos. Muchos no publican las cuatro columnas: es habitual dar el coeficiente y, debajo, entre paréntesis, el error estándar —o, en algunas tradiciones, el estadístico t —, con asteriscos que codifican niveles de significación. Antes de interpretar nada hay que averiguar qué contiene el paréntesis, porque la diferencia es enorme: un 0,02 bajo un coeficiente de 0,5 significa una estimación muy precisa si es un error estándar, y una estimación pésima si es un estadístico t . La nota al pie de la tabla lo suele decir; si no lo dice, la división a mano lo resuelve.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 4, sección 4.6 (cómo se informan los resultados de una regresión, y cómo leer las convenciones habituales de presentación).

9 Significación estadística $\neq$ relevancia económica

La identidad de la sección “Lectura geométrica: la razón de catetos” lo explica sin necesidad de moraleja: $|t|$ mezcla *fuerza de la relación* con *cantidad de evidencia*.

n	R^2	θ	$ t $	Veredicto al 5 %
3	0,90	18,4°	3,00	no significativo ($t_c = 12,71$)
5	0,90	18,4°	5,20	significativo ($t_c = 3,18$)
1002	0,01	84,3°	3,18	significativo ($t_c = 1,96$)

Mismo ángulo, veredicto opuesto (filas 1 y 2). Y un ángulo de 84° —casi ortogonal, R^2 del 1 %— resulta significativo con mil observaciones (fila 3).

Qué mirar en su lugar: el coeficiente en las unidades del problema; el intervalo de confianza; el R^2 . La significación dice si el efecto es *distinguible de cero*, no si es *grande*.

Y tres avisos más: “no rechazar” no es “aceptar”; el valor p no es la probabilidad de que H_0 sea cierta; nada de esto establece causalidad.

Significación estadística $\neq$ relevancia económica

Esta es la transparencia más importante de la sesión, y la más útil fuera del curso. Su contenido se resume en una frase: “*significativo*” no quiere decir “*grande*”. No hace falta apelar a la experiencia para justificarla: se lee en la identidad que obtuvimos en la sección “Lectura geométrica: la razón de catetos”.

Recordémosla: $|t| = \sqrt{n-k} \cdot \sqrt{\text{SEC}/\text{SRC}}$. El estadístico de contraste es el producto de dos factores que miden cosas completamente distintas. El segundo mide la *fuerza de la relación* en la muestra: el ángulo, el R^2 , la razón de catetos. El primero solo cuenta *observaciones*. Un $|t|$ grande puede deberse a cualquiera de los dos, y el estadístico no distingue entre ellos: con suficientes observaciones, una relación arbitrariamente débil produce un $|t|$ arbitrariamente grande. Decir “el coeficiente es significativo” es, por tanto, decir algo sobre el producto de los dos factores, no sobre el efecto.

imprimen los programas es $\sqrt{\text{STC}/(n-1)}$, es decir, *exactamente* la misma fórmula que $s = \sqrt{\text{SRC}/(n-k)}$ evaluada en el modelo con un único regresor, la constante ($k=1$): en ese modelo el ajuste es el vector de medias y el residuo es el vector en desviaciones, luego $\text{SRC} = \text{STC}$ y $n-k = n-1$. La “dispersión de los datos” es, por tanto, el caso degenerado de la “dispersión residual” cuando el modelo no aporta nada más que la media.

La tabla de la transparencia lleva esto al extremo con tres casos, calculados y no estimados a ojo. Las dos primeras filas tienen el *mismo* R^2 de 0,90 —el mismo ángulo de $18,4^\circ$, la misma fuerza de relación en la muestra— y veredictos opuestos: con $n = 3$ el estadístico vale 3,00 frente a un valor crítico de 12,71, y no se rechaza; con $n = 5$ vale 5,20 frente a 3,18, y se rechaza. La tercera fila hace el recorrido inverso: un R^2 del 1 % —un ángulo de $84,3^\circ$, prácticamente ortogonal, una relación casi inexistente— resulta significativo al 5 % en cuanto hay mil observaciones. Esta última situación no es una curiosidad de laboratorio: es lo que ocurre al trabajar con las bases de datos grandes que hoy son habituales, donde casi cualquier coeficiente resulta significativo y la significación deja, en consecuencia, de aportar información.

¿Qué mirar entonces? Tres cosas, por orden. *Primera*: el coeficiente, en las unidades del problema, y preguntarse si su magnitud es económicamente apreciable. Un efecto de dos céntimos sobre el salario mensual puede ser significativísimo y no interesarle a nadie; un efecto de doscientos euros puede no ser significativo y merecer toda la atención: lo razonable es buscar una muestra mayor, que permita saber si el efecto es real o solo el producto de unos pocos datos poco representativos. Esta lectura del tamaño del coeficiente es un hilo que recorrerá el resto del curso: al introducir modelos con logaritmos y variables dicotómicas, buena parte del trabajo consistirá precisamente en saber qué significa $\hat{\beta}_j$ en cada caso (un cambio absoluto, un cambio porcentual, una elasticidad, un desplazamiento). *Segunda*: el intervalo de confianza, que dice de una vez si el efecto es distinguible de cero y con qué margen; el panel izquierdo de la figura de la sección “El intervalo de confianza” era un caso claro de resultado significativo e informativo de casi nada. *Tercera*: el R^2 , con toda la cautela que ya le pusimos en la lección 8 —no es una medida de calidad del modelo, y un R^2 alto puede ser puramente espurio—, pero que al menos informa de la fuerza de la relación sin mezclarla con el tamaño de la muestra.

Los tres avisos del último fragmento son los errores de lectura más frecuentes.

“*No rechazar*” no es “*aceptar*”. Cuando el contraste no rechaza $H_0 : \beta_2 = 0$, lo correcto es decir que los datos son compatibles con que β_2 sea cero; no que β_2 sea cero. La diferencia es la que hay entre “no he encontrado pruebas” y “he probado que no hay nada”. Un contraste no rechaza por dos motivos muy distintos: porque el efecto es realmente nulo, o porque no hay evidencia suficiente para detectarlo —regresor poco disperso, muestra pequeña, mucho ruido—. El intervalo de confianza permite distinguir los dos casos: un intervalo estrecho alrededor del cero es informativo (“si hay efecto, es pequeño”); un intervalo ancho que contiene al cero no dice casi nada. Por eso, ante un resultado no significativo, la pregunta útil no es “¿acepto H_0 ?” sino “¿qué anchura tiene mi intervalo?”.

El valor p no es la probabilidad de que H_0 sea cierta. Es la probabilidad de observar unos datos al menos tan extremos como los observados *suponiendo que H_0 es cierta*. Las dos cosas se parecen en la redacción y no tienen nada que ver: la primera exigiría una distribución de probabilidad sobre las hipótesis, que en este marco no existe — β_2 es un número fijo, como ya discutimos con el intervalo—. Un valor p de 0,03 no significa “hay un 3 % de probabilidad de que el regresor no importe”. Significa: “si el regresor no importara, datos como estos aparecerían el 3 % de las veces”.

Nada de esto establece causalidad. El contraste t se pronuncia sobre un coeficiente de un ajuste; de si ese coeficiente mide un efecto causal no dice, ni puede decir, absolutamente nada. Es la misma advertencia de la lección 9 —la descomposición ortogonal no implica causalidad— y de la lección 8 —las correlaciones espurias cumplen la identidad de Pitágoras con la misma fuerza

matemática que las relaciones sensatas—. Un coeficiente significativo en una relación espuria es igual de significativo. La significación mide la compatibilidad de los datos con una hipótesis sobre un parámetro; la causalidad es una cuestión ajena, que exige teoría y, sobre todo, un diseño que permita sostenerla.

Conviene añadir un cuarto aviso, que apunta ya a las dos lecciones siguientes. Los contrastes t que hemos construido son *individuales*: cada uno se pronuncia sobre un coeficiente, por separado. Y en regresión múltiple puede ocurrir que ningún coeficiente sea individualmente significativo y que, sin embargo, los regresores en conjunto sí expliquen el regresando: eso es lo que detecta el contraste F de la próxima lección. Suele ser síntoma de que dos o más regresores apuntan en direcciones muy próximas y el ajuste no puede repartir el efecto entre ellos con precisión —la colinealidad, a la que dedicaremos otra lección—. Dicho en el lenguaje de hoy: no es que falte relación, es que a cada regresor le queda poca longitud *propia* con la que medirse.

Y, para cerrar, una observación sobre el supuesto de normalidad con el que abrimos la sesión. En el laboratorio anterior vimos que, con $n = 506$, el histograma de las estimaciones parecía normal aunque la perturbación no lo fuera, mientras que con $n = 12$ dejaba de ser normal. Eso no era casualidad: el teorema central del límite garantiza que, al crecer la muestra, la distribución de $\hat{\beta}_2$ se aproxima a la normal aunque U no sea normal. La consecuencia práctica es tranquilizadora y conviene conocerla: en muestras grandes, los contrastes t y los intervalos de confianza de esta lección siguen siendo aproximadamente válidos sin el supuesto de normalidad. En muestras pequeñas, en cambio, ese supuesto es el que sostiene el resultado *exacto*, y si falla, el valor p que imprime el programa puede estar bastante equivocado.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 4, sección 4.2f (significación económica frente a significación estadística: el epígrafe que más conviene leer de todo el capítulo); y cap. 5, sección 5.2 (normalidad asintótica de MCO y validez aproximada de los contrastes en muestras grandes).

10 Recapitulación y guiño a las sesiones siguientes

Pieza	Fórmula	Lectura geométrica
Error estándar	$\mathbf{s}/\ \mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\ _e$	tamaño estimado del ruido por unidad de longitud del regresor
Estadístico t	$\hat{\beta}_2/\text{ee}(\hat{\beta}_2)$	$\sqrt{n - k} \times$ razón de catetos
Grados de libertad	$n - k$	dimensión del subespacio donde vive el residuo
Región crítica	$ t > t_c$	cono alrededor de la dirección del regresor
Intervalo de confianza	$\hat{\beta}_2 \pm t_c \cdot \text{ee}(\hat{\beta}_2)$	haz de pendientes compatibles

Un solo supuesto nuevo (normalidad); todo lo demás venía de las lecciones 8 y 11.

Lección 13: el mismo cociente de catetos, con dos divisores en lugar de uno, es el contraste F —que juzga varios regresores a la vez—. En regresión simple, $F = t^2$.

Más adelante: con k regresores, $\text{ee}(\hat{\beta}_j) = \mathbf{s}/\|\tilde{\mathbf{x}}_j\|_e$, donde $\tilde{\mathbf{x}}_j$ es lo que le queda de *propio* al regresor j tras descontar lo que comparte con los demás. Cuando dos regresores casi se solapan, esa

longitud se acorta: colinealidad.

Recapitulación y guiño a las sesiones siguientes

El balance de esta sesión es parecido al de la lección 11: mucho resultado con poco ingrediente nuevo. El único supuesto añadido ha sido la normalidad de la perturbación, y su único cometido ha sido dar *forma* a una distribución cuyos dos primeros momentos ya conocíamos. Todo lo demás —el triángulo, las sumas de cuadrados, el R^2 , la varianza de $\hat{\beta}_2$, la cuasivarianza de los residuos con su divisor $n - k$ — estaba ya sobre la mesa desde las lecciones 8 y 11.

La tabla resume las cinco piezas y su lectura geométrica. Conviene subrayar el patrón que las recorre: todas ellas son, en el fondo, comparaciones de longitudes dentro del plano de las desviaciones. El error estándar compara el ruido con la longitud del regresor; el estadístico t compara los dos catetos del triángulo; el intervalo de confianza convierte esa comparación en un abanico de pendientes; los grados de libertad cuentan las dimensiones disponibles para el residuo; y la región crítica es un cono cuya abertura fija el valor crítico. No hay, en toda la inferencia de esta lección, ningún objeto que no pueda mirarse así.

Dos hilos quedan abiertos, y los dos salen de la misma identidad.

El primero apunta a la lección siguiente. El cociente SEC/SRC que hoy ha aparecido dentro de t^2 no es propiedad del contraste t : es el cociente que compara la parte explicada con la parte no explicada, y admite una versión más general en la que cada una se divide por sus propios grados de libertad. Ese cociente —SEC/($k - 1$) frente a SRC/($n - k$)— es el *estadístico F*, que permite juzgar varios regresores a la vez en lugar de uno por uno. En el caso de hoy, con un único regresor no constante, $k - 1 = 1$ y el F coincide con t^2 : el mismo objeto con otro nombre. La figura del triángulo servirá, sin cambiar un trazo, para la próxima lección.

El segundo apunta algo más lejos. Todo lo de hoy se ha demostrado para $k = 2$, con un único regresor no constante, porque solo en ese caso el cateto explicado es un múltiplo del regresor. Con más regresores, la fórmula del error estándar sigue teniendo la misma estructura —un cociente de longitudes—, pero el denominador cambia de una manera muy instructiva: en lugar de la longitud del regresor en desviaciones, aparece la longitud de $\tilde{\mathbf{x}}_j$, la parte del regresor j que *no* se puede reconstruir a partir de los demás regresores. Lo enunciamos aquí sin demostrarlo:

$$\text{ee}(\hat{\beta}_j) = \frac{\mathbf{s}}{\|\tilde{\mathbf{x}}_j\|_e}.$$

La lectura es inmediata y anticipa un problema que trataremos con detalle: si el regresor j es casi una combinación lineal de los demás —si apunta casi en la misma dirección que ellos—, entonces $\tilde{\mathbf{x}}_j$ es muy corto, el error estándar se dispara y el coeficiente se estima con muy poca precisión. No porque falte información en los datos, sino porque esa información no permite separar el efecto de ese regresor del de sus compañeros. Es la *colinealidad*, y es la traducción exacta, en el lenguaje de los ángulos de este curso, de lo que en la transparencia del intervalo de confianza vimos con un solo regresor: para medir bien el efecto de una variable hace falta que esa variable varíe *por su cuenta*.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 4, sección 4.5 (el contraste F , con el que arranca la lección siguiente); y cap. 3, sección 3.4 (varianza de los estimadores MCO en regresión múltiple y el papel de la colinealidad).