Índice general

1 De dónde venimos: una pregunta pendiente **2**

2 El marco: muestra aleatoria **3**

3 $\hat{\beta}_2$: la misma fórmula, aplicada a variables aleatorias **6**

4 Dos propiedades de los pesos **8**

5 Sustituyendo el modelo poblacional **10**

6 Insesgadez: $\mathrm{E}(\hat{\beta}_2) = \beta_2$ **11**

7 Varianza: cuán dispersas están las estimaciones **12**

8 MCO es BLUE; estimando σ^2 **15**

9 ¿Y con más regresores? **17**

10 Recapitulación y guiño a la sesión siguiente **19**

11 Apéndice: lanzar una moneda infinitas veces **20**

Lección 11. ¿Es $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ un buen estimador? Insesgadez y varianza

Marcos Bujosa

29 de octubre de 2026

Resumen

¿Es $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ un buen estimador de $\boldsymbol{\beta}$? Para el modelo lineal simple: $\hat{\beta}_2$ es insesgado y calculamos su varianza, *reutilizando* la fórmula de la lección 7 sobre variables aleatorias.

"¿Es bueno un estimador? ¿Está bien centrado? ¿Cuánto se dispersa?"

- (slides) — (html) — (pdf)

1 De dónde venimos: una pregunta pendiente

Recordemos cómo cerraba la lección 10: *"¿es $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ un buen estimador del verdadero $\boldsymbol{\beta}$?"*

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$, calculados primero con argumentos geométricos sobre los vectores de datos, se reinterpretaron después como *estimadores* de β_1, β_2 por el método de los momentos.

Hoy, para el modelo lineal simple (constante *1* más un regresor *no constante* X), demostraremos dos propiedades de $\hat{\beta}_2$:

1. *Insesgadez*: $\mathrm{E}(\hat{\beta}_2) = \beta_2$.
2. *Varianza*: una fórmula exacta de $Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}]$.

Nos centramos en $\hat{\beta}_2$ (la pendiente, de mayor interés económico); los mismos argumentos, sobre la fórmula $\hat{\beta}_1$, permiten probar la insesgadez de $\hat{\beta}_1$; no los desarrollamos aquí para no ser repetitivos.

Ningún ingrediente geométrico nuevo: la fórmula de $\hat{\beta}_2$ que obtuvimos por geometría, la reutilizamos hoy tal cual, evaluada sobre variables aleatorias en lugar de sobre datos: *una fórmula aritmética vieja, aplicada sobre un objeto nuevo.*

De dónde venimos: una pregunta pendiente

Esta sesión responde a una pregunta que quedó abierta en las lecciones 9 y 10. En la lección 9 ("El puente") dimos sentido, por primera vez, a la pregunta "¿$\hat{\beta}_2$ estima bien al verdadero β_2 poblacional?", al construir el modelo poblacional $Y = \beta_1\, 1 + \beta_2 X + U$ y reinterpretar las fórmulas de la lección 7 como estimadores por el método de los momentos. En la lección 10 (regresión múltiple) esa misma pregunta se generalizó a k regresores, pero se dejó sin respuesta: una sola frase en la

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

recapitulación, sin fórmula ni supuestos generalizados. Hoy la retomamos en detalle en el caso más sencillo, $k = 2$: la constante *1* y un único regresor no constante X.

La estrategia de esta sesión no introduce ninguna geometría nueva. Vamos a reutilizar, tal cual, la fórmula de $\hat{\beta}_2$ de la lección 7, covarianza sobre varianza, obtenida de las dos condiciones del residuo: media cero y ortogonalidad al regresor. Esa fórmula, una vez concluido el cálculo geométrico, quedó escrita como una expresión puramente aritmética: una suma de productos dividida por una suma de cuadrados. Precisamente por ser aritmética, y ya no geométrica, podemos evaluarla en cualquier conjunto de argumentos siempre que las operaciones estén bien definidas. Hoy evaluaremos la fórmula, en lugar de con datos fijos $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n$, con la muestra aleatoria $X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_n$. El resultado de esa sustitución ya no es un número: es una nueva variable aleatoria, el *estimador* $\hat{\beta}_2(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y})$.

Conviene advertir que la lección de hoy no se basa en argumentos geométricos. Lo único que hacemos hoy es sustituir números por variables aleatorias dentro de una fórmula ya conocida. Es una operación distinta de una demostración geométrica, y no exige comprobar ninguna propiedad de producto escalar: es la diferencia entre demostrar un teorema y usar en otro contexto la fórmula que el teorema produjo.

También conviene precisar el alcance de esta sesión: demostramos insesgadez y la expresión de la varianza *solo* para $\hat{\beta}_2$ en la regresión con dos regresores (modelo lineal simple). La generalización a k regresores existe: la citaremos al final de la sesión en su forma matricial, sin demostrarla, porque requiere álgebra que este curso no desarrolla; la insesgadez y la varianza de cada coeficiente por separado sí están demostradas sin matrices en el apéndice (sección 7.1) (html). Lo que sí haremos, como cierre, es comprobar que la fórmula general, evaluada en el caso particular $k = 2$, coincide con lo que aquí probamos sin matrices.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, sección 2.5: insesgadez y varianza de los estimadores MCO en regresión simple (Teoremas 2.1 y 2.2).

2 El marco: muestra aleatoria

Recordemos (lección 9): los n datos son n copias idénticas e independientes de Y; hoy, del par (X, U).

$\boldsymbol{X}$: la *versión aleatoria* de $\mathbf{X} = [\mathbf{1};\ \boldsymbol{x}]$, con columnas *1* ($n$ copias) y $X_1, \ldots, X_n$. Análogamente $\boldsymbol{Y} = (Y_1, \ldots, Y_n)$ y $\boldsymbol{U} = (U_1, \ldots, U_n)$. Para cada i: $Y_i = \beta_1\, 1 + \beta_2 X_i + U_i$, con los tres supuestos de la lección 9, condicionando ahora en $\boldsymbol{X}$.

Lo nuevo es el **muestreo aleatorio**: las n copias (X_i, U_i) son independientes entre sí. Dos consecuencias:

- $E[U_i \mid \boldsymbol{X}] = 0$: $U_i \perp$ funciones de X_i (*por definición*) y de las demás copias (*por independencia*).
- Perturbaciones de observaciones distintas, incorreladas: $Cov[U_i, U_j \mid \boldsymbol{X}] = 0 \quad (i \neq j)$.

  Condicionar en $\boldsymbol{X}$: la esperanza condicional de la lección 9, sobre las n copias a la vez.

El marco: muestra aleatoria

La lección 9 introdujo, sin desarrollarla, una frase que hoy se convierte en el ingrediente central de la sesión: "asumiremos que nuestros n datos son el resultado de observar la realización de n copias idénticas e independientes de esa variable Y". Allí solo servía para interpretar cada dato y_i como la realización de una variable aleatoria. Hoy hace falta más, porque para hablar de la *distribución* de $\hat{\beta}_2$, de cuánto varía de una muestra a otra, hay que imaginar que la muestra podría haber sido distinta.

Formalicemos esa idea. Desde la lección 4 venimos usando $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ para el vector de datos observados (y, desde la lección 6, para el vector de datos observados de un *regresor*), y en la lección 10 los agrupamos en la matriz de regresores $\mathbf{X}$, una columna por regresor (en el modelo lineal simple, $\mathbf{X} = [\mathbf{1};\ \boldsymbol{x}]$). Hoy introducimos su análogo aleatorio: la matriz[1] $\boldsymbol{X}$. Este es el objeto sobre el que condicionaremos todos los momentos a lo largo de la sesión. Cada columna de $\boldsymbol{X}$ corresponderá al muestreo de uno de los regresores poblacionales. En el modelo lineal simple son *1* y X; por tanto, la segunda columna de $\boldsymbol{X}$ está formada por las n variables aleatorias $X_1, \ldots, X_n$: cada una es una copia idéntica e independiente de la variable poblacional X de la lección 9,[2] y la primera está formada por n copias de *1*. Es la relación dato/variable aleatoria de la lección 9, entre y_i e Y, aplicada a cada componente de cada columna.




Figura 1: La matriz de copias. Cada fila es una copia de la variable aleatoria X, una función sobre Ω; la matriz continúa hacia abajo indefinidamente. Elegir n filas es fijar la muestra aleatoria; elegir una sección vertical (una "columna") es fijar un suceso elemental ω donde evaluar las infinitas copias; las dos cosas a la vez (elegir n copias y evaluarlas en ω) dan el vector de $\mathbb{R}^n$ de la derecha: la muestra, es decir, una realización de la muestra aleatoria en ese ω. Los datos observados son dicha muestra, y aparecen dispuestos en el vector $\boldsymbol{x}$ de la derecha.

[1] Denotada en negrita cursiva pero sin letra de palo seco (reservada para las matrices con números).

[2] Copias idénticas quiere decir con la misma distribución, no la misma función sobre Ω: dos copias independientes toman, en general, valores distintos en un mismo suceso elemental. Qué son las copias y de dónde salen está en el apéndice, secciones 2 (html) y 3.

Mire la figura de la matriz de copias como lo que es: una tabla. Cada fila es una copia de la variable X, es decir, una función que a cada suceso elemental ω le asigna un número. Una sección vertical corresponde a la evaluación de las variables aleatorias en un mismo suceso elemental ω. La casilla donde se cruzan la fila i y la sección vertical por ω contiene el número $X_i(\omega)$, el valor que la copia i toma en ese suceso elemental ω. Como hay tantas copias de X como se quiera, la tabla continúa hacia abajo sin fin.

Con esa lectura, los dos objetos de la sesión se ven en la tabla. Elegir n filas es elegir n copias, $X_1, \ldots, X_n$: esa lista de n funciones es la *muestra aleatoria*. No es un vector de $\mathbb{R}^n$, porque los componentes de la lista son funciones, no números. Evaluar esas n funciones en un mismo suceso elemental ω es seleccionar una sección vertical de la figura, que podemos entender como una "columna": se obtienen n números, $X_1(\omega), \ldots, X_n(\omega)$, que son las componentes del vector de $\mathbb{R}^n$ dibujado a la derecha. Ese vector es la *muestra*: los datos observados del regresor, el $\boldsymbol{x}$ de las lecciones anteriores. Otras n filas evaluadas en ese mismo ω dan otro vector de datos: la tabla tiene filas de sobra, y en lo que sigue "otra muestra" es siempre otro bloque de n filas en la misma columna. Y cuando en el laboratorio de la sesión siguiente repitamos un experimento dos mil veces (actividad 3 (html) de la práctica A de la sesión 16), lo leeremos así: Gretl consume una única secuencia de números pseudoaleatorios, un solo ω, y toma de ella dos mil bloques sucesivos de n filas; como los bloques son copias independientes, el histograma de las dos mil estimaciones aproxima la distribución de $\hat{\beta}_2$. El apéndice (sección 3) (html) desarrolla esta lectura.

Una precisión de uso. Durante casi toda la sesión no haremos ninguna operación matricial con $\boldsymbol{X}$: bastarán sumatorios sobre las X_i, y "condicionar en $\boldsymbol{X}$" significará proyectar sobre el espacio de las funciones de todas las variables aleatorias de $\boldsymbol{X}$ a la vez. La estructura de matriz reaparece al justificar el divisor $n-k$ y en la generalización final a k regresores.

Para cada observación i, el modelo poblacional de la lección 9 se aplica sin ningún cambio, con subíndice i añadido:

$$Y_i = \beta_1\, 1 + \beta_2 X_i + U_i, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

con los tres supuestos del Modelo Clásico de Regresión Lineal aplicados a cada par (X_i, U_i): linealidad, independencia lineal ($\mathrm{Var}(X) \neq 0$) y homocedasticidad $Var[U_i \mid \boldsymbol{X}] = \sigma^2\, 1$; más la exogeneidad estricta $E[U_i \mid \boldsymbol{X}] = 0$, que en la lección 9 obteníamos sin supuesto adicional.[3]

Sobre el supuesto $\mathrm{Var}(X) \neq 0$ conviene una precisión, porque es fácil que el símbolo "X" induzca a confusión una vez que ya solo hablamos de $X_1, \ldots, X_n$. La letra X, sin subíndice, sigue denotando, como en la lección 9, la variable poblacional de la que $X_1, \ldots, X_n$ son copias. El supuesto $\mathrm{Var}(X) \neq 0$ se enuncia sobre esa variable poblacional, y se aplica a cada copia X_i porque, al ser copias idénticas, cada X_i tiene la misma distribución que X (y, en particular, la misma varianza).

Fíjese que la exogeneidad estricta tampoco es introducida aquí como un supuesto adicional,

[3] Ese "sin supuesto adicional" merece hoy una precisión que en la lección 9 no hacía falta. Allí $U = Y - E[Y \mid X]$ era ortogonal *por construcción* a toda función de X, y de ahí salía $E[U \mid X] = 0$. Hoy condicionamos en toda la matriz $\boldsymbol{X}$, las n copias a la vez, y la definición de U_i solo garantiza la ortogonalidad a las funciones de X_i; sobre las funciones de las demás copias, X_j con $j \neq i$, no dice nada. Lo que falta lo da el muestreo aleatorio: la copia (X_i, U_i) es independiente de las demás, y la independencia, leída con el producto escalar del curso, es ortogonalidad entre sus funciones centradas. Con ello U_i resulta ortogonal a toda función de $\boldsymbol{X}$, que es lo que dice $E[U_i \mid \boldsymbol{X}] = 0$. La demostración, que obtiene del mismo modo la homocedasticidad y la incorrelación condicionadas a $\boldsymbol{X}$, está en el apéndice, sección 6.1 (html).

aunque hoy descansa sobre dos propiedades del modelo (en lugar de solo una): en primer lugar, la definición de U_i da $U_i \perp$ funciones de X_i; y, en segundo lugar, el muestreo aleatorio da $U_i \perp$ funciones de las demás copias X_j con $j \neq i$. Esta es la primera consecuencia que extraemos del muestreo aleatorio; la segunda viene a continuación.

La segunda consecuencia del muestreo aleatorio es aún más directa: si (X_i, U_i) y (X_j, U_j) son independientes para $i \neq j$, entonces, en particular, U_i y U_j son independientes, y dos variables independientes tienen covarianza cero:[4]

$$Cov[U_i, U_j \mid \boldsymbol{X}] = 0 \qquad (i \neq j).$$

No se trata, por tanto, de un supuesto añadido *ex novo*: es la traducción, en términos de covarianzas, de algo que ya habíamos dado por sentado desde la lección 9 al hablar de copias "idénticas e independientes" (lo que su curso de Estadística del cuatrimestre anterior llamaba *muestreo aleatorio simple*). Hoy es la primera vez que necesitamos esta consecuencia de forma explícita, porque es la primera vez que trabajamos con *varias* perturbaciones $U_1, \ldots, U_n$ simultáneamente, en lugar de con una sola U genérica. En el lenguaje de la lección 9: dadas $\boldsymbol{X}$, las perturbaciones $U_1, \ldots, U_n$ son una familia ortogonal de variables aleatorias de la misma longitud σ. Es todo lo que usan la insesgadez y la varianza de esta sesión; la independencia completa, que es más, solo hará falta en la lección 12 (apéndice, secciones 6.1 (html) y 7.1).

Por último, nótese que, al enunciar el supuesto de homocedasticidad, la varianza de cada U_i se condiciona a *toda* la matriz $\boldsymbol{X}$; esta condición es más fuerte que condicionar solo sobre X_i. Es la condición que hace falta para todo lo que sigue (ni es un corolario de la definición de U_i ni tampoco del muestreo aleatorio simple) y la estamos *imponiendo* directamente en esa forma más fuerte.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, sección 2.5, supuesto SLR.2 (muestreo aleatorio).

3 $\hat{\beta}_2$: la misma fórmula, aplicada a variables aleatorias

Estimación vs. estimador (distinción hoy imprescindible):

- $\hat{\beta}_2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$, la *estimación*: un número.
- $\hat{\beta}_2(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y})$, el *estimador*: una variable aleatoria, la MISMA fórmula sobre la muestra aleatoria.

Recordando la lección 7 ($\hat{\beta}_2 = \sigma_{\boldsymbol{xy}}/\sigma^2_{\boldsymbol{x}}$, escrita con sumatorios):

$$\hat{\beta}_2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \frac{\sum_i (x_i - \mu_{\boldsymbol{x}}) y_i}{\sum_j (x_j - \mu_{\boldsymbol{x}})^2} = \sum_i w_i y_i; \quad \text{donde } w_i = \frac{(x_i - \mu_{\boldsymbol{x}})}{\sum_j (x_j - \mu_{\boldsymbol{x}})^2}.$$

Sustituimos x_i, y_i por X_i, Y_i:

[4] *Notación.* Esta es la primera vez en el curso que aparece una covarianza *condicionada*. Sigue el mismo convenio que ya fijamos en la lección 9 para la esperanza y la varianza: $\mathrm{Cov}(\cdot,\cdot)$, con paréntesis y en recta, es un *número* (la covarianza no condicionada); $Cov[\cdot,\cdot \mid \cdot]$, con corchetes y en cursiva, es una *variable aleatoria*, una función de aquello sobre lo que se condiciona. Su definición es la análoga de la varianza condicional: $Cov[Z, W \mid \boldsymbol{X}] = E\big[(Z - E[Z \mid \boldsymbol{X}])(W - E[W \mid \boldsymbol{X}]) \mid \boldsymbol{X}\big]$. La usaremos efectivamente al calcular la varianza de $\hat{\beta}_2$.

$$\hat{\beta}_2(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}) = \frac{\sum_i (X_i - \overline{X})Y_i}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2} = \sum_i W_i Y_i; \quad \text{donde } W_i = \frac{(X_i - \overline{X})}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2}.$$

donde $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_i X_i$ es la *media muestral*; y $\sum_i (X_i - \overline{X}) = 0$.

$\hat{\beta}_2$: la misma fórmula, aplicada a variables aleatorias

Antes de seguir, conviene fijar una distinción que hasta ahora el curso no había requerido. Cuando escribimos $\hat{\beta}_2 = \frac{\sigma_{\boldsymbol{xy}}}{\sigma^2_{\boldsymbol{x}}} = \frac{\sum_i (x_i - \mu_{\boldsymbol{x}})y_i}{\sum_j (x_j - \mu_{\boldsymbol{x}})^2}$ (lección 7 (html)) y evaluamos esa fórmula con dos vectores de datos concretos $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$, obtenemos un *número*: la *estimación* $\hat{\beta}_2$ de β_2. Si aplicamos la misma fórmula a las muestras aleatorias $\boldsymbol{X}$ y $\boldsymbol{Y}$, el resultado es una función de variables aleatorias, es decir, una variable aleatoria[5]: el *estimador* $\hat{\beta}_2$ de β_2.[6]

Su curso de Estadística ya hizo esta distinción con la media: sus tablas tenían tres columnas, parámetro, estimador y estimación, con μ, la media muestral y el número calculado con los datos. Hoy es la misma tabla con β_2, $\hat{\beta}_2(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ y $\hat{\beta}_2(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$. Una diferencia de escritura: allí la media muestral se escribía casi siempre $\bar{x}$, fuese un número o una variable aleatoria; aquí la variable aleatoria se escribe con mayúscula, $\overline{X}$, y la minúscula, $\mu_{\boldsymbol{x}}$, es siempre un número.

Precisemos qué significa "sustituir datos por variables aleatorias en una fórmula". Una fórmula como $\mu_{\boldsymbol{x}} = f(x_1,\ldots,x_n) = \frac{1}{n}\sum_i x_i$ es, matemáticamente, una función que toma n números y devuelve un solo número: *la media*. Pero nada impide evaluar esa MISMA fórmula con otro tipo de argumento (si la operación sigue estando bien definida): si en lugar de n números sus argumentos son n variables aleatorias $X_1,\ldots,X_n$, el resultado $f(X_1,\ldots,X_n) = \frac{1}{n}\sum_i X_i$ ya no es un número, ahora es una variable aleatoria. A esta nueva variable aleatoria la llamamos *media muestral*, y la denotamos con $\overline{X}$; es el estimador natural del valor esperado $\mathrm{E}(X)$. Su definición emplea la MISMA fórmula aritmética que en la lección 4 usamos para definir la media de un vector de datos, pero ahora la fórmula es aplicada a la muestra aleatoria, las n variables aleatorias $X_1,\ldots,X_n$ (de ahí el nombre de *media muestral*).

Esta observación guía toda la sesión, y no encierra más complejidad que la enunciada: nos limitamos a definir nuevas variables aleatorias mediante la aplicación de fórmulas preexistentes (desarrolladas en su momento en $\mathbb{R}^n$) a una muestra aleatoria. Dichas variables aleatorias se conocen como *estadísticos* o *estadísticos muestrales*.

Con esto aclarado, retomamos la fórmula de la pendiente de la lección 7, $\hat{\beta}_2 = \sigma_{\boldsymbol{xy}}/\sigma^2_{\boldsymbol{x}}$, obtenida de las dos condiciones del residuo. La vía alternativa (html) de esa lección la escribió como cociente de productos escalares, cambiando a los generadores ortogonales $\mathbf{1}$ y $\boldsymbol{x} - \mu_{\boldsymbol{x}}\mathbf{1}$: para dos vectores de datos $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$,

$$\hat{\beta}_2(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \frac{\langle \boldsymbol{y}, (\boldsymbol{x} - \mu_{\boldsymbol{x}}\mathbf{1})\rangle_s}{\langle (\boldsymbol{x} - \mu_{\boldsymbol{x}}\mathbf{1}), (\boldsymbol{x} - \mu_{\boldsymbol{x}}\mathbf{1})\rangle_s} = \frac{\sum_i (x_i - \mu_{\boldsymbol{x}})y_i}{\sum_j (x_j - \mu_{\boldsymbol{x}})^2}.$$

El lado izquierdo de esta igualdad ($\langle\cdot,\cdot\rangle_s$) es geometría: un cociente de dos productos escalares, con todo su significado y papel en la proyección ortogonal. El lado derecho, en cambio, ya no

[5] Una función de $\omega \in \Omega$, donde Ω es el espacio de sucesos.

[6] En la literatura estadística y econométrica es costumbre usar la misma notación para ambos objetos (la estimación y el estimador), pero recuerde que son muy distintos (un número el primero y una variable aleatoria el segundo).

necesita esos conceptos para ser evaluado: es una simple expresión aritmética (los factores $1/n$ de cada producto escalar se cancelan al dividir, así que ni siquiera hace falta escribirlos). Hoy nos quedamos con esta expresión aritmética, prescindiendo de la geometría subyacente, y sustituimos directamente las observaciones x_i, y_i por las variables aleatorias X_i, Y_i; y reescribimos la expresión como una suma ponderada:[7]

$$\hat{\beta}_2(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = \frac{\sum_i (X_i - \overline{X}) Y_i}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2} = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\left(\frac{(X_i - \overline{X})}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2} \right)}_{W_i} Y_i = \sum_{i=1}^{n} W_i Y_i.$$

Escribimos los pesos aleatorios W_i con mayúscula por ser estadísticos (i.e., variables aleatorias).

Respecto a la media muestral, fijémonos que como $\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_i X_i$, entonces, por una parte, $\sum_i X_i = n\overline{X}$ y por otra $\sum_{i=1}^{n} \overline{X} = \underbrace{\overline{X} + \cdots + \overline{X}}_{n \text{ veces}} = n\overline{X}$; así

$$\sum_i (X_i - \overline{X}) = \sum_i X_i - \sum_i \overline{X} = n\overline{X} - n\overline{X} = 0.$$

Usaremos esta propiedad de la *media muestral* en la siguiente transparencia.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, sección 2.5 (donde $\hat{\beta}_2$ se escribe, con la misma idea, como $\sum w_i y_i$ mediante sumatorios).

4 Dos propiedades de los pesos

Dos identidades algebraicas sobre los pesos. Ninguna es nueva.

Ambas valen para *cualquier* lista de números y, por tanto, siguen siendo ciertas al sustituir x_i por X_i: son hechos aritméticos, no probabilísticos:

- la primera es la condición $\sum_i (X_i - \overline{X}) = 0$ de la transparencia anterior (la misma cuenta que en la lección 4 daba media cero al vector en desviaciones);

$$\sum_i W_i = 0;$$

- la segunda es la razón por la que, en la "vía alternativa" de la lección 7, el coeficiente de $\boldsymbol{x} - \mu_{\boldsymbol{x}} \mathbf{1}$ resultaba ser exactamente $\hat{\beta}_2$.

$$\sum_i W_i X_i = 1 \qquad \left(\text{pues } \frac{\sum_i (X_i - \overline{X}) X_i}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2} = \frac{\sum_i (X_i - \overline{X})^2}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2} \right).$$

[7] El nombre correcto de la operación debería ser *forma bilineal definida sobre el anillo de las variables aleatorias*. Pero ese nombre aquí no ayuda, dado el nivel matemático del curso. Tan solo advertir que el nombre de *suma ponderada* es abusivo, pues en la expresión $\sum_{i=1}^{n} W_i Y_i$ no hay "números" que hagan de ponderaciones en la suma de las Y_i; lo que aparece son las variables aleatorias W_i, que son funciones (no números). Por el mismo motivo, tampoco sería correcto usar el nombre de *combinación lineal* de las Y_i.

Dos propiedades de los pesos

Antes de sustituir el modelo poblacional en $\hat{\beta}_2 = \sum_i W_i Y_i$, necesitamos las dos propiedades de los pesos W_i que enuncia la transparencia: $\sum_i W_i = 0$ y $\sum_i W_i X_i = 1$. Las dos se obtienen dividiendo una suma por el denominador común de los pesos, $\sum_j (X_j - \overline{X})^2$: la primera, la suma $\sum_i (X_i - \overline{X}) = 0$ de la transparencia anterior; la segunda, la suma $\sum_i (X_i - \overline{X}) X_i$, que vale $\sum_i (X_i - \overline{X})^2$, como se comprueba más abajo. Ninguna de las dos es nueva, como dice la transparencia: son las mismas sumas que ya hicimos con datos en las lecciones 4 y 7, y lo que se traslada de los datos a las copias es la cuenta aritmética, no la geometría, como explica el párrafo siguiente.

Un punto clave, para no reintroducir la confusión entre estimador y estimación de "$\hat{\beta}_2$: la misma fórmula, aplicada a variables aleatorias": estas dos propiedades no son afirmaciones probabilísticas, sino identidades *algebraicas*. Tome n números cualesquiera $x_1, \ldots, x_n$, su media $\mu_{\boldsymbol{x}}$ y los pesos $w_i = (x_i - \mu_{\boldsymbol{x}}) / \sum_j (x_j - \mu_{\boldsymbol{x}})^2$. Las igualdades $\sum_i w_i = 0$ y $\sum_i w_i x_i = 1$ se cumplen sea cual sea la elección de esos números, iguales o distintos entre sí, positivos o negativos, porque se deducen solo de las definiciones de $\mu_{\boldsymbol{x}}$ y w_i, sin usar ninguna propiedad estadística de los números. Por eso, cuando en lugar de n números ponemos las n copias $X_1, \ldots, X_n$, con $\overline{X}$ en el lugar de $\mu_{\boldsymbol{x}}$ y W_i en el de w_i, las igualdades siguen siendo ciertas sin ningún argumento adicional: en cada suceso elemental ω las copias toman n números, y para ellos la identidad se cumple.[8] Conviene retener la regla, porque se usará muchas veces: por este camino solo pasan las identidades, las igualdades ciertas para toda lista de números. Las tres sumas que usa la lección, $\sum_i W_i$, $\sum_i W_i X_i$ y, más adelante, $\sum_i W_i^2$, pasan por él.

Primera propiedad: $\sum_i W_i = 0$. Como $W_i = \frac{(X_i - \overline{X})}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2}$ y el denominador es común a todos los términos, $\sum_i W_i = \frac{\sum_i (X_i - \overline{X})}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2}$; y donde el numerador sabemos que es nulo: $\sum_i (X_i - \overline{X}) = 0$.

Segunda propiedad: $\sum_i W_i X_i = 1$. Usando de nuevo que $\sum_i (X_i - \overline{X}) = 0$

$$\sum_i (X_i - \overline{X}) X_i = \sum_i (X_i - \overline{X})(X_i - \overline{X} + \overline{X}) = \sum_i (X_i - \overline{X})(X_i - \overline{X}) + \overline{X} \underbrace{\sum_i (X_i - \overline{X})}_{=0};$$

y donde hemos sacado factor común $\overline{X}$ en el sumatorio $\sum_i (X_i - \overline{X})\overline{X}$ para comprobar que es cero.

Por tanto $\sum_i W_i X_i = \frac{\sum_i (X_i - \overline{X}) X_i}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2} = \frac{\sum_i (X_i - \overline{X})^2}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2} = 1$.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, sección 2.5 (donde estas dos propiedades se verifican mediante sumatorios, sin distinguir explícitamente su estatus puramente algebraico).

[8] Con una salvedad: en los sucesos elementales ω en los que las n copias toman el mismo valor, $X_1(\omega) = \cdots = X_n(\omega)$, el denominador $\sum_j \left(X_j(\omega) - \overline{X}(\omega)\right)^2$ vale 0 y $W_i(\omega)$ no está definido. No es que las copias sean iguales como funciones, son copias distintas; es que en esa muestra han tomado todas el mismo valor. Lo que hace tolerable la salvedad es el supuesto $\mathrm{Var}(X) \neq 0$ del modelo, aunque no basta para que ese suceso tenga probabilidad cero. Si X es continua, sí: el denominador es distinto de cero con probabilidad uno. Si X es discreta, no: con X de Bernoulli de parámetro $1/2$, $\mathrm{Var}(X) = 1/4 \neq 0$ y, sin embargo, la probabilidad de que las n copias tomen el mismo valor es $2^{1-n} > 0$. Lo que $\mathrm{Var}(X) \neq 0$ garantiza en general es que esa probabilidad es menor que uno y tiende a cero al crecer n. Todo lo que sigue se entiende condicionado a que el denominador no sea cero, es decir, a que el regresor varíe en la muestra observada, igual que un programa estadístico no calcula la pendiente cuando no varía.

5 Sustituyendo el modelo poblacional

$$\hat{\beta}_2(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = \sum_i W_i Y_i = \sum_i W_i(\beta_1\, 1 + \beta_2 X_i + U_i)$$

$$= \beta_1 \underbrace{\sum_i W_i}_{=0} + \beta_2 \underbrace{\sum_i W_i X_i}_{=1} + \sum_i W_i U_i$$

$$\boxed{\hat{\beta}_2(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{U}) = \beta_2\, 1 + \sum_{i=1}^{n} W_i U_i}$$

(escrito ahora en función de $\boldsymbol{U}$, pues $\boldsymbol{Y}$ ha sido sustituida).

Mediante manipulación algebraica (sustitución y las dos identidades de la transparencia anterior): *el estimador es el parámetro verdadero MÁS una "suma ponderada" de las perturbaciones.* Todo lo que sigue sale de estudiar ese segundo término.

Sustituyendo el modelo poblacional

Gracias a las "Dos propiedades de los pesos", el cálculo que resta es puramente mecánico. Partimos de $\hat{\beta}_2 = \sum_i W_i Y_i$ (sección "$\hat{\beta}_2$: la misma fórmula, aplicada a variables aleatorias") y sustituimos el modelo poblacional $Y_i = \beta_1\, 1 + \beta_2 X_i + U_i$ (sección "El marco: muestra aleatoria") en cada sumando:

$$\hat{\beta}_2(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{U}) = \sum_i W_i(\beta_1\, 1 + \beta_2 X_i + U_i) = \beta_1 \sum_i W_i + \beta_2 \sum_i W_i X_i + \sum_i W_i U_i.$$

El primer término se anula ($\sum_i W_i = 0$); el segundo se reduce exactamente a $\beta_2\, 1$ ($\sum_i W_i X_i = 1$):

$$\hat{\beta}_2(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{U}) = \beta_2\, 1 + \sum_{i=1}^{n} W_i U_i.$$

Esta identidad es el núcleo algebraico de la sesión: dice que el estimador $\hat{\beta}_2$ es la variable aleatoria constante $\beta_2\, 1$ (donde β_2 es el verdadero parámetro poblacional) *más* una "suma ponderada" de las perturbaciones $U_1, \ldots, U_n$, con los pesos W_i que ya conocemos. Todo lo que necesitamos demostrar sobre $\hat{\beta}_2$ (que su valor esperado sea β_2, y que su dispersión sea tal o cual) se reduce, a partir de aquí, a estudiar el comportamiento de esa suma ponderada $\sum_i W_i U_i$. Los W_i son funciones de $X_1, \ldots, X_n$, como acabamos de comprobar. Por eso, al condicionar en $\boldsymbol{X}$, podremos *sacarlos fuera* de la esperanza y de la varianza condicionales. Conviene ser preciso sobre qué autoriza ese paso, porque es tentador decir que "condicionar en $\boldsymbol{X}$ convierte los W_i en números": no es así. Los W_i siguen siendo variables aleatorias, funciones de ω, antes y después de condicionar; lo que ocurre es que son funciones *de aquello sobre lo que se condiciona*, y el Lema de la sección siguiente demuestra que tales factores salen fuera del operador $E[\cdot \mid \boldsymbol{X}]$. El resultado *se parece* al de una combinación lineal con coeficientes fijos, pero la justificación no es esa: es el Lema, que a su vez sale de la caracterización geométrica de la esperanza condicional (lección 9 (html)).

El ejemplo numérico de la lección 7 es coherente con esta descomposición: allí, con $\boldsymbol{u} = (1, -2, 0, 2, -1)$ diseñado deliberadamente con $\sum w_i u_i = 0$ (covarianza muestral nula con el regresor), obtuvimos la *estimación* $\hat{\beta}_2 = \beta_2$ exactamente. La fórmula de hoy explica *por qué* ese resultado se debía al diseño del ejemplo y no es lo esperable en general: $\hat{\beta}_2 = \beta_2\, \mathit{1} + \sum_i W_i U_i$, y solo cuando esa suma se anula por construcción (como en aquel ejemplo, ya con datos y no con variables aleatorias) coinciden estimador y parámetro. Sobre la muestra aleatoria, $\sum_i W_i U_i$ no es cero, sino una variable aleatoria con su propio valor esperado y su propia varianza, que es lo que estudiamos en las dos transparencias siguientes.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, ecuación (2.35) y comentario adyacente.

6 Insesgadez: $\mathrm{E}(\hat{\beta}_2) = \beta_2$

Cambiemos de pregunta:

- de "¿Cuánto vale la estimación $\hat{\beta}_2$ con los datos disponibles $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$?"
- a "¿cuánto vale el estimador $\hat{\beta}_2$, en promedio, sobre todas las muestras posibles?" (su proyección sobre *1*, lección 9).

  Lema (demostrado en el apéndice): si $c(\boldsymbol{X})$ es una función de $\boldsymbol{X}$,

  $$E\big[c(\boldsymbol{X})Z \mid \boldsymbol{X}\big] = c(\boldsymbol{X})E[Z \mid \boldsymbol{X}].$$

  Aplicándolo con $c(\boldsymbol{X}) = W_i$ (pues cada W_i es función de $\boldsymbol{X}$, sección anterior):

  $$E[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = \beta_2\, \mathit{1} + \sum_i W_i\, E[U_i \mid \boldsymbol{X}] = \beta_2\, \mathit{1} + \sum_i W_i\, \mathit{0} = \beta_2\, \mathit{1}.$$

  Ley de las esperanzas iteradas: Como $E[Z \mid \boldsymbol{X}]$ es la proyección ortogonal de Z sobre el espacio de las funciones de $\boldsymbol{X}$ (y *1* es una de ellas), entonces $Z - E[Z \mid \boldsymbol{X}] \perp \mathit{1}$. Por tanto,

  $$\mathrm{E}(Z) = \mathrm{E}(E[Z \mid \boldsymbol{X}]).$$

$$\boxed{\mathrm{E}(\hat{\beta}_2) = \mathrm{E}(E[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}]) = \beta_2.}$$

$\hat{\beta}_2$ no coincide con β_2 en cada muestra, pero no se desvía *sistemáticamente* en ninguna dirección.

Insesgadez: $\mathrm{E}(\hat{\beta}_2) = \beta_2$

Partimos de $\hat{\beta}_2 = \beta_2\, \mathit{1} + \sum_i W_i U_i$ ("Sustituyendo el modelo poblacional") y tomamos esperanza condicionada a $\boldsymbol{X}$: el primer paso de la sesión que usa probabilidad.

La herramienta es la definición de $E[Z \mid \boldsymbol{X}]$ de la lección 9, la función de $\boldsymbol{X}$ que minimiza la distancia $\|Z - g(\boldsymbol{X})\|_P$, escrita como se escribe toda proyección: por la ortogonalidad del resto (lección 4 para una recta, lección 6 para un plano).

Caracterización de $E[Z \mid \boldsymbol{X}]$. Es la única variable aleatoria (salvo, como advertimos en la lección 9, en un conjunto de sucesos de probabilidad nula) que cumple, a la vez:

1. *Pertenencia*: es una función de $\boldsymbol{X}$.
2. *Ortogonalidad del residuo*: $\mathrm{E}\Big((Z - E[Z \mid \boldsymbol{X}])h(\boldsymbol{X})\Big) = 0$ para *toda* función $h(\boldsymbol{X})$.

De esta caracterización salen, comprobando en cada caso que el candidato es función de $\boldsymbol{X}$ y que el resto es ortogonal, las tres reglas que usaremos de aquí en adelante; las demostraciones, de dos líneas cada una, están en el apéndice, sección 1.3 (html), y la versión no condicional de las dos primeras, en el apéndice, sección 1.6 (html). *Linealidad*: $E[aZ+bW \mid \boldsymbol{X}] = a\,E[Z \mid \boldsymbol{X}]+b\,E[W \mid \boldsymbol{X}]$. *Las funciones de* $\boldsymbol{X}$ *quedan fijas*: $E[g(\boldsymbol{X}) \mid \boldsymbol{X}] = g(\boldsymbol{X})$; en particular, $E[\beta_2\, 1 \mid \boldsymbol{X}] = \beta_2\, 1$. Y el Lema de la transparencia, que generaliza la anterior:

Lema (sacar fuera de la esperanza condicionada las funciones de variables sobre las que se condiciona). Si $c(\boldsymbol{X})$ es una función de la lista de variables aleatorias $\boldsymbol{X}$,

$$E[c(\boldsymbol{X})Z \mid \boldsymbol{X}] = c(\boldsymbol{X})E[Z \mid \boldsymbol{X}].$$

Aplicamos el Lema con $c(\boldsymbol{X}) = W_i$ y con $Z = U_i$:

$$E[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = \beta_2\, 1 + \sum_i E[W_iU_i \mid \boldsymbol{X}] = \beta_2\, 1 + \sum_i W_i\, E[U_i \mid \boldsymbol{X}] = \beta_2\, 1 + \sum_i W_i\, 0 = \beta_2\, 1,$$

donde hemos usado la exogeneidad estricta $E[U_i \mid \boldsymbol{X}] = 0$ de la sección "El marco: muestra aleatoria".

Falta pasar de la esperanza condicional a la incondicional: queremos $\mathrm{E}(\hat{\beta}_2)$, no $E[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}]$. Es la *Ley de las Esperanzas Iteradas* de la transparencia, $\mathrm{E}(E[Z \mid \boldsymbol{X}]) = \mathrm{E}(Z)$ para cualquier Z, que sale de la caracterización con $h(\boldsymbol{X}) = 1$: la constante es una función de $\boldsymbol{X}$, así que el resto es ortogonal a 1 y las dos esperanzas coinciden. Es la misma idea con la que la lección 9 dedujo $\mathrm{E}(U) = 0$ de $U \perp 1$; en el apéndice, sección 1.3 (html) se lee como proyectar en dos pasos sobre subespacios anidados: primero sobre las funciones de $\boldsymbol{X}$ y después sobre la recta de las constantes.

Aplicándola a $Z = \hat{\beta}_2$, y usando que $E[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = \beta_2\, 1$ es constante:

$$\mathrm{E}(\hat{\beta}_2) = \mathrm{E}(E[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}]) = \mathrm{E}(\beta_2\, 1) = \beta_2.$$

$\hat{\beta}_2$ es, por tanto, un *estimador insesgado* de β_2: en promedio, sobre todas las muestras posibles que podríamos haber observado, ni sobreestima ni subestima el verdadero parámetro poblacional.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, Teorema 2.1 (insesgadez de $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$).

7 Varianza: cuán dispersas están las estimaciones

Desarrollando el cuadrado (apuntes) y aplicando el *Lema* anterior:

$$Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = Var\Big[\textstyle\sum_i W_iU_i \,\Big|\, \boldsymbol{X}\Big] = \sum_i W_i^2\, Var[U_i \mid \boldsymbol{X}] + \sum_{i\neq j} W_iW_j\, Cov[U_i, U_j \mid \boldsymbol{X}]$$

Homocedasticidad + $Cov[U_i, U_j \mid \boldsymbol{X}] = 0$ ("El marco") $\implies$

$$Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = \sigma^2 \sum_i W_i^2.$$

$$\boxed{Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = \frac{\sigma^2}{\sum_i (X_i - \overline{X})^2} = \frac{\sigma^2}{n\, S^2}.}$$

donde $S^2 = \frac{1}{n}\sum_i (X_i - \overline{X})^2$ es la *varianza muestral* del regresor (divisor n, como en la lección 5).

Más dispersión en X, o más observaciones: más precisión. Mayor varianza de U (σ^2): menos precisión.

Versión interactiva: cuaderno 4 en MyBinder (muchas muestras, muchas rectas; el histograma de $\hat{\beta}_2$ y el efecto de la dispersión de $\boldsymbol{x}$).

Varianza: cuán dispersas están las estimaciones

La insesgadez nos dice que $\hat{\beta}_2$ está bien "centrado" en β_2. Pero un estimador insesgado puede, aun así, ser muy poco fiable en una muestra concreta si su dispersión es grande. Necesitamos, por tanto, calcular $Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}]$.

Partimos de $\hat{\beta}_2 = \beta_2\, 1 + \sum_i W_i U_i$. Como $\beta_2\, 1$ es una variable aleatoria constante: $Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = Var\big[\sum_i W_i U_i \mid \boldsymbol{X}\big]$. Nos queda, por tanto, desarrollar la varianza de una suma de n sumandos. Si su curso de Estadística no llegó a la varianza de una suma, lea antes la regla 3 del apéndice, sección 1.6 (html): aquí se hace la misma cuenta con la esperanza condicional. Lo haremos en dos pasos: primero calculamos la varianza y la covarianza de cada sumando por separado (aquí interviene el Lema), y después desarrollamos la suma completa. Calculemos primero, para un único sumando, $Var[W_i U_i \mid \boldsymbol{X}]$. Ya vimos que $E[W_i U_i \mid \boldsymbol{X}] = 0$ (Lema, con $c(\boldsymbol{X}) = W_i$). Por tanto, la definición de varianza condicional ($Var[Z \mid \boldsymbol{X}] = E[(Z - E[Z \mid \boldsymbol{X}])^2 \mid \boldsymbol{X}]$) se simplifica exactamente como en la lección 9 ($Var[U \mid X] = E[U^2 \mid X]$, porque también allí $E[U \mid X] = 0$):

$$Var[W_i U_i \mid \boldsymbol{X}] = E[(W_i U_i)^2 \mid \boldsymbol{X}] = E[W_i^2 U_i^2 \mid \boldsymbol{X}] = W_i^2\, E[U_i^2 \mid \boldsymbol{X}] = W_i^2\, Var[U_i \mid \boldsymbol{X}],$$

donde la penúltima igualdad es, de nuevo, el Lema (con $c(\boldsymbol{X}) = W_i^2$, sobre $Z = U_i^2$), y la última vuelve a usar que $E[U_i \mid \boldsymbol{X}] = 0$.

Por el mismo argumento, para $i \neq j$ (usando la covarianza condicional definida en "El marco: muestra aleatoria", $Cov[Z, W \mid \boldsymbol{X}] = E[(Z - E[Z \mid \boldsymbol{X}])(W - E[W \mid \boldsymbol{X}]) \mid \boldsymbol{X}]$, análoga a la varianza):

$$Cov[W_i U_i, W_j U_j \mid \boldsymbol{X}] = E[W_i U_i W_j U_j \mid \boldsymbol{X}] = W_i W_j\, E[U_i U_j \mid \boldsymbol{X}] = W_i W_j\, Cov[U_i, U_j \mid \boldsymbol{X}],$$

usando el Lema con $c(\boldsymbol{X}) = W_i W_j$.

Con estas dos piezas ya podemos desarrollar la suma entera. Abreviando $Z_i = W_i U_i$ (de modo que $E[Z_i \mid \boldsymbol{X}] = 0$ para todo i, como acabamos de comprobar), la definición de varianza condicional da

$$Var\Big[\sum_i Z_i \,\Big|\, \boldsymbol{X}\Big] = E\Big[\Big(\sum_i Z_i\Big)^2 \,\Big|\, \boldsymbol{X}\Big] = E\Big[\sum_i \sum_j Z_i Z_j \,\Big|\, \boldsymbol{X}\Big] = \sum_i \sum_j E[Z_i Z_j \mid \boldsymbol{X}],$$

donde solo hemos desarrollado el cuadrado de la suma y usado después la linealidad de la esperanza *condicional* (recordada junto al Lema, en la sección "Insesgadez"), aplicada ahora a una suma de n^2 términos. Basta ya con separar los términos de la diagonal ($i = j$) del resto: como todas las Z_i tienen esperanza condicional nula, $E[Z_i Z_j \mid \boldsymbol{X}]$ es $Var[Z_i \mid \boldsymbol{X}]$ cuando $i = j$, y $Cov[Z_i, Z_j \mid \boldsymbol{X}]$ cuando $i \neq j$. Sustituyendo en ambos casos las dos piezas calculadas más arriba:

$$Var\Big[\sum_i W_i U_i \,\Big|\, \boldsymbol{X}\Big] = \sum_i W_i^2 \, Var[U_i \mid \boldsymbol{X}] + \sum_{i \neq j} W_i W_j \, Cov[U_i, U_j \mid \boldsymbol{X}].$$

Ahora intervienen, por primera vez en la sesión, la homocedasticidad ($Var[U_i \mid \boldsymbol{X}] = \sigma^2 \, \mathit{1}$ para todo i, supuesto de la lección 9) y la ausencia de covarianza cruzada ($Cov[U_i, U_j \mid \boldsymbol{X}] = \mathit{0}$ para $i \neq j$, consecuencia del muestreo aleatorio, sección "El marco: muestra aleatoria"). Con ambas, la doble suma se reduce a

$$Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = \sigma^2 \sum_i W_i^2.$$

Calculemos $\sum_i W_i^2$. Como $W_i = \frac{X_i - \overline{X}}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2}$:

$$\sum_i W_i^2 = \sum_i \left(\frac{X_i - \overline{X}}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2} \right)^2 = \frac{\sum_i (X_i - \overline{X})^2}{\left(\sum_j (X_j - \overline{X})^2 \right)^2} = \frac{1}{\sum_j (X_j - \overline{X})^2}.$$

Sustituyendo:

$$Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = \frac{\sigma^2}{\sum_i (X_i - \overline{X})^2}.$$

Esta expresión admite una segunda lectura, útil para su interpretación. Como $\sum_i (X_i - \overline{X})^2 = n \cdot \frac{1}{n} \sum_i (X_i - \overline{X})^2 = n \, S^2$ (la varianza muestral del regresor, con la convención estadística del curso, $S^2 = \frac{1}{n} \sum_i (X_i - \overline{X})^2$), podemos escribir, equivalentemente,

$$Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = \frac{\sigma^2}{n \, S^2}.$$

Esta segunda forma hace explícitos los tres ingredientes que determinan la precisión de $\hat{\beta}_2$. (i) Cuanto mayor sea σ^2 (mayor varianza de la perturbación), menor será la precisión. (ii) Cuanto mayor sea n (más observaciones), mayor será la precisión. (iii) Cuanto mayor sea S^2 (más dispersión en los valores del regresor), mayor será la precisión: una muestra donde X apenas varía impide medir la pendiente con precisión. Evaluada en la muestra observada, esta varianza es σ^2 dividido por $\|\boldsymbol{x} - \mu_{\boldsymbol{x}} \mathbf{1}\|_e^2$, la longitud euclídea al cuadrado del regresor en desviaciones, el mismo vector con el que la lección 7 calculó la pendiente: cuanto más largo, menor la varianza. Es la forma que usará la lección 12 para el error estándar.

Su curso de Estadística enunció sin demostrar dos propiedades de la media muestral: $\mathrm{E}(\bar{x}) = \mu$ y $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n}$, el "error de muestreo". El argumento de hoy las demuestra. Tome el modelo con un único regresor, la constante: $Y_i = \beta_1 \, \mathit{1} + U_i$. Su ajuste es el vector de medias (lección 4), así que el estimador de β_1 es la media muestral $\overline{Y} = \sum_i \frac{1}{n} Y_i$: una suma ponderada con pesos $1/n$, que son números y no variables aleatorias. Sustituyendo el modelo, $\overline{Y} = \beta_1 \, \mathit{1} + \sum_i \frac{1}{n} U_i$. Su esperanza es

β_1, porque cada U_i tiene esperanza cero; y su varianza, por la misma cuenta de esta transparencia con $W_i = 1/n$ y sin necesidad de condicionar, es $\sum_i \frac{1}{n^2}\sigma^2 = \sigma^2/n$. Son las dos propiedades de su curso con β_1 en el papel de μ. Evaluadas en la muestra observada, las dos varianzas se parecen más de lo que parece: la de la media muestral es $\sigma^2/\|\mathbf{1}\|_e^2$, porque $n = \|\mathbf{1}\|_e^2$, y la de la pendiente es $\sigma^2/\|\boldsymbol{x} - \mu_{\boldsymbol{x}}\mathbf{1}\|_e^2$. En los dos casos, σ^2 dividido por la longitud euclídea al cuadrado de la parte del regresor ortogonal a los demás regresores: en la media muestral, $\mathbf{1}$ es el único regresor y esa parte es él entero; en la pendiente, es $\boldsymbol{x} - \mu_{\boldsymbol{x}}\mathbf{1}$, la parte de $\boldsymbol{x}$ ortogonal a $\mathbf{1}$. La lección 12 enunciará esta forma para cualquier número de regresores.

Nótese, por último, que $Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}]$ es una variable aleatoria, una función de $\boldsymbol{X}$: en cada suceso elemental ω toma un valor, el número $\sigma^2/\sum_i \left(X_i(\omega) - \overline{X}(\omega)\right)^2$, mayor o menor según cuánto se dispersen en ese ω los valores de las copias. El número que informa un programa es el de la muestra observada. La varianza incondicional, un único número para todas las muestras, sale de la descomposición de la varianza del apéndice, sección 1.3 (html), el Pitágoras de la lección 9 aplicado a $\hat{\beta}_2$ condicionando en $\boldsymbol{X}$:

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}_2) = \mathrm{E}(Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}]) + \mathrm{Var}(E[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}]).$$

El segundo sumando es cero, porque $E[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = \beta_2\, \mathit{1}$ es constante (sección "Insesgadez"); el primero, $\mathrm{E}(\sigma^2/(nS^2))$, es la esperanza de un cociente, y la esperanza de $1/S^2$ no es $1/\mathrm{E}(S^2)$: para calcularla haría falta conocer la distribución de S^2, que depende de la de X, y el resultado no tiene una fórmula cerrada en general. Por eso, en la práctica y en el resto del curso, se trabaja con la fórmula condicional evaluada en la muestra observada: es lo que hace cualquier programa estadístico al informar del error estándar de un coeficiente.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, Teorema 2.2 (varianza de $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ bajo los supuestos SLR.1-SLR.5).

8 MCO es BLUE; estimando σ^2

Enunciado (Gauss–Markov; demostración en el apéndice): de entre todos los estimadores *lineales e insesgados* de β_2, $\hat{\beta}_2$ tiene la menor varianza: MCO es *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*).

σ^2 (desconocido) se estima con la *cuasivarianza de los residuos*, un *tercer* producto escalar, tras el euclídeo y el estadístico:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{n-k} = \frac{1}{n-k}\langle \cdot, \cdot \rangle_e, \qquad \mathfrak{s}^2 = \langle \widehat{\boldsymbol{e}}, \widehat{\boldsymbol{e}} \rangle_{n-k} = \frac{\mathrm{SRC}}{n-k}.$$

Tres divisores, tres motivos distintos: 1 (geometría pura, sin más), n (para que $\|\mathbf{1}\|_s = 1$, lección 4), $n-k$ (para que $\mathfrak{s}^2$ sea un estimador insesgado de σ^2).

MCO es BLUE; estimando σ^2

Con insesgadez y varianza ya establecidas, cerramos con dos observaciones que esta sesión enuncia y el apéndice demuestra, y que conviene conocer.

La primera es el *Teorema de Gauss–Markov*: bajo los tres supuestos del Modelo Clásico de Regresión Lineal (y el muestreo aleatorio de esta sesión), $\hat{\beta}_2$ no es solo insesgado; es, además, el

estimador de *menor varianza* entre todos los estimadores *lineales* e *insesgados*. Lineal quiere decir de la forma $\sum_i C_i Y_i$, donde $Y_1, \ldots, Y_n$ son la muestra aleatoria (no los datos observados $y_1, \ldots, y_n$) y los pesos C_i no dependen de $\boldsymbol{Y}$ (van con mayúscula porque, igual que los W_i, pueden ser funciones de $\boldsymbol{X}$). Este resultado se resume con el acrónimo *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*, "el mejor estimador lineal insesgado"). La demostración está en el apéndice (sección 7.3) (html) y no necesita matrices. Aquí basta con lo que dice: cualquier otra regla que combine linealmente las Y_i y esté centrada en β_2 tiene más varianza que $\hat{\beta}_2$. Es la justificación teórica de la elección de mínimos cuadrados entre los estimadores lineales e insesgados.

La segunda observación es más práctica: la fórmula $Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = \sigma^2 / \sum_i (X_i - \overline{X})^2$ depende de σ^2, la varianza de la perturbación poblacional, que no conocemos. Para usarla en la práctica (algo que haremos en la próxima sesión teórica, al construir errores estándar) necesitamos estimar σ^2 a partir de los residuos $\widehat{\boldsymbol{e}}$. Estos residuos observados se interpretan aquí como la realización, sobre nuestra muestra concreta, de la lista de residuos $(\hat{E}_1, \ldots, \hat{E}_n)$, con $\hat{E}_i = Y_i - \hat{\beta}_1\, 1 - \hat{\beta}_2 X_i$; es el mismo paso de variable aleatoria a dato que hemos dado varias veces en esta sesión. Esas componentes aproximan, sin ser idénticas a ellas, a las perturbaciones U_i del modelo poblacional.[9]

La estimación natural sería $\langle \widehat{\boldsymbol{e}}, \widehat{\boldsymbol{e}} \rangle_s = \mathrm{SRC}/n$, la varianza de los residuos con nuestra convención habitual. Pero ese estimador, la misma fórmula evaluada sobre la lista de residuos $(\hat{E}_1, \ldots, \hat{E}_n)$, es *sesgado*: subestima σ^2 en promedio.[10] La razón es geométrica. Por las ecuaciones normales (lección 10), los residuos viven en el subespacio ortogonal a las columnas de $\mathbf{X}$, que tiene dimensión $n - k$ (apéndice, sección 5.1 (html)); en una base ortonormal de ese subespacio, SRC es una suma de $n - k$ cuadrados, y cada uno, evaluado sobre la muestra aleatoria, tiene esperanza σ^2 (apéndice, sección 7.2 (html)). Así que SRC tiene esperanza $(n - k)\sigma^2$, SRC/n subestima σ^2, y dividir por $n - k$ es lo que da un estimador insesgado.

Ese divisor introduce un *tercer* producto escalar en la familia que el curso construye desde la lección 2: junto al euclídeo $\langle \cdot, \cdot \rangle_e$ (divisor 1) y al estadístico $\langle \cdot, \cdot \rangle_s = \langle \cdot, \cdot \rangle_n$ (divisor n), definimos

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle_{n-k} = \frac{1}{n-k} \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle_e .$$

Sigue siendo un producto escalar (multiplicar por una constante positiva conserva la simetría, la linealidad y la positividad),[11] y con él definimos la *cuasivarianza de los residuos*

$$\mathfrak{s}^2 = \langle \widehat{\boldsymbol{e}}, \widehat{\boldsymbol{e}} \rangle_{n-k} = \frac{\mathrm{SRC}}{n-k},$$

que es un estimador insesgado de σ^2, por la cuenta de coordenadas del párrafo anterior. Los tres divisores tienen motivos distintos. El 1 es la geometría euclídea sin más. El n se eligió en la lección

[9] Esta es la posición de Eros con la que abríamos la lección 9: ni conocemos U_i (eso sería la posición del dios), ni carecemos de toda información sobre ella (la posición del ignorante); $\hat{E}_i$ es lo que tenemos en lugar de U_i: una función de la muestra aleatoria, cuya realización, el residuo $\hat{e}_i$, sí se calcula con los datos, y que bajo los supuestos del modelo tiene, como U_i, esperanza condicional nula.

[10] Seguimos la convención del resto de esta sección: escribimos las fórmulas con los residuos observados $\widehat{\boldsymbol{e}}$ aunque hablemos de propiedades, como el sesgo, que son del estimador. Es el abuso de notación ya señalado al distinguir estimador de estimación.

[11] El subíndice indica por qué número se divide. Con ese criterio los tres productos escalares del curso admiten una notación unificada: $\langle \cdot, \cdot \rangle_e = \langle \cdot, \cdot \rangle_1$, $\langle \cdot, \cdot \rangle_s = \langle \cdot, \cdot \rangle_n$ y $\langle \cdot, \cdot \rangle_{n-k}$. Mantendremos los subíndices e y s, ya habituales, pero conviene saber que la familia es una sola.

4 para que $\|\mathbf{1}\|_s = 1$, un motivo geométrico. El $n-k$ se elige por un motivo *estadístico*, la insesgadez, y su lectura geométrica es la razón: la dimensión del subespacio donde vive $\widehat{\boldsymbol{e}}$, el número de coordenadas del vector de residuos que entran en SRC. Los manuales de estadística escriben esta cantidad s^2. Aquí usamos la ese gótica, $\mathfrak{s}^2$, para que no se confunda con la varianza muestral S^2 de esta lección, que divide por n.

La expresión $n-k$ recibe, en la terminología habitual de la estadística, el nombre de *grados de libertad* del modelo: el número de observaciones menos el número de parámetros ya estimados. En esta sesión, con dos regresores en total, $k=2$, así que $\mathfrak{s}^2 = \mathrm{SRC}/(n-2)$. Volveremos sobre los grados de libertad, con más detalle, en la próxima sesión teórica.

El divisor $n-1$ con el que su curso de Estadística definía la varianza de la muestra es el caso $k=1$ de esta regla. En el modelo con la constante como único regresor, el residuo es el vector en desviaciones, que vive en $\mathcal{L}(\mathbf{1})^\perp$, de dimensión $n-1$; dividir por esa dimensión es lo que hace insesgado al estimador de σ^2. Allí se dio sin motivo; el motivo es este.

Para profundizar:

- Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, Teorema 2.2 (parte final: BLUE) y cap. 3, sección 3.5 (Teorema de Gauss-Markov, versión general con k regresores).
- Wooldridge, J. M. (2020), cap. 3, sección 3.4 (estimación insesgada de σ^2, grados de libertad).

9 ¿Y con más regresores?

Sin demostrarlo (generalización matricial de lo probado hoy; recordando la notación de la lección 10 y su extensión aleatoria de "El marco"):

$$E[\widehat{\boldsymbol{\beta}} \mid \boldsymbol{X}] = \boldsymbol{\beta}\, \mathit{1}, \qquad Var[\widehat{\boldsymbol{\beta}} \mid \boldsymbol{X}] = \sigma^2 (\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})^{-1}.$$

En la diagonal de esta matriz están $Var[\hat{\beta}_1 \mid \boldsymbol{X}], \ldots, Var[\hat{\beta}_k \mid \boldsymbol{X}]$; fuera de la diagonal, las covarianzas $Cov[\hat{\beta}_i, \hat{\beta}_j \mid \boldsymbol{X}]$.

Para $k=2$, el elemento $(2,2)$ de esta fórmula matricial se reduce exactamente a lo que hoy hemos demostrado sin matrices (y los otros tres elementos dan lo que no hemos calculado).

Sustituyendo $\boldsymbol{X}$ por la matriz de regresores observada $\mathbf{X}$, y σ^2 por su estimación $\mathfrak{s}^2$ (transparencia anterior), obtenemos la fórmula que calculan los programas estadísticos:

$$\mathfrak{s}^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}.$$

¿Y con más regresores?

Todo lo demostrado en esta sesión se ha limitado, deliberadamente, al caso con dos regresores: la constante *1* y un único regresor no constante X. Con k regresores (lección 10), el resultado análogo existe, y su enunciado, sin demostración, es la generalización matricial natural de lo que hoy hemos probado:

$$E[\widehat{\boldsymbol{\beta}} \mid \boldsymbol{X}] = \boldsymbol{\beta}\, \mathit{1}, \qquad Var[\widehat{\boldsymbol{\beta}} \mid \boldsymbol{X}] = \sigma^2 (\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})^{-1}.$$

Aquí $\boldsymbol{X}$ es la misma matriz aleatoria de regresores que fijamos al abrir la sesión, solo que ahora con k columnas en lugar de dos; $\mathbf{X}$ sigue denotando, como en la lección 10, la matriz de regresores *observada*. La primera igualdad generaliza la insesgadez de la sección "Insesgadez": $\boldsymbol{\beta}\,\mathit{1}$ denota el vector cuyas componentes son las variables aleatorias constantes $\beta_1\,\mathit{1}, \ldots, \beta_k\,\mathit{1}$, el análogo, para un vector de parámetros, de la constante $\beta_2\,\mathit{1}$ que obtuvimos en la sección "Insesgadez". La segunda generaliza la varianza de la sección "Varianza": es una matriz $k \times k$ que ocupa el lugar que antes ocupaba el escalar $1/\sum_i (X_i - \overline{X})^2$; en su diagonal contiene las varianzas $Var[\hat{\beta}_1 \mid \boldsymbol{X}], \ldots, Var[\hat{\beta}_k \mid \boldsymbol{X}]$ (con $Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}]$ como caso particular, ya conocido, en la posición $(2,2)$), y fuera de la diagonal, las covarianzas $Cov[\hat{\beta}_i, \hat{\beta}_j \mid \boldsymbol{X}]$ entre cada par de coeficientes. Esta fórmula matricial se enuncia sin demostrar. Lo que sí está demostrado con material del curso, en el apéndice, sección 7.1 (html), es su diagonal: la insesgadez y la varianza de cada coeficiente por separado, con cualquier número de regresores, usando la parte propia del regresor que define la lección 14.

Al evaluar esta fórmula en una muestra ya observada, sustituimos la matriz aleatoria $\boldsymbol{X}$ por la matriz de regresores observada $\mathbf{X}$, con lo que queda por calcular $(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}$. Multiplicada por $\mathfrak{s}^2$ (la estimación de σ^2 de "MCO es BLUE; estimando σ^2", pues σ^2 sigue siendo desconocido) da $\mathfrak{s}^2(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}$: la fórmula que Gretl (y cualquier otro programa estadístico) usa internamente para calcular los errores estándar que veremos en la próxima sesión teórica.

Es razonable preguntarse si esta fórmula, presentada aquí sin demostración, es compatible con lo que sí hemos demostrado hoy. La respuesta es sí, y podemos comprobarlo con un cálculo elemental. Para $k = 2$ (constante más un único regresor no constante), la matriz $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ (análogo aleatorio de la $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ de la lección 10) es

$$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} n\,\mathit{1} & n\overline{X} \\ n\overline{X} & \sum_i X_i^2 \end{pmatrix}.$$

Usando la fórmula general para invertir una matriz 2×2, obtenemos[12]

$$(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})^{-1} = \frac{1}{n\sum_i (X_i - \overline{X})^2} \begin{pmatrix} \sum_i X_i^2 & -n\overline{X} \\ -n\overline{X} & n\,\mathit{1} \end{pmatrix}.$$

El elemento $(2,2)$ de esta matriz, el que corresponde a la varianza condicional del segundo coeficiente, $\hat{\beta}_2$, vale $n\,\mathit{1}/(n\sum_i (X_i - \overline{X})^2) = \mathit{1}/\sum_i (X_i - \overline{X})^2$. Multiplicando por σ^2:

$$\sigma^2 [(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})^{-1}]_{22} = \frac{\sigma^2}{\sum_i (X_i - \overline{X})^2},$$

exactamente la fórmula de la sección "Varianza". Además, la misma matriz da las otras dos cantidades que esta sesión no ha llegado a calcular, al habernos centrado, como anunciamos en la primera transparencia, en $\hat{\beta}_2$: el elemento $(1,1)$, multiplicado por σ^2, da $Var[\hat{\beta}_1 \mid \boldsymbol{X}] = \sigma^2 \sum_i X_i^2/(n\sum_i (X_i - \overline{X})^2)$; y el elemento $(1,2) = (2,1)$, multiplicado por σ^2, da $Cov[\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = -\sigma^2 \overline{X}/\sum_i (X_i - \overline{X})^2$. La generalización matricial, aunque no la hayamos demostrado, es consistente con todo lo que sí hemos probado en esta sesión, y añade dos fórmulas más que no habíamos calculado en la lección.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), Apéndice E.2 (fórmulas matriciales de insesgadez y varianza para el modelo de regresión múltiple).

[12] $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, con $a = n\,\mathit{1}$, $b = c = n\overline{X}$, $d = \sum_i X_i^2$, y usando que $ad - bc = n\sum_i X_i^2 - n^2\overline{X}^2 = n\sum_i (X_i - \overline{X})^2$ (la "fórmula de cálculo" de la varianza, lección 5, evaluada sobre $\boldsymbol{X}$ y multiplicada por n).

10 Recapitulación y guiño a la sesión siguiente

Propiedad	Resultado (regresión simple, $k = 2$)	Supuestos usados
Insesgadez	$\mathrm{E}(\hat{\beta}_2) = \beta_2$	Linealidad + $\mathrm{Var}(X) \neq 0$ + muestreo aleatorio
Varianza	$Var[\hat{\beta}_2 \mid \boldsymbol{X}] = \frac{\sigma^2}{\sum_i (X_i - \overline{X})^2}$	+ Homocedasticidad (+ $Cov[U_i, U_j \mid \boldsymbol{X}] = 0$, del muestreo aleatorio)
Eficiencia	MCO es BLUE (mejor entre los lineales e insesgados)	Los tres + muestreo aleatorio (Gauss–Markov, apéndice)

Casi nada nuevo: la fórmula de la pendiente (lección 7), la esperanza condicional y la independencia entre observaciones (lección 9). Lo único nuevo: evaluar la fórmula sobre variables aleatorias, no sobre datos; eso, y solo eso, convierte $\hat{\beta}_2$ en un estimador.

Nota: los mismos argumentos, sobre $\hat{\beta}_1 = \overline{Y} - \hat{\beta}_2 \overline{X}$, prueban la insesgadez de $\hat{\beta}_1$.

Lección 12: ya conocemos el valor esperado y la varianza de $\hat{\beta}_2$; para intervalos de confianza y contrastes hace falta algo más: la *forma* de su distribución.

Recapitulación y guiño a la sesión siguiente

Esta sesión tiene pocos ingredientes nuevos. Hemos demostrado dos propiedades, insesgadez y varianza de $\hat{\beta}_2$, con piezas que ya teníamos. La fórmula de la pendiente de la lección 7, covarianza sobre varianza, nos dio $\hat{\beta}_2$ como combinación lineal de los datos. La esperanza condicional de la lección 9 nos permitió tomar esperanzas y varianzas "condicionando en $\boldsymbol{X}$". Y la independencia entre observaciones, anunciada en esa misma lección 9 ("copias idénticas e independientes"), nos dio la incorrelación entre perturbaciones.

Lo único nuevo es esto: tomar una fórmula ARITMÉTICA ya obtenida (geométricamente, en la lección 7, sobre datos fijos) y evaluarla en variables aleatorias en lugar de en datos. Eso, sin más, es lo que convierte una estimación (un número, calculado a partir de una muestra concreta) en un estimador (una variable aleatoria, cuya distribución depende de qué muestra hubiéramos observado). Hemos sustituido números por variables aleatorias dentro de una fórmula que ya conocida, y hemos reservado la herramienta probabilística de la lección 9 (esperanza condicional, independencia) para el momento en que era necesaria: al tomar esperanzas y varianzas de esa expresión calculada sobre una muestra aleatoria.

La tabla resume las dos propiedades centrales, junto con los supuestos exactos que cada una requiere: la insesgadez solo necesita linealidad (más el muestreo aleatorio, que es lo que eleva la exogeneidad estricta al condicionamiento en toda la matriz $\boldsymbol{X}$); la varianza necesita, además, homocedasticidad y la ausencia de covarianza cruzada entre perturbaciones (también consecuencia del muestreo aleatorio). Conviene tener presente esta jerarquía: cada propiedad exige un subconjunto distinto de los tres supuestos del Modelo Clásico. Cuando más adelante se ponga en duda alguno de ellos (la homocedasticidad, por ejemplo), sabremos qué propiedad de $\hat{\beta}_2$ deja de estar garantizada y cuál sigue intacta.

Queda, sin embargo, una limitación importante que esta sesión no resuelve. Saber que $\hat{\beta}_2$ está bien centrado en β_2 (insesgadez) y saber cuánto se dispersa alrededor de ese centro (varianza) NO basta para responder preguntas del tipo "si β_2 valiese cero, ¿sería $\hat{\beta}_2 = 0{,}5$ una estimación demasiado

rara?" o "¿en qué rango de valores podemos confiar razonablemente que está el verdadero β_2?". Para responderlas (son los contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza que ocuparán buena parte del resto del curso) no basta con el valor esperado y la varianza de $\hat{\beta}_2$: hace falta conocer, además, la *forma* completa de su distribución. Esa es la tarea de la próxima sesión teórica: enunciar, apoyándonos en un supuesto adicional sobre la distribución de la perturbación U, la distribución de $\hat{\beta}_2$ (la demostración está en el apéndice (sección 9) (html)), y a partir de ella construir el error estándar, el intervalo de confianza y el contraste t.

Para profundizar: Wooldridge, J. M. (2020), cap. 2, sección 2.5 (Teoremas 2.1 y 2.2) y cap. 3, secciones 3.3 y 3.4 (los mismos resultados con k regresores).

11 Apéndice: lanzar una moneda infinitas veces

Material complementario. Este apartado respondía a una pregunta que la lección 9 dejó abierta y que esta lección ha usado sin discutir: de dónde salen las copias idénticas e independientes de una variable aleatoria, y qué significa, en el lenguaje geométrico del curso, que sean independientes. La respuesta, con el ejemplo de la moneda (el intervalo $[0, 1]$ con la longitud como probabilidad, y la moneda n-ésima como la cifra binaria n-ésima de ω), está ahora en el apéndice "Estructura geométrica de la probabilidad y de la inferencia en el modelo de regresión" (html), secciones 1.5 (independientes es "a escuadra"), 2 (la moneda) y 3 (la matriz de copias: filas, columnas y vectores de $\mathbb{R}^n$). Lo esencial cabe en dos frases: "n copias idénticas e independientes" no es un supuesto sobre el mundo, sino una construcción, porque dada cualquier variable existe un Ω en el que caben tantas copias como se quiera; lo que sí es un supuesto es que *nuestros datos* sean una realización de esas copias, y ese supuesto es el muestreo aleatorio de esta lección.