

Sesión 16 (B) — Condicionar en $\mathbf{X}$: la misma fórmula, dos experimentos

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

Qué es condicionar en $\mathbf{X}$ ya está definido con precisión: la lección 9 presentó $E[Z \mid \mathbf{X}]$ como la proyección ortogonal de Z sobre las funciones de $\mathbf{X}$, y la lección 11 trabajó con esa definición. Esta práctica busca otra cosa: la *consecuencia observable* de condicionar, es decir, qué cambia en los números cuando se condiciona y cuando no.

En la práctica anterior mantuvimos el regresor `rooms` fijo a lo largo de las 2000 réplicas, y solo dejamos cambiar la perturbación. Lo justificamos con una frase: “*eso es lo que significa condicionar en $\mathbf{X}$* ”. En la imagen de la matriz de copias de la lección 11 ([apéndice, sección 3 \(html\)](#)), condicionar en $\mathbf{X}$ es mirar solo las columnas en las que los regresores toman los valores observados.

Esta práctica pone esa frase a prueba haciendo lo contrario. Vamos a repetir el mismo experimento de Montecarlo dos veces:

- *Experimento A*: el regresor se fija una vez y no cambia; solo cambia la perturbación.
- *Experimento B*: en cada réplica se sortea *también* un regresor nuevo.

Si la distinción fuera irrelevante, ambos experimentos darían lo mismo. Veremos que no.

Objetivos

1. Comprobar que la fórmula $\text{Var}[\hat{\beta}_2 \mid \mathbf{X}] = \sigma^2 / \sum_i (X_i - \bar{X})^2$ describe el experimento A, no el B.
2. Ver qué consecuencia numérica concreta tiene el condicionamiento en $\text{Var}[\cdot \mid \mathbf{X}]$, que las lecciones 9 y 11 ya definieron con precisión.
3. Ver que la insesgadez, en cambio, se cumple en *ambos* experimentos, y entender por qué las dos propiedades se comportan de forma distinta.
4. Apreciar por qué el resultado que reportan los programas estadísticos es siempre el condicional.

Advertencia de diseño. Para que la diferencia se vea con claridad, trabajaremos con una muestra deliberadamente *pequeña*: doce viviendas. Cuanto mayor es la muestra, menos importa la distinción que queremos ilustrar, y con las 506 observaciones de la práctica anterior costaría apreciarla. En la última actividad repetiremos el experimento con una muestra grande para comprobar precisamente eso.

Comandos nuevos de esta práctica. Todo el aparato es el de la práctica A: `open`, `ols --quiet` y sus accesorios, `loop --progressive`, `store` y la apertura del fichero de réplicas con `open "@workdir/..."`. Lo nuevo:

`smpl 12 --random` elige al azar doce observaciones del conjunto de datos y restringe la muestra a ellas; a partir de ahí `$nobs` vale 12 y las funciones sobre series actúan solo sobre esas doce. Con `set seed` delante, siempre salen las mismas.

`sd(x)` desviación típica de una serie, con divisor $n - 1$ (sesión 7).

`min(x)`, `max(x)` mínimo y máximo de una serie.

Bloques que empiezan con `open` cuando la salida de una actividad mezcla escalares teóricos y series de réplicas, los `printf` van en bloques distintos: el que calcula sobre las réplicas va precedido de `open "@workdir/..."`, que abre su fichero, y desde esa línea los escalares anteriores ya no existen. Por eso los valores teóricos se imprimen siempre antes.

Actividad 1 - El mismo mundo, pero con doce viviendas

Reutilizamos el mundo artificial de la práctica A (mismos β_1 , β_2 y σ), pero nos quedamos solo con doce viviendas, elegidas al azar. Además, anotamos la media y la desviación típica de `rooms` en el conjunto completo: servirán de “población” de la que se sortean regresores nuevos en el experimento B.

Dos bloques. El primero repite el mundo artificial de la práctica A y añade dos escalares, la media y la desviación típica de `rooms` en las 506 viviendas, que servirán de población del regresor. El segundo imprime esa población, restringe la muestra a doce viviendas con `smp1 12 --random` (después de `set seed 160`, para que sean siempre las mismas doce) y calcula sobre ellas `Sxx_obs`, la suma de cuadrados en desviaciones, y `var_cond`, la varianza que predice la lección 11. El «`Sxx` típico» que también se imprime es $(n - 1)$ veces la varianza poblacional del regresor: lo que cabría esperar de doce viviendas cualesquiera.

en línea de comandos:

```
open hprice2.gdt --quiet

ols price const rooms --quiet
scalar b1_true = $coeff(const)
scalar b2_true = $coeff(rooms)
scalar sigma   = sqrt($ess/$df)

scalar mu_r = mean(rooms)           # "poblacion" del regresor
scalar sd_r = sd(rooms)

printf "Poblacion del regresor: media = %.4f   desv. tipica = %.4f\n", mu_r, sd_r

set seed 160
smp1 12 --random                    # doce viviendas elegidas AL AZAR
scalar Sxx_obs = sum((rooms-mean(rooms))^2)
scalar var_cond = sigma^2 / Sxx_obs

printf "\nSubmuestra observada (n = %d):\n", $nobs
printf "  media(rooms) = %.4f   desv. tipica(rooms) = %.4f\n", mean(rooms), sd(rooms)
printf "  Sxx = suma de cuadrados en desviaciones = %.4f\n", Sxx_obs
printf "  Sxx tipico de una muestra de este tamaño = %.4f\n", ($nobs-1)*sd_r^2
printf "\nVar[b2 | X] que predice la leccion 11 = %.1f   (desv. tipica %.1f)\n", var_cond, sqrt(var_cond)
```

Poblacion del regresor: media = 6,2841 desv. tipica = 0,7026

Submuestra observada (n = 12):

media(rooms) = 6,3917 desv. tipica(rooms) = 0,5450
Sxx = suma de cuadrados en desviaciones = 3,2670
Sxx tipico de una muestra de este tamaño = 5,4300

Var[b2 | X] que predice la leccion 11 = 13417907,5 (desv. tipica 3663,0)

Recuerde que `Sxx` es la abreviatura que introdujimos en la práctica A para $\sum_i (x_i - \mu_x)^2$: el cuadrado de la norma euclídea del vector en desviaciones del regresor, o equivalentemente $n S^2$ (evaluada sobre la muestra aleatoria, es el $\sum_i (X_i - \bar{X})^2$ de la lección 11). No es notación del curso, solo una comodidad para los guiones.

Dos detalles del código merecen comentario. El primero es `smp1 12 --random`: elegimos las doce viviendas *al azar*, en lugar de tomar las doce primeras. Es importante, porque `hprice2` viene ordenado por distritos censales y las primeras viviendas se parecen mucho entre sí; tomarlas directamente nos daría una submuestra

atípica por un motivo ajeno a lo que queremos estudiar. El segundo es `set seed`, que fija *qué* doce viviendas salen, para que el resultado sea reproducible.

Compare ahora las dos últimas cifras: el Sxx de nuestras doce viviendas y el Sxx que cabría esperar de doce viviendas cualesquiera. Esa comparación explica los resultados que siguen.

Actividad 2 - Experimento A: el regresor se queda quieto

Es el experimento de la práctica anterior, sin más cambio que el tamaño muestral. El bucle es el de la práctica A con $R = 4000$ réplicas y la muestra de doce viviendas: cada vuelta sorteando la perturbación, construye `y`, estima con `ols --quiet` y guarda el coeficiente `b_fijo` como una fila más de `repFijo.gdt`.

en línea de comandos:

```
scalar R = 4000

set seed 160
loop R --progressive --quiet
  series u = normal(0, sigma)
  series y = b1_true + b2_true*rooms + u      # rooms NO cambia
  ols y const rooms --quiet
  scalar b_fijo = $coeff(rooms)
  store "@workdir/repFijo.gdt" b_fijo
endloop
```

Actividad 3 - Experimento B: el regresor también se sortea

Ahora añadimos una línea dentro del bucle: antes de construir el regresando, sorteamos un regresor nuevo. Conceptualmente estamos diciendo “no solo podría haber sido otra la perturbación; también podrían haber sido otras las doce viviendas”. En el código, la línea nueva es `series xnew = mu_r + sd_r*normal(0,1)`: doce sorteos de una normal estándar, reescalados a la media y la desviación típica de la población del regresor. Después `y` se construye con `xnew`, la regresión se estima sobre `xnew`, y `store` guarda dos escalares por réplica, el coeficiente `b_var` y `Sxx_i`, la suma de cuadrados en desviaciones del regresor de esa réplica, en `repVar.gdt`.

en línea de comandos:

```
set seed 160
loop R --progressive --quiet
  series xnew = mu_r + sd_r*normal(0,1)      # doce viviendas NUEVAS
  series u = normal(0, sigma)
  series y = b1_true + b2_true*xnew + u
  ols y const xnew --quiet
  scalar b_var = $coeff(xnew)
  scalar Sxx_i = sum((xnew-mean(xnew))^2)    # el Sxx de ESTA replica
  store "@workdir/repVar.gdt" b_var Sxx_i
endloop
```

Guardamos también `Sxx_i`, la suma de cuadrados en desviaciones del regresor *de cada réplica*. En el experimento A ese número era una constante; aquí es una variable aleatoria más, y en ella está la diferencia entre los dos experimentos.

Actividad 4 - Las dos varianzas, cara a cara

Tres bloques de `printf`, cada uno con su salida. El primero usa los escalares teóricos. El segundo va precedido de `AbrirRepFijo`, que abre `repFijo.gdt`, y calcula la media y la varianza (divisor n) de `b_fijo`. El tercero va precedido de `AbrirRepVar`, que abre `repVar.gdt`, y hace lo mismo con `b_var` y añade, con `mean`, `min` y `max`, el recorrido de `Sxx_i` a lo largo de las réplicas.

en línea de comandos:

```
printf "=== LO QUE PREDICE LA LECCION 11 (condicional en la X observada) ===\n"
printf "beta_2 verdadero = %.2f\n", b2_true
printf "Var[b2 | X]      = %.1f\n", var_cond
```

```
=== LO QUE PREDICE LA LECCION 11 (condicional en la X observada) ===
beta_2 verdadero = 9119,55
Var[b2 | X]      = 13417907,5
```

```
open "@workdir/repFijo.gdt" --quiet
```

```
printf "=== EXPERIMENTO A: regresor FIJO ===\n"
printf "media de b2hat = %.2f\n", mean(b_fijo)
printf "varianza de b2hat = %.1f\n", sum((b_fijo-mean(b_fijo))^2)/$nobs
```

```
=== EXPERIMENTO A: regresor FIJO ===
media de b2hat = 9061,70
varianza de b2hat = 13168607,8
```

```
open "@workdir/repVar.gdt" --quiet
```

```
printf "=== EXPERIMENTO B: regresor REGENERADO en cada replica ===\n"
printf "media de b2hat = %.2f\n", mean(b_var)
printf "varianza de b2hat = %.1f\n", sum((b_var-mean(b_var))^2)/$nobs
printf "\nSxx a lo largo de las replicas del experimento B:\n"
printf " medio = %.4f minimo = %.4f maximo = %.4f\n", mean(Sxx_i), min(Sxx_i), max(Sxx_i)
```

```
=== EXPERIMENTO B: regresor REGENERADO en cada replica ===
media de b2hat = 9125,59
varianza de b2hat = 9747173,3
```

```
Sxx a lo largo de las replicas del experimento B:
medio = 5,4482 minimo = 0,7178 maximo = 19,0432
```

Lo que debe observar

Tres hechos, en este orden:

1. *El experimento A reproduce la fórmula.* La varianza empírica de las estimaciones con el regresor fijo queda cerca de σ^2/S_{xx} , calculado con el S_{xx} de *nuestras doce viviendas*. La fórmula de la lección 11 describe este experimento.
2. *El experimento B da otro resultado.* Con el regresor regenerado, la varianza es apreciablemente distinta. Los dos experimentos responden a preguntas diferentes.
3. *Las medias, en cambio, coinciden.* En ambos experimentos la media de las estimaciones queda cerca de β_2 . La insesgadez se cumple en los dos diseños; la fórmula de la varianza, no.

De dónde viene la diferencia

Mire la última línea de la salida: el recorrido de `Sxx_i` a lo largo de las réplicas del experimento B. Verá que ese número varía considerablemente de una réplica a otra, y compárelo con el `Sxx` fijo de nuestras doce viviendas observadas.

En el experimento A la varianza de $\hat{\beta}_2$ es σ^2 dividido por *un número fijo*. En el experimento B es, en promedio, σ^2 multiplicado por el promedio de $1/Sxx$, y el promedio de un cociente no es el cociente de los promedios. Si nuestras doce viviendas concretas resultan tener valores de `rooms` menos dispersos de lo habitual, su `Sxx` será menor que el típico y, en consecuencia, condicionar en ellas dará una varianza *mayor* que la que resulta de promediar sobre todos los conjuntos posibles de doce viviendas. Si hubieran salido más dispersas, ocurriría lo contrario.

Esta es la razón por la que la lección 11 se detuvo en la fórmula condicional y solo mencionó brevemente la incondicional: al intentar calcular $\text{Var}(\hat{\beta}_2)$ aparecía $E(\sigma^2/(nS^2))$, la esperanza de un cociente, que no se simplifica.

Actividad 5 - ¿Y si la muestra fuera grande?

Repita el experimento con cuatrocientas viviendas en lugar de doce, dejando todo lo demás igual. Cuatro bloques. El primero realiza todos los pasos: reabre `hprice2` y recupera los escalares (se perdieron al abrir los ficheros de réplicas), toma cuatrocientas viviendas con `smpl 400 --random`, y ejecuta un solo bucle de 40 000 vueltas que hace los dos experimentos a la vez: primero con `rooms` fijo (coeficiente `bg_fijo`) y después con un regresor nuevo `xnew` y una perturbación nueva `u2` (coeficiente `bg_var`); `store` guarda los dos por réplica en `repGrande.gdt`. Tarda bastante más que los bucles anteriores. El segundo imprime las cifras teóricas; el tercero, `AbrirRepGrande`, abre `repGrande.gdt`, y el cuarto imprime las dos varianzas empíricas y su cociente.

en línea de comandos:

```
open hprice2.gdt --quiet
ols price const rooms --quiet
scalar b1_true = $coeff(const)
scalar b2_true = $coeff(rooms)
scalar sigma = sqrt($ess/$df)
scalar mu_r = mean(rooms)
scalar sd_r = sd(rooms)

set seed 160
smpl 400 --random
scalar Sxx_obs = sum((rooms-mean(rooms))^2)
scalar var_cond = sigma^2 / Sxx_obs

set seed 160
loop 40000 --progressive --quiet      # diez veces mas replicas: ver nota
  series u = normal(0, sigma)
  series y = b1_true + b2_true*rooms + u
  ols y const rooms --quiet
  scalar bg_fijo = $coeff(rooms)
  series xnew = mu_r + sd_r*normal(0,1)
  series u2 = normal(0, sigma)
  series y2 = b1_true + b2_true*xnew + u2
  ols y2 const xnew --quiet
  scalar bg_var = $coeff(xnew)
  store "@workdir/repGrande.gdt" bg_fijo bg_var
endloop

printf "Con n = 400: Sxx observado = %.2f (tipico: %.2f)\n", Sxx_obs, ($nobs-1)*sd_r^2
printf "                Var[b2|X] condicional teorica = %.2f\n", var_cond
printf "                cociente Sxx observado/tipico = %.3f <- lo que cabe esperar de var_B/var_A\n",
↪ Sxx_obs/((($nobs-1)*sd_r^2)
```

```
Con n = 400: Sxx observado = 205,76 (tipico: 196,96)
                Var[b2|X] condicional teorica = 213046,34
```

```
cociente Sxx observado/tipico = 1,045 <- lo que cabe esperar de var_B/var_A
```

```
open "@workdir/repGrande.gdt" --quiet
```

```
printf " regresor FIJO      : var = %.2f\n", sum((bg_fijo-mean(bg_fijo))^2)/$nobs
printf " regresor REGENERADO : var = %.2f\n", sum((bg_var-mean(bg_var))^2)/$nobs
printf " cociente observado : %.3f\n", (sum((bg_var-mean(bg_var))^2))/(sum((bg_fijo-mean(bg_fijo))^2))
```

```
regresor FIJO      : var = 214203,96
regresor REGENERADO : var = 224464,19
cociente observado : 1,048
```

Lo que debe observar

Lo primero que conviene mirar no es el tamaño de la diferencia, sino su *signo*.

Con doce viviendas, la varianza del experimento B salía **menor** que la del A. Con cuatrocientas sale **mayor**. Es la confirmación del mecanismo que explicamos en la actividad anterior. Allí dijimos que todo dependía de si nuestra muestra concreta tenía un Sxx más pequeño o más grande que el típico, y añadimos: “si hubieran salido más dispersas, ocurriría lo contrario”. Compruébelo en las salidas:

- *Doce viviendas*: Sxx observado = 3,27 frente a un típico de 5,43. Nuestra muestra estaba **poco dispersa**, condicionar en ella daba una varianza mayor que el promedio, y por eso B quedaba por debajo de A.
- *Cuatrocientas viviendas*: Sxx observado = 205,76 frente a un típico de 196,96. Ahora la muestra está, ligeramente, **más dispersa** de lo típico; condicionar en ella da una varianza menor que el promedio, y B queda por encima de A.

El cambio de signo es la predicción cumplida. Y descarta una conclusión falsa que sería fácil extraer de la actividad anterior, “condicionar infla la varianza”: condicionar no la aumenta ni la reduce sistemáticamente, la *ajusta a la muestra que tenemos*, y hacia qué lado la ajuste depende de cómo sea esa muestra.

En cuanto al tamaño, la diferencia *se reduce mucho* al pasar de doce a cuatrocientas observaciones, pero no llega a desaparecer. Conviene entender por qué, porque en esa distinción hay dos efectos superpuestos:

1. *Nuestra muestra deja de ser excepcional*. Con doce viviendas, el Sxx de la muestra observada podía quedar muy lejos del típico; con cuatrocientas, cualquier muestra tiene un Sxx bastante parecido al típico. Este efecto se atenúa al crecer n , pero lentamente.
2. *El promedio de un cociente no es el cociente de los promedios*. Aunque el Sxx medio coincidiera con el observado, promediar σ^2/Sxx sobre las réplicas no daría σ^2 dividido por el Sxx medio. Este segundo efecto también se atenúa con n , y más deprisa que el primero.

Con $n = 400$ el segundo efecto ya es prácticamente inapreciable, y todo lo que queda es el primero. Eso se puede comprobar con las cifras de la salida: el cociente de varianzas que observamos debería parecerse al cociente Sxx observado/típico, que la salida imprime, y en efecto se le parece.¹

La conclusión práctica es que con muestras grandes la distinción tiene poca consecuencia numérica. La conclusión conceptual, en cambio, no cambia en absoluto: siguen siendo dos preguntas distintas, y la que responde la fórmula de la lección 11, y también su programa estadístico, es siempre la condicional.

¹Aquí hemos subido el número de réplicas de 4000 a 40000, y merece la pena decir por qué: con 4000 réplicas el ruido de Montecarlo sobre un cociente de varianzas supera el 3%, del mismo orden que el efecto de un 4,5% que queremos medir. Repitiendo el experimento con distintas semillas, el cociente oscilaba entre 1,00 y 1,08; con algunas semillas el efecto *parecía* desaparecer del todo. Con 40000 réplicas el cociente se estabiliza por encima de uno y el experimento ilustra lo que pretende ilustrar. El coste es de unos pocos segundos. Un experimento simulado tiene su propia precisión, y conviene asegurarse de que es mejor que el efecto que se quiere ver.

Preguntas de interpretación para la clase

1. ¿Qué pregunta responde el experimento A y qué pregunta, distinta, responde el experimento B? Formule ambas con palabras, sin fórmulas.
2. ¿Por qué la insesgadez se cumple en los dos experimentos, mientras que la fórmula de la varianza solo describe el primero? (Pista: ¿en qué paso de la demostración de la lección 11 interviene $\mathbf{X}$ de forma esencial?)
3. Cuando Gretl le muestra el error estándar de un coeficiente, ¿está respondiendo a la pregunta del experimento A o a la del B? ¿Por qué cree que es así?
4. Imagine que un investigador *diseña* el experimento y puede elegir los valores del regresor (por ejemplo, las dosis en un ensayo). A la vista de la fórmula de la lección 11, ¿qué le convendría hacer con esas dosis?
5. En la Actividad 5, con $n = 400$, las dos varianzas casi coinciden. ¿Diría entonces que la distinción entre condicionar y no condicionar es irrelevante en la práctica? Argumente a favor y en contra.

Para profundizar:

- Lección 11 ([lección 11](#)), sección “Varianza”, en particular el párrafo final sobre la varianza incondicional y la ley de la varianza total.
- Lección 9 ([lección 9](#)) para la esperanza condicional como proyección.
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics*, cap. 2, sección 2.5.

Código completo de la práctica

```
# -----
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# -----

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↪ directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#   DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↪ trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

set verbose off

open hprice2.gdt --quiet

ols price const rooms --quiet
scalar b1_true = $coeff(const)
scalar b2_true = $coeff(rooms)
scalar sigma   = sqrt($ess/$df)

scalar mu_r = mean(rooms)           # "poblacion" del regresor
scalar sd_r = sd(rooms)
outfile --quiet preparacion.txt
  printf "Poblacion del regresor: media = %.4f   desv. tipica = %.4f\n", mu_r, sd_r

  set seed 160
  smpl 12 --random                  # doce viviendas elegidas AL AZAR
  scalar Sxx_obs = sum((rooms-mean(rooms))^2)
  scalar var_cond = sigma^2 / Sxx_obs

  printf "\nSubmuestra observada (n = %d):\n", $nobs
  printf "  media(rooms) = %.4f   desv. tipica(rooms) = %.4f\n", mean(rooms), sd(rooms)
  printf "  Sxx = suma de cuadrados en desviaciones = %.4f\n", Sxx_obs
  printf "  Sxx tipico de una muestra de este tamaño = %.4f\n", ($nobs-1)*sd_r^2
  printf "\nVar[b2 | X] que predice la leccion 11 = %.1f   (desv. tipica %.1f)\n", var_cond,
    ↪ sqrt(var_cond)
end outfile

scalar R = 4000

set seed 160
loop R --progressive --quiet
  series u = normal(0, sigma)
  series y = b1_true + b2_true*rooms + u      # rooms NO cambia
  ols y const rooms --quiet
  scalar b_fijo = $coeff(rooms)
  store "@workdir/repFijo.gdt" b_fijo
endloop

set seed 160
loop R --progressive --quiet
  series xnew = mu_r + sd_r*normal(0,1)      # doce viviendas NUEVAS
  series u    = normal(0, sigma)
  series y    = b1_true + b2_true*xnew + u
  ols y const xnew --quiet
```

```

    scalar b_var = $coeff(xnew)
    scalar Sxx_i = sum((xnew-mean(xnew))^2)      # el Sxx de ESTA replica
    store "@workdir/repVar.gdt" b_var Sxx_i
endloop

outfile --quiet comparacion.txt
    printf "=== LO QUE PREDICE LA LECCION 11 (condicional en la X observada) ===\n"
    printf "beta_2 verdadero = %.2f\n", b2_true
    printf "Var[b2 | X] = %.1f\n\n", var_cond
end outfile

open "@workdir/repFijo.gdt" --quiet
outfile --quiet comparacionA.txt
    printf "=== EXPERIMENTO A: regresor FIJO ===\n"
    printf "media de b2hat = %.2f\n", mean(b_fijo)
    printf "varianza de b2hat = %.1f\n", sum((b_fijo-mean(b_fijo))^2)/$nobs
end outfile

open "@workdir/repVar.gdt" --quiet
outfile --quiet comparacionB.txt
    printf "=== EXPERIMENTO B: regresor REGENERADO en cada replica ===\n"
    printf "media de b2hat = %.2f\n", mean(b_var)
    printf "varianza de b2hat = %.1f\n", sum((b_var-mean(b_var))^2)/$nobs
    printf "\nSxx a lo largo de las replicas del experimento B:\n"
    printf "    medio = %.4f    minimo = %.4f    maximo = %.4f\n", mean(Sxx_i), min(Sxx_i), max(Sxx_i)
end outfile

open hprice2.gdt --quiet
ols price const rooms --quiet
scalar b1_true = $coeff(const)
scalar b2_true = $coeff(rooms)
scalar sigma = sqrt($ess/$df)
scalar mu_r = mean(rooms)
scalar sd_r = sd(rooms)

set seed 160
smpl 400 --random
scalar Sxx_obs = sum((rooms-mean(rooms))^2)
scalar var_cond = sigma^2 / Sxx_obs

set seed 160
loop 40000 --progressive --quiet      # diez veces mas replicas: ver nota
    series u = normal(0, sigma)
    series y = b1_true + b2_true*rooms + u
    ols y const rooms --quiet
    scalar bg_fijo = $coeff(rooms)
    series xnew = mu_r + sd_r*normal(0,1)
    series u2 = normal(0, sigma)
    series y2 = b1_true + b2_true*xnew + u2
    ols y2 const xnew --quiet
    scalar bg_var = $coeff(xnew)
    store "@workdir/repGrande.gdt" bg_fijo bg_var
endloop

outfile --quiet muestraGrande.txt
    printf "Con n = 400: Sxx observado = %.2f (tipico: %.2f)\n", Sxx_obs, ($nobs-1)*sd_r^2
    printf "    Var[b2|X] condicional teorica = %.2f\n", var_cond
    printf "    cociente Sxx observado/tipico = %.3f <- lo que cabe esperar de var_B/var_A\n",
    ↪ Sxx_obs/((($nobs-1)*sd_r^2))
end outfile

open "@workdir/repGrande.gdt" --quiet
outfile --quiet muestraGrandeResultado.txt
    printf "    regresor FIJO : var = %.2f\n", sum((bg_fijo-mean(bg_fijo))^2)/$nobs
    printf "    regresor REGENERADO : var = %.2f\n", sum((bg_var-mean(bg_var))^2)/$nobs
    printf "    cociente observado : %.3f\n",
    ↪ (sum((bg_var-mean(bg_var))^2))/(sum((bg_fijo-mean(bg_fijo))^2))

```

```
end outfile
```

Enlace al guión: [S16-Prct-B-condicionar.inp](#)

Respuestas

1. *Las dos preguntas.* El experimento A pregunta: “dadas *estas* doce viviendas, con estos valores concretos de **rooms**, ¿cuánto variaría mi estimación si el azar hubiera repartido otras perturbaciones?”. El experimento B pregunta algo más amplio: “¿cuánto variaría mi estimación entre todos los estudios posibles de doce viviendas, considerando que también podrían haber sido otras las viviendas?”. La primera toma la muestra de regresores como un dato del problema; la segunda la considera parte de lo que podría haber sido distinto.
2. *Por qué la insesgadez se mantiene.* Porque la demostración de la insesgadez pasa por $E[\hat{\beta}_2 | \mathbf{X}] = \beta_2$ y después aplica la ley de las esperanzas iteradas: el resultado condicional *no depende de $\mathbf{X}$* , es la misma constante sea cual sea la matriz de regresores, y por tanto su promedio sobre todas las $\mathbf{X}$ posibles vuelve a ser esa constante. Con la varianza ocurre lo contrario: $Var[\hat{\beta}_2 | \mathbf{X}] = \sigma^2/S_{xx}$ *sí depende de $\mathbf{X}$* , así que promediar sobre las $\mathbf{X}$ posibles da un número distinto del que corresponde a una $\mathbf{X}$ concreta.
3. *Lo que reporta Gretl.* Responde a la pregunta del experimento A: el error estándar se calcula con la matriz de datos efectivamente observada, sustituyendo σ^2 por su estimación $\hat{\sigma}^2$. Tiene sentido que sea así por dos motivos. Uno práctico: no conocemos la distribución de la que salieron los regresores, así que no podríamos promediar sobre ella aunque quisiéramos. Y otro conceptual: la pregunta que le interesa a quien analiza unos datos es cuánta confianza merece *su* estimación, con *su* muestra, no cuánta merecería en promedio un estudio hipotético que nunca hizo.
4. *Si se pueden elegir los valores del regresor.* La fórmula dice que la varianza es σ^2 dividido por $\sum_i (X_i - \bar{X})^2$. Conviene, por tanto, hacer ese denominador lo más grande posible: elegir dosis muy separadas entre sí, en los extremos del rango admisible, en lugar de concentrarlas en torno a un valor central. Es el mismo principio que hemos visto en sentido contrario en esta práctica: nuestras doce viviendas tenían valores de **rooms** poco dispersos, y eso aumentaba la varianza de la estimación. (Naturalmente, esto supone que el modelo lineal es válido en todo ese rango: separar mucho las dosis mejora la precisión, pero solo si la relación sigue siendo lineal allí.)
5. *¿Es irrelevante con n grande?* A favor de que lo es: numéricamente las dos varianzas se acercan mucho (la diferencia pasa de ser enorme con doce observaciones a ser modesta con cuatrocientas), así que a efectos de calcular un error estándar la distinción cambia poco las cifras. En contra: primero, “ n grande” no siempre se tiene, y con muestras pequeñas, que abundan en economía aplicada, la diferencia es la que hemos visto. Segundo, la distinción no es solo numérica, sino conceptual: aclara qué población de muestras estamos imaginando cuando decimos que un estimador “varía”. Confundir ambas preguntas lleva a interpretar mal qué significa exactamente un error estándar.