EjemploMoodle

1. **EjemploMoodle-1**

   CLOZE 0.10 penalty

   Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

   MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$ ✓	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{A}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$ ✓	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas	

2. **EjemploMoodle-2**

   CLOZE 0.10 penalty

   Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

   MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$ ✓	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{A}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas	

3. **EjemploMoodle-3**

   CLOZE 0.10 penalty

   Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

   MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$ ✓	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{A}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas	

4. **EjemploMoodle-4**

   CLOZE 0.10 penalty

   Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

   MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$ ✓	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{B}$	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$ ✓	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas	

5. **EjemploMoodle-5**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$ ✓	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{B}$	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas	

6. **EjemploMoodle-6**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$ ✓	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{B}$	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas	

7. **EjemploMoodle-7**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{A}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$ ✓	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas	

8. **EjemploMoodle-8**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{A}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas	

9. **EjemploMoodle-9**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{A}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas	

10. **EjemploMoodle-10**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{B}$	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$ ✓	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas	

11. **EjemploMoodle-11**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{B}$	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas ✓	

12. **EjemploMoodle-12**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{B}$	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas ✓	

13. **EjemploMoodle-13**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{A}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas	

14. **EjemploMoodle-14**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{A}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas	

15. **EjemploMoodle-15**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{A}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas	

16. **EjemploMoodle-16**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{B}$	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas ✓	

17. **EjemploMoodle-17**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{B}$	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas ✓	

18. **EjemploMoodle-18**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{B}$	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas ✓	

19. **EjemploMoodle-19**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{A}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas	

20. **EjemploMoodle-20**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{A}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas	

21. **EjemploMoodle-21**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{A}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas	

22. **EjemploMoodle-22**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{B}$	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas ✓	

23. **EjemploMoodle-23**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{B}$	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas ✓	

24. **EjemploMoodle-24**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{B}$	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas ✓	

25. **EjemploMoodle-25**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{A}$	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas ✓	

26. **EjemploMoodle-26**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{A}$	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas ✓	

27. **EjemploMoodle-27**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{A}$	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas ✓	

28. **EjemploMoodle-28**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{B}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas	

29. **EjemploMoodle-29**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{B}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas	

30. **EjemploMoodle-30**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{B}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas	

31. **EjemploMoodle-31**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{A}$	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas ✓	

32. **EjemploMoodle-32**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{A}$	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas ✓	

33. **EjemploMoodle-33**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{A}$	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas ✓	

34. **EjemploMoodle-34**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{B}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas	

35. **EjemploMoodle-35**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{B}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas	

36. **EjemploMoodle-36**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{B}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas	

37. **EjemploMoodle-37**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{A}$	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas ✓	

38. **EjemploMoodle-38**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{A}$	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$ ✓	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas	

39. **EjemploMoodle-39**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{A}$	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas ✓	

40. **EjemploMoodle-40**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{B}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas	

41. **EjemploMoodle-41**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{B}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$ ✓	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas	

42. **EjemploMoodle-42**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{C}$	*Solo se deduce $\mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ junto con $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
se da $\mathcal{B}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas	

43. **EjemploMoodle-43**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$ ✓	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{A}$	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas	

44. **EjemploMoodle-44**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$ ✓	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{A}$	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$ ✓	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas	

45. **EjemploMoodle-45**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$ ✓	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{A}$	*Si se considera $\mathcal{A}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{B}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{A}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas	

46. **EjemploMoodle-46**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$ ✓	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{B}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$	*Hace falta $\mathcal{A}$ como hipótesis y la implicación $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{C}$.*
Las demás opciones son falsas	

47. **EjemploMoodle-47**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$ ✓	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{B}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$ ✓	*Hace falta $\mathcal{B}$ como hipótesis y la equivalencia $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
Las demás opciones son falsas	

48. **EjemploMoodle-48**

CLOZE 0.10 penalty

Considere $\mathcal{B}$ y que $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$. Entonces, con toda seguridad:

MULTI 3 points Multiple Shuffle

se da $\mathcal{D}$ ✓	*Solo se deduce $\mathcal{D}$ de $\mathcal{B}$ junto con $\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{D}$.*
se da $\mathcal{B}$ ✓	*Si se considera $\mathcal{B}$, se da por hipótesis; si se considera $\mathcal{A}$, ninguna de las hipótesis implica $\mathcal{B}$, que puede ser falsa.*
se da $\mathcal{E}$	*Nada se afirma sobre $\mathcal{E}$: no se deduce de las hipótesis.*
Las demás opciones son falsas	

Total of marks: 144