

## Prueba01

### 1. PreguntaSinSentido

MULTI 1.0 point 0.10 penalty Single Shuffle

Dado  $W$ , dado  $z_n \#_n(\mathbf{a})$ , dado  $\left(\left[\overline{\|A\|}\right]^{-1}\right)$  y  $A \# \vec{b}$  resulta que  $\mu_{\mathbf{x}}^2$  y que

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}.$$

Si  $[f \circ g]: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ , el determinante de  $\left(\mathbf{I}_{\tau'_1 \dots \tau'_p}\right)$  multiplicado por  $\text{fila}_i(\mathbf{A}^\top)$   
 $x \longmapsto \mathbf{x}$

es:

- (a)  $\left(\widehat{\mathbf{X}}^\top \widehat{\mathbf{X}}\right)^{-1}$
- (b)  $\left((\mathbf{A}^\top)^{-1}\right)$
- (c)  $\mathcal{L}\left(Z\right)$
- (d)  $\vec{x}_{/Z}$
- (e)  $\text{cof}_{ij}\left(\mathbf{A}\right)$
- (f)  $\left|i^{\vec{\tau}}\mathbf{A}^{\vec{j}}\right|$
- (g)  $\mathbf{A}_{\left[(\lambda)\vec{i}+j\right]}^{\boldsymbol{\tau}}$
- (h)  $\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_d}^{\tau_4^*} \checkmark$
- (i)  $\left(\tau_k \dots \tau_j \mathbf{A}_{\tau_j \dots \tau_k}\right) \checkmark$
- (j)  $\left({}_i(\mathbf{A}^\top)_{|j}\right)$
- (k)  $\left[{}_i\mathbf{A}\right]^\top$
- (l)  $esp\left(\mathbf{A}_{\left[(a)j+k\right]}^{\boldsymbol{\tau}}\right)$
- (m)  $\langle f(x), g(x) \rangle$
- (n)  $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \odot \mathbf{c}$
- (o)  $(\mathbf{A}^\top)\mathbf{b}$
- (p)  $\mathbf{A}_{esp(\tau_2^{-1})}$
- (q)  $\tau_k^{-1}$
- (r)  $\tau_2^{-1}\mathbf{A}$
- (s)  $\tau_1 \cdots \tau_3$
- (t)  $\mathbf{A}_{\left[(a)j+k\right]}^{\boldsymbol{\tau}}$
- (u)  $\tau_j \dots \tau_k (\mathbf{A} + \mathbf{B})$
- (v)  $\left(\mathbf{B}_{\tau_j \dots \tau_k}\right)$
- (w)  $\mathbf{A}_{\left[(5)\vec{i}+j\right]\left[(-7)j\right]}^{\boldsymbol{\tau}}$
- (x)  $\mathbf{I}_{\left[(-5)\vec{i}+j\right]\left[(-7)j\right]}^{\boldsymbol{\tau}}$
- (y)  $\mathbf{A}_{\left[\mathfrak{E}\right]}^{\boldsymbol{\tau}}$

$$(\mathbf{Z}) \left( \mathbf{A}_{\tau_{[i \rightleftharpoons j]}} \right)$$