## О характеризации конечной простой группы ее порядком и графом Грюнберга-Кегеля

Ильенко Кристина Альбертовна Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского УрО РАН christina.ilyenko@yandex.ru

Секция: Алгебра

В. Ши поставил вопрос характеризации конечной простой группы ее спектром и порядком. Этот вопрос исследовался в серии работ, и 2009 г. А.В. Васильевым, М.А. Гречкосеевой и В.Д. Мазуровым [1] было доказано, что если G — конечная простая группа и H — конечная группа такая, что  $\omega(H) = \omega(G)$  и |H| = |G|, то  $H \cong G$ .

Поскольку понятие графа Грюнберга–Кегеля широко обобщает понятие спектра конечной группы, то вопрос характеризации конечной простой группы ее порядком и графом Грюнберга–Кегеля возникает естественным образом. Историю постановки этого вопроса можно найти, например, в [2].

В этой работе мы обсуждаем вопрос характеризации порядком и графом Грюнберга–Кегеля конечной простой группы, граф Грюнберга–Кегеля которой содержит не менее трех компонент связности. В частности, мы исправляем неточности, допущенные в работах [3] и [4].

- [1] А. В. Васильев, М. А. Гречкосеева, В. Д. Мазуров, Характеризация конечных простых групп спектром и порядком, Алгебра и логика, 48:6 (2009), 685–728.
- [2] Peter Cameron, Natalia Maslova, Criterion of unrecognizability of a finite group by its Gruenberg-Kegel graph, J. Algebra, **607**:Part A (2022), 186-213.
- [3] Bahman Khosravi, Behnam Khosravi, Behrooz Khosravi, On the prime graph of PSL(2,p) where p>3 is a prime number, Acta Math Hungar, **116**:4 (2007), 295.
- [4] Q. Zhang, W. Shi, R. Shen, Quasirecognition by prime graph of the simple groups  $G_2(q)$  and  ${}^2B_2(q)$ , J. Algebra Appl., **10**:2 (2011), 309–317.