Загальний курс фізики

Каркаси конспектів лекцій

Електростатика і постійний струм
Молекулярна фізика і термодинаміка

За підручником: Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П.
Загальний курс фізики, т. 1 (1999), т. 2 (2001). — К.: Техніка.

Згенеровано з вікі проєкту, 26 жовтня 2026 р.

Як користуватися

Кожен розділ — це **каркас** однієї рукописної сторінки конспекту, а не готовий конспект. Він містить:

- **Layout** — план сторінки у вигляді рамок [A], [B], …;
- точні терміни й означення з підручника (у «лапках»), формули з номерами рівнянь книги, сторінки;
- ✎ — місця, де треба намалювати схему чи сформулювати думку власними словами;
- ⚠ — розбіжності між підручником і програмою, помилки в книзі, неперевірені місця;
- ✔ — формули звірено зі сканом сторінки; ⚡ — важливий або парадоксальний висновок;
- **Self-check** — 2–4 запитання для самоперевірки.

Пояснення до структури подано англійською, терміни й цитати — українською, як у підручнику. Посилання «т. 2, с. 38» — друковані сторінки підручника.

Зміст

Як користуватися **i**

I Електростатика і постійний струм **1**

Програма: 23 питання **2**

1. Електричний заряд та його властивості **3**

2. Закон Кулона. Диполь в неоднорідному полі **6**

3. Напруженість електричного поля E **8**

4. Потенціал електричного поля **10**

5. Диполь в однорідному електричному полі **12**

6. Потік вектора напруженості. Теорема Гаусса **14**

7. Дивергенція вектора E **15**

8. Зв’язок між напруженістю та потенціалом **16**

9. Теорема Стокса **17**

10–12. Поле зарядженої площини · двох площин · сферичної поверхні **19**

13. Теорема Остроградського–Гаусса **21**

14. Провідник у зовнішньому електричному полі **22**

15. Конденсатори та їх ємність. Ємність плоского, циліндричного та сферичного конденсаторів **24**

16. З’єднання конденсаторів **26**

17. Енергія зарядженого провідника **27**

18. Енергія електростатичного поля **28**

19. Електричний струм. Постійний електричний струм. Закони Ома **29**

20. Сила струму, густина струму. Електрорушійна сила **31**

21. Поняття опору. Потужність **33**

22. Перший та другий закон Кірхгофа **35**

23. Закон Джоуля–Ленца **37**

II Молекулярна фізика і термодинаміка **39**

Програма МКР №2: 30 питань **40**

2. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу **42**

1. Закони ідеальних газів **44**

20. Закон рівномірного розподілу енергії по ступенях свободи · 21. Внутрішня енергія ідеальних газів **46**

18. Закон розподілу Максвела **48**

17. Закон розподілу Больцмана · 19. Закон розподілу Максвела-Больцмана **50**

22. Середня довжина вільного пробігу молекули в газах **52**

23. Дифузія в газах · 24. Внутрішнє тертя в газах · 25. Теплопровідність газів **54**

3. Внутрішня енергія термодинамічної системи **56**

4. Теплота, робота, теплоємність **58**

6. Перший закон термодинаміки **60**

5. Теплоємність ідеальних газів **62**

7. Ізотермічний процес · 8. Ізохоричний процес · 9. Ізобарний процес **64**

10. Адіабатичний процес **66**

11. Колові процеси **68**

12. Цикл Карно (необернений) та його ккд · 13. Цикл Карно (обернений) та його ккд **70**

16. Другий закон термодинаміки **72**

14. Ентропія та її властивості **74**

15. Теорема Нернста **77**

26. Відмінність реального газу від ідеального **79**

27. Рівняння Ван-Дер-Ваальса **81**

28. Класифікація кристалів **83**

29. Дефекти в кристалах **85**

30. Рідини **87**

III Додатки **89**

Інтегральна ↔ диференціальна форма законів **90**

Принцип суперпозиції **91**

Процеси в ідеальному газі: одна таблиця **92**

Явища переносу: один закон, три величини **93**

Позначення, знаки й одиниці **94**

Глосарій **96**

Частина І

Електростатика і постійний струм

Програма: 23 питання

№	Питання (as worded in the syllabus)	Wiki page	§
1	Електричний заряд та його властивості	01	1.1
2	Закон Кулона. Диполь в неоднорідному полі	02	1.2–1.3, 1.6
3	Напруженість електричного поля E	03	1.4–1.5
4	Потенціал електричного поля	04	1.10–1.11
5	Диполь в однорідному електричному полі	05	1.6
6	Потік вектора напруженості електричного поля E. Теорема Гауса	06	1.7
7	Дивергенція вектора E	07	1.8
8	Зв’язок між напруженістю та потенціалом	08	1.11
9	Теорема Стокса	09	1.10
10	Поле зарядженої площини	10–12	1.7
11	Поле двох заряджених площин (теорема Гауса)	10–12	1.7
12	Поле сферичної поверхні	10–12	1.7, 1.11
13	Теорема Остроградського-Гауса	13	1.8
14	Провідник у зовнішньому електричному полі	14	1.12–1.13
15	Конденсатори та їх ємність. Ємність плоского, циліндричного та сферичного конденсаторів	15	1.14
16	З’єднання конденсаторів	16	1.14
17	Енергія зарядженого провідника	17	1.25–1.26
18	Енергія електростатичного поля	18	1.26
19	Електричний струм. Постійний електричний струм. Закони Ома	19	2.1–2.3
20	Сила струму, густина струму. Електрорушійна сила	20	2.1, 2.3
21	Поняття опору. Потужність	21	2.2, 2.4
22	Перший та другий закон Кірхгофа	22	2.6
23	Закон Джоуля-Ленца	23	2.5

Overlaps to keep in mind

- 2 and 5 share the dipole. Define it once (in 5) and refer to it from 2.
- 6, 7, 13 form one chain: Gauss (integral) → div (differential) → Ostrogradsky–Gauss (the mathematical bridge).
- 19, 20, 21 overlap. Proposed split: 19 = Ohm’s law in every form, 20 = I, j, EPC, 21 = R, ρ, P.
- 17 and 18 give the same W, read once through the charges and once through the field.

1. Електричний заряд та його властивості

Джерело: Кучерук т. 2, **§ 1.1 «Електричний заряд», с. 14–21** (spreads 8–11). All formulas checked against the scan.

This is a scaffold for the handwritten page: exact terms and formulas plus the structure. The wording on the page is yours.

Suggested page layout (one A4 side)



Box 0 — Що таке заряд (p. 15)

- Book's definition: «Електричний заряд є **внутрішньою характеристикою** деяких елементарних матеріальних частинок, яка проявляється в їхній взаємодії на відстані або під час дії на них зовнішніх електромагнітних полів.»
- Key idea to write in your own words: a charge is **both the source and the object** of the field («як джерело, так і об'єкт дії»).
- How a charge is measured (p. 14): put two particles in turn at the same point M of a field:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{q_1}{q_2} \qquad (1.1)$$

The ratio depends on neither the field nor the point M, only on the particles.

- Contrast with mass (p. 15): mass has one sign and only attracts; charge has two signs, so charges can **compensate** each other.

Box 1 — Два види зарядів (p. 15)

- Like charges repel and unlike charges attract (однойменні / різнойменні).
- Sign convention: **позитивний** = скло, натерте шовком; **негативний** = ебоніт (бурштин), натертий хутром.
- The convention is arbitrary. What matters is that there are two kinds.
- ✎ Your line: why are bodies usually neutral?

Box 2 — Дискретність: закон квантування електричного заряду (pp. 16–19)

- Book's term (italic): ***закон квантування електричного заряду***. Free charges consist of equal discrete portions equal to the electron's charge.

$$\Delta q = n|e|, \quad n = \pm 1, \pm 2, \ldots \qquad |e| = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{Кл}$$

- **Дослід Міллікена (рис. 1.1, p. 18)**: sketch two horizontal plates, an oil droplet, and arrows for qE↑, F_A↑, mg↓, av↕.
  - No field: the droplet falls uniformly, so mg = av + F_A, which gives a.
  - With field E: the droplet rises uniformly, so **qE + F_A = mg + av′**, which gives q.
  - X-rays change the charge: Δq = q′ − q = n|e| **always**.
- The quantization itself is a **постулат**: theory doesn't explain it (p. 19).
- Side facts, optional: e/m = 1,7588·10¹¹ Кл/кг (Thomson 1897); m_e = 9,109·10⁻³¹ кг; quarks ±e/3, 2e/3, never found free.

Box 3 — Інваріантність заряду (p. 20)

- The value does **not** depend on the inertial frame or the speed of the carrier.
- Evidence: atoms are neutral. Electrons in He move about 2× faster than in H_2, yet both are neutral, so the charge doesn't depend on speed. Checked up to v ≈ 0,5c.
- ✎ Contrast it yourself: mass *does* change with speed (relativity), charge doesn't.

Box 4 — Закон збереження заряду (pp. 20–21)

- ***Замкнена система*** is one where no charged particles cross its boundary.
- «Повний електричний заряд замкненої системи є величиною постійною і дорівнює алгебричній сумі її позитивних та негативних зарядів»:

$$q = q_1 + q_2 + ... + q_n = \sum_{i=1}^{n} q_i = \text{const} \qquad (1.2)$$

- Consequence: charges are born and die **only in ± pairs** ($e^- e^+$ pair creation from γ, annihilation).
- Electrification by friction only **redistributes** charge; the total doesn't change (p. 16). This is a good example to draw.

Box 5 — Неперервний розподіл: густини заряду (p. 21)

- Why: 1 A ≈ 6·10¹⁸ elementary charges per second, so the discreteness is invisible and we treat charge as continuous.

Term (book's italic)	Formula	Unit
об'ємна густина заряду	$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV}$ (1.3)	Кл/м³
поверхнева густина заряду	$\sigma = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS}$ (1.4)	Кл/м²
лінійна густина	$\tau = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl}$ (1.5)	Кл/м

- Caveat (book): ΔV, ΔS, Δl are small, but each still holds many elementary charges.
- You'll reuse σ in topics 10–12 (charged plane, two planes, sphere) and τ for a charged thread.

Footer — носії заряду (p. 16)

- Stable carriers: **електрон** (−e), **протон** (+e, equal in magnitude to the electron's charge to a very high relative precision, p. 19). Ions form when an atom loses or gains electrons.

Skip, digressions with no bearing on the topic

History (Gilbert, Franklin, Dufay, Stoney), the classical electron radius $r_0 = e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_0 c^2) = 2{,}82\cdot10^{-15}$ м, spin, the electron's "infinite energy" paradox, and the neutron's lifetime. Include them only if your lecturer cares about history.

Self-check before you write

1. Why does an atom being neutral prove invariance?
2. What does Millikan's experiment prove, and what does it measure?
3. Why does friction electrify dielectrics but not metals? (p. 16)
4. Which property is a *postulate*, and which are experimental facts?

2. Закон Кулона. Диполь в неоднорідному полі

Джерело: т. 2, **§ 1.2** (с. 21–26), **§ 1.3** (с. 26), **§ 1.6** (с. 32–35). ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Закон Кулона: формулювання + (1.6)/(1.7) + рис. 1.2 крутильні ваги ┐
├ [B] Векторна форма (1.8)  │ [C] k, ε₀, одиниці                        ┤
├ [D] Принцип суперпозиції (1.10) + рис. 1.4                             ┤
├ [E] Середовище: ε (§1.3)  │ [F] Диполь у неоднорідному полі (1.26)     ┤
└ footer: межі застосування закону                                       ┘
```

[A] Закон Кулона (p. 22)

- The book's wording (worth learning by heart): «сила взаємодії F двох **нерухомих точкових зарядів у вакуумі** прямо пропорційна добуткові кількостей електрики цих зарядів q_1 і q_2, обернено пропорційна квадратові відстані r між ними і напрямлена вздовж прямої, яка сполучає ці заряди»
- $F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$ (1.6) → in SI: $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}$ (1.7)
- **точковий заряд**: the size of the bodies ≪ the distance between them (p. 24).
- Sign convention: repulsion F > 0, attraction F < 0.
- ✎ Sketch Coulomb's torsion balance (рис. 1.2): thread, beam, balls a and d.

[B] Векторна форма (p. 24)

- $\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^3}\vec{r}_{12}$ (1.8); the same for $\vec{F}_{21}$ with $\vec{r}_{21}$ (1.9). Since $\vec{r}_{12} = -\vec{r}_{21}$, $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.
- The forces are **центральні** (central): they act along the line joining the charges.

[C] Коефіцієнт і одиниці (pp. 23–24)

- $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\cdot 10^9 \ \frac{\text{Н·м}^2}{\text{Кл}^2}$; **електрична стала** $\varepsilon_0 = 8{,}854\cdot 10^{-12}$ Ф/м.
- 1 Кл = 1 А·1 с; the ampere is the base unit, so the coulomb is a derived one.
- "Раціоналізована форма" puts the 4π in k so that it drops out of the formulas used most often.
- Optional: in СГСЕ k = 1, and 1 Кл = $3\cdot 10^9$ СГСЕ units.

[D] Принцип суперпозиції (p. 25)

- The force between two charges **does not depend on other charges being present**; the net force is the vector sum: $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i q_0}{r_{i0}^3}\vec{r}_{i0}$ (1.10)
- For extended bodies, divide them mentally into point charges.

[E] Вплив середовища (§ 1.3, p. 26)

- **діелектрична проникність** $\varepsilon = F_0/F$, how many times weaker the force is in a medium than in vacuum (dimensionless).
- $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{\varepsilon r^2}$
- Why it happens: the medium undergoes **поляризація** (polarization) and partly neutralizes the charges.

[F] Диполь у неоднорідному полі (p. 35)

- In a non-uniform field the two forces differ, so a net force appears as well as the torque: $F = F_1 - F_2 = qE - q\left(E - \frac{dE}{dx}l\right) = q\frac{dE}{dx}l$ (1.26), dipole along a field line (рис. 1.14).
- ⚠ Book inconsistency: in the text $F_1 = qE$ acts on the charge in the stronger field (+q), but рис. 1.14 labels F_1 at −q. The result is correct.
- Direction: **towards increasing field strength**; the dipole is pulled into the stronger field.
- ✎ Example to write: why a charged comb attracts scraps of paper (induced dipoles).
- Optional: Example 1.1, two dipoles on one line, $F = -\frac{6p_1 p_2}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r^4}$.
- The definition of a dipole itself is in topic 5 (put it there or here, but only once).

Footer: межі застосування (p. 26)

- Verified from about 10^{-17} м (electron scattering) up to about 10^{7} м (satellites).

Self-check

1. Why is the law stated for *point* charges *at rest*?
2. What does superposition add that Coulomb's law alone doesn't give?
3. Why does a dipole in a uniform field rotate but not move?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **(1.26) via the dipole moment** (→ [F]): since $p = ql$, $F = p\,\frac{dE}{dx}$.

3. Напруженість електричного поля E

Джерело: т. 2, **§ 1.4** (с. 27), **§ 1.5** (с. 28–31). ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Що таке поле (§1.4): близькодія vs далекодія ┐
├ [B] Означення E (1.11) + пробний заряд            ┤
├ [C] Поле точкового заряду (1.12) │ [D] Суперпозиція (1.13)–(1.14) ┤
├ [E] Неперервні заряди (1.15)–(1.18)               ┤
└ [F] Силові лінії: рис. 1.6–1.8; однорідне поле    ┘
```

[A] Електричне поле (p. 27)

- **Електричне поле**: «матеріальна складова електромагнітного поля, яке діє на заряд, зумовлене зарядами або змінним у часі магнітним полем».
- Main sign of a field: **a force acts on any charge placed in it**.
- Two concepts: **далекодія** (action at a distance: instantaneous, no carrier) was rejected; **близькодія** (local action: through the field, at finite speed) is accepted.
- In electrostatics both give the same results; they differ only for moving charges.

[B] Означення напруженості (p. 28)

- **Пробний заряд** (test charge): a point charge, positive, small enough not to distort the field.
- «Напруженість E у даній точці електростатичного поля чисельно дорівнює силі, з якою поле діє на **одиничний позитивний пробний заряд**, вміщений у цю точку»
- $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ (1.11), a **вектор** and the **силова характеристика поля** (force characteristic).
- Units: Н/Кл = В/м.
- E is **локальна** (local): each point has its own value.

[C] Поле точкового заряду (p. 28)

- $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^3}\vec{r}$ (1.12), where $\vec{r}$ is the radius vector from q to the point (book, p. 28)
- Where it comes from: Coulomb's law (1.8) for q and the test charge q_0, divided by q_0 as in (1.11).
- The field is **центрально-симетричне** (centrally symmetric).
- The two-step view of interaction (p. 29): q_1 creates the field E_{12}, and the field acts on q_2 with $\vec{F}_{12} = q_2\vec{E}_{12}$.

[D] Принцип суперпозиції полів (pp. 29–30)

- $\vec{E} = \sum_{i=1}^{n}\vec{E}_i$ (1.13), $\vec{E} = \sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i}{r_i^3}\vec{r}_i$ (1.14)
- The **польове формулювання** (field formulation): the field of a system equals the sum of the fields of each charge «за відсутності всіх інших».
- «Основне завдання електростатики»: find **E** at every point from a given distribution of charges (p. 29).

[E] Неперервний розподіл (pp. 30–31)

- $dq = \rho\, dV \to \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\rho\,\vec{r}}{r^3} dV$ (1.15); similarly with σdS and τdl (1.18).
- Links to topic 1: ρ, σ, τ.

[F] Силові лінії (p. 31)

- **Силова лінія** is a line whose tangent at every point points along E.
- They start on + charges and end on − charges (or go to infinity); they **never cross**.
- Their density (lines per unit area) ∝ E.
- **Однорідне поле** (uniform field): E is the same everywhere, so the lines are parallel and evenly spaced.
- ✎ Sketch three pictures: an isolated +, an isolated −, and a +/− pair (рис. 1.6–1.8).

Self-check

1. Why must the test charge be small?
2. Why can’t field lines cross?
3. Which is primary in close-range action: the force or the field?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn’t print these forms.

- **Magnitude of (1.12)** (→ [C]): $|\vec{r}| = r$, so $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

4. Потенціал електричного поля

Джерело: т. 2, **§ 1.10** (с. 44–45, робота), **§ 1.11** (с. 48–56). ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Робота поля не залежить від шляху (1.44)–(1.46) ┐
├ [B] Означення φ (1.54)  │ [C] φ точкового заряду (1.55)  ┤
├ [D] Суперпозиція (1.56) │ [E] Різниця потенціалів, напруга (1.59), еВ ┤
└ [F] Еквіпотенціальні поверхні: рис., E ⊥ поверхні     ┘
```

[A] Робота сил поля (pp. 44–45)

- Moving q_0 in the field of q from 1 to 2: $A_{12} = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$ (1.45)
- The work **does not depend on the path**, so the field is **потенціальне (консервативне)** (conservative).
- Around a closed loop the work is 0: $\oint_L \vec{E}\, d\vec{l} = 0$ (1.46), the **циркуляція вектора E** (circulation). More on this in topic 9.

[B] Означення потенціалу (pp. 48–49)

- Work equals the **decrease** in the potential energy U of the test charge: $A_{12} = -\int_1^2 dU = q_0 \int_1^2 E\, dl \cos\alpha$ (1.53)
- $\varphi_1 = \frac{A_{1\infty}}{q_0} = \frac{U_1}{q_0} = \int_1^\infty E\, dl \cos\alpha$ (1.54)
- The book's definition: «фізична величина, що чисельно дорівнює роботі, яку виконують сили електричного поля при переміщенні **пробного одиничного заряду** із заданої точки **в нескінченність**»
- Or, in the book's words: «відношення потенціальної енергії взаємодії заряду з полем до значення цього заряду», the middle term U_1/q_0 of (1.54).
- φ is a **скалярна** (scalar) and **енергетична характеристика** (energy characteristic). 1 В = 1 Дж/1 Кл.
- Zero point: φ(∞) = 0 in theory and φ(Землі) = 0 in practice.

[C] Потенціал точкового заряду (p. 50)

- $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$ (1.55), positive for +q and negative for −q.

[D] Суперпозиція (p. 50)

- $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{r_i}$ (1.56), an **algebraic** sum, not a vector one. This is the main practical advantage of φ over E.
- Continuous charges: $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho\, dV}{r}$ (1.57).

[E] Різниця потенціалів = напруга (pp. 50–51)

- φ is defined only up to an additive constant, so **Δφ** is the physically meaningful quantity: $\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A_{12}}{q_0}$ (1.59), written **U**, unit: вольт.
- **Електрон-вольт**: 1 еВ = 1,6·10⁻¹⁹ Дж.

[F] Еквіпотенціальні поверхні (p. 51)

- A surface where φ = const. Moving a charge along it does zero work, so **E ⊥ the surface**.
- A conductor’s surface is equipotential.
- ✎ Sketch: a point charge, with concentric circles (φ) and radial arrows (E).

Self-check

1. Why can we define φ at all? (Hint: use [A].)
2. Why is φ simpler to compute than E?
3. Why is Δφ ”more physical” than φ?

5. Диполь в однорідному електричному полі

Джерело: т. 2, **§ 1.6** (с. 32–35); potential and energy in **§ 1.11** (с. 53–54). ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Означення диполя, p (1.19) + рис. 1.9  ┐
├ [B] Поле диполя: на осі (1.20), на перпендикулярі (1.21) ┤
├ [C] Момент сил у однорідному полі (1.23)–(1.25) + рис. 1.13 ┤
└ [D] Енергія, рівновага  │ [E] Потенціал диполя (1.66)       ┘
```

[A] Електричний диполь (p. 32)

- «сукупність двох однакових за абсолютним значенням і протилежних за знаком точкових зарядів +q і −q, розміщених на деякій відстані l»
- **плече диполя** l (the arm). **Жорсткий** (rigid): l is constant. **Точковий** (point dipole): l ≪ r. Example: polar molecules.
- **електричний дипольний момент**: $\vec{p} = q\vec{l}$ (1.19), pointing **from − to +**; unit Кл·м.

[B] Поле точкового диполя (pp. 32–34)

- On the axis: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\frac{2\vec{p}}{r^3}$ (1.20)
- On the perpendicular bisector: $\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\frac{\vec{p}}{r^3}$ (1.21), antiparallel to p.
- In general (1.22): falls off as **1/r³**, compared with 1/r² for a point charge.

[C] Дія однорідного поля (p. 34)

- $F_+ = -F_-$, so the resultant is 0, but they form a **пара сил** (couple): $M = pE\sin\alpha$ (1.24), $\vec{M} = [\vec{p}\cdot\vec{E}]$ (1.25), as printed
- The couple turns **p** towards **E**.
- ✎ Sketch рис. 1.13: a dipole at angle α to E, with two forces qE.

[D] Енергія і рівновага (pp. 34, 54)

- $W = -pE\cos\alpha$ (p. 34, unnumbered); on p. 54 the same energy is $U = -\vec{p}\vec{E} = -pE\cos\alpha$ (1.67).
- p ∥ E means **стійка рівновага** (stable, W is minimal); p antiparallel to E means **нестійка** (unstable).

[E] Потенціал диполя (p. 53)

- $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\vec{r}}{r^3} = \frac{p\cos\alpha}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (1.66), α is the angle between $\vec{r}$ and $\vec{p}$; falls off as 1/r².

Contrast with topic 2

Поле	Сила	Момент
однорідне	0	pE sin α
неоднорідне	q·l·dE/dx (1.26), into the stronger field	also present

Self-check

1. Why is the net force zero in a uniform field?
2. Which equilibrium is stable, and why? (Use W.)
3. Why does a dipole's field fall off faster than a charge's?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Notation** (→ [C], [D], [E]): the book writes the scalar product without a dot ($\vec{p}\vec{E}$, $\vec{p}\vec{r}$) and the vector product in square brackets, $[\vec{p}\cdot\vec{E}]$ in (1.25). Modern notation: $\vec{p}\cdot\vec{E}$ and $\vec{M}=\vec{p}\times\vec{E}$.
- **Potential energy: W or U** (→ [D]): the book uses both letters for the same dipole energy, W on p. 34 and U on p. 54. Many courses write U (or W_p).

6. Потік вектора напруженості. Теорема Гаусса

Джерело: т. 2, **§ 1.7** (с. 36–38). The applications are in topics 10–12. ✔ Formulas checked against the scan.

Spelling: the book writes **Гаусса** (double c); the syllabus writes «Гауса».

Layout

```
┌ [A] Потік: означення (1.27) + рис. 1.16 (площадка, нормаль, кут α) ┐
├ [B] Ідея доведення: тілесний кут (1.29), рис. 1.17 а/б             ┤
├ [C] Теорема Гаусса: формулювання + (1.31), (1.33)                  ┤
└ [D] Фізичний зміст: джерела/стоки; Гаусс = Кулон в інтегральній формі ┘
```

[A] Потік вектора E (p. 36)

- A uniform field through a flat patch: $\Delta\Phi_E = E\,\Delta S\cos\alpha = E_n\Delta S$ (1.27)
- In general: $\Phi_E = \int_S E_n\,dS$
- The sign comes from cos α. The **outward** normal is taken as positive.
- Picture: the number of field lines crossing the surface.

[B] Ідея доведення (pp. 36–38)

- For a point charge, $d\Phi_E = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\omega$ (1.29), where dω is the **тілесний кут** (solid angle).
- Charge **inside**: $\oint d\omega = 4\pi$, so $\Phi_E = q/\varepsilon_0$ (1.30).
- Charge **outside**: every cone crosses the surface an even number of times, so $\Phi_E = 0$ (1.32).
- ✎ Draw рис. 1.17 а/б: a cone from q cutting a closed surface once vs twice.

[C] Теорема Гаусса (p. 38)

- «потік вектора напруженості електростатичного поля у вакуумі Ф_E крізь **довільну замкнену поверхню** S зсередини назовні дорівнює **алгебричній сумі** тих точкових зарядів q_i, які охоплюються поверхнею S, поділеній на електричну сталу ε₀»
- $\Phi_E = \oint_S E_n\,dS = \dfrac{1}{\varepsilon_0}\sum_i q_i$ (1.31)
- Continuous charges: $\Phi_E = \dfrac{1}{\varepsilon_0}\left(\int_V \rho\,dV + \int_S \sigma\,dS\right)$ (1.33)

[D] Фізичний зміст (p. 38)

- + charges are **джерела** (sources) of the field and − charges are **стоки** (sinks).
- The theorem holds *because* E ∝ 1/r². So «теорема Гаусса є **інтегральною формою запису закону Кулона**».
- Why it matters: it turns hard integrals (1.15) into a short symmetry argument (topics 10–12), and it leads to the differential form (topic 7).

Self-check

1. Why doesn’t the flux depend on the shape of the surface?
2. Why does a charge outside give zero flux?
3. Why would the theorem fail if the force went as 1/r³?

7. Дивергенція вектора E

Джерело: т. 2, **§ 1.8 «Теорема Гаусса в диференціальній формі»** (с. 41–43). ✔ Formulas checked against the scan.

This overlaps topic 13 (Остроградський–Гаусс). Suggested split: **this page = div and its meaning**, **topic 13 = the integral↔differential bridge**.

Layout

```
┌ [A] Навіщо: інтегральна vs диференціальна форма ┐
├ [B] Виведення: паралелепіпед dx dy dz, рис. 1.22 ┤
├ [C] Означення div (через границю) + декартова форма ┤
└ [D] div E = ρ/ε₀ (1.42) + фізичний зміст        ┘
```

[A] Мотивація (p. 41)

- The integral form links **different** points: E on the surface and q inside the volume.
- The differential form links quantities **at one point**, which fits close-range action.

[B] Виведення (pp. 41–42)

- A tiny box dx·dy·dz around charge ρ dV. The flux through the pair of x-faces is $\frac{\partial E_x}{\partial x} dx\,dy\,dz$; the same goes for y and z.
- By Gauss: the total flux $\left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}\right) dx\,dy\,dz$ equals $\rho\,dx\,dy\,dz/\varepsilon_0$, so $\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (1.38)
- ✎ Draw the box with E_x entering on the left and E_x + ($\partial E_x/\partial$x)dx leaving on the right.

[C] Означення дивергенції (p. 42)

- **розходження, або дивергенція** of a vector A at a point is the limit of flux per unit volume: $\operatorname{div}\vec{A} = \lim_{V\to 0} \frac{\oint_S A_n\,dS}{V}$, which doesn't depend on the shape of S.
- Cartesian form: $\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$ (1.43)

[D] Результат (pp. 42–43)

- $\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (1.42), Gauss's theorem in differential form = **диференціальна форма закону Кулона**.
- Meaning: div measures the **потужність джерел або стоків** (strength of sources or sinks).
  - div E > 0: lines start here (+ charge).
  - div E < 0: lines end here (− charge).
  - Where ρ = 0: div E = 0, so the lines pass through.

Self-check

1. What does div E = 0 mean at a point in empty space?
2. Why is (1.42) "local" and (1.31) not?

8. Зв’язок між напруженістю та потенціалом

Джерело: т. 2, **§ 1.11** (с. 51–53). ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Інтегральний зв'язок: φ₁ − φ₂ = ∫E dl (1.60)        ┐
├ [B] Диференціальний: E_x = −∂φ/∂x → E = −grad φ (1.62)  ┤
├ [C] Однорідне поле: E = U/d   │ [D] Градієнт: що це     ┤
└ [E] Рівняння Пуассона (1.63) і Лапласа (1.64)           ┘
```

[A] φ із E (p. 51)

- $\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E}\, d\vec{l}$ (1.60), which gives φ when E is known.
  - ⚠ **Misprint in the book** (p. 51): (1.60) is printed with a minus, φ₁ − φ₂ = −∫E dl. That contradicts its own (1.53) and (1.59), A₁₂ = q₀∫E dl = q₀(φ₁ − φ₂). The form without the minus is correct: going along E, the potential falls.

[B] E із φ (pp. 51–52)

- Over a small dx: $dA = q_0 E_x\, dx = -q_0\, d\varphi$, so $E_x = -\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}$, and likewise E_y, E_z.
- $\vec{E} = -\left(\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} + \dfrac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{j} + \dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k}\right) = -\operatorname{grad}\varphi$ (1.61)–(1.62)
- **Мінус**: E points the way φ **decreases**.

[C] Однорідне поле (p. 52)

- $E = \dfrac{\varphi_1 - \varphi_2}{d} = \dfrac{U}{d}$, which is why E is measured in **В/м**.

[D] Градієнт (p. 52)

- **grad φ** is the vector pointing in the direction of the **fastest increase** of φ; its length is the derivative of φ along that direction.
- So E ⊥ the equipotentials (topic 4[F]), pointing ”downhill”.
- ✎ A picture that helps: φ as the height of a hill, E as the direction a ball rolls.

[E] Рівняння Пуассона і Лапласа (pp. 52–53)

- Put E = −grad φ into div E = ρ/ε₀: $\nabla^2\varphi = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$ (1.63), the **рівняння Пуассона**
- Where ρ = 0: $\nabla^2\varphi = 0$ (1.64), the **рівняння Лапласа**
- $\nabla^2 = \dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial z^2}$, the **лапласіан**
- And rot grad φ ≡ 0, so the second equation (rot E = 0) holds automatically (links to topic 9).

Self-check

1. Where is the field stronger: where equipotentials are dense or sparse?
2. Can E = 0 where φ ≠ 0? Give an example. (Inside a conductor.)

9. Теорема Стокса

Джерело: т. 2, **§ 1.10** (с. 45–48). The book doesn't give Stokes a section of its own: it appears inside «Робота сил електричного поля. Потенціальний характер електростатичного поля». ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Циркуляція E = 0 (1.46): електростатичне поле потенціальне ┐
├ [B] Ротор: означення (1.47) + рис. 1.25, 1.26                   ┤
├ [C] Декартова форма rot A (1.49)                                ┤
├ [D] Теорема Стокса: ∮A dl = ∫rot A dS                           ┤
└ [E] rot E = 0 (1.51); система div E = ρ/ε₀, rot E = 0 (1.52)    ┘
```

[A] Циркуляція (p. 45)

- **циркуляція вектора E**: $\oint_L \vec{E}\, d\vec{l}$ around a closed loop L.
- Electrostatics: $\oint_L \vec{E}\, d\vec{l} = 0$ (1.46), the integral form of **потенціальність** (the field being conservative).
- Consequence: electrostatic field lines are **not closed**; they start and end on charges.

[B] Ротор (p. 46)

- From the Latin *roto*, "I turn". It measures the «завихрення» (curl, or whirl) of a vector field.
- The projection onto the direction n: $\operatorname{rot}_n \vec{A} = \lim\limits_{\Delta S \to 0} \dfrac{\oint_L \vec{A}\, d\vec{l}}{\Delta S}$ (1.47), with the loop direction set by the **правий гвинт** (right-hand screw) rule.

[C] Декартова форма (p. 47)

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{k} \quad (1.49)$$

[D] Теорема Стокса (p. 47)

- $\oint_L \vec{A}\, d\vec{l} = \int_S \operatorname{rot} \vec{A}\, d\vec{S}$, where S is **any** surface bounded by the loop L.
- Words: the circulation around a loop = the flux of the curl through a surface spanning that loop.
- ✎ Sketch: a loop L with a "soap film" S on it and normals n.

[E] Застосування до E (pp. 47–48)

- $\int_S \operatorname{rot} \vec{E}\, d\vec{S} = \oint \vec{E}\, d\vec{l} = 0$ (1.50) for any S, so $\operatorname{rot} \vec{E} = 0$ (1.51).
- The two **basic differential equations of electrostatics** (1.52): $\operatorname{div} \vec{E} = \rho/\varepsilon_0, \qquad \operatorname{rot} \vec{E} = 0$
- These replace Coulomb's law plus superposition, and they are a special case of **Maxwell's equations**.

Pairing table (our summary; good for the page footer)

	інтегральна форма	**диференціальна форма**	**теорема-міст**
джерела	$\oint E\,dS = q/\varepsilon_0$	$\operatorname{div} E = \rho/\varepsilon_0$	Остроградського–Гаусса (topic 13)
вихори	$\oint E\,dl = 0$	$\operatorname{rot} E = 0$	Стокса (this topic)

Self-check

1. Why do closed field lines contradict rot E = 0?
2. What is the difference between ”flux” and ”circulation”?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn’t print these forms.

- **Memory aid for (1.49)** (→ [C]): rot A is a 3×3 determinant with rows (i j k), (∂/∂x ∂/∂y ∂/∂z), (A_x A_y A_z). Modern notation writes rot A as ∇ × A and div A as ∇ · A.

10–12. Поле зарядженої площини · двох площин · сферичної поверхні

Джерело: т. 2, **§ 1.7** applications (с. 38–40); potentials in **§ 1.11** (с. 54–56). ✔ Formulas checked against the scan.

One method, three shapes, so they fit well on one double page with a shared ”recipe” box.

Recipe box (our method, not from the book; write it once, at the top)

1. Use the symmetry to find the **direction** of E.
2. Choose a closed **Gaussian surface** on which E is constant or the flux is 0.
3. Compute the flux by definition (E·area) and set it equal to $q_{\text{inside}}/\varepsilon_0$.
4. Solve for E. Then get φ from $\varphi_1 - \varphi_2 = \int E\,dl$.

---

10. Поле рівномірно зарядженої нескінченної площини (pp. 38–39, 54)

- ”Infinite” means the distance to the plane ≪ its size.
- Symmetry: E ⊥ the plane. Surface: a **прямий циліндр** (right cylinder) crossing the plane, with bases S.
- Flux: through the side = 0 and through the two bases = 2ES. Enclosed charge σS.
- $2ES = \dfrac{\sigma S}{\varepsilon_0} \Longrightarrow E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (1.34)
- E doesn’t depend on distance, so the field on each side is **однорідне** (uniform).
- Potential: $\varphi(x) = \varphi(0) - \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}x$, decreasing linearly.
- ✎ Sketch рис. 1.18: the plane, a cylinder through it, and arrows out of both bases.

11. Поле двох різнойменно заряджених паралельних площин (p. 39)

- +σ and −σ. By **superposition**, the fields add between the planes and cancel outside.
- Between: $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (1.35). Outside: E = 0.
- Two planes with the **same** sign: E = 0 between them.
- Potential between: $\varphi(x) = \varphi(0) - \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}x$ (p. 55).
- ✎ Sketch рис. 1.19: two plates, three regions, the field arrows from each plate, and their sum.
- Related: the field right next to a conductor is $E = \sigma/\varepsilon_0$ (1.36), p. 40 (topic 14).

12. Поле рівномірно зарядженої сферичної поверхні (кулі) (pp. 40, 55)

- Symmetry: E is radial. Surface: a **concentric sphere** of radius r.
- Outside (r > R): $E \cdot 4\pi r^2 = q/\varepsilon_0 \Longrightarrow E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}$, the same as a point charge at the centre.
- Inside a **сфера** (conducting ball, charge on the surface): E = 0 and φ = const = $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$.
- Potential outside: $\varphi(r) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$.
- Optional, a ball charged through its **volume** with ρ: inside, $E = \dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0\varepsilon}$, which grows linearly.
- ✎ Plot E(r) and φ(r) for the shell: E jumps up at R then falls as $1/r^2$; φ is flat inside then falls as $1/r$.

Bonus row (book p. 40, cylinder)

- An infinite charged cylinder or thread with linear density τ: $E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}$ (1.37) outside, 0 inside a cylindrical surface.
  - ⚠ **Misprint in the book** (p. 40): (1.37) is printed as E = η/(4πε₀r), but the line above it, E·2πrh = ηh/ε₀, gives **η/(2πε₀r)**. The book itself uses η/(2πε₀r) for the cylindrical capacitor (p. 62). The book writes the linear density as **η** here, not τ.

Summary table (our summary; good for the page footer)

Розподіл	**Гауссова поверхня**	**E**	**залежність від r**
площина σ	циліндр ⊥	σ/2ε₀	const
дві площини ±σ	— (суперпозиція)	σ/ε₀ між, 0 зовні	const
нитка/циліндр τ	коаксіальний циліндр	τ/2πε₀r	1/r
сфера q	концентрична сфера	q/4πε₀r² зовні, 0 всередині	1/r²

Self-check

1. Why does the plane give 1/(2ε₀) but the conductor's surface 1/ε₀?
2. Why does E not depend on distance for a plane, when it does for a sphere?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Voltage between the plates** (→ 11): put x = d into φ(x), so $U = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}$. This is the parallel-plate capacitor of topic 15.

13. Теорема Остроградського–Гаусса

Джерело: т. 2, **§ 1.8** (с. 42); also used in § 2.1 (с. 109) for the continuity equation. ✔ Formulas checked against the scan.

Watch the naming. The syllabus says «Теорема Остроградського-Гауса». The book uses this name for the **mathematical formula** (the divergence theorem), and calls the physical law (topic 6) «теорема Гаусса». Keep them apart on the page.

Layout

```
┌ [A] Математична теорема: ∮A dS = ∫div A dV     ┐
├ [B] Застосування до E: (1.39) → (1.40) → (1.41) ┤
├ [C] Висновок: div E = ρ/ε₀ (1.42)               ┤
└ [D] Ще одне застосування: рівняння неперервності (2.12) ┘
```

[A] Формула Остроградського–Гаусса (p. 42)

- For any vector field A, closed surface S and the volume V it bounds: $\oint_S A_n \, dS = \int_V \operatorname{div} \vec{A} \, dV$
- Words: the flux out through the boundary = the sum of the ”sources” inside.
- ✎ Picture: a volume filled with small cubes; the fluxes across shared faces cancel, leaving only the outer surface.

[B] Застосування до поля E (p. 42)

1. Physics (Gauss, topic 6): $\oint_S E_n \, dS = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, dV$ (1.39)
2. Mathematics (Ostrogradsky–Gauss): $\oint_S E_n \, dS = \int_V \operatorname{div} \vec{E} \, dV$ (1.40)
3. So: $\int_V \operatorname{div} \vec{E} \, dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, dV$ (1.41)

[C] Висновок (p. 42)

- V is **arbitrary**, so the integrands are equal: $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (1.42)
- This is the same result as topic 7, reached differently: topic 7 used a small box, and this one uses the general theorem.

[D] Bonus: рівняння неперервності (§ 2.1, p. 109)

- The same trick on the current density j: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{j}$ (2.12), which is charge conservation in local form. Links to topics 1 and 20.

Self-check

1. Which step needs ”V is arbitrary”, and why?
2. Who proved what? (Ostrogradsky the maths, Gauss the electrostatics.)

14. Провідник у зовнішньому електричному полі

Джерело: т. 2, **§ 1.12** «Розподіл зарядів на поверхні провідника» (с. 56–59), **§ 1.13** «Провідники в електричному полі» (с. 59–60). ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Провідник: вільні носії; рівновага → E = 0 всередині ┐
├ [B] Наслідки: ρ = 0, заряд на поверхні, поверхня еквіпотенціальна, E ⊥ поверхні ┤
├ [C] Електростатична індукція (§1.13) + малюнок          ┤
├ [D] Порожнина, клітка Фарадея │ [E] Кривизна і σ, вістря ┤
└ footer: E біля поверхні = σ/ε₀ (1.36); Ван де Грааф (optional) ┘
```

[A] Провідник у рівновазі (p. 56)

- **Провідники** have **вільні носії заряду** (free charge carriers): electrons in metals, ions in electrolytes.
- In equilibrium the carriers don't drift, so **E = 0 inside**.

[B] Наслідки (pp. 56–57)

- From div E = ρ/ε₀ with E = 0, we get **ρ = 0 inside**: any excess charge sits **only on the outer surface**, described by σ.
- The surface is **еквіпотенціальна**, and **E ⊥ the surface** at every point.
- Just outside: $E = \sigma/\varepsilon_0$ (1.36), p. 40.

[C] Електростатична індукція (pp. 59–60)

- The book's term: «Явище перерозподілу електричних зарядів у провіднику під дією зовнішнього електричного поля … називають **електростатичною індукцією** або **електризацією через вплив**»
- The electrons shift against E, so the near face (facing the incoming field) turns −, and the far face turns +.
- The induced charges create an inner field **E′ opposite to E**. The shift stops once E′ = E, so the total inside is 0.
- Charging by induction: put two touching conductors in the field, separate them, then remove the field. You are left with a + body and a − body.
- ✎ Sketch: a metal block in uniform E, with − on the left face, + on the right, and E′ inside pointing the other way.

[D] Порожнина, захист (p. 57)

- The field inside a closed conducting cavity is 0 (Faraday's experiments). This is the basis of **електростатичний захист** (electrostatic shielding).
- A charged body inside a cavity gives up **all** its charge to the outer surface. Optional: the **електростатичний генератор** (Van de Graaff) works this way, pp. 57–58.

[E] Кривизна поверхні (pp. 58–59)

- Two balls joined by a wire end up with $\varphi_1 = \varphi_2$, so $\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}$.
- σ, and therefore E, is larger where the curvature is larger, so charge leaks off **вістря** (sharp points). This is how lightning rods work, and why power lines lose energy.

Self-check

1. Why E = 0 inside, from the carriers’ point of view?
2. Where does excess charge go, and why not into the bulk?
3. Why does charge leak off sharp points?

15. Конденсатори та їх ємність. Ємність плоского, циліндричного та сферичного конденсаторів

Джерело: т. 2, **§ 1.14** (с. 60–63). ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Ємність відокремленого провідника (1.68); фарад; куля C = 4πε₀εR ┐
├ [B] Конденсатор: означення, обкладки, (1.70); вплив діелектрика ε    ┤
├ [C] Плоский │ [D] Циліндричний │ [E] Сферичний  (три малюнки в ряд)  ┤
└ footer: робоча напруга / пробій                                      ┘
```

[A] Електрична ємність провідника (p. 60)

- For an isolated conductor q/φ = const: $C = \frac{q}{\varphi}$ (1.68), $\Delta q = C\Delta\varphi$ (1.69)
- Meaning: «електрична ємність провідника чисельно дорівнює зарядові, який потрібний для зміни потенціалу провідника на одиницю»
- Unit: **фарад**, 1 Ф = 1 Кл/В. It is enormous: a ball of R = 9·10⁶ км would have 1 Ф. Hence мкФ = 10^{-6} Ф and пФ = 10^{-12} Ф.
- A sphere: $C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon R$.
- C depends on the **size, the shape and the surrounding medium**, but not on the material or on hollows inside.

[B] Конденсатор (p. 61)

- «система з двох металевих електродів, розміщених на близькій відстані один від одного і розділених шаром діелектрика»; the electrodes are called **обкладки** (plates).
- The field sits almost entirely between the plates, so C hardly depends on nearby bodies (unlike a single conductor).
- $C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U}$ (1.70)
- Filling it with a dielectric: $C/C_0 = \varepsilon$.

[C] Плоский (p. 61)

- Two parallel plates of area S at distance d ≪ the plate size (ignore edge effects).
- In vacuum: $\varphi_1 - \varphi_2 = Ed = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}d = \frac{q}{\varepsilon_0 S}d$ (topic 11) $\Longrightarrow C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$ (1); with a dielectric $C = \frac{\varepsilon_0\varepsilon S}{d}$

[D] Циліндричний (pp. 61–62)

- Two coaxial cylinders $r_1 < r_2$ of height h ≫ r.
- In vacuum: $E = \frac{\eta}{2\pi\varepsilon_0 r} \Longrightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\eta}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1} \Longrightarrow C = \frac{2\pi\varepsilon_0 h}{\ln(r_2/r_1)}$ (2); with a dielectric $C = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon h}{\ln(r_2/r_1)}$. η is the linear charge density.
- A small gap $d = r_2 - r_1 \ll r_1$ gives $C \approx \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1 h}{d}$, which is a flat capacitor. ✎ Worth noting why.

[E] Сферичний (p. 62)

- Two concentric spheres $r_1 < r_2$.
- In vacuum: $\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \Longrightarrow C = \frac{4\pi\varepsilon_0 r_1 r_2}{r_2 - r_1}$ (3); with a dielectric $C = \frac{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r_1 r_2}{r_2 - r_1}$

The same pattern three times (our summary)

Find E (Gauss) → integrate to get U → C = q/U. ✎ Write that one line above the three drawings.

Footer (p. 63)

- **робоча напруга** (rated voltage) U_p: above it **пробій** (breakdown) occurs.
- Optional: a two-wire line, $C \approx \pi\varepsilon_0 h / \ln(d/r)$ for length h, d ≫ r (Example 1.3, (4)).

Self-check

1. Why do capacitors work better than isolated conductors?
2. How do the three C formulas show ”C depends only on geometry and ε”?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn’t print these forms.

- **Spherical capacitor check** (→ [E]): as $r_2 \to \infty$, (3) becomes the single sphere $C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1$ of [A].
- **Notation** (→ [D]): for linear charge density the book uses τ in (1.5) but η in the worked examples (pp. 40, 62). (1), (2), (3), (4) are the numbers inside Examples 1.2–1.3, not chapter equations.

16. З’єднання конденсаторів

Джерело: т. 2, **§ 1.14** (с. 63–64). ✔ Formulas checked against the scan. A short topic: half a page.

Layout (two columns)

```
┌ Паралельне (рис. 1.31)        │ Послідовне (рис. 1.32)          ┐
│ U однакова                    │ q однаковий (електростатична індукція) │
│ q = q₁ + q₂ + …               │ U = U₁ + U₂ + …                  │
│ C = C₁ + C₂ + … (1.71)        │ 1/C = 1/C₁ + 1/C₂ + … (1.72)     │
│ n однакових: C = nC₀          │ n однакових: C = C₀/n            │
└ footer: навіщо (батареї); імпульс nU (рис. 1.33)                  ┘
```

Паралельне з’єднання (p. 63)

- The same voltage U on every capacitor; the charges add: $q = (C_1 + C_2 + ... + C_n)U$.
- $C = C_1 + C_2 + ... + C_n$ (1.71)

Послідовне з’єднання (pp. 63–64)

- **Electrostatic induction** gives every capacitor the same charge q; the voltages add.
- $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + ... + \frac{1}{C_n}$ (1.72)
- C is always **smaller than the smallest** C_i.

Why connect them (p. 63)

- To get a needed capacitance at a needed voltage, in a **батарея конденсаторів** (capacitor bank). Series connection splits the voltage, so the bank can handle a higher one.
- Trick (p. 64, рис. 1.33): charge n capacitors in parallel to U, then switch them to series and you get nU. Used for high-voltage pulses.

✎ Your own line

- Contrast with resistors (topic 22): capacitors in parallel **add up**, while resistors **add up in series**. Note why: C ∝ q/U and R ∝ U/I.

Self-check

1. Why is the charge the same on capacitors in series?
2. Two capacitors, 2 мкФ and 3 мкФ: give C for each connection. (5 and 1,2 мкФ.)

17. Енергія зарядженого провідника

Джерело: т. 2, **§ 1.25** «Енергія взаємодії електричних зарядів» (с. 101–103), **§ 1.26** start (с. 103–104). ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Енергія двох зарядів (1.128)–(1.129) ┐
├ [B] Система n зарядів (1.130): чому ½    ┤
├ [C] Заряджання провідника: dA = φ dq → (1.132) ┤
└ [D] Те саме для конденсатора (1.133)       ┘
```

[A] Два точкові заряди (pp. 101–102)

- Bring the charges from infinity: $W = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}}$ (1.128)
- In symmetric form: $W = \frac{1}{2}(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2)$ (1.129), where φ_1 is the potential that q_2 creates at q_1.

[B] Система n зарядів (p. 102)

- $W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i\varphi_i$ (1.130), where φ_i is the potential at q_i from **all the other** charges.
- **Why ½**: each pair is counted twice in the sum.
- Continuous charges: $W = \frac{1}{2}\left(\int \rho\varphi\, dV + \int \sigma\varphi\, dS\right)$.

[C] Енергія зарядженого провідника (pp. 103–104)

- Charge the conductor in portions dq brought from infinity. Each costs $dA = \varphi\, dq = \frac{q}{C}dq$.
- From 0 to q: $A = \frac{q^2}{2C}$, which becomes the stored energy.
- $W = \frac{q\varphi}{2} = \frac{C\varphi^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$ (1.132)

[D] Конденсатор (p. 104)

- (1.132) also gives the energy of a capacitor, with φ replaced by the voltage Δφ = U. For a parallel-plate capacitor: $W_{\text{п}} = \frac{1}{2}C\Delta\varphi^2$ (1.133)
- Picture: carry charge from one plate to the other.

Self-check

1. Where does the ½ come from? Give two explanations: double counting and the triangle.
2. If q doubles, how does W change? (×4.)

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Where the ½ comes from** (→ [C]): φ = q/C is a straight line through 0 on a φ–q graph, and the work $\int \varphi\, dq$ is the area under it, a triangle. ✎ Worth a small sketch.
- **All three forms for a capacitor** (→ [D]): $W = \frac{CU^2}{2} = \frac{qU}{2} = \frac{q^2}{2C}$, from (1.132) with U = Δφ.
- **Notation** (→ all): in §§ 1.25–1.26 the book writes potential energy as $W_{\text{п}}$. It uses W in § 1.6 and U in § 1.11 for the same kind of quantity.

18. Енергія електростатичного поля

Джерело: т. 2, **§ 1.26** (с. 103–105). ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Від енергії конденсатора до енергії поля (1.133)→(1.134) ┐
├ [B] Неоднорідне поле (1.135)                                 ┤
├ [C] Об'ємна густина енергії w (1.136)                        ┤
└ [D] Де «живе» енергія: заряди чи поле? (близькодія vs далекодія) ┘
```

[A] Перетворення для плоского конденсатора (p. 104)

- Start from $W_{\text{п}} = \frac{1}{2} C \Delta\varphi^2$ (1.133) and put in $\Delta\varphi = Ed$ and $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$:
- $W_{\text{п}} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} Sd = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} V$ (1.134), where V = Sd is the volume between the plates.
- The energy is now written through the **field E** and the **volume**, with no charges in it.

[B] Загальний випадок (p. 104)

- A non-uniform field: $W_{\text{п}} = \frac{1}{2} \int_V \varepsilon_0 \varepsilon E^2 \, dV$ (1.135)

[C] Густина енергії (p. 105)

- **об'ємна густина енергії електричного поля**: $w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D}$ (1.136)
- Here $D = \varepsilon_0 \varepsilon E$ is the **вектор електричної індукції** (electric displacement), defined in the dielectrics sections, §1.16+. One line on the page is enough.
- Unit: Дж/м³.

[D] Фізична інтерпретація (p. 105), worth a boxed note

- **Близькодія**: the energy is carried by the **field** and spread through space with density w.
- **Далекодія**: the energy sits on the charged conductors.
- In **electrostatics no experiment can tell them apart**, because the field can't be separated from its charges.
- **Changing fields** settle it: EM waves carry energy with no charges present, so the energy is in the field.

Self-check

1. Topic 17 and topic 18 give the same W. What is the difference between them?
2. Why does an EM wave prove the energy is in the field?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Density as energy per volume** (→ [C]): in a uniform field w = W/V, from (1.134). Written with the modern dot: $w = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$.

19. Електричний струм. Постійний електричний струм. Закони Ома

Джерело: т. 2, **§ 2.1** (с. 105–110), **§ 2.2** (с. 110–115), **§ 2.3** (с. 118–120). ✔ Formulas checked against the scan.

Overlaps topics 20–21. Suggested split: **this page = what a current is plus all three forms of Ohm's law**; topic 20 = the quantities I, j, EPC; topic 21 = R, ρ, power.

Layout

```
┌ [A] Струм: означення, носії, напрям, види ┐
├ [B] Постійний струм: умови (2.3), (2.13)–(2.14) ┤
├ [C] Закон Ома для однорідної ділянки (2.16)–(2.17) ┤
├ [D] Диференціальна форма j = σE (2.23)              ┤
└ [E] Неоднорідна ділянка (2.33) і повне коло (2.34) ┘
```

[A] Електричний струм (pp. 105–106)

- «**упорядкований рух** електричних зарядів»
- **Носії заряду** (charge carriers): electrons in metals and semiconductors; ions in electrolytes; electrons and ions in gases.
- **Напрям струму** (direction): the way **positive** charges move, so in metals it runs opposite to the electrons.
- Kinds of current: **струм провідності** (conduction, inside a conductor), **конвекційний** (convection, the charged body itself moves), **струм поляризації** (polarization, in dielectrics).

[B] Постійний струм (pp. 107, 110)

- **стаціонарний або постійний** (steady): equal charges pass in equal times and the direction doesn't change. $I = \Delta q / \Delta t$ (2.3)
- Continuity for a steady current: $\oint \vec{j}\, d\vec{S} = 0$ (2.13), $\operatorname{div} \vec{j} = 0$ (2.14). Current lines are **closed**, and I is the same along an unbranched wire.

[C] Закон Ома (однорідна ділянка) (pp. 111–112)

- «сила струму в однорідному провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях цього провідника»
- $I = kU$ (2.16), where k is the **провідність** (conductance, unit См) → $I = \dfrac{U}{R}$ (2.17)
- **спад напруги** (voltage drop) $U = \varphi_1 - \varphi_2$ along a wire carrying current.

[D] Диференціальна форма (p. 114)

- A small cylinder dl·dS: $j\, dS = \dfrac{E\, dl}{\rho\, dl/dS} \Longrightarrow \vec{j} = \sigma \vec{E}$ (2.23)
- «густина електричного струму в будь-якій точці фізично однорідного провідника пропорційна напруженості електричного поля»
- σ depends **only on the material**, not on shape or size.
- Ohm's law is **not fundamental**: it fails in strong fields, at contacts, and in diodes (нелінійні елементи), p. 115.

[E] Неоднорідна ділянка і повне коло (pp. 119–120)

- A section with a source: $IR_{12} = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12}$ (2.33). Sign rule: **EPC > 0** if, moving along the current, you pass the source from − to +.
- A closed circuit ($\varphi_1 = \varphi_2$): $I = \dfrac{\mathcal{E}}{R + r}$ (2.34), where r is the **внутрішній опір** (internal resistance).
- $U = IR = \mathcal{E} - Ir$ (2.35). An open circuit gives U = $\mathcal{E}$. A short circuit gives $I_{max} = \mathcal{E}/r$ (2.37).

Three forms of Ohm's law (our summary; good for the page footer)

ділянка	закон
однорідна	$I = U/R$
неоднорідна	$IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}$
повне коло	$I = \mathcal{E}/(R + r)$
точка	$j = \sigma E$

Self-check

1. Why is a steady current impossible with Coulomb forces alone? (See topic 20.)
2. Which form of Ohm's law is local, and why does that matter?

20. Сила струму, густина струму. Електрорушійна сила

Джерело: т. 2, **§ 2.1** (с. 106–110), **§ 2.3** (с. 115–118). ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Сила струму I (2.1); ампер, кулон                ┐
├ [B] Густина струму j (2.4)–(2.10) + рис. 2.1 (циліндр v·dt) ┤
├ [C] Рівняння неперервності (2.11)–(2.12)            ┤
├ [D] Сторонні сили: навіщо + рис. 2.4 (кругообіг зарядів) ┤
└ [E] ЕРС: означення (2.28), циркуляція (2.29)–(2.30) ┘
```

[A] Сила струму (p. 106)

- «скалярна величина, яка чисельно дорівнює зарядові, що переноситься крізь поперечний переріз провідника за одиницю часу»
- $I = \dfrac{dq}{dt}$ (2.1). Unit: **ампер**, a base SI unit. 1 Кл = 1 А·1 с.

[B] Густина струму (pp. 107–109)

- $j = \dfrac{dI}{dS_\perp}$ (2.4), a **vector** pointing along the drift of positive carriers.
- Through carriers: $\vec{j} = n_0 e \vec{v}_д$ (2.6), where n_0 is the concentration and $v_д$ the **дрейфова швидкість** (drift velocity).
- For electrons: $\vec{j} = -n_0 |e| \vec{v}_д$ (2.7).
- $I = \int_S j_n \, dS$ (2.9). Uniform current: $I = n_0 e v_д S = jS$ (2.10). Unit А/м².
- Note: the average thermal velocity ⟨v⟩ = 0, so only the drift carries current.
- ✎ Sketch рис. 2.1a: a cylinder of base dS and length $v_д$·dt; everything inside it passes through in time dt.

[C] Рівняння неперервності (pp. 109–110)

- $\oint_S j_n \, dS = -\dfrac{\partial q}{\partial t}$ (2.11) $\Longrightarrow \dfrac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{j}$ (2.12) via Ostrogradsky–Gauss (topic 13).
- This is **charge conservation** in macroscopic electrodynamics (topic 1).

[D] Сторонні сили (pp. 115–116)

- Coulomb forces alone would equalize the potentials (E → 0) and stop the current.
- The charges have to be pushed **against** E inside the source, which takes **сторонні сили**: «Будь-які сили неелектростатичної природи, які діють на заряджені частинки». They can be chemical, mechanical, magnetic, from light, and so on.
- **Джерело струму** (current source): a device where external forces act (a cell, a generator, a thermocouple, a solar panel).
- Their field $E_{ст}$ gives $\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}_{ст})$ (2.26).
- ✎ Sketch рис. 2.4: a loop where the wire runs $\varphi_1 \to \varphi_2$ and the source pushes $\varphi_2 \to \varphi_1$.

[E] Електрорушійна сила (p. 118)

- «Скалярну величину $\mathcal{E}$, яка дорівнює **роботі сторонніх сил, віднесеній до одиниці позитивного заряду**, називають електрорушійною силою (ЕРС)»
- $\mathcal{E} = \dfrac{A}{q}$ (2.28), A being the work of the external forces; in a closed loop $\mathcal{E} = \oint \vec{E}_{ст} d\vec{l}$ (2.29), the **circulation of the external-force field**. On a section 1–2: $\mathcal{E}_{12} = \int_1^2 \vec{E}_{ст} d\vec{l}$ (2.30).

- Despite the name, it's **not a force**: it's an energy characteristic of the source, measured in volts.
- Contrast with topic 9: the circulation of E is 0 and the circulation of $E_{\text{ст}}$ is $\mathcal{E} \neq 0$. That non-zero circulation is exactly what keeps the current going (pp. 117–118).

Self-check

1. Why is the drift velocity tiny, yet a lamp lights up instantly?
2. Why is "electromotive *force*" a misleading name?

21. Поняття опору. Потужність

Джерело: т. 2, **§ 2.2** (с. 111–114), **§ 2.4** (с. 121–123). ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Опір R: означення, Ом, звідки береться        ┐
├ [B] R = ρl/S (2.18); питомий опір; σ = 1/ρ (2.21) ┤
├ [C] Залежність від T (2.19)–(2.20) + графік ρ(T)  ┤
├ [D] Робота струму (2.38)–(2.41)                   ┤
└ [E] Потужність (2.43)–(2.46); ККД; макс. при R = r + графік P(R) ┘
```

[A] Електричний опір (pp. 111–112)

- $R = 1/k$, the inverse of conductance. 1 Ом: 1 A flows at 1 B.
- Where it comes from (metals): electrons **scatter** on lattice defects and **thermal vibrations** of the lattice.
- It doesn't depend on I (for moderate currents); it depends on geometry, material and state (T, p).

[B] Опір провідника (pp. 112–113)

- $R = \rho\dfrac{l}{S}$ (2.18), where ρ is the **питомий опір** (resistivity), in Ом·м.
- $\sigma = 1/\rho$ (2.21), the **питома електропровідність** (conductivity), in См/м.
- Lowest ρ: silver, copper, gold, aluminium (used for wires). High ρ: nichrome (heaters), constantan and nickeline (reference resistors).
- Classification by σ: провідники $\sigma > 10^{6}$, діелектрики $\sigma < 10^{-10}$, напівпровідники in between (См/м); checked against the scan.

[C] Температурна залежність (pp. 112–113)

- The **температурний коефіцієнт опору** $\alpha = \dfrac{1}{\rho}\dfrac{d\rho}{dT}$ (2.19). Metals: α > 0. Electrolytes: α < 0.
- For metals near 0 °C, $\alpha \approx 1/273$ K^{-1} and $\rho = \rho_0(1 + \alpha t)$, or $\rho = \rho_0 \alpha T$ (2.20).
- Uses: resistance thermometers, thermostats, bolometers.

[D] Робота струму (p. 121)

- $A = IUt$ (2.38) $= I^2Rt = \dfrac{U^2}{R}t$ (2.39)
- The whole source over the whole loop: $A_{\text{заг}} = \mathcal{E}It$ (2.41).

[E] Потужність (pp. 121–123)

- **Потужність** (power) is the work per unit time.
- **Корисна** (useful, in the load R): $P = IU = I^2R = \dfrac{U^2}{R}$ (2.43) $= \dfrac{\mathcal{E}^2 R}{(R+r)^2}$ (2.44)
- **Загальна** (total): $P_{\text{дж}} = \mathcal{E}I = \dfrac{\mathcal{E}^2}{R+r}$ (2.45)
- **ККД** (efficiency): $\eta = \dfrac{P}{P_{\text{дж}}} = \dfrac{R}{R+r}$ (2.46)
- Maximum useful power when **R = r**: $P_{max} = \dfrac{\mathcal{E}^2}{4r}$, but then η = 50 %.
- ✎ Graph P(R): zero at R = 0, a peak at R = r, tending to 0 as R → ∞. Overlay η(R) rising

towards 1.

Self-check

1. Why can’t you get maximum power and maximum efficiency at the same time?
2. Why do metals resist more when hot?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn’t print these forms.

- **Notation** (→ [E]): the book’s $P_{\text{дж}}$ is the total power of the source (дж = джерело). It also writes $A_{\text{заг}}$ for the total work (2.41). The ККД is η here, the same letter as viscosity in vol. 1 and linear charge density in §1.7 examples.

22. Перший та другий закон Кірхгофа

Джерело: т. 2, **§ 2.6** «Електричне коло. Правила Кірхгофа» (с. 126–131). ✔ Formulas checked against the scan.

The book says **правила** Кірхгофа; the syllabus says «закон». Both are used.

Layout

```
┌ [A] Прості з'єднання: послідовне / паралельне (табличка)    ┐
├ [B] Терміни: розгалужене коло, вузол, ділянка, контур       ┤
├ [C] I правило (2.54) + рис. 2.12 │ [D] II правило (2.55) + рис. 2.13 ┤
└ [E] Як складати рівняння: знаки, незалежні контури          ┘
```

[A] Послідовне і паралельне з’єднання опорів (pp. 127–128)

	послідовне (рис. 2.7)	**паралельне (рис. 2.9)**
струм	$I = I_1 = I_2 = \dots$	$I = I_1 + I_2 + \dots$
напруга	$U = U_1 + U_2 + \dots$	$U = U_1 = U_2 = \dots$
опір	$R = R_1 + R_2 + \dots$	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$
пропорція	$U_1/U_2 = R_1/R_2$	$I_1/I_2 = R_2/R_1$

- **Дільник напруги (потенціометр)** (voltage divider), p. 127.
- Optional, batteries of sources (pp. 128–129): in series $\mathcal{E} = \Sigma\mathcal{E}_k$, $r = \Sigma r_k$; n identical in parallel give $r = r_1/n$.

[B] Терміни (p. 129)

- **Розгалужене коло** (branched circuit): a network of several loops with shared sections.
- **Вузол** (node): «Точку розгалуженого кола, в якій сходяться **три або більше** провідників із струмами»
- **Ділянка** (branch): the part of a loop between two nodes, carrying one current.

[C] Перше правило (p. 129)

- It expresses **charge conservation** at a node: «алгебрична сума сил струмів, які сходяться у вузлі, дорівнює нулеві»
- $\sum_{k=1}^{n} I_k = 0$ (2.54). Incoming currents are +, outgoing are −.
- Why it holds: otherwise charge would pile up at the node and the potentials would change, so the current would not be steady.

[D] Друге правило (p. 130)

- A generalization of **Ohm’s law** for a loop: «у контурі алгебрична сума спадів напруг (добутків сил струмів на опори відповідних ділянок) дорівнює алгебричній сумі електрорушійних сил, які діють у цьому контурі»
- $\sum_{k=1}^{n} I_k R_k = \sum_{k=1}^{m} \mathcal{E}_k$ (2.55)
- Proof idea: write (2.33) for each section of the loop and add them; **the potentials cancel**.

[E] Як користуватись (pp. 129–131)

1. Pick a direction for each current at random; a negative answer means it flows the other way.
2. Pick a direction to go round each loop. IR counts + if the current runs with that direction. $\mathcal{E}$ counts + if going round takes you through the source from − to +.
3. Use only **independent** loops, ones that can't be built by combining others.
4. ✎ Do one worked example yourself on рис. 2.13: three branches, two nodes.

Self-check

1. Which conservation law does each rule express? (Charge; energy, through Ohm's law.)
2. How many independent node equations are there for N nodes? (N − 1.)

23. Закон Джоуля–Ленца

Джерело: т. 2, **§ 2.5** «Закон Джоуля — Ленца. Закон збереження енергії електричного поля» (с. 123–126). ✔ Formulas checked against the scan.

Layout

```
┌ [A] Формулювання + Q = I²Rt (2.47)            ┐
├ [B] Механізм: зіткнення електронів з ґраткою   ┤
├ [C] Диференціальна форма: w = ρj² = σE² = jE (2.48)–(2.50) ┤
└ [D] Закон збереження енергії в колі (2.51), два наслідки ┘
```

[A] Закон (p. 123)

- Joule (1841) and Lenz (1842), found by experiment.
- «кількість теплоти, що виділяється в провіднику при проходженні по ньому постійного електричного струму, прямо пропорційна добуткові квадрата сили струму, опору провідника і часу проходження струму»
- $Q = I^2Rt$ (2.47). It also equals $IUt = \frac{U^2}{R}t$ (for a wire at rest with no chemistry).
- Changing current: $Q = \int_0^t I^2(t)R\,dt$.

[B] Механізм (pp. 123–124)

- Electrons gain energy from the field **between collisions** and hand it to the lattice ions **in collisions**. The ordered motion turns into chaotic motion, which is heat.
- ✎ A sketch: a sawtooth graph of electron energy over time, rising then dropping at each collision.

[C] Диференціальна форма (p. 124)

- **питома потужність струму** (power density), the heat per unit volume per unit time: $w = \frac{dQ}{dV\,dt}$
- $w = \rho j^2$ (2.48), $w = \sigma E^2$ (2.49), $w = \vec{j}\vec{E}$ (2.50)
- Integrating over volume and time brings back (2.47). Local versus integral form again, as with Ohm's law.

[D] Закон збереження енергії (pp. 125–126)

- $dW = \delta Q + dU + \delta A$ (2.51): the source's energy goes into heat, a change in field energy, and mechanical work.
- Consequences: (1) nothing moves, so all of the source's work becomes heat; (2) the charges are fixed, so mechanical work comes from the loss of field energy.
- The details on ponderomotive forces are **optional**; skip them.

Pairing with Ohm's law (our summary; good for the page footer)

	інтегральна	**диференціальна**
Ом	I = U/R	j = σE
Джоуль–Ленц	Q = I²Rt	w = σE² = jE

Self-check

1. Why does a thin wire in a series circuit heat up more? (Same I, bigger R.)
2. Why are heaters made of nichrome and not copper?

Частина II

Молекулярна фізика і термодинаміка

Програма МКР №2: 30 питань

Source: **т. 1, Частина II, розд. 14–19 (с. 298–484)**. Every question below is mapped to a § from the section headings found in the OCR. Questions are copied from the photo.

1. Question → textbook map

№	Питання (syllabus wording)	§ т. 1	с.	Wiki page (planned, in `topics/molecular/`)
1	Закони ідеальних газів	14.6, 14.7	311–317	01
2	Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу	14.2, 14.3 (+14.4 температура)	299–309	02
3	Внутрішня енергія термодинамічної системи	16.1, 16.2	371–377	03
4	Теплота, робота, теплоємність	16.1, 16.2	371–383	04
5	Теплоємність ідеальних газів	16.5	390–397	05
6	Перший закон термодинаміки	16.2	374–383	06
7	Ізотермічний процес	16.4 (+14.7)	386–390	07-09
8	Ізохоричний процес	16.4 (+14.7)	386–390	07-09
9	Ізобарний процес	16.4 (+14.7)	386–390	07-09
10	Адіабатичний процес	16.3 «Адіабатний процес. Рівняння Пуассона»	383–386	10
11	Колові процеси	16.6 «Оборотні та необоротні процеси. Колові процеси (цикли)»	397–399	11
12	Цикл Карно (необернений) та його ккд	16.6, 16.7	399–403	12-13
13	Цикл Карно (обернений) та його ккд	16.6, 16.7 (холодильна машина)	399–403	12-13
14	Ентропія та її властивості	16.8, 16.10	403–409, 411–414	14
15	Теорема Нернста	16.11 «Третій закон термодинаміки»	414–415	15
16	Другий закон термодинаміки	16.8 «Другий закон термодинаміки. Теорема Карно»	403–409	16
17	Закон розподілу Больцмана	14.11	331–337	17,19
18	Закон розподілу Максвела	14.8, 14.9, 14.10	317–331	18
19	Закон розподілу Максвела-Больцмана	14.11 «Барометрична формула. Розподіл Максвелла — Больцмана»	331–337	17,19
20	Закон рівномірного розподілу енергії по ступенях свободи	16.2 (с. 376), 16.5	376, 390–392	20-21
21	Внутрішня енергія ідеальних газів	16.5	390–392	20-21
22	Середня довжина вільного пробігу молекули в газах	15.1	343–348	22
23	Дифузія в газах	15.4 (+14.5)	356–364	23-25
24	Внутрішнє тертя в газах	15.2 «Внутрішнє тертя (в’язкість) у газах»	348–352	23-25
25	Теплопровідність газів	15.3	352–356	23-25
26	Відмінність реального газу від ідеального	17.1	419–422	26
27	Рівняння Ван-Дер-Ваальса	17.2, 17.3 (+17.4)	422–433	27
28	Класифікація кристалів	18.1 «Кристалічні та аморфні тіла»	444–450	28
29	Дефекти в кристалах	18.3 «Дефекти в реальних кристалах»	453–456	29

№	Питання (syllabus wording)	§ т. 1	с.	Wiki page (planned, in `topics/molecular/`)
30	Рідини (handwritten addition)	19.1 (+19.2–19.4 optional)	462–474	30

That is **30 questions → 23 pages**. The merges (7–9, 12–13, 17+19, 20–21, 23–25) put questions that share one method or formula on one page.

2. Terminology: book vs syllabus

Use the book's term on the page, and note the syllabus variant once.

Syllabus	Book (т. 1)
ступені свободи	**ступені вільності** (i)
адіабатичний процес	**адіабатний процес**
Максвела, Ван-Дер-Ваальса	**Максвелла**, **Ван-дер-Ваальса**
необернений / обернений цикл Карно	прямий / **обернений** цикл; the book never uses «необернений» (p. 399)
внутрішнє тертя	внутрішнє тертя **(в'язкість)**
теорема Нернста	третій закон термодинаміки (теорема Нернста)

3. Study order (not the syllabus order)

The syllabus jumps around. Each block below builds on the previous one, so work through them in this order:

Block	Pages	Why here	Size
A. Молекулярно-кінетична теорія	2 → 1 → 20–21	the pressure and temperature of a gas from molecules; i, U = (i/2)νRT	3
B. Статистичні розподіли	18 → 17,19	Maxwell (speeds) → Boltzmann (potential field) → combined	2
C. Явища переносу	22 → 23–25	⟨l⟩ first; then one shared pattern: D, η, λ ∝ ⅓⟨v⟩⟨l⟩	2
D. Перший закон	3 → 4 → 6 → 5	U, Q, A → the first law → C_V, C_p, Mayer's equation	4
E. Процеси	7–9 → 10	a table: law, A, Q, ΔU, C for each process; then the adiabat	2
F. Цикли і другий закон	11 → 12–13 → 16 → 14 → 15	cycle → Carnot → 2nd law → entropy → 3rd law	5
G. Реальні гази	26 → 27	the deviations → the van der Waals equation and isotherms, critical state	2
H. Конденсовані стани	28 → 29 → 30	crystals → defects → liquids	3

Concept pages to create along the way:

- `concepts/isoprocesses-table`: one table of all five processes. It's the most useful single page for the MKP.
- `concepts/transport-phenomena`: diffusion, viscosity and heat conduction as one law, "flux = −coefficient × gradient".
- `concepts/statistical-vs-thermodynamic`: two ways to describe the same gas (blocks A–C vs D–F).

2. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу

Джерело: т. 1, **§ 14.2** (с. 299–300), **§ 14.3** (с. 301–305), **§ 14.4** (с. 305–309). ✔ (14.5)–(14.10) checked against the scan.

Block A, page 1 of 3. Start here: the gas laws (01) and U = (i/2)RT (20–21) both follow from this page.

Layout

```
┌ [A] Модель ідеального газу: 6 положень МКТ (стисло)        ┐
├ [B] Виведення тиску: куб l³, молекула б'ється об стінку, рис. 14.1 ┤
├ [C] Основне рівняння (14.6) у рамці + словами               ┤
├ [D] Температура: θ = ⅔⟨ε⟩, θ = kT → ⟨ε⟩ = 3/2 kT (14.10)    ┤
└ [E] p = n₀kT (14.13) → місток до сторінки 01                ┘
```

[A] Ідеальний газ (pp. 299–300)

- The book's definition (p. 300): we can neglect the size of the molecules («вважати молекули матеріальними точками») and their interaction at a distance, counting only collisions. «Такий газ називають **ідеальним**».
- **Основні положення МКТ газів** (6 of them, p. 300). Copy them as a short list:
  1. The molecules are identical spheres of negligible size, with no attraction or repulsion between them.
  2. Even a small volume holds very many molecules, so statistical laws apply.
  3. Collisions are **elastic**.
  4. The time between collisions ≫ the time of a collision, so between collisions the motion is uniform and straight.
  5. With no external forces the molecules are spread evenly through the volume.
  6. All directions of velocity are equally likely, the **«молекулярний хаос»**.
- **Тепловий рух** (thermal motion): the completely chaotic motion of molecules (p. 300).

[B] Виведення (pp. 301–303)

- Cube of edge l (рис. 14.1). One molecule hits the right wall: $\Delta p = 2m_0 v_x$. It returns after $\Delta t = 2l/v_x$, so the average force is $f = m_0 v_x^2 / l$.
- Sum over all n molecules and divide by $S = l^2$. The directions are equally likely, so $p_x = p_y = p_z$, which gives $p = \frac{2}{3}\frac{1}{l^3}\sum_{i=1}^{n}\frac{m_{0i}v_i^2}{2}$ (14.5)
- **Середня квадратична швидкість** (root-mean-square speed): $\langle v_{\text{кв}}^2\rangle = \frac{v_1^2 + v_2^2 + \ldots + v_n^2}{n}$
- ✎ Sketch: a cube, one molecule bouncing off the right face, with arrows $v_x \rightarrow$ and $-v_x \leftarrow$.

[C] Основне рівняння МКТ (p. 303) — put it in a box

$$p = \frac{2}{3} n_0 \frac{m_0 \langle v_{\text{кв}}^2\rangle}{2} \qquad (14.6)$$

- $n_0 = n/V$ is the **number of molecules per unit volume**; $m_0\langle v_{\text{кв}}^2\rangle/2$ is the **average kinetic energy of translational motion of one molecule**.
- In words (p. 303): «тиск ідеального газу дорівнює двом третинам середньої кінетичної енергії поступального руху молекул одиниці об'єму газу»

- Why it matters: it links **microscopic** quantities (m_0, v) to a **macroscopic** one (p) that can be measured.
- Pressure is a **статистичний параметр** (statistical parameter): it makes no sense for a single molecule (p. 304).
- Units: Па = Н/м². Also 1 атм = 101 325 Па; 1 тор = 133,322 Па; 1 бар = 10^5 Па.

[D] Температура (pp. 305–308)

- **Термодинамічна рівновага** (thermodynamic equilibrium): all macroscopic changes stop. **Релаксація** (relaxation) is the spontaneous approach to it; the **час релаксації** is how long it takes. Its existence is the **нульове начало термодинаміки** (zeroth law), p. 306.
- The piston example (рис. 14.2): at equilibrium the average kinetic energies on both sides even out. So temperature "behaves like" ⟨ε⟩, and it is an **інтенсивний параметр** (it doesn't depend on the mass of the system).
- Definition in energy units: $\Theta = \frac{2}{3}\frac{m_0\langle \nu_{\text{кв}}^2\rangle}{2}$, which gives $p = n_0\Theta$ (14.8)
- In kelvins: $\Theta = kT$ (14.9), where k is the **стала Больцмана** (Boltzmann constant), $1{,}38\cdot10^{-23}$ Дж/К.
- $$\frac{m_0\langle \nu_{\text{кв}}^2\rangle}{2} = \frac{3}{2}kT \qquad (14.10)$$
- Meaning of k: by how much the energy of translational motion of one molecule changes when T changes by 1 K.

[E] Наслідок (p. 311)

- Combining (14.6) and (14.10): $p = n_0kT$ (14.13). This is the step to 01 gas laws.

Self-check

1. Where in the derivation are "elastic collisions" and "chaos" used?
2. Why can't we speak of the pressure of one molecule?
3. What happens to ⟨v²⟩ if T doubles? (×2, so $\nu_{\text{кв}}$ grows by √2.)

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Notation: speeds and ⟨ ⟩** (→ [B], [C]): the book writes the mean of v² as $\langle \nu_{\text{кв}}^2\rangle$, so the root-mean-square speed is $\nu_{\text{кв}} = \sqrt{\langle \nu_{\text{кв}}^2\rangle}$. English texts write ν_{rms} or $\sqrt{\overline{\nu^2}}$; an overbar often replaces ⟨ ⟩. The book's m_0 is the mass of one molecule (often m).
- **Two atmospheres** (→ [C], p. 304): the physical atmosphere 1 атм = 101 325 Па and the technical one 1 ат = 98 066,5 Па ≈ 0,98 бар. Don't mix them up.

1. Закони ідеальних газів

Джерело: т. 1, **§ 14.6** «Рівняння стану ідеального газу» (с. 311–313), **§ 14.7** «Основні закони ідеального газу» (с. 313–317). ✔ (14.13)–(14.18) checked against the scan; (14.22)–(14.31) taken from clear OCR.

Block A, page 2 of 3. The book's approach: the **experimental** laws come out **as consequences** of p = n₀kT.

Layout

```
┌ [A] Рівняння стану: pV = nkT → Клапейрон → Клапейрон–Менделєєв ┐
├ [B] Таблиця трьох ізопроцесів (закон, рівняння, графік)        ┤
│     + три маленькі графіки p–V, V–T, p–T (рис. 14.5–14.7)      │
├ [C] Закон Авогадро                                             ┤
└ [D] Межі застосування моделі                                   ┘
```

[A] Рівняння стану ідеального газу (pp. 311–313)

- **Термічне рівняння стану** (thermal equation of state): an equation that links p, V, T at thermal equilibrium, $F(p, V, T) = 0$ (14.12).
- From the MKT: $p = n_0 kT$ (14.13) $\Longrightarrow$ $pV = nkT$ (14.14), where n is the number of molecules.
- For one mole: $pV_M = N_A kT$ (14.15). With **молярна газова стала** $R = kN_A$ = 8,31451 Дж/(моль·К): $pV_M = RT$ (14.16), the **рівняння Клапейрона**.
- For ν moles: $pV = \nu RT$ (14.17). Since ν = m/M = n/N_A:

$$pV = \frac{m}{M}RT, \quad \text{або} \quad pV = \frac{n}{N_A}RT \qquad (14.18)$$

  the **рівняння Клапейрона–Менделєєва**.
- Meaning of R (p. 313): the work done by 1 mole of ideal gas expanding **isobarically** when heated by 1 K. ✎ Sketch the piston of рис. 14.4.

[B] Ізопроцеси (m = const) (pp. 313–316)

процес	умова	закон (book's name)	рівняння	графік
ізотермічний	T = const	закон **Бойля–Маріотта**	pV = const (14.22)	p–V: hyperbolas (рис. 14.5)
ізобарний	p = const	закон **Гей-Люссака**	V/T = const (14.25); V = V₀(1 + αt) (14.26)	V–T: straight lines to the origin (рис. 14.6)
ізохорний	V = const	"рівняння ізохорного процесу"	p/T = const (14.28); p = p₀(1 + βt) (14.29)	p–T: straight lines to the origin (рис. 14.7)

- α = β = 0,003661 K⁻¹ ≈ 1/273, the **коефіцієнт об'ємного розширення** and the **термічний коефіцієнт тиску**.
- Optional: the isothermal compressibility $\chi = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = \frac{1}{p}$ (14.24), and the link $\beta = \alpha/(p\chi)$ (14.31).
- In the textbook the ізохорний law is **not named after Charles**. If your lecturer uses "закон Шарля", add it yourself.
- ✎ Draw the three small graphs with several curves each ($T_1 < T_2$, $p_1 < p_2$, $V_1 < V_2$), and mark which curve has the higher parameter.

- This page has the laws only. Work, heat and ΔU for each process come in block E (07–09).

[C] Закон Авогадро (p. 316)

- From pV = nkT: «в однакових об'ємах ідеальних газів при однакових температурах і тисках міститься однакове число молекул»

[D] Межі застосування (p. 313)

- The model holds when the molecules' own volume and their interaction can be neglected: **low pressure and high enough temperature**. Normal atmospheric conditions mostly qualify. Leads to 26 реальний газ.

Optional (Example 14.1, p. 316)

- Derive pV/T = const from experiment alone: isotherm 1→1′, then isochore 1′→2. A good exam trick, and it's half a page.

Self-check

1. Which equation needs the number of molecules, and which needs only the mass?
2. Why do the isobars on a V–T graph all pass through the origin (in kelvins)?
3. What is the physical meaning of R?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Notation: n, $\mathbf{n_0}$, ν,** V_M (→ [A]): the book writes the number of molecules as **n** and the concentration (molecules per m^3) as $\mathbf{n_0}$ = n/V. Many English texts use N for the number and n for the concentration, so the same letter n means different things. ν is the amount in moles, M the molar mass (older texts: μ), V_M the molar volume. The book also mentions the specific gas constant B, with pV = mBT (Example 14.1).

20. Закон рівномірного розподілу енергії по ступенях свободи · 21. Внутрішня енергія ідеальних газів

Джерело: т. 1, **§ 16.2** (с. 375–377, inside «Перший закон термодинаміки»), **§ 16.5** «Теплоємність ідеального газу» (с. 390–392). ✔ (16.3), (16.4), (16.46) and the C_V values checked against the scan.

Block A, page 3 of 3. ⚠ Terminology: the book says **«ступені вільності»**, the syllabus «ступені свободи». Use the book's word and note the variant once.

Layout

```
┌ [A] Ступені вільності: означення, i = i_пост + i_оберт + i_колив (16.4) ┐
├ [B] Закон рівного розподілу (рамка): ½kT на ступінь; коливальний → kT ┤
├ [C] Таблиця: газ → i → U → C_V, C_p + малюнки молекул (1, 2, 3 атоми)  ┤
├ [D] Внутрішня енергія ідеального газу: U = (i/2)RT; тільки від T      ┤
└ [E] Межі класичної теорії (спирт: теорія 3R, дослід ≈ 8R)            ┘
```

[A] Ступені вільності (p. 376)

- «Число таких незалежних координат називають **кількістю ступенів вільності** й позначають i». These are the coordinates needed to fix the positions of all the points of a system.
- A free material point has i = 3 (translation). A free rigid body has i = 6 (3 translational + 3 rotational).
- $i = i_{\text{пост}} + i_{\text{оберт}} + i_{\text{колив}}$ (16.4)

[B] Закон рівного розподілу (p. 377) — put it in a box

- The book's name: **«закон рівного розподілу енергії за класичними ступенями вільності (закон рівного розподілу Больцмана)»**. On p. 392 it's also called «закон про **рівномірний** розподіл енергії за ступенями вільності», which is close to the syllabus wording.
- Wording (p. 377): «у стані теплової рівноваги на кожний класичний ступінь вільності руху частинок системи припадає кінетична енергія, що дорівнює в середньому **½kT**»
- Rotational degree of freedom: ½kT. **Vibrational: kT**, made up of ½kT kinetic plus ½kT potential.
- General formula: $\langle w \rangle = (3 + r + 2s)\dfrac{kT}{2}$ (16.45), where r is the number of rotational and s the number of vibrational degrees of freedom.
- It is broken where quantum effects matter (p. 377).

[C] Таблиця (pp. 391–392), rigid molecules (s = 0)

газ	приклади	i	U (1 моль)	C_V	C_p
одноатомний	He, Ar, Hg vapour	3	3/2 RT	3/2 R	5/2 R
двохатомний	H_2, O_2, N_2	5 (3 + 2)	5/2 RT	5/2 R	7/2 R
багатоатомний	H_2O vapour, CH_4	6 (3 + 3)	3RT	3R	4R

- $C_p = C_V$ + R. The **Mayer equation** itself belongs in topic 5; here just use it.
- ✎ Draw three small molecules (a dot, a dumbbell, a triangle) with arrows for the axes of rotation. The dumbbell has only 2 rotational axes; rotation about its own axis doesn't count.

- Optional: CO_2 (linear) gives ⟨w⟩ = 6,5kT, and H_2O (non-linear) gives 6kT when vibrations are counted (16.43–16.44).

[D] Внутрішня енергія ідеального газу (pp. 376, 390–392)

- Generally U is **кінетична енергія теплового руху + потенціальна енергія взаємодії** (p. 375). Topic 3 covers this in full.
- In an ideal gas there is **no interaction**, so U is kinetic energy only: «внутрішня енергія ідеального газу дорівнює сумарній кінетичній енергії його молекул» (p. 390).
- One mole of a monatomic gas: $U = \frac{3}{2}RT$ (16.2). In general:

$$U = \frac{i}{2}RT \qquad (16.3)$$

- Key conclusion (p. 392): «внутрішня енергія ідеального газу є функцією **тільки абсолютної температури**». It does not depend on V. The block E processes rest on this.

[E] Межі класичної теорії (p. 392)

- Simple molecules near room temperature agree with experiment. For complex ones, such as C_2H_5OH, theory gives C_V = 3R but experiment gives about 8R.
- C_V = 5/2 R for diatomic gases holds only within a limited range of temperature, because vibrations ”switch on” at high T. This is a quantum effect.

Self-check

1. Why does a dumbbell molecule have only 2 rotational degrees of freedom?
2. Why does a vibrational degree of freedom carry kT and not ½kT?
3. Why doesn’t an ideal gas’s U depend on volume?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn’t print these forms.

- **ν moles** (→ [D]): U = ν(i/2)RT, since (16.3) is per mole.

18. Закон розподілу Максвела

Джерело: т. 1, **§ 14.8** «Швидкості газових молекул та вимірювання їх» (с. 317–320), **§ 14.9** «Поняття про статистичний розподіл. Функція розподілу. Розподіл молекул за швидкостями (розподіл Максвелла)» (с. 320–330), **§ 14.10** (с. 331). ✔ (14.54)–(14.63) checked against the scan.

Block B, page 1 of 2. Spelling: the book writes **Максвелла** (double л); the syllabus writes «Максвела».

Layout

```
┌ [A] Постановка: чому «скільки молекул в інтервалі v…v+dv», а не «з швидкістю v» ┐
├ [B] Функція розподілу f(v): означення (14.42), нормування (14.43)               ┤
├ [C] Формула Максвелла (14.57) у рамці + ГРАФІК f(v) для T₁ < T₂ (рис. 14.13)     ┤
├ [D] Три швидкості: v_н, ⟨v⟩, v_кв (14.58), (14.61), (14.62) + співвідношення    ┤
└ [E] Дослідна перевірка: Штерн (рис. 14.9), Ламмерт (рис. 14.15)                 ┘
```

[A] Постановка задачі (p. 320)

- The speed is continuous, so the probability of an *exact* speed is 0. The right question: «скільки з усіх наявних молекул мають швидкості, значення яких лежать у певному інтервалі швидкостей в околі заданої швидкості?»
- **Простір швидкостей** (velocity space): each molecule is a point (v_x, v_y, v_z), рис. 14.11.

[B] Функція розподілу (pp. 322–323)

- $dW = \dfrac{dn}{n} = f(\vec{v})\,d\omega$ (14.42). f is the **функція розподілу молекул за швидкостями**, also called the **густина ймовірності** (probability density).
- **Умова нормування**: $\int f\,d\omega = 1$ (14.43): the molecule certainly has *some* speed.
- Directions are equally likely, so f depends only on |v|. The components are independent, so $f = f(v_x)f(v_y)f(v_z)$ (14.46). Maxwell (1859).
- Skip the derivation (pp. 323–327); just note the idea: ”independence + isotropy ⟹ Gaussian”.

[C] Закон Максвелла (p. 327) — put it in a box

$$\frac{dn}{n} = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{m_0}{2kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} v^2\,dv \qquad (14.57)$$

- Words: the **relative number of molecules** whose speeds lie between v and v + dv.
- Per component: $f(v_x) = \dfrac{1}{\sqrt{\pi}\,v_н} e^{-v_x^2/v_н^2}$ (14.54), a bell curve centred on 0 (рис. 14.14).
- Shape of f(v) (pp. 327–328): f = 0 at v = 0 (no molecules at rest) and f → 0 as v → ∞. It is **asymmetric**: a steep rise and a slow fall. The area under it is 1.
- **Heating** (p. 328): the peak shifts right (∝ √T) and gets lower and wider, because the area stays 1.
- ✎ The main drawing: two curves for $T_1 < T_2$, the same area, with $v_н$, ⟨v⟩ and $v_{кв}$ marked on one of them. Shade one strip dv as dn/n.
- An example from the book (Table 3, O_2 at 0 °C): about ¾ of the molecules move at 200–600 м/с.

[D] Характерні швидкості (pp. 328–330)

швидкість	формула	№
найбільш імовірна $v_{\text{н}}$ (peak of f)	$\sqrt{2kT/m_0} = \sqrt{2RT/M}$	(14.58)
середня (арифметична) ⟨v⟩	$\sqrt{8kT/(\pi m_0)}$	(14.61)
середня квадратична $v_{\text{кв}}$	$\sqrt{3kT/m_0}$	(14.62)

- $v_{\text{кв}} : \langle v \rangle : v_{\text{н}} \approx 1{,}2 : 1{,}1 : 1$
- Universal form with u = v/$v_{\text{н}}$: $\frac{dn}{n\,du} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} u^2$ (14.63). It doesn't depend on the gas or on T.
- Scale (p. 318): H_2 ≈ 1,9 км/с, N_2 ≈ 493 м/с, O_2 ≈ 461 м/с at room temperature.

[E] Дослідна перевірка (pp. 318–320, 331)

- **Stern's experiment (1920)**: a silver-coated wire inside two rotating cylinders. The deposited strip shifts and **smears**, which shows the atoms have a spread of speeds with a peak. ✎ Sketch рис. 14.9 from above.
- **Lammert (1929)**: two rotating discs with slits offset by an angle φ act as a speed selector. It confirmed Maxwell's law with high accuracy.

Self-check

1. Why is the probability of an exact speed zero?
2. Why does the peak get lower when the gas is heated?
3. Order $v_{\text{н}}$, ⟨v⟩ and $v_{\text{кв}}$ from smallest to largest, and explain why.

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Names of the three speeds** (→ [D]): the book's $v_{\text{н}}$ (найбільш імовірна) is the English most probable speed v_p; ⟨v⟩ is the mean speed $\bar{v}$; $v_{\text{кв}}$, often printed as $\langle v_{\text{кв}} \rangle$, is the rms speed v_{rms}. The book also calls $v_{\text{кв}}$ the **теплова швидкість** (thermal speed, p. 318).

17. Закон розподілу Больцмана · 19. Закон розподілу Максвела-Больцмана

Джерело: т. 1, **§ 14.11** «Барометрична формула. Розподіл Максвелла — Больцмана» (с. 331–337). ✔ (14.64)–(14.75) checked against the scan.

Block B, page 2 of 2. Logic: Maxwell assumed **no external field**. Gravity added → barometric formula → Boltzmann (any potential field) → combined with Maxwell.

Layout

```
┌ [A] Барометрична формула: стовп повітря, dp = −ρg dh → (14.68) + рис. 14.16 ┐
├ [B] Розподіл Больцмана (14.71) у рамці + графік n(h) (рис. 14.18)           ┤
├ [C] Розподіл Максвелла–Больцмана (14.74): два незалежні множники            ┤
└ [D] Наслідки: атмосфери планет, флуктуації (optional)                       ┘
```

[A] Барометрична формула (pp. 331–333)

- Only the combined action of **thermal motion + gravity** gives the atmosphere its shape. Without gravity the molecules would spread out; without thermal motion they would fall to the ground.
- A thin layer dh: $dp = -\rho g\, dh$ (14.64), with ρ = $m_0 n_0$ and n_0 = p/kT $\Longrightarrow \frac{dp}{p} = -\frac{m_0 g}{kT} dh$ (14.66)
- Integrate:

$$p = p_0 e^{-\frac{m_0 g (h-h_0)}{kT}} \text{ (14.67)}, \qquad p = p_0 e^{-\frac{M g (h-h_0)}{RT}} \text{ (14.68)}$$

  the **барометрична формула** (Laplace, 1821).
- Assumptions: an ideal gas, **T = const**, **g = const**, so it is accurate only up to a few km.
- The pressure falls exponentially, and faster for heavier gases (larger M) and colder ones (smaller T).
- ✎ Sketch рис. 14.16: a column of air, a layer dh, p and p − dp.

[B] Розподіл Больцмана (p. 335) — put it in a box

- Since p = nkT: $n = n_0 e^{-\frac{m_0 g (h-h_0)}{kT}}$ (14.70)
- General form:

$$n = n_0 e^{-\frac{\Delta U}{kT}} \qquad (14.71)$$

  where ΔU is the difference in a molecule's **potential energy** (ΔU = $m_0$gh in gravity).
- Boltzmann showed it is **universal**: it holds for any particles in thermal equilibrium in **any potential field**. «Цей статистичний закон називається **розподілом Больцмана**»
- Meaning: the concentration is higher where U is lower, which is the tendency towards stable equilibrium.
- In a layer: $\frac{dn}{n} = e^{-\frac{m_0 g}{kT} dh}$ (14.73). ⚠ Copied as printed on p. 336, but it can't be right: dh sits inside the exponent. The fraction of molecules in the layer h…h + dh is $\frac{dn}{n} = \frac{m_0 g}{kT} e^{-\frac{m_0 g h}{kT}} dh.$
- ✎ Graph рис. 14.18: n against h, an exponential decay from n_0.

[C] Розподіл Максвелла–Больцмана (p. 336)

- Substitute n from (14.71) into Maxwell's (14.57):

$$dn = \frac{4}{\sqrt{\pi}} n_0 \left(\frac{m_0}{2kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 \Delta\varphi}{kT}} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} v^2 \, dv \qquad (14.74)$$

  where φ = gh is the potential.
- **Two independent factors**: the Boltzmann factor $e^{-m_0 \Delta\varphi / kT}$ (position) × the Maxwell factor $e^{-m_0 v^2 / 2kT}$ (speed).
- So the Boltzmann distribution doesn't depend on the speed distribution, and Maxwell's doesn't depend on the potential.

[D] Optional

- Planets' atmospheres (pp. 333–334): only molecules in the "tail" of Maxwell's distribution exceed escape velocity, so light planets (the Moon) lose their atmosphere. With g decreasing with height, the book gets (14.69), which gives p ≠ 0 even at h = ∞, a paradox it resolves on p. 334.
- **Міжнародна стандартна атмосфера (МСА)** (pp. 334–335): sea level 1,013·10⁵ Па at 15 °C, temperature falling to −56,5 °C at 11 км (the nominal start of the stratosphere); altimeters on aircraft are calibrated by it. ⚠ The book prints the lapse rate as **5,6 К/км**, but its own numbers give (15 + 56,5)/11 = **6,5 К/км**, the standard ISA value: the digits are swapped.
- Also for aerospace (p. 334): Earth's aerodynamic drag becomes small above about 190–200 км, which allows long orbital flight; "space" conditions start at about 100 км on Mars and 300 км on Venus. Altitude is found from the barometric formula with temperature corrections (рис. 14.17).
- Fluctuations (Smoluchowski, p. 335): $\delta = \sqrt{\frac{2}{\pi}\frac{1}{n}}$ (14.72), smaller when there are more particles.
- Perrin's experiment (§ 14.12) used Boltzmann's law to measure N_A.

Self-check

1. Which two "forces" set the shape of the atmosphere?
2. Why is the barometric formula wrong at large altitudes? (T and g change.)
3. What does it mean that the Maxwell–Boltzmann distribution splits into two factors?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Memory aid** (→ [C]): both factors of (14.74) combine into $e^{-(E_п + E_к)/kT}$, the total energy over kT in the exponent.
- **n and n₀ here** (→ [B]): in (14.70)–(14.71) n and n₀ are **concentrations** at heights h and h₀, while elsewhere (§ 14.6) n is the number of molecules and n₀ the concentration. In (14.73)–(14.74) n is again a number of molecules.
- **γ twice** (→ [D]): on p. 333 the book writes the gravitational constant as γ, the same letter as the adiabatic index $\gamma = C_p/C_V$. Modern texts use G for gravity.

22. Середня довжина вільного пробігу молекули в газах

Джерело: т. 1, **§ 15.1** «Середня довжина вільного пробігу молекул. Число зіткнень» (с. 343–348). ✔ (15.1), (15.2) checked against the scan.

Block C, page 1 of 2. ⚠ Notation: the book writes the free path as **⟨l⟩**; λ is used later for thermal conductivity.

Layout

```
┌ [A] Чому важливо: зигзаг, зіткнення → рівновага                  ┐
├ [B] Модель: «циліндр» πd²⟨v⟩ (рис. 15.1) → ⟨z⟩ (15.1) → ⟨l⟩ (15.2) ┤
├ [C] Ефективний переріз σ = πd²; ефективний діаметр (Сезерленд)    ┤
├ [D] Залежності: ⟨l⟩ ~ 1/p; числа для N₂                          ┤
└ [E] Послаблення пучка n = n₀e^(−x/⟨l⟩) (15.5); дослід Борна       ┘
```

[A] Навіщо (p. 343)

- Molecules move at hundreds of м/с, but along a **zigzag**, so they don't get far. Collisions set up equilibrium and the Maxwell distribution.
- **Середня довжина вільного пробігу** ⟨l⟩: «середню відстань, яку проходить молекула між двома послідовними зіткненнями»
- The model: molecules are identical, perfectly elastic spheres of diameter d; only collisions between **pairs** count.

[B] Виведення (pp. 343–344)

- Freeze all the molecules but one. In 1 с it sweeps out a cylinder of base πd² and length ⟨v⟩, and hits every molecule whose centre lies inside: ⟨z⟩ = πd²n₀⟨v⟩.
- The others move too, so use the relative speed $\langle v\rangle_{\text{відн}} = \sqrt{2}\langle v\rangle$ (from Maxwell's distribution):

$$\langle z\rangle = \sqrt{2}\,\pi d^2 n_0 \langle v\rangle \qquad (15.1)$$

$$\langle l\rangle = \frac{\langle v\rangle}{\langle z\rangle} = \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n_0} \qquad (15.2)$$

- ✎ Sketch рис. 15.1: a molecule, a "straightened" cylinder of radius d, and molecules whose centres are inside it.

[C] Ефективний переріз (pp. 344–345)

- **Повний ефективний поперечний переріз** σ = πd². It is measured in м² but has no geometric meaning: it describes the **probability** of the collision process.
- The **ефективний діаметр** shrinks as T rises (Sutherland): $d = d_0\sqrt{1 + C/T}$ (15.3), so ⟨l⟩ grows with T.

[D] Порядки величин і залежності (p. 345)

- N_2 at normal conditions: ⟨l⟩ ≈ 0,6·10⁻⁷ м, about **1000 times the size of a molecule**. Collisions are rare even at atmospheric pressure.
- At T = const, **⟨l⟩ ∝ 1/p**. When ⟨l⟩ reaches the size of the container the gas is in a **вакуум** state (§ 15.5).

[E] Послаблення пучка (pp. 345–347), optional

- $-\frac{dn}{n} = \frac{dx}{\langle l \rangle}$ (15.4) $\Longrightarrow$ $n = n_0 e^{-x/\langle l \rangle}$ (15.5). Only about 1/e ≈ ⅓ of molecules travel further than ⟨l⟩.
- Born’s experiment (1921): a beam of silver atoms through four diaphragms gives ⟨l⟩ directly (15.9).

Self-check

1. Why √2 in (15.1)?
2. Why does ⟨l⟩ not depend on T at constant n_0? (Ignoring Sutherland.)
3. What is ”vacuum” in terms of ⟨l⟩?

23. Дифузія в газах · 24. Внутрішнє тертя в газах · 25. Теплопровідність газів

Джерело: т. 1, **§ 15.2** «Внутрішнє тертя (в’язкість) у газах» (с. 348–352), **§ 15.3** «Теплопровідність газів» (с. 352–356), **§ 15.4** «Дифузія газів» (с. 356–363). ✔ (15.10), (15.14), (15.16)–(15.27) checked against the scan.

Block C, page 2 of 2. One idea, three times. See the concept page явища переносу.

Layout (best as a 3-column table with a shared top)

```
┌ [A] Що таке явища переносу: перенос маси / імпульсу / енергії; спільна модель ┐
│     (площинка ΔS, 1/6 n₀⟨v⟩ в кожен бік, «пам'ять» на відстані ⟨l⟩) + рис. 15.3  │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ [B] Дифузія      │ [C] В'язкість    │ [D] Теплопровідність                     │
│ Фік (15.22)      │ Ньютон (15.10)   │ Фур'є (15.16)                            │
│ D = ⅓⟨v⟩⟨l⟩      │ η = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩     │ λ = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩c_V                          │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
└ [E] Зв'язок: η = Dρ, λ = ηc_V; залежність від p і T                           ┘
```

[A] Явища переносу (pp. 348, 349, 353, 357)

- The book’s definition (p. 348): phenomena caused by thermal motion that carry **mass (diffusion), momentum (internal friction), energy (heat conduction)**. They drive the system towards equilibrium.
- A shared derivation:
  - Take a small area $\Delta S \perp OX$ with a gradient along OX.
  - In each direction, $\frac{1}{6} n_0 \langle v \rangle$ molecules cross per unit time.
  - Each carries the value of the quantity it had at its **last collision**, a distance $\langle l \rangle$ away.
  - The net flux $\propto$ the difference between $x - \langle l \rangle$ and $x + \langle l \rangle$, which is the gradient $\times\, 2\langle l \rangle$.
- ✎ One shared picture (рис. 15.3/15.5/15.7): the plane ΔS, $\langle l \rangle$ to the left and right, and the quantity ”higher” on the left.

[B] Дифузія (23) (pp. 356–358)

- «Дифузія газів — це процес самовільного вирівнювання густин (концентрацій) у суміші, зумовлений тепловим рухом мікрочастинок». In a single gas it is called **самодифузія** (self-diffusion). It is **irreversible**.
- **Закон Фіка** (the first): $j_m = -D\frac{d\rho}{dx}$ (15.22), where D is the **коефіцієнт дифузії**, in м²/с.
- From kinetic theory: $D = \frac{1}{3}\langle v \rangle \langle l \rangle$ (15.27)
- D $\propto$ 1/p at T = const, and D grows with T.
- Optional: unsteady diffusion, $\Delta n_0 = \Delta n_{00} e^{-t/\tau}$ (15.29); Fick’s second law $\partial n_0/\partial t = D\,\partial^2 n_0/\partial x^2$ (15.30); mutual diffusion and thermodiffusion (pp. 360–363).

[C] Внутрішнє тертя (в’язкість) (24) (pp. 348–350)

- Layers moving at different speeds exchange the **momentum of ordered motion** carried by thermal motion. The fast layer slows and the slow layer speeds up.
- **Закон Ньютона**: $F = -\eta\frac{du}{dx}\Delta S$ (15.10), where η is the **коефіцієнт динамічної в’язкості**, in Па·с. The **кінематична в’язкість** is $\nu = \eta/\rho$.
- From kinetic theory: $\eta = \frac{1}{3}\rho\langle v \rangle \langle l \rangle$ (15.14)
- ⚡ **The paradox** (p. 350): η **does not depend on pressure**, because ρ $\propto$ p and $\langle l \rangle \propto$ 1/p. More molecules carry momentum, but each over a shorter distance. Cutting p by

500 times changes the viscosity of air by only 4 %.
- η grows with T (∝ √T, in practice faster). Puluj measured this, p. 350.

[D] Теплопровідність (25) (pp. 352–354)

- «Теплопровідність — це молекулярне перенесення енергії в суцільному середовищі, зумовлене градієнтом температури»
- **Закон Фур'є**: $j_q = -\lambda \operatorname{grad} T$ (15.16), where λ is the **коефіцієнт теплопровідності**, in Вт/(м·К).
- Each molecule carries its average energy $\frac{i}{2}kT$. From kinetic theory: $\lambda = \frac{1}{3}\rho\langle v\rangle\langle l\rangle c_V$ (15.21), where c_V is the specific heat capacity.
- Also **independent of p**, except at very low pressure. Light gases conduct better (H_2 is used for cooling).

[E] Зв'язок між коефіцієнтами (p. 358)

$$\eta = D\rho, \qquad \lambda = \eta c_V, \qquad \lambda = D\rho c_V$$

	що переноситься	закон	коефіцієнт	від p	від T
дифузія	маса	Фіка	D = ⅓⟨v⟩⟨l⟩	∝ 1/p	grows
в'язкість	імпульс	Ньютона	η = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩	none	grows
теплопровідність	енергія	Фур'є	λ = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩c_V	none	grows

Self-check

1. Why does D depend on pressure but η and λ don't?
2. What exactly does a molecule "carry" in each of the three phenomena?
3. Where does the factor ⅓ (= 2 × ⅙) come from?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Letters that mean two things** (→ [C], [D]): ν is the kinematic viscosity η/ρ here but the amount in moles elsewhere; λ is the thermal conductivity here (English texts often use k or κ) but a wavelength in optics; η is viscosity here but efficiency (ККД) in topics 12–13. Lowercase c_V is the specific heat capacity (per kg), uppercase C_V the molar one: $C_V = Mc_V$ (16.9).
- **Flux symbols** (→ [B], [D]): the book writes the mass flux density j_m and the heat flux density j_q; English texts often use J and q (or $\vec{q}$) for heat flux.

3. Внутрішня енергія термодинамічної системи

Джерело: т. 1, **§ 16.1** «Основні поняття і означення» (с. 371–374), **§ 16.2** «Перший закон термодинаміки», the part «Внутрішня енергія» (с. 375–377). ✔ Checked against the scan as part of block A (pp. 375–377).

Block D, page 1 of 4. This page sets up the **thermodynamic language** that blocks D–F all use. The ideal-gas formula U = (i/2)RT is on 20–21; here we only link to it.

Layout

```
┌ [A] Термодинаміка: предмет; термодинамічна система; параметри стану   ┐
├ [B] Типи систем (ізольована/закрита/відкрита/адіабатна) + рівноважні процеси ┤
├ [C] Внутрішня енергія: означення, що входить / що НЕ входить            ┤
├ [D] Функція стану: ∮dU = 0 (малюнок двох шляхів A→B на p–V)             ┤
└ [E] Адитивність (16.1); калоричне рівняння стану; ідеальний газ → 20–21 ┘
```

[A] Основні поняття (pp. 371–372)

- **Термодинаміка**: «наука про найбільш загальні властивості макроскопічних фізичних систем, що знаходяться в стані термодинамічної рівноваги, та про процеси переходу між цими станами». It is **axiomatic**: it rests on laws drawn from experience, not on molecular models (p. 374).
- **Термодинамічна система** (thermodynamic system): macroscopic bodies and fields that can exchange **energy** (as work and heat) and **matter**.
- **Термодинамічні параметри стану** (state parameters): p, T, V, ρ, concentration, field strengths… These are **внутрішні** (internal) and **зовнішні** (external), p. 372.

[B] Системи і процеси (pp. 372–373)

система	обмін речовиною	обмін енергією
ізольована (замкнута)	ні	ні
закрита	ні	так
відкрита	так	так
теплоізольована (адіабатна)	—	no heat exchange

- **Квазістатичний (квазірівноважний) процес**: a continuous sequence of equilibrium states, such as sand added one grain at a time onto a piston. Only these can be drawn on a p–V diagram.
- Optional: **фаза** (phase) and **компонента** (component), p. 373.

[C] Внутрішня енергія (p. 375)

- «Енергію, що залежить від внутрішнього стану фізичної системи, називають **внутрішньою енергією**»
- It **includes** the kinetic energy of all kinds of particle motion plus their interaction energy. In practice that means the **kinetic energy of thermal motion + the potential energy of interaction** (no intra-atomic or nuclear energy).
- It **excludes** the kinetic energy of the system as a whole and its potential energy in external fields; those are ”external” energies.
- Sign: dU > 0 if U increases.

[D] Функція стану (pp. 375–376) — put it in a box

- U is a **однозначна функція стану** (single-valued function of state): $\Delta U = U_2 - U_1$ depends only on the end states, not the path. For a cycle:

$$\oint dU = 0$$

- ✎ Sketch two different paths A→B on a p–V diagram, both with the same ΔU. This sets up the contrast with Q and A (topic 4), which **do** depend on the path.

[E] Ще дві властивості (p. 376)

- **Адитивність** (additivity): $U = \sum U_i$ (16.1)
- **Калоричне рівняння стану** (caloric equation of state): U = U(V, T), or U(p, V), or U(p, T). For liquids and gases U depends on T (kinetic part) **and V** (interaction).
- **Ideal gas**: there's no interaction, so U = U(T) only. For a monatomic gas $U = \frac{3}{2}RT$ (16.2); the general case is on 20–21.

Self-check

1. Why doesn't the kinetic energy of a flying ball count in its internal energy?
2. What does "function of state" mean for a closed cycle?
3. Why does a real gas's U depend on V but an ideal gas's doesn't?

4. Теплота, робота, теплоємність

Джерело: т. 1, **§ 16.2**, the parts «Макроскопічна робота», «Кількість теплоти» (с. 377–381). ✔ (16.5)–(16.9) checked against the scan.

Block D, page 2 of 4. The key idea: **Q and A are functions of the process**; U is a function of state (topic 3).

Layout

```
┌ [A] Робота: поршень (рис. 16.1), d'A = p dV (16.5), A = ∫p dV (16.6)      ┐
├ [B] Робота = площа під кривою; два шляхи A→B (рис. 16.2) → різна A        ┤
├ [C] Кількість теплоти: теплообмін, «мікроскопічна робота»; знаки          ┤
├ [D] Таблиця: робота vs теплота (макро/мікро; обидві — функції процесу)    ┤
└ [E] Теплоємність: C₀ = d'Q/dT (16.7), питома c (16.8), молярна C = Mc (16.9) ┘
```

[A] Макроскопічна робота (pp. 377–378)

- A gas under a piston of area S expands quasistatically by dx: $d'A = F\,dx = pS\,dx = p\,dV$ (16.5)
- **Sign** (the book's convention): work done **by the gas** when it expands is **positive**; work done by external forces on the gas is negative.
- $A = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV$ (16.6)
- The book's definition (p. 378): «робота в термодинаміці — це **макроскопічна міра зміни внутрішньої енергії** системи у квазістатичних процесах»

[B] Функція процесу (pp. 378–379)

- On a p–V diagram, **A = the area under the curve** of the process (рис. 16.2).
- Two different paths A→B have different areas, so different work. Work is a **функція процесу, а не функція стану**.
- Hence the notation **d'A, not dA**: it is not an exact differential.
- In a cycle the work can be ≠ 0, which is what makes heat engines possible.
- ✎ The main drawing: two paths AmB and AnB with the areas under them shaded differently.

[C] Кількість теплоти (p. 380)

- **Теплообмін** (heat exchange): «Процес передачі енергії від більш нагрітого тіла до менш нагрітого **без виконання макроскопічної роботи**». The **кількість теплоти Q** is the measure of it.
- The mechanism is collisions of molecules, sometimes called "microscopic work".
- Signs: heat **given to** the system is +, heat taken from it is −. Unit: Дж.
- Q is also a function of the process, so it's written **d'Q**.

[D] Робота vs теплота (p. 380)

	робота A	**теплота Q**
форма передачі енергії	**macrophysical**: energy of ordered motion	**microphysical**: many molecular processes
пов'язана зі зміною	external parameters (V)	none; heat exchange alone
функція	процесу (d'A)	процесу (d'Q)

	робота A	**теплота Q**
спільне	both are measures of **energy transfer**, in Дж	

[E] Теплоємність (pp. 380–381)

- $C_0 = \frac{d'Q}{dT}$ (16.7), the heat needed to raise the temperature by 1 K.
- **Питома теплоємність** (specific heat capacity) c, per unit mass: $C_0 = mc$ (16.8)
- **Молярна теплоємність** (molar heat capacity) C, per mole: $C = Mc$ (16.9)
- Notation: C_p (isobaric), C_V (isochoric), C_T (isothermal), $C_{\text{ад}}$ (adiabatic). Since d'Q depends on the process, **heat capacity depends on the process too**. Values for an ideal gas are on 05.

Self-check

1. Why is it d'A and not dA?
2. Why does the work around a cycle not have to be zero, while ΔU does?
3. What is the physical difference between heat and work?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Sign of work: two conventions** (→ [A]): this book (like most physics and engineering texts) counts A as work done **by** the system, so $d'Q = dU + d'A$. Chemistry and IUPAC count W as work done **on** the system, so $\Delta U = Q + W$. Same physics, opposite sign of the work term. Check which one a source uses before copying a formula.
- **d′ vs δ** (→ [B]): the book marks an inexact differential with a prime, d′Q and d′A. Other texts write δQ, δA, or đQ. All mean the same: a small amount that is not the change of a state function.

6. Перший закон термодинаміки

Джерело: т. 1, **§ 16.2** «Перший закон термодинаміки» (с. 374, 381–383). ✔ (16.10)–(16.17) checked against the scan.

Block D, page 3 of 4. It combines topics 3 and 4: two ways to change U.

Layout

```
┌ [A] Звідки: механічна енергія не зберігається при терті → теплота = енергія ┐
├ [B] Формулювання + (16.10) dU = d'Q − d'A  ⚠ знаки!                          ┤
├ [C] Зручна форма (16.11) d'Q = dU + d'A; інтегральна (16.12); цикл (16.13)   ┤
├ [D] Вічний двигун I роду неможливий                                          ┤
└ [E] Для ідеального газу: d'Q = C_V dT + p dV (16.17) → місток до 05, 07–10   ┘
```

[A] Звідки закон (p. 374)

- Mechanical energy is conserved only without **dissipative forces**. With friction it ”disappears” but heat appears. Counting the internal energy of thermal motion restores conservation.
- «Перший закон термодинаміки — це **узагальнений закон збереження й перетворення енергії** для тих макроскопічних систем, для яких суттєву роль відіграє тепловий рух»

[B] Формулювання (p. 381) — put it in a box

- «у теплових процесах зміна внутрішньої енергії відбувається за рахунок приросту кількості теплоти і виконаної роботи»

$$dU = d'Q - d'A \qquad (16.10)$$

- ⚠ **A flaw in the book.** Under (16.10) it says «d’A — робота, виконана **над** системою», but with the minus sign and its own convention on p. 378 (d’A = p dV > 0 on expansion), d’A must be the work done **by** the system. Write: **d’A is the work done by the system against external forces.** The adiabatic case (16.20), d’A = −dU (”the system does work by losing internal energy”), confirms this reading.

[C] Інші форми (p. 382)

- The heat form, convenient for heat engineering: $d'Q = dU + d'A$ (16.11). Words: the heat given **goes into** raising U and doing work.
- Integral form: $Q = (U_2 - U_1) + A_{12}$ (16.12)
- A cycle ($U_2 = U_1$): $Q = A$ (16.13), so all the net heat becomes work.
- If d’Q = 0 the process is **адіабатний** (topic 10).

[D] Вічний двигун першого роду (p. 382)

- «неможливо побудувати машину, що діє періодично, яка виконувала б роботу без одержання енергії ззовні або виконувала б більшу роботу, ніж одержана ззовні енергія»

[E] Ідеальний газ (pp. 382–383)

- U = U(T, V) (16.14), but for an ideal gas (∂U/∂V)_T = 0, so $dU = C_V\,dT$ (16.16), with $C_V = (\partial U/\partial T)_V$.
- One mole:

$$d'Q = C_V\,dT + p\,dV \qquad (16.17)$$

This one line is the source of everything in blocks D–E: Mayer's equation (05), the isoprocesses (07–09) and the adiabat (10).

Self-check

1. State the first law in words without formulas.
2. In a cycle ΔU = 0; where does the heat go?
3. Why is a perpetual motion machine of the first kind impossible?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Sign of work: two conventions** (→ [B]): this book (like most physics and engineering texts) counts A as work done **by** the system, so $d'Q = dU + d'A$. Chemistry and IUPAC count W as work done **on** the system, so $\Delta U = Q + W$. Same physics, opposite sign of the work term. Check which one a source uses before copying a formula.
- **d′ vs δ** (→ [B]): the book marks an inexact differential with a prime, d′Q and d′A. Other texts write δQ, δA, or đQ. All mean the same: a small amount that is not the change of a state function.

5. Теплоємність ідеальних газів

Джерело: т. 1, **§ 16.2** (Mayer's equation, с. 382–383), **§ 16.5** «Теплоємність ідеального газу» (с. 390–397). ✔ (16.16)–(16.19), (16.46), the C_V/C_p table checked against the scan.

Block D, page 4 of 4. The C_V table itself is already on 20–21. Here the focus is C_V **vs** C_p, **γ** and **where classical theory fails**.

Layout

```
┌ [A] C_V = dU/dT; C_p — більше; рівняння Майєра (16.19) у рамці        ┐
├ [B] Класична теорія: C_V = (i/2)R, C_p = ((i+2)/2)R, γ = (i+2)/i — таблиця ┤
├ [C] Графік C_V(T) для двохатомного газу (рис. 16.7): сходинки 3/2 → 5/2 → 7/2 ┤
└ [D] Чому: квантування; характеристичні температури T_оберт, T_кол      ┘
```

[A] Рівняння Майєра (pp. 382–383) — put it in a box

- From the first law for one mole, $d'Q = C_V\,dT + p\,dV$ (16.17):
  - V = const: dV = 0, so $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ (16.16)
  - p = const: p dV = R dT, so $d'Q = C_V\,dT + R\,dT$ (16.18)

$$C_p = C_V + R \qquad (16.19)$$

  the **рівняння Майєра** (Mayer's equation).
- Meaning: at constant p, part of the heat goes into **work done by expansion**, not only into U. So $C_p > C_V$, and by exactly R (the meaning of R from 01).

[B] Класична теорія (pp. 390–392)

- The book gives C_V and C_p for each kind of gas (p. 392); the γ column is our C_p/C_V.

газ	**i**	C_V	C_p	**γ**
одноатомний	3	3/2 R	5/2 R	5/3 ≈ 1,67
двохатомний (жорсткий)	5	5/2 R	7/2 R	7/5 = 1,4
багатоатомний (жорсткий)	6	3R	4R	4/3 ≈ 1,33

- γ is the **показник адіабати** (adiabatic index); it is needed for topic 10.
- The general formula with vibrations: $U = (3 + r + 2s)\frac{RT}{2}$ (16.46).

[C] Невдачі класичної теорії (pp. 392–394)

1. Complex molecules: for C_2H_5OH the rigid model gives 3R and the elastic one 24R, but experiment gives about 8R. **Both models fail.**
2. **The temperature dependence** isn't explained. For a diatomic gas, рис. 16.7:
   - low T: $C_V \approx$ 3/2 R, as if there were translation only (H_2 below 60 K behaves as monatomic);
   - room T: 5/2 R (rotation "switched on");
   - thousands of K: towards 7/2 R (vibrations switch on, but molecules dissociate first).
3. ✎ Draw the "staircase" C_V(T) with steps at $T_{\text{оберт}}$ and $T_{\text{кол.}}$

[D] Квантове пояснення (pp. 394–397), short

- The energies of rotation and vibration are **quantized**: $\varepsilon_{\text{пост}} \ll \varepsilon_{\text{оберт}} \ll \varepsilon_{\text{кол}}$, hence the **характеристичні температури** (characteristic temperatures) $T_{\text{пост}} \ll T_{\text{оберт}} \ll T_{\text{кол}}$.
- Below $T_{\text{оберт}}$ or $T_{\text{кол}}$, kT is too small to excite that motion, so its degrees of freedom are ”frozen”.
- Values: $T_{\text{оберт}}$ for H_2 is 85 K, for N_2 2,85 K; $T_{\text{кол}}$ for N_2 is 3340 K, for O_2 2240 K.

Self-check

1. Why is $C_p - C_V$ exactly R?
2. Why does diatomic H_2 behave as monatomic at 60 K?
3. Which γ do you use for air, and why?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn’t print these forms.

- **General formulas** (→ [B]): from U = (i/2)RT, $C_V = \frac{i}{2}R$, $C_p = \frac{i+2}{2}R$, $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}$. They reproduce the book’s table for i = 3, 5, 6.
- **Subscripts** (→ [D]): the book writes vibrational quantities with «колив» in (16.4) but «кол» in § 16.5 ($T_{\text{кол}}$, $\varepsilon_{\text{кол}}$). English texts use θ_{rot}, θ_{vib} (or Θ_r, Θ_v) for the characteristic temperatures.

7. Ізотермічний процес · 8. Ізохоричний процес · 9. Ізобарний процес

Джерело: т. 1, **§ 16.4** «Робота ідеального газу при ізопроцесах. Політропний процес» (с. 386–390); the laws themselves are in **§ 14.7** (с. 313–316, see 01). ✔ (16.26)–(16.33) checked against the scan.

Block E, page 1 of 2. Spelling: the syllabus says «ізохоричний», the book «**ізохорний**». Use with the summary table isoprocesses, which is the most useful single page for the МКР.

Layout (one block per process, the same 5 rows each time)

```
┌ [Ізохорний V = const]  ┬ [Ізобарний p = const] ┬ [Ізотермічний T = const] ┐
│ закон: p/T = const     │ V/T = const (Г-Л)     │ pV = const (Б-М)         │
│ графік p–V: вертикаль  │ горизонталь + площа   │ гіпербола + площа        │
│ A = 0                  │ A = p(V₂−V₁)=νRΔT     │ A = νRT ln(V₂/V₁)        │
│ ΔU = νC_VΔT            │ ΔU = νC_VΔT           │ ΔU = 0                   │
│ Q = ΔU                 │ Q = νC_pΔT            │ Q = A                    │
└────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┘
          + footer: політропний процес pVⁿ = const об'єднує всі (16.40)
```

(ν = m/M)

Ізохорний процес, V = const (pp. 386–387)

- Example: heating a gas in a rigid, sealed vessel.
- $d'A_V = p\,dV = 0$, $A_V = 0$ (16.26)
- From the first law, $d'Q = dU = \frac{m}{M} C_V dT$ (16.27) and $\Delta U = \frac{m}{M} C_V (T_2 - T_1)$ (16.28).
- **All the heat goes into internal energy.**

Ізобарний процес, p = const (p. 387)

- Example: a gas under a freely moving piston, or water heated in an open vessel.
- $A_p = p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1)$ (16.29). On the p–V diagram this is a **rectangle** (рис. 16.4).
- $Q_p = \frac{m}{M}(C_V + R)(T_2 - T_1) = \frac{m}{M} C_p (T_2 - T_1)$ (16.30)
- The heat goes into **both ΔU and work** (Mayer).

Ізотермічний процес, T = const (pp. 387–388)

- It needs ideal thermal contact with a **термостат** (a body at constant temperature) and must be very slow. All first-order phase transitions (boiling, for example) are isothermal.
- dU = 0, so $d'Q = d'A$ (16.31): **all the heat becomes work**.
- $$A_T = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1} \qquad (16.32)$$
- Also: $Q_T = A_T = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_1}{p_2} = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ (16.33)
- ✎ The area under the hyperbola. Remember where the logarithm comes from: ∫dV/V.

Footer: політропний процес (pp. 388–389), optional but elegant

- A process with **constant heat capacity C**: $pV^n = \text{const}$ (16.40), with $n = \frac{C_p - C}{C_V - C}$ (16.37).

процес	C	n
ізобарний	C_p	0
ізотермічний	$\pm\infty$	1
адіабатний	0	γ
ізохорний	C_V	$\to \infty$

- All four processes are special cases of one equation.

Self-check

1. In which process does all the heat go into work, and in which all into U?
2. Why is $C_T = \infty$? (Heat is added but $\Delta T = 0$.)
3. Draw all three on one p–V diagram from the same starting point.

10. Адіабатичний процес

Джерело: т. 1, **§ 16.3** «Адіабатний процес. Рівняння Пуассона» (с. 383–386). ✔ (16.20)–(16.25) checked against the scan.

Block E, page 2 of 2. Terminology: the syllabus says «адіабатичний», the book «**адіабатний**». Use the book's word.

Layout

```
┌ [A] Означення + умови (теплоізоляція, «достатня повільність»)        ┐
├ [B] Перший закон: dU + d'A = 0 (16.20) → pdV = −C_V dT (16.21)        ┤
├ [C] Виведення → рівняння Пуассона TV^(γ−1) = const, pV^γ = const     ┤
├ [D] ГРАФІК: адіабата крутіша за ізотерму (рис. 16.3) + чому          ┤
└ [E] Робота (16.24)–(16.25); приклади з життя                         ┘
```

[A] Означення (pp. 383–384)

- **Адіабатний процес**: «що відбувається **без теплообміну** з навколишнім середовищем» (d'Q = 0).
- Two conditions: **heat insulation** (non-conducting walls) and **enough slowness** to stay quasistatic. In practice the process is made fast, so heat has no time to leave, but slower than the speed of sound.

[B] Перший закон (p. 384)

- $dU + d'A = 0$ (16.20) $\Longrightarrow d'A = -dU$. «система виконує роботу внаслідок **зменшення внутрішньої енергії**»
- One mole: $p\,dV = -C_V dT$ (16.21). **Expansion cools** the gas; compression heats it.

[C] Рівняння Пуассона (p. 384) — put it in a box

- Substitute p = RT/V: $\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V}\frac{dV}{V}$ (16.22). Integrate, using $R/C_V = \gamma - 1$:

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}\ (16.23), \qquad pV^{\gamma} = \text{const}, \quad pT^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = \text{const}\ (16.23a)$$

- **γ =** C_p/C_V, the **показник адіабати** or **коефіцієнт Пуассона** (values on 05).

[D] Адіабата vs ізотерма (pp. 384–385)

- Isotherm: p ∝ 1/V. Adiabat: p ∝ $1/V^{\gamma}$ with γ > 1, so the **adiabat is steeper**.
- Physically: during adiabatic expansion p falls both because **V grows and because T falls**.
- ✎ The main drawing, рис. 16.3: an isotherm and an adiabat through one point, the adiabat steeper, with the work area $V_1 \to V_2$ shaded.

[E] Робота (p. 385)

- $A = -\frac{m}{M}C_V \int_{T_1}^{T_2} dT = \frac{m}{M}C_V(T_1 - T_2)$ (16.24)
- $$A = \frac{m}{M}\frac{RT_1}{\gamma - 1}\left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right] \qquad (16.25)$$
- Examples from life:
  - air rising in the troposphere expands adiabatically and cools, which is why it is colder higher up;

- internal combustion engines;
- producing low temperatures.

Self-check

1. Why does a gas cool when it expands adiabatically, when no heat is taken away?
2. Why is the adiabat steeper than the isotherm? Give two reasons in one sentence.
3. Air: γ = 1,4. How does T change if the volume halves? (×2^0,4 ≈ 1,32.)

11. Колові процеси

Джерело: т. 1, **§ 16.6** «Оборотні та необоротні процеси. Колові процеси (цикли)» (с. 397–399).
✔ Checked against the scan (pp. 397–399; (16.13) on p. 382).

Block F, page 1 of 5.

Layout

```
┌ [A] Оборотні vs необоротні процеси (таблиця + приклади)          ┐
├ [B] Цикл: означення; ΔU = 0 → Q = A (16.13)                       ┤
├ [C] ГРАФІК: цикл 1a2b1 на p–V (рис. 16.8): A = площа всередині    ┤
└ [D] Прямий (теплова машина) vs обернений (холодильна) цикл       ┘
```

[A] Оборотні та необоротні процеси (p. 397)

- **Оборотний процес** (reversible): «такий процес, при якому система, проведена в зворотному напрямі, повертається в початковий стан **через ті самі проміжні стани**, що й у прямому процесі, а стан тіл поза системою залишається незмінним». All quasistatic processes are reversible.
- **Необоротний процес** (irreversible): one that can't be reversed without changes in the system or its surroundings. **All real processes are irreversible.**
- Typical irreversible processes: heat exchange across a finite ΔT, diffusion, expansion into vacuum, friction. The main sign of irreversibility is **dissipation heat** (p. 398).
- Why study ideal reversible processes: they set the limit that real processes approach.

[B] Цикл (p. 398)

- **Цикл (коловий процес)**: «термодинамічний процес, у результаті якого система повертається в початковий стан»
- U is a function of state, so ΔU = 0 over a cycle, and $Q = A$ (16.13): the net heat received becomes work (06).
- Why cycles: one expansion gives only limited work. To repeat it you must compress the gas back **along a different path**, at lower pressure, otherwise the net work is 0.

[C] Робота циклу (pp. 398–399)

- The work of a cycle equals the **area enclosed by the loop** on the p–V diagram (рис. 16.8): the expansion work minus the compression work.
- ✎ The main drawing: a loop 1a2b1, horizontal hatching under the upper branch (expansion), vertical hatching under the lower one (compression), and the difference shaded.

[D] Прямий і обернений цикл (p. 399)

	прямий	**обернений**
машина	теплова машина (двигун)	холодильна машина
обхід на p–V	clockwise	anticlockwise
робота	$A_{\text{розш}} > A_{\text{стиск}}$, A > 0	$A_{\text{стиск}} > A_{\text{розш}}$
теплота	part of the heat → work, the rest → холодильник (cooler)	work moves heat from cold to hot

- **Оборотний цикл** (reversible cycle): all its parts are reversible. **Необоротний** (irreversible): at least one part is not.

Self-check

1. Why can’t you compress the gas back along the same curve?
2. Which way round does a heat engine’s cycle go on a p–V diagram?
3. Why is every real process irreversible?

12. Цикл Карно (необернений) та його ккд · 13. Цикл Карно (обернений) та його ккд

Джерело: т. 1, **§ 16.6** «… Цикл Карно та його коефіцієнт корисної дії» (с. 399–401), **§ 16.7** «Теплові машини» (с. 402–403). ✔ (16.53)–(16.68) checked against the scan.

Block F, page 2 of 5. Terminology: the syllabus says «**необернений**» meaning the **direct** cycle. The book never uses this word; it says **прямий** / **обернений** (direct / reverse). Write «прямий (необернений)» once on the page.

Layout

```
┌ [A] Що таке цикл Карно: 2 ізотерми + 2 адіабати; ідеальна машина     ┐
├ [B] ГРАФІК 1→2→3→4→1 (рис. 16.9) з T₁, T₂, Q₁, Q₂ + таблиця 4 стадій ┤
├ [C] ККД прямого циклу: η = 1 − Q₂/Q₁ (16.53) = 1 − T₂/T₁ (16.64) — рамка ┤
├ [D] Обернений цикл: холодильна машина ε (16.68), тепловий насос φ (16.67) ┤
└ [E] Схеми трьох машин (рис. 16.10–16.12) — стрілки потоків енергії     ┘
```

[A] Цикл Карно (p. 399)

- Carnot’s 1824 questions: is there a limit to improving heat engines, and does the working substance matter?
- «Він складається з **двох адіабатних та двох ізотермічних** процесів». It is **reversible**: the cycle of an **ideal** heat engine, with no losses to conduction, radiation or friction.
- It is also the route to a quantitative **second law** (16).

[B] Прямий цикл з ідеальним газом (pp. 400–401), 1 mole, clockwise

стадія	процес	контакт	робота	теплота
1→2	ізотермічне розширення, T₁	**нагрівник** (heater)	$A_{12} = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = Q_1$ (16.55)	Q₁ > 0 received
2→3	адіабатне розширення	isolated	$A_{23} = C_V(T_1 - T_2)$ (16.56)	0
3→4	ізотермічне стискання, T₂	**холодильник** (cooler)	$A_{34} = -RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4} = -Q_2$ (16.57)	Q₂ given away
4→1	адіабатне стискання	isolated	$A_{41} = C_V(T_2 - T_1)$ (16.58)	0

- The adiabatic works cancel. From the adiabats: $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$ (16.63), the **condition for the cycle to close**.
- ✎ The main drawing, рис. 16.9: two isotherms (T₁ upper, T₂ lower) and two steeper adiabats, with arrows 1→2→3→4 and Q₁ in, Q₂ out.

[C] ККД (pp. 400–401) — put it in a box

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad (16.53) \qquad \eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (16.64)$$

- The efficiency of a reversible Carnot cycle depends **only on the temperatures of the heater and the cooler**.
- **η < 1 always**: η = 1 would need $T_1 \to \infty$ or $T_2 \to 0$, which is impossible.
- If $\Delta T \to 0$ then $\eta \to 0$, so a heat engine **must have two thermostats**.

[D] Обернений цикл (pp. 399, 402–403)

- It runs anticlockwise: the work of **external forces** carries heat from the **colder** body to the **hotter** one.
- **Холодильна машина** (refrigerator): $\varepsilon = \frac{Q_2}{A}$ (16.68), the **холодильний коефіцієнт**, heat taken from the cold body per unit of work.
- **Тепловий насос** (heat pump): $\varphi = \frac{Q_1}{A} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$ (16.67), the **коефіцієнт перетворення**, heat delivered to the warm body per unit of work. It can be > 1.

[E] Три типи теплових машин (p. 402)

- ✎ Three small block diagrams (рис. 16.10–16.12):
  - двигун (engine): heater → Q_1 → working body → A out, and Q_2 → cooler;
  - холодильник (refrigerator): A in, cold body → Q_2 → working body → Q_1 → surroundings;
  - тепловий насос (heat pump): the same arrows, but the goal is Q_1 going into the warm room.

Self-check

1. Why doesn't the Carnot efficiency depend on the gas?
2. Where does the work of the two adiabats go?
3. Why can a heat pump's φ be greater than 1 without breaking energy conservation?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Refrigerator on a reverse Carnot cycle** (→ [D]): from (16.64), $\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$. Note φ = ε + 1, since $Q_1 = Q_2 + A$.
- **Sign of Q_2** (→ [B], [C]): on p. 400 the book says the gas gives the cooler «Q_2 ($Q_2 < 0$)», yet (16.53) and (16.57) use Q_2 as a positive amount, and (16.65) writes $|Q_2|$. In § 16.8 (topic 16) Q_2 is signed again. Rule of thumb: in $\eta = 1 - Q_2/Q_1$, Q_2 is the **magnitude** of the heat given away; in Clausius's $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 \le 0$ it is **signed** (negative).
- **Names of the coefficients** (→ [D]): the book's холодильний коефіцієнт ε is the English coefficient of performance COP_R; its коефіцієнт перетворення φ is COP_{HP}. The book's thermal efficiency is η or $\eta_т$.

16. Другий закон термодинаміки

Джерело: т. 1, **§ 16.8** «Другий закон термодинаміки. Теорема Карно. Поняття про ентропію. Характеристичні функції» (с. 403–409). ✔ (16.69)–(16.74) checked against the scan.

Block F, page 3 of 5. Entropy itself (the same §, from p. 406) is on 14.

Layout

```
┌ [A] Що визначає закон: НАПРЯМ процесів + межу перетворення Q → A      ┐
├ [B] Три формулювання: Клаузіус · Томсон · Оствальд (у рамках)          ┤
├ [C] Теорема Карно: два твердження; η ≤ η₀ (16.69)                      ┤
├ [D] Кількісно: нерівність Клаузіуса Q₁/T₁ + Q₂/T₂ ≤ 0 (16.71); зведена теплота ┤
└ [E] Узагальнення на довільний цикл ∮d'Q/T ≤ 0 (16.74) + рис. 16.13     ┘
```

[A] Що визначає (p. 403)

- The first law allows any process that conserves energy. The **second law** «визначає **напрям** термодинамічних процесів та встановлює максимально можливі границі перетворення теплоти в роботу». It sums up experiment.

[B] Формулювання (pp. 403–404)

- **Клаузіус (1850)**: «теплота не може **сама собою** переходити від менш нагрітого тіла до більш нагрітого»
- **Томсон (Кельвін, 1851)**: «не можна побудувати машину, що діє періодично, яка б неперервно перетворювала теплоту в роботу **тільки внаслідок охолодження одного тіла**, без того, щоб у навколишніх тілах не відбулося одночасно певних залишкових змін»
- **Оствальд**: «**вічний двигун другого роду** неможливий». Such an engine would run by cooling the ocean; it wouldn’t break energy conservation, but the second law forbids it.
- ✎ Contrast it with the perpetual motion machine of the **first** kind (06), which is forbidden by energy conservation.

[C] Теорема Карно (p. 404)

1. The efficiency of a **reversible** Carnot cycle doesn’t depend on the working substance or the design; it equals that of the ideal-gas cycle at the same temperatures.
2. The efficiency of an **irreversible** cycle is always lower.
3. $\eta \le \eta_0$ (16.69): equality for a reversible cycle, < for an irreversible one.

[D] Нерівність Клаузіуса (p. 404)

- Put in $\eta = \dfrac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$ and $\eta_0 = \dfrac{T_1 - T_2}{T_1}$ (16.70). With $Q_2 < 0$:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \le 0 \qquad (16.71)$$

- **Зведена теплота** (reduced heat) is the heat exchanged with a reservoir divided by that reservoir’s absolute temperature.
- In words: the sum of reduced heats in a reversible Carnot cycle is 0; in an irreversible one it is < 0.

[E] Довільний цикл (p. 405)

- Any reversible cycle can be cut by a grid of isotherms and adiabats into elementary Carnot cycles (рис. 16.13); the inner pieces cancel.
- $$\oint \frac{d'Q}{T} = 0 \text{ (оборотний) (16.73)}, \qquad \oint \frac{d'Q}{T} \le 0 \text{ (загалом) (16.74)}$$
- (16.74) is the second law for any cycle. Because (16.73) equals 0, d'Q/T must be the differential of a **function of state**, which is **entropy**. Continue on 14.
- ✎ Sketch рис. 16.13: an oval cut by a grid of isotherms and adiabats.

Self-check

1. Clausius's and Thomson's wordings sound different. Why are they equivalent?
2. Why doesn't a perpetual motion machine of the second kind break the first law?
3. What is "reduced heat", and why is it summed and not plain heat?

14. Ентропія та її властивості

Джерело: т. 1, **§ 16.8** (from p. 406, «Поняття про ентропію»), **§ 16.10** «Зв’язок ентропії з імовірністю стану системи» (с. 411–414); Example 16.4 (с. 410–411). ✔ (16.75)–(16.82) checked against the scan; (16.84), (16.91) from clear OCR.

Block F, page 4 of 5. Two views: **thermodynamic** (dS = d’Q/T) and **statistical** (S = k ln w).

Layout

```
┌ [A] Означення: dS = d'Q/T (16.75) — рамка; Клаузіус 1854          ┐
├ [B] Властивості: функція стану · адитивна · до сталої (16.76)     ┤
├ [C] Закон зростання ентропії: dS > d'Q/T (16.81), ізольована dS > 0 (16.82) ┤
├ [D] ΔS для процесів ідеального газу (приклад 16.4) — табличка     ┤
├ [E] Статистичний зміст: S = k ln w (16.91); мікро-/макростан; рис. 16.15 ┤
└ footer: основне рівняння TdS = dU + pdV (16.84); «теплова смерть» — чому ні ┘
```

[A] Означення (p. 406) — put it in a box

$$dS = \frac{d’Q}{T} \qquad (16.75)$$

- From (16.73): d’Q/T is an exact differential, so a function of state S exists. Clausius introduced it in 1854; the name is Greek for ”turning, change”.
- The book’s definition: «Ентропія — функція стану системи, яка визначається тим, що її повний диференціал dS при елементарному **оборотному** процесі дорівнює відношенню нескінченно малої кількості теплоти d’Q, що її дістала система, до термодинамічної температури T системи»
- $d’Q = T\,dS$, the same structure as $d’A = p\,dV$: T is the ”generalized force” of heat exchange and S its ”generalized coordinate”.

[B] Властивості (p. 406)

1. A **function of state**: it doesn’t depend on the path.
2. **Additive**: S = ΣSᵢ.
3. Defined only **up to a constant**: $S = S_0 + \int \frac{d’Q}{T}$ (16.76). The third law fixes S₀ (15).

[C] Закон зростання ентропії (pp. 406–408)

- An irreversible path A→B, returned reversibly (рис. 16.14), gives $S_2 - S_1 > \int_1^2 \frac{d’Q}{T}$ (16.80). For an infinitesimal irreversible step:

$$dS > \frac{d’Q}{T} \qquad (16.81)$$

- An **isolated** system (d’Q = 0): $dS > 0$ (16.82) for irreversible processes; $dS = 0$ (16.83) in equilibrium, when all processes are reversible.
- «ентропія замкненої системи **не може зменшуватись**; вона або зростає, якщо в системі відбуваються необоротні процеси, або залишається незмінною …». Entropy is a **measure of irreversibility**.

[D] ΔS для ідеального газу, 1 моль (pp. 410–411, Example 16.4)

процес	**ΔS**
адіабатний (оборотний)	0, **ізоентропійний** (isentropic)
ізотермічний	Q/T
ізохорний	C_V ln(T₂/T₁)
ізобарний	C_p ln(T₂/T₁)

- Any quasistatic process (Example 16.5, C_V const): $\Delta S = \frac{m}{M} C_V \ln T + \frac{m}{M} R \ln V$, as printed: an indefinite form, up to a constant.

[E] Статистичний зміст (pp. 411–413)

- **Макростан** (macrostate): given p, T, ρ… **Мікростан** (microstate): a particular distribution of the particles over coordinates and momenta.
- **Термодинамічна ймовірність w** (thermodynamic probability): the **number of microstates** that realize a given macrostate. It is ≥ 1, usually a huge number, unlike mathematical probability. $w = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_N!}$ (16.90)
- The example on p. 412: 6 molecules in 3 cells. 2-2-2 can happen in 90 ways, 6-0-0 in only 1. The **even** distribution is the most probable, which is equilibrium.
- **Принцип Больцмана** (1886):

$$S = k \ln w \qquad (16.91)$$

- Meaning: «довільний природний процес протікає в напрямі **збільшення ймовірності стану**». Entropy measures **disorder** and how close the system is to equilibrium. A decrease is not forbidden, only very improbable (fluctuations).
- ✎ Sketch рис. 16.15: two molecules in two cells, with all the arrangements.

Footer

- The fundamental equation (16.84): $T\,dS = dU + p\,dV$, the first and second laws together.
- **”Heat death of the Universe”** (pp. 413–414): this is wrong, because the Universe is not a thermodynamic system.
- Optional: characteristic functions (pp. 408–409): ентальпія I = U + pV, вільна енергія F = U − TS (16.87), термодинамічний потенціал Гіббса Z = U − TS + pV (16.88).

Self-check

1. Why is d’Q not an exact differential while d’Q/T is?
2. In an isolated system, can entropy decrease? Answer strictly (thermodynamics) and statistically.
3. Why is the even distribution of molecules the equilibrium?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn’t print these forms.

- **One inequality for both cases** (→ [C]): combining (16.75) and (16.81), $dS \geq \frac{d'Q}{T}$, and for an isolated system $dS \geq 0$: = for reversible, > for irreversible. The book prints the strict and the equal cases separately.
- **Isothermal ΔS** (→ [D]): with Q = RT ln(V₂/V₁) from (16.32), ΔS = R ln(V₂/V₁) per mole.
- **Between two states** (→ [D]): from Example 16.5, $\Delta S = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$ with ν = m/M.
- **Letters for the potentials** (→ footer): the book writes enthalpy as **I** and the Gibbs

potential as **Z**. Modern texts use **H** and **G** (Gibbs free energy); F is also written A (Helmholtz energy).

15. Теорема Нернста

Джерело: т. 1, **§ 16.11** «Третій закон термодинаміки. Недосяжність абсолютного нуля температур» (с. 414–415). The book calls this the **third law**; «теорема Нернста» is its historical name. ✔ (16.93) and the consequences checked against the scan (pp. 414–415).

Block F, page 5 of 5. A short topic: half a page.

Layout

```
┌ [A] Навіщо: ентропія відома лише до сталої (16.76) → потрібен новий постулат ┐
├ [B] Формулювання Нернста (1906) — рамка                                       ┤
├ [C] Формулювання Планка: lim S = 0 при T → 0 (16.93)                          ┤
└ [D] Наслідки: недосяжність 0 K · C_p, C_V → 0 · коефіцієнти розширення → 0    ┘
```

[A] Навіщо (p. 414)

- The first and second laws give only **changes** in entropy; S_0 in (16.76) stays undetermined. That's enough until the **chemical composition** changes, which is the problem of chemical affinity.
- So a **new postulate** was needed, generalizing new experiments at low temperatures.

[B] Формулювання Нернста (1906) (pp. 414–415)

- «при наближенні температури до абсолютного нуля ентропія будь-якої рівноважної системи при ізотермічних процесах **перестає залежати від термодинамічних параметрів стану** і при T → 0 набуває **ту саму для всіх систем сталу величину**, яку можна вважати такою, що дорівнює нулю»
- Nernst considered only **condensed** systems: solids and liquids.

[C] Формулювання Планка (p. 415)

- Planck went further: entropy itself goes to zero, for **any** system:

$$\lim_{T \to 0} S = 0 \qquad (16.93)$$

  the most general statement of the third law.

[D] Наслідки (p. 415)

1. **Absolute zero can't be reached**. All cooling methods use adiabatic processes. Near 0 K the difference between adiabatic and isothermal processes vanishes, so cooling becomes ever less effective. You can only approach 0 K asymptotically. The law is sometimes stated as the «принцип недосяжності абсолютного нуля».
2. $C_p, C_V \to 0$ as T → 0. This is confirmed by experiment and by the quantum theories of Einstein and Debye; compare 05, where classical theory fails.
3. The thermal coefficients of expansion and pressure → 0.

The three laws together (our summary; good for the page footer)

закон	суть
I	energy is conserved: Q = ΔU + A
II	direction: S of an isolated system doesn't decrease
III	S → 0 as T → 0; 0 K can't be reached

Self-check

1. Why couldn’t the first two laws fix the value of entropy?
2. Why does adiabatic cooling stop working near 0 K?

26. Відмінність реального газу від ідеального

Джерело: т. 1, **§ 17.1** «Реальні гази та відхилення їхніх властивостей від законів ідеального газу. Сили міжмолекулярної взаємодії в газах» (с. 419–422). ✔ Checked against the scan (pp. 419–421).

Block G, page 1 of 2.

Layout

```
┌ [A] Означення реального газу; дві причини відхилень (власний об'єм, притягання) ┐
├ [B] Кількісні vs якісні відхилення; коли модель ідеального газу ще працює    ┤
├ [C] ГРАФІК сили F(r): відштовхування/притягання, r₀ (рис. 17.2)              ┤
├ [D] Сили Ван дер Ваальса: Кеєзом · Дебай · Лондон (таблиця) + водневий зв'язок ┤
└ [E] Ізотерми Амага, крива і температура Бойля (optional)                     ┘
```

[A] Реальний газ (p. 419)

- «**Реальними** називають гази, для яких суттєву роль відіграють міжмолекулярні сили взаємодії»
- Compared with the ideal model (non-interacting point molecules), two things are added:
  1. **the molecules' own volume**. At normal conditions it is about 10^{-4} of the gas volume, but at about 10^{8} Па it is significant;
  2. **intermolecular attraction**, which adds extra pressure.

[B] Характер відхилень (pp. 419–420)

- **Кількісні** (quantitative): the ideal-gas laws, pV = RT included, hold only approximately.
- **Якісні** (qualitative): interaction lets a gas turn into a **liquid and a solid**, which is impossible for an ideal gas.
- The ideal-gas laws hold at **low pressure and high temperature**, when the average potential energy of interaction ≪ the average kinetic energy.

[C] Сили міжмолекулярної взаємодії (pp. 420–421)

- Repulsion $F_1 \propto 1/r^n$ (n = 9–15) acts at short range; attraction $F_2 \propto 1/r^m$ (m = 7) acts further out.
- At r = r_0, F = 0, the **рівноважна відстань** (equilibrium distance). For r > r_0 attraction wins; for r < r_0 repulsion wins.
- ✎ The main drawing, рис. 17.2: F(r), with the repulsion curve above, the attraction curve below, their sum and the zero at r_0. Optionally add the potential energy curve with a well at r_0.

тип	автор	у яких молекул	природа	особливості

[D] Сили Ван дер Ваальса (pp. 421–422)

- Weak forces of attraction at distances of about 10^{-9} м.

тип	автор	у яких молекул	природа	особливості
орієнтаційні	Кеєзом	polar (H_2O, NH_3)	permanent dipoles	depend on T, not additive
індукційні	Дебай	polar + induced	induced dipole	small, don’t depend on T
дисперсійні	Лондон	**non-polar** (the main ones)	instantaneous dipoles from electron motion	additive

- **Водневий зв’язок** (hydrogen bond), p. 422: specific attraction in water and alcohols through OH groups.

[E] Optional: ізотерми Амага (p. 420)

- In pV–p coordinates an ideal gas gives straight lines; a real gas’s curves first dip (attraction) and then rise (own volume). The minimum lies on the **крива Бойля**; $T_{\text{Б}}$ is the **температура Бойля**.

Self-check

1. Name the two causes of deviation from the ideal gas, and say when each one dominates.
2. Why can’t an ideal gas be liquefied?
3. Which van der Waals forces act between N_2 molecules?

27. Рівняння Ван-Дер-Ваальса

Джерело: т. 1, **§ 17.2** «Рівняння Ван-дер-Ваальса» (с. 422–424), **§ 17.3** «Ізотерми газу Ван-дер-Ваальса. Критичний стан речовини…» (с. 425–430), **§ 17.4** (с. 430–432). ✔ (17.4), (17.9)–(17.12) checked against the scan.

Block G, page 2 of 2. Spelling: the book writes **Ван-дер-Ваальса**.

Layout

```
┌ [A] Рівняння (17.4) у рамці + що означає кожна поправка          ┐
├ [B] Звідки a/V² (внутрішній тиск) і b (4 × об'єм молекул)        ┤
├ [C] ГРАФІК ізотерм (рис. 17.4/17.5): хвиля, горизонталь, критична точка K ┤
├ [D] Критичні параметри (17.12); критичний стан                   ┤
└ [E] Порівняння з дослідом; зведене рівняння (17.18)              ┘
```

[A] Рівняння (p. 423) — put it in a box

$$\left(p + \frac{a}{V_M^2}\right)(V_M - b) = RT \qquad (17.4)$$

- For one mole. V_M is the molar volume; **a, b** are experimental constants of the gas.
- **a/V_M²** accounts for the **attraction** of molecules. It has the dimension of pressure and is called the **внутрішній тиск** (internal pressure), p_i.
- **b** corrects for the molecules' **own volume** (repulsion at short range).
- For mass m (17.7): $\left(p + \frac{m^2}{M^2}\frac{a}{V^2}\right)\left(V - \frac{m}{M}b\right) = \frac{m}{M}RT$
- It is only approximate: quantitatively good at high T and low p, but **qualitatively** valid everywhere.

[B] Звідки поправки (pp. 423–424)

- **b**: the centres of two hard spheres of radius r can't come closer than 2r, so the "forbidden" volume per molecule is ½·(4/3)π(2r)³ = 4·(4/3)πr³. So **b = 4 × the volume of the molecules** in a mole.
- **a/V²**: a molecule near the wall is pulled back into the gas. That force ∝ n_0 and the number of molecules hitting the wall ∝ n_0, so $p_i \propto n_0^2 \propto 1/V^2$.
- ✎ Sketch a molecule near the wall with the forces from its neighbours pulling it inwards.

[C] Ізотерми (pp. 425–430)

- Multiplying out gives a **cubic in** V_M (17.8): for given p and T there can be **three** volumes.
- Below $T_к$: an S-shaped "wave". On the **experimental** isotherm it is replaced by a **horizontal** line (рис. 17.5), where liquid and vapour coexist at constant p.
  - The right branch is gas; the left, steep branch is liquid (it barely compresses).
  - **Метастабільні стани** (metastable): the section bc is **пересичена пара** (supersaturated vapour); ef is **перегріта рідина** (superheated liquid).
  - The section cde is absolutely unstable ($\partial p/\partial V > 0$), so it can't be realized.
- **Бінодаль** (binodal) bounds the two-phase region; **спінодаль** (spinodal) bounds the unstable states.
- Above $T_к$: monotonic hyperbolas, so a gas **can't be liquefied by pressure alone** (CO_2 above 31 °C).

- ✎ The main drawing: a family of isotherms $T_1 < T_к < T_2$, the wave and the horizontal line on T_1, the inflection point K, and the bell-shaped binodal with labelled regions ”рідина”, ”рідина + пара”, ”газ”.

[D] Критичний стан (pp. 426–427)

- At $T = T_к$ the three roots merge and the isotherm has an **inflection point K**.

$$p_к = \frac{a}{27b^2}, \qquad V_к = 3b, \qquad T_к = \frac{8a}{27Rb} \qquad (17.12)$$

- In the critical state the difference between liquid and gas disappears, and the compressibility $\to \infty$.
- You can go from gas to liquid **without a phase transition** by going round the two-phase region via $T > T_к$ (p. 430).

[E] Порівняння з дослідом (pp. 430–432), short

- a and b depend on T. The **критичний коефіцієнт** $K_к = \frac{RT_к}{p_к V_к} = \frac{8}{3} \approx 2{,}67$ in theory, but for H_2 it is 3,12 and for water 4,46. In reality $V_к \approx 2b$.
- **Зведене рівняння** (reduced equation), with $\pi = p/p_к$, $\omega = V_M/V_к$, $\theta = T/T_к$ (17.17): $\left(\pi + \frac{3}{\omega^2}\right)(3\omega - 1) = 8\theta$ (17.18), the same for all substances. This is the **закон відповідних станів** (law of corresponding states).

Self-check

1. Which constant stands for attraction, and which for repulsion?
2. Why is b four times the molecules’ own volume, not equal to it?
3. Why can’t you liquefy a gas above $T_к$ however hard you compress it?

28. Класифікація кристалів

Джерело: т. 1, **§ 18.1** «Кристалічні та аморфні тіла. Основні характеристики кристалів» (с. 444–450); classification by type of bond, **§ 18.2** «Сили зв’язку у твердих тілах» (с. 450–453). ✔ Checked against the scan (pp. 446–448).

Block H, page 1 of 3. The book classifies crystals in **two ways**: by **symmetry** (syngonies, Bravais lattices) and by **type of bond**. Cover both.

Layout

```
┌ [A] Тверде тіло: кристалічне vs аморфне (дальній/ближній порядок, анізотропія) ┐
├ [B] Моно- і полікристали; закони кристалографії; елементи симетрії             ┤
├ [C] Гратка, вузли, елементарна комірка, rₙ = ma₁ + na₂ + pa₃ (18.1)            ┤
├ [D] ТАБЛИЦЯ 7 сингоній + 4 типи граток Браве (14 разом) + малюнки кубічних    ┤
└ [E] Класифікація за типом зв'язку: іонні · ковалентні · металічні · молекулярні ┘
```

[A] Кристалічні та аморфні тіла (pp. 444–445)

- **Тверде тіло** (solid): «агрегатний стан речовини, який характеризується стабільністю форми та об’єму», plus ordered positions of atoms that vibrate slightly about equilibrium.

	кристалічні	**аморфні**
порядок	**дальній** (long-range): strict periodic repetition in 3D	only **ближній** (short-range)
властивості	**анізотропія** (anisotropy): properties depend on direction	**ізотропні** (isotropic)
приклади	metals, salt, quartz	glass, amber, resin, polymers

- **Монокристал** (single crystal, one large regular crystal) vs **полікристал** (polycrystal, many small grains fused together at random; most metals).

[B] Закони кристалографії і симетрія (pp. 445–446)

- Flat faces and straight edges; **constant angles between faces**; rational ratios of the intercepts on the axes.
- **Закон симетрії**: only axes of order **1, 2, 3, 4 and 6** are possible (no 5th order).
- Elements of symmetry: the **вісь симетрії** (axis, rotation by 2π/n), the **площина симетрії** P (plane, mirror) and the **центр інверсії** C (centre of inversion).

[C] Просторова гратка (pp. 446–447)

- Put a point at the centre of mass of each structural unit to get the **просторові гратки** (space lattice); its points are the **вузли** (nodes).
- **Елементарна комірка** (unit cell): a parallelepiped built on the vectors a_1, a_2, a_3, whose lengths are the **періоди ідентичності** (lattice periods). Any node is at $\vec{r}_{mnp} = m\vec{a}_1 + n\vec{a}_2 + p\vec{a}_3$ (18.1).
- **Гратки Браве** (Bravais lattices): unit cells of minimal area that keep the full symmetry. There are **14** of them in **7 сингоній** (crystal systems).

[D] 7 сингоній (pp. 447–449, Table 18.4)

сингонія	ребра	кути	приклади (book)
триклінна	a ≠ b ≠ c	α ≠ β ≠ γ ≠ 90°	feldspars
моноклінна	a ≠ b ≠ c	α = γ = 90° ≠ β	gypsum, mica, talc
ромбічна	a ≠ b ≠ c	α = β = γ = 90°	sulphur, topaz
ромбоедрична (тригональна)	a = b = c	α = β = γ ≠ 90°	calcite, tellurium
тетрагональна	a = b ≠ c	α = β = γ = 90°	rutile, cassiterite
гексагональна	a = b ≠ c	α = β = 90°, γ = 120°	ice, graphite, zinc
кубічна	a = b = c	α = β = γ = 90°	most metals, diamond

- Lattice types: **примітивна** (primitive, nodes at the corners), **базоцентрована** (base-centred), **об'ємноцентрована** (body-centred: Fe, W, Na), **гранецентрована** (face-centred: Al, Cu, Ag, Au).
- ✎ Draw the three cubic lattices: simple, body-centred and face-centred.
- Optional: **Miller indices** (h k l) for planes, p. 449; **230 space groups** (Fedorov, 1890); **32 classes** of symmetry.

[E] За типом зв'язку (§ 18.2, pp. 450–453)

тип кристала	у вузлах	зв'язок	властивості	приклади
іонний	± ions	electrostatic	strong, high T_{melt}, poor conductor	NaCl
ковалентний (атомний)	neutral atoms	shared electron pairs, **directional, saturated**	very hard, high T_{melt}, dielectrics or semiconductors	diamond, Si
металічний	+ ions	**electron gas**	good electrical and thermal conductor, shiny, ductile	Cu, Au
молекуляр-ний	molecules	van der Waals, hydrogen	low T_{melt}, insulators	organic crystals; N, P, S compounds

Self-check

1. What is the difference between long-range and short-range order?
2. Why can't a crystal have a 5th-order symmetry axis? (Pentagons can't tile a plane.)
3. Why do metals conduct electricity while covalent crystals don't?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **Iron in two lists** (→ [D]): the book names iron among both body-centred and face-centred metals (p. 449). The reason: α-Fe (room temperature) is body-centred and γ-Fe (above about 912 °C) is face-centred, which is what makes steel hardenable.
- **Ice** (→ [E]): ice is a molecular crystal held by hydrogen bonds; the book lists it only under the hexagonal system.
- **Lattice letters** (→ [D]): табл. 18.4 marks the lattice types P (primitive), C (base-centred), J (body-centred; English texts use I) and F (face-centred); the rhombohedral cell is R.

29. Дефекти в кристалах

Джерело: т. 1, **§ 18.3** «Дефекти в реальних кристалах» (с. 453–456). ✔ Checked against the scan (pp. 453–456).

Block H, page 2 of 3. The structure is simple: **classification by dimension (0D–3D)**.

Layout

```
┌ [A] Навіщо: дефекти визначають структурно-чутливі властивості          ┐
├ [B] Класифікація за вимірністю — головна таблиця 0D/1D/2D/3D           ┤
├ [C] Точкові: Шотткі, Френкель, домішки (рис. 18.5 а/б/в) + n_в (18.4)   ┤
├ [D] Лінійні: дислокації — крайова (рис. 18.6) і гвинтова (рис. 18.7); вектор Бюргерса ┤
└ [E] Поверхневі та об'ємні (коротко)                                    ┘
```

[A] Навіщо (p. 453)

- A perfect structure exists only in small volumes. Defects largely determine the **структурно-чутливі властивості** (structure-sensitive properties): electrical and thermal conductivity, strength…

[B] Класифікація (p. 453) — the main table

вимірність	тип	приклади
0 (нульвимірні)	**точкові** (point): size ~ one or a few interatomic distances in all directions	vacancies (Schottky), Frenkel pairs, impurity atoms
1 (одновимірні)	**лінійні** (line)	**дислокації**: edge and screw
2 (двовимірні)	**поверхневі** (planar)	grain boundaries, mosaic blocks, stacking faults, twins, the surface
3 (тривимірні)	**об’ємні** (volume)	cracks, inclusions, pores

[C] Точкові дефекти (pp. 453–455)

- **Atomic** ones:
  - **дефект за Шотткі** (Schottky defect): an empty node, a vacancy (рис. 18.5 а);
  - **дефект за Френкелем** (Frenkel defect): a vacancy **plus** a nearby interstitial atom (рис. 18.5 в). It needs a little less energy than a Schottky defect, 2–4 eB in both cases;
  - **домішкові атоми** (impurity atoms): interstitial or substituting a host atom (рис. 18.5 б).
- Electronic ones (free electrons, holes, the **exciton** and the **polaron**, Pekar’s theory) and energy ones (**phonons**, quanta of lattice vibration): mention them in one line.
- Equilibrium concentration of vacancies: $n_в = n_0 e^{-W_в/kT}$ (18.4). It grows quickly with T; near melting $n_в/n_0 \approx 10^{-4}$. Compare Boltzmann’s distribution on 17, 19.
- ✎ Draw three small square grids: one with a missing atom, one with an atom moved from its node into a gap, one with a foreign atom.

[D] Дислокації (pp. 455–456)

- **Крайова** (edge dislocation, рис. 18.6): one atomic plane ends inside the crystal, like a book with one page torn halfway.
- **Гвинтова** (screw dislocation, рис. 18.7): two half-planes slip by one period relative to each other.

- Dislocations can’t end inside a crystal; they form loops or reach the surface.
- **Вектор Бюргерса** (Burgers vector): go round a contour by a whole number of steps. Around a dislocation the contour **doesn’t close**, and the gap a′a″ is the Burgers vector, a measure of the lattice distortion.
- **Густина дислокацій** (dislocation density): the number of dislocation lines crossing a unit area.
- ✎ Sketch the ”extra half-plane” with a Burgers contour round it.

[E] Поверхневі та об’ємні (p. 456)

- **Двійники** (twins): two crystals of one substance grown together along a crystallographic plane that is a mirror plane.

Self-check

1. Schottky vs Frenkel: what’s the difference?
2. Why does the number of vacancies grow with temperature, and by what law?
3. How do you detect a dislocation with a Burgers contour?

30. Рідини

Джерело: т. 1, **§ 19.1** «Загальні властивості та будова рідин» (с. 462–466), **§ 19.2** «В’язкість рідин» (с. 467). ✔ Checked against the scan (pp. 462–467).

Block H, page 3 of 3. ⚠ This question was **handwritten** on the MKP sheet («30. Рідини»), so its scope is unclear. This page covers the structure and properties of liquids (§19.1–19.2). If your lecturer means surface tension and capillarity, see the ”possible extension” at the end.

Layout

```
┌ [A] Рідина між газом і твердим тілом: ближній порядок без дальнього     ┐
├ [B] ГРАФІК радіальної функції розподілу N(r): тверде/рідина/газ (рис. 19.1) ┤
├ [C] Тепловий рух за Френкелем: коливання + стрибки; час «осілого життя» τ ┤
├ [D] Властивості: мала стисливість β_T, теплове розширення α_p, аномалія води ┤
└ [E] Перенос у рідинах: D, λ, η — і їх залежність від T (протилежна газам!) ┘
```

[A] Місце рідин (pp. 462–463)

- The three states differ in how strong **the interaction of molecules is compared with their thermal motion**.
- Liquids sit **between gases and solids**. Molecules interact strongly, as in a solid, but sit on no periodic lattice.
- Frenkel’s idea: a liquid is a ”**disordered solid**”, with **short-range order** and **no long-range order** (28).

[B] Радіальна функція розподілу (pp. 462–463)

- N(r) is the number of neighbours at a distance r from a chosen molecule.
  - Solid: sharp discrete peaks to large r (fixed positions).
  - Liquid: a few blurred maxima, damped towards a constant (short-range order).
  - Gas: smooth, with no structure.
- **Bernal’s model**: the structure is described by the radii of the coordination spheres, the number of molecules in them, and how blurred they are.
- ✎ Draw three small graphs N(r) side by side, as in рис. 19.1 а/б/в.

[C] Тепловий рух (Френкель) (pp. 463–464)

- **Oscillation** about a temporary equilibrium (period about 10^{-12} c), then a **jump** to a neighbouring position. These jumps are **трансляційні рухи** and need vacancies, or ”holes”.
- The **час осілого життя** (residence time): $\tau = Ae^{\Delta W/kT}$ (19.1), where ΔW is the potential barrier. It shrinks as T rises.
- The jumps explain **fluidity** and **diffusion** in liquids.

[D] Властивості (pp. 464–466)

- They keep their **volume** (not their shape) and have a **free surface**.
- **Мала стисливість** (low compressibility): $\beta_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{dV}{dp}\right)_T$ (19.2), about 10^{-9}–10^{-10} Па$^{-1}$, tens to hundreds of thousands of times smaller than for gases. This is strong repulsion at work.
- **Теплове розширення** (thermal expansion): $\alpha_p = \frac{1}{V}\left(\frac{dV}{dT}\right)_p$ (19.3), usually > 0.

  - ⚡ **The water anomaly**: between 0 and 3,98 °C water **shrinks** when heated, so its density is greatest at 3,98 °C. The cause is its open, tetrahedral, hydrogen-bonded structure.
- Heat capacity is close to that of solids and much larger than that of gases, because heat goes into both kinetic and potential energy.

[E] Перенос у рідинах (pp. 466–467) — contrast with gases (23–25)

	гази	**рідини**
механізм	free flights over ⟨l⟩	jumps between equilibrium positions
D	⅓⟨v⟩⟨l⟩; 0,1–0,9 см²/с	$\frac{1}{6}\langle\delta^2\rangle/\langle t\rangle$ (19.4); 4–5 orders of magnitude smaller; $D = Be^{-\Delta W/kT}$ (19.5)
η від T	**grows** with T	**falls** with T: $\eta = Ae^{\Delta W/kT}$, **Frenkel's formula** (19.7)
λ від T	grows	falls roughly linearly

- Water's viscosity falls by 20 % from 20 to 30 °C; glycerine's falls 2,4 times.

Possible extension, if "рідини" includes surface phenomena

- § 19.3 «Поверхневий шар рідини. Поверхневий натяг» (с. 468–471), § 19.4 «Формула Лапласа. Змочування та капілярні явища» (с. 471–474). Not yet in the wiki. Ask your lecturer, and tell me to add a page if needed.

Self-check

1. Why is a liquid closer to a solid than to a gas?
2. Why does a liquid's viscosity fall with T while a gas's grows?
3. Why is water densest at 4 °C?

Addendum (not in the book)

Our shorthand and derivations. The book doesn't print these forms.

- **d or ∂** (→ [D]): the book prints (19.2)–(19.3) with straight d and a subscript, $(dV/dp)_T$; with the subscript it means the partial derivative $(\partial V/\partial p)_T$, as other texts write it. The same quantity β_T is called χ for gases in (14.24).
- **τ and ⟨t⟩** (→ [C], [E]): the residence time is τ in (19.1) but ⟨t⟩ in (19.4).

Частина III

Додатки

Інтегральна ↔ диференціальна форма законів

The same pattern comes up in at least four syllabus topics. The integral form links **different places** (a surface and a volume, or a loop). The differential form links quantities **at one point**, which is what close-range action needs. The bridges are two mathematical theorems.

Закон	інтегральна	диференціальна	міст	topics
Гаусс (джерела E)	$\oint E\,dS = q/\varepsilon_0$	$\operatorname{div} E = \rho/\varepsilon_0$	Остроградського–Гаусса	6, 7, 13
потенціальність E	$\oint E\,dl = 0$	$\operatorname{rot} E = 0$	Стокса	4, 9
збереження заряду	$\oint j\,dS = -\partial q/\partial t$	$\partial\rho/\partial t = -\operatorname{div} j$	Остроградського–Гаусса	1, 20
Ом	$I = U/R$	$j = \sigma E$	(local cylinder dl·dS)	19
Джоуль–Ленц	$Q = I^2Rt$	$w = \sigma E^2 = jE$	(local cylinder)	23

Book’s framing (т. 2, p. 41): «Теорема Гаусса дає можливість звести основні рівняння електростатики до диференціальної форми й узгодити їх, таким чином, з теорією близькодії.»

Принцип суперпозиції

Fields from several sources add **without affecting one another**. This is an experimental fact, not something that follows from Coulomb’s law (т. 2, p. 25).

Величина	як додається	формула	topic
сила	vector sum	$F = \Sigma F_i$ (1.10)	2
напруженість	vector sum	$E = \Sigma E_i$ (1.13)	3
потенціал	**algebraic** sum	$\varphi = \Sigma \varphi_i$ (1.56)	4
поле двох площин	the fields add between the plates and cancel outside	σ/ε_0	11
поле диполя	the fields of +q and −q add	(1.20)–(1.22)	5

The book’s wording: «суперпозиція — це здатність фізичних полів до накладання, при якому векторні характеристики їх додаються геометрично, а після розходження їх ці поля існують незалежно одне від одного».

Процеси в ідеальному газі: одна таблиця

ν = m/M moles. The first law: Q = ΔU + A. For an ideal gas always **$\Delta U = \nu C_V \Delta T$**. Sources: т. 1, § 14.7, § 16.3–16.4.

процес	умова	рівняння	закон	A (газ)	ΔU	Q	C	n (pVⁿ)
ізохорний	V = const	p/T = const	(14.28)	0	$\nu C_V \Delta T$	= ΔU	C_V	±∞
ізобарний	p = const	V/T = const	Гей-Люссака	p(V₂−V₁) = νRΔT	$\nu C_V \Delta T$	$\nu C_p \Delta T$	$C_p = C_V + R$	0
ізотермічний	T = const	pV = const	Бойля–Маріотта	νRT ln(V₂/V₁)	0	= A	∞	1
адіабатний	d’Q = 0	pV^γ = const, $TV^{\gamma-1}$ = const	Пуассона	νC_V(T₁−T₂)	−A	0	0	γ
політропний	C = const	pVⁿ = const	(16.40)	—	$\nu C_V \Delta T$	νCΔT	C	$(C_{p-C})/(C_{V-C})$

✎ One p–V diagram from a common point with all four curves: an isochore (vertical), an isobar (horizontal), an isotherm (hyperbola) and an adiabat (a steeper hyperbola).

Values: one-atom γ = 5/3, two-atom 7/5, many-atom 4/3 (see 05).

Явища переносу: один закон, три величини

All three transport phenomena have the shape **потік = −коефіцієнт × градієнт** (flux = −coefficient × gradient). In a gas each coefficient is **⅓ × (what one molecule carries) × ⟨v⟩ × ⟨l⟩**.

	потік чого	**закон**	**градієнт**	**коефіцієнт (газ)**	**topic**
дифузія	маси	j_m = −D dρ/dx (Фік)	густини	D = ⅓⟨v⟩⟨l⟩	23–25
в’язкість	імпульсу	F/ΔS = −η du/dx (Ньютон)	швидкості течії	η = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩	23–25
теплопровідність	енергії	j_q = −λ dT/dx (Фур’є)	температури	λ = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩c_V	23–25

The same ”flux ∝ −gradient” shape appears in electricity: **Ohm’s law j = σE = −σ grad φ** (electrostatics 19). All four laws are local, differential laws; see інтегральна ↔ диференціальна форма.

The microscopic ingredient they share is the mean free path ⟨l⟩ (22).

Позначення, знаки й одиниці

A reference for reading other sources next to Кучерук: lecture slides, English textbooks, problem books, aerospace literature. The same physics can look different because the letters, signs or units differ. The book column is checked against the scans; ”other texts” means common modern or English usage.

Одна літера — кілька величин (у цій книзі)

літера	значення в книзі	де
γ	показник адіабати C_p/C_V; гравітаційна стала	(16.23); т. 1, с. 333
η	в’язкість; ККД; лінійна густина заряду	(15.10); (16.53); т. 2, с. 40, 62
τ	лінійна густина заряду; час осілого життя; час релаксації	(1.5); (19.1); (15.29)
ν	кількість речовини (моль); кінематична в’язкість η/ρ; частота	(14.17); с. 349; (16.49)
λ	теплопровідність (in optics: wavelength)	(15.16)
σ	поверхнева густина заряду; питома електропровідність; ефективний переріз	(1.4); (2.21); с. 344
ρ	об’ємна густина заряду; питомий опір; густина речовини	(1.3); (2.18); (14.64)
α	кут; температурний коефіцієнт опору; коефіцієнт розширення; поляризованість	(2.19); (14.26), (19.3); (17.2)
β	термічний коефіцієнт тиску; стисливість рідин β_T	(14.29); (19.2)
n, n_0	число молекул і концентрація; у (14.70) обидві — концентрації; показник політропи	(14.14); (14.70); (16.37)
W, U	потенціальна енергія: W у § 1.6, U у § 1.11, $W_п$ у § 1.25; U — також внутрішня енергія і напруга	т. 2, с. 34, 54, 101; т. 1, (16.1)
k	коефіцієнт у законі Кулона; стала Больцмана; провідність	(1.6); (14.9); (2.16)
C	ємність; теплоємність; стала Сезерленда	(1.68); (16.7); (15.3)
ε	діелектрична проникність; холодильний коефіцієнт; енергія кванта	т. 2, с. 26; (16.68); с. 394
φ	потенціал; коефіцієнт перетворення теплового насоса; кут	(1.54); (16.66)
I	сила струму; ентальпія; потенціал іонізації	(2.1); с. 408; (17.3)
D	вектор електричної індукції; коефіцієнт дифузії	(1.136); (15.22)
r, s	радіус; внутрішній опір; числа обертальних і коливальних ступенів вільності	(2.34); (16.45)

Книга vs інші тексти

величина	Кучерук	інші тексти
неповний диференціал	d′Q, d′A	δQ, δW, đQ
скалярний добуток	$\vec{p}\vec{E}$ (без крапки)	$\vec{p}\cdot\vec{E}$
векторний добуток	$[\vec{p}\cdot\vec{E}]$, (1.25)	$\vec{p}\times\vec{E}$
ротор, дивергенція	rot, div	$\nabla\times$, $\nabla\cdot$; curl
середнє	⟨v⟩	$\bar{v}$
найбільш імовірна / середня квадратична швидкість	$\nu_н$ / $\nu_{кв}$	ν_p / ν_{rms}
число молекул / концентрація	n / n_0	N / n
молярна маса	M	M, μ (older texts)
ентальпія / потенціал Гіббса / вільна енергія	I / Z / F	H / G / F or A

величина	Кучерук	інші тексти
гравітаційна стала	γ	G
теплопровідність	λ	k, к
тепловий потік	j_q	q, $\vec{q}$
характеристичні температури	$T_{\text{оберт}}$, $T_{\text{кол}}$	θ_{rot}, θ_{vib}
об’ємноцентрована гратка	J	I
холодильний коефіцієнт / коефіцієнт перетворення	ε / φ	COP_R / COP_{HP}
ЕРС	$\mathcal{E}$	$\mathcal{E}$, emf

Знаки

що	Кучерук	інше
робота в першому законі	A — робота **системи**: $d'Q = dU + d'A$ (16.11)	хімія, IUPAC: W — робота **над** системою, ΔU = Q + W
теплота	надана системі > 0 (с. 380)	the same almost everywhere
Q_2 у циклі	у $\eta = 1 - Q_2/Q_1$ модуль; у (16.71) зі знаком, $Q_2 < 0$	many texts write Q_C or $\lvert Q_2\rvert$ throughout
дипольний момент	від − до + (1.19)	some chemistry texts draw the arrow from + to −
напрям струму	рух **позитивних** зарядів (т. 2, с. 106)	the same; electrons move the other way
нормаль у потоці	зовнішня — додатна (с. 36)	the same
ЕРС у правилі Кірхгофа	> 0, якщо обхід проходить джерело від − до +	the same convention, but check each text

Одиниці

величина	значення	джерело
заряд, СГСЕ	1 Кл = $3\cdot10^9$ од. СГСЕ; у СГСЕ k = 1	т. 2, с. 23
тиск	1 атм = 101 325 Па ≈ 1,01 бар; 1 ат = 98 066,5 Па ≈ 0,98 бар; 1 тор = 133,322 Па; 1 бар = 10^5 Па	т. 1, с. 304
енергія	1 еВ = $1{,}6\cdot10^{-19}$ Дж	т. 2, с. 51
температура	T = t + 273,15; потрійна точка води 273,16 K	т. 1, с. 410
стандартна атмосфера (МСА)	$1{,}013\cdot10^5$ Па, 15 °C на рівні моря; −56,5 °C на 11 км; градієнт 6,5 K/км (у книзі надруковано 5,6)	т. 1, с. 335
авіаційні одиниці	1 psi ≈ 6895 Па; 1 ft = 0,3048 м; 1 inHg ≈ 3386 Па; °F = 1,8·°C + 32	standard values, not in the book
калорія	1 кал = 4,1868 Дж	standard value, not in the book

Як не заплутатися

- When you copy a formula from another source, check three things first: what each letter means, the sign of the work, and whether it is per mole, per kilogram or for the whole body (C, c, C_0 in (16.7)–(16.9)).
- The book writes decimals with a comma (8,31); English texts use a point (8.31).
- In handwritten notes, pick one symbol per quantity and write a one-line legend at the top of the page if you deviate from the book.

Глосарій

1. Електростатика

Тема 1. Електричний заряд та його властивості (§ 1.1)

- **електричний заряд** — внутрішня характеристика деяких елементарних матеріальних частинок, яка проявляється в їхній взаємодії на відстані або під час дії на них зовнішніх електромагнітних полів; є як джерелом, так і об’єктом дії електромагнітного поля · $F_1/F_2 = q_1/q_2$ (1.1) · [Кл] · (EN) electric charge · т. 2, с. 14–15
- **електростатика** — розділ фізики, в якому вивчають властивості й взаємодію нерухомих електричних зарядів та властивості їхніх електричних полів · (EN) electrostatics · т. 2, с. 14
- **електростатичне поле** — поле нерухомих зарядів, характеристики якого в кожній точці не змінюються з часом (функції лише координат) · (EN) electrostatic field · т. 2, с. 14–15
- **позитивні / негативні заряди** — два види зарядів; позитивні виникають на скляній паличці при натиранні шовком, негативні — на ебонітовій (янтарній) при натиранні хутром; однойменні відштовхуються, різнойменні притягуються · (EN) positive / negative charges · т. 2, с. 15
- **електризація тертям** — перерозподіл електронів між тілами при щільному контакті; тіла набувають однакових за модулем і протилежних за знаком зарядів, сумарний заряд не змінюється · (EN) triboelectric charging · т. 2, с. 16
- **елементарний заряд** — найменша порція електрики, що дорівнює за модулем заряду електрона · $|e| = 1{,}602\,189\,2(46)\cdot 10^{-19}$ Кл · (EN) elementary charge · т. 2, с. 16, 18
- **закон квантування електричного заряду** — усі заряди, які існують у природі у вільному стані, складаються з окремих дискретних зарядів, однакових за абсолютним значенням і таких, що дорівнюють зарядові електрона; приймається як постулат · $\Delta q = n|e|$, $n = \pm 1, \pm 2, \ldots$ · (EN) charge quantization · т. 2, с. 18–19
- **питомий заряд електрона** — відношення заряду частинки до її маси · $e/m = 1{,}7588\cdot 10^{11}$ Кл/кг · (EN) specific charge · т. 2, с. 17
- **маса спокою електрона** · $m = 9{,}109\,534(47)\cdot 10^{-31}$ кг · (EN) electron rest mass · т. 2, с. 18
- **інваріантність заряду** — незалежність числового значення заряду від стану інерціальних систем відліку (від швидкості руху носія) · (EN) charge invariance · т. 2, с. 20
- **замкнена система** — система, в яку з оточуючого середовища крізь її межі не проникають електрично заряджені частинки · (EN) closed (isolated) system · т. 2, с. 20
- **закон збереження заряду** — повний електричний заряд замкненої системи є величиною постійною і дорівнює алгебричній сумі її позитивних та негативних зарядів · $q = \sum_{i=1}^{n} q_i = \text{const}$ (1.2) · (EN) conservation of charge · т. 2, с. 20–21
- **об’ємна густина заряду** · $\rho = \lim_{\Delta V\to 0} \Delta q/\Delta V = dq/dV$ (1.3) · [Кл/м³] · (EN) volume charge density · т. 2, с. 21
- **поверхнева густина заряду** · $\sigma = \lim_{\Delta S\to 0} \Delta q/\Delta S = dq/dS$ (1.4) · [Кл/м²] · (EN) surface charge density · т. 2, с. 21
- **лінійна густина заряду** · $\tau = \lim_{\Delta l\to 0} \Delta q/\Delta l = dq/dl$ (1.5) · [Кл/м] · (EN) linear charge density · т. 2, с. 21

2. Постійний струм

3. Молекулярна фізика та термодинаміка

Блок А. Основне рівняння МКТ · Закони ідеальних газів · Ступені вільності, U

- **ідеальний газ** — газ, у якому можна знехтувати розмірами молекул (вважати їх матеріальними точками) та їхньою взаємодією на відстані, враховуючи лише взаємодію під час зіткнень · (EN) ideal gas · т. 1, с. 300
- **тепловий рух** — абсолютно хаотичний рух молекул, коли всі напрями швидкостей рівноймовірні · (EN) thermal motion · т. 1, с. 300
- **середня квадратична швидкість** · $\langle v_{\text{кв}}^2 \rangle = (v_1^2 + \ldots + v_n^2)/n$ · (EN) root-mean-square speed · т. 1, с. 303
- **основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів** — тиск ідеального газу дорівнює двом третинам середньої кінетичної енергії поступального руху молекул одиниці об’єму газу · $p = \frac{2}{3} n_0 \frac{m_0 \langle v_{\text{кв}}^2 \rangle}{2}$ (14.6) · (EN) basic equation of kinetic theory · т. 1, с. 303
- **тиск** (газу) — усереднена за часом результуюча сила дії молекул на одиницю площі стінки; статистичний параметр · [Па = Н/м²] · (EN) pressure · т. 1, с. 301, 304
- **термодинамічна рівновага** — стан, у якому припиняються всі макроскопічні зміни; самовільний перехід до неї — **релаксація**, час — **час релаксації** · (EN) thermodynamic equilibrium, relaxation · т. 1, с. 305
- **нульове начало термодинаміки** — кожна система при фіксованих зовнішніх умовах з часом самовільно сягає стану термодинамічної рівноваги · (EN) zeroth law · т. 1, с. 306
- **температура** — інтенсивний параметр, що характеризує стан внутрішнього руху частинок рівноважної системи; для ідеального газу $\Theta = \frac{2}{3}\langle \varepsilon \rangle$, $\Theta = kT$ (14.9) · [K] · (EN) temperature · т. 1, с. 307–308
- **стала Больцмана** — множник, що виражає співвідношення між одиницями енергії і термодинамічної температури · $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К; $\frac{m_0 \langle v_{\text{кв}}^2 \rangle}{2} = \frac{3}{2} kT$ (14.10) · (EN) Boltzmann constant · т. 1, с. 308
- **термічне рівняння стану** — рівняння, яке в стані теплової рівноваги пов’язує p, V, T · $F(p, V, T) = 0$ (14.12); для ідеального газу $pV = nkT$ (14.14) · (EN) thermal equation of state · т. 1, с. 311–312
- **молярна (універсальна) газова стала** — $R = kN_A = 8{,}31451$ Дж/(моль·К); чисельно дорівнює роботі розширення одного моля ідеального газу при ізобарному нагріванні на 1 К · (EN) molar gas constant · т. 1, с. 312–313
- **рівняння Клапейрона** · $pV_M = RT$ (14.16) · (EN) Clapeyron equation · т. 1, с. 312
- **рівняння Клапейрона–Менделєєва** · $pV = \frac{m}{M} RT$ (14.18) · (EN) ideal gas law · т. 1, с. 312–313
- **закон Бойля–Маріотта** (ізотермічний процес, T = const) · $pV = \text{const}$ (14.22) · (EN) Boyle–Mariotte law · т. 1, с. 314
- **закон Гей-Люссака** (ізобарний процес, p = const) · $V/T = \text{const}$ (14.25), $V = V_0(1 + \alpha t)$ (14.26), α = 0,003661 К⁻¹ · (EN) Gay-Lussac’s law · т. 1, с. 315
- **рівняння ізохорного процесу** (V = const) · $p/T = \text{const}$ (14.28), $p = p_0(1 + \beta t)$ (14.29) · (EN) isochoric law (Charles’s law) · т. 1, с. 315–316
- **закон Авогадро** — в однакових об’ємах ідеальних газів при однакових температурах і тисках міститься однакове число молекул · (EN) Avogadro’s law · т. 1, с. 316
- **внутрішня енергія** — енергія, що залежить від внутрішнього стану фізичної системи; однозначна функція стану; адитивна · $U = \sum U_i$ (16.1) · (EN) internal

energy · т. 1, с. 375–376
- **ступені вільності** (syllabus: «ступені свободи») — кількість незалежних координат, потрібних для визначення положення всіх точок системи · $i = i_{\text{пост}} + i_{\text{оберт}} + i_{\text{колив}}$ (16.4) · (EN) degrees of freedom · т. 1, с. 376–377
- **закон рівного розподілу енергії за класичними ступенями вільності** (закон рівного розподілу Больцмана) — у стані теплової рівноваги на кожний класичний ступінь вільності припадає в середньому кінетична енергія ½kT (коливальний — kT) · (EN) equipartition theorem · т. 1, с. 377
- **внутрішня енергія ідеального газу** — сумарна кінетична енергія молекул; функція тільки абсолютної температури · $U = \frac{i}{2}RT$ (16.3) на 1 моль · (EN) internal energy of an ideal gas · т. 1, с. 377, 390–392

Блок B. Розподіл Максвелла · Больцман, Максвелл–Больцман

- **функція розподілу молекул за швидкостями** (густина ймовірності) — $dW = dn/n = f(\vec{v})\,d\omega$ (14.42); умова нормування $\int f\,d\omega = 1$ (14.43) · (EN) velocity distribution function · т. 1, с. 322
- **закон розподілу Максвелла** (syllabus: «Максвела») — відносна кількість молекул зі швидкостями від v до v + dv · $\frac{dn}{n} = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{m_0}{2kT}\right)^{3/2} e^{-m_0 v^2/2kT} v^2 dv$ (14.57) · (EN) Maxwell distribution · т. 1, с. 327
- **найбільш імовірна швидкість** · $v_{\text{н}} = \sqrt{2kT/m_0}$ (14.58) · (EN) most probable speed · т. 1, с. 328
- **середня (арифметична) швидкість** · $\langle v\rangle = \sqrt{8kT/\pi m_0}$ (14.61) · (EN) mean speed · т. 1, с. 330
- **середня квадратична (теплова) швидкість** · $v_{\text{кв}} = \sqrt{3kT/m_0}$ (14.62); $v_{\text{кв}} : \langle v\rangle : v_{\text{н}} \approx 1{,}2 : 1{,}1 : 1$ · (EN) rms speed · т. 1, с. 318, 330
- **барометрична формула** · $p = p_0 e^{-Mg(h-h_0)/RT}$ (14.68); T = const, g = const · (EN) barometric formula · т. 1, с. 332
- **розподіл Больцмана** — універсальний закон розподілу частинок у будь-якому потенціальному полі в стані теплової рівноваги · $n = n_0 e^{-\Delta U/kT}$ (14.71) · (EN) Boltzmann distribution · т. 1, с. 335
- **розподіл Максвелла–Больцмана** — добуток больцманівського й максвеллівського множників · (14.74) · (EN) Maxwell–Boltzmann distribution · т. 1, с. 336

Блок C. Довжина вільного пробігу · Явища переносу

- **середня довжина вільного пробігу** — середня відстань, яку проходить молекула між двома послідовними зіткненнями · $\langle l\rangle = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n_0)$ (15.2) · (EN) mean free path · т. 1, с. 343–344
- **середнє число зіткнень** · $\langle z\rangle = \sqrt{2}\pi d^2 n_0 \langle v\rangle$ (15.1) · (EN) collision frequency · т. 1, с. 344
- **ефективний поперечний переріз** (повний) · $\sigma = \pi d^2$; характеризує ймовірність процесу, а не геометрію · (EN) effective cross-section · т. 1, с. 344
- **явища переносу** — зумовлені тепловим рухом молекул явища перенесення маси (дифузія), імпульсу (внутрішнє тертя) і енергії (теплопровідність) · (EN) transport phenomena · т. 1, с. 348
- **дифузія газів** — процес самовільного вирівнювання густин (концентрацій) у суміші, зумовлений тепловим рухом мікрочастинок; в однокомпонентному середовищі — **самодифузія** · (EN) diffusion, self-diffusion · т. 1, с. 356
- **закон Фіка** · $j_m = -D\,d\rho/dx$ (15.22); $D = \frac{1}{3}\langle v\rangle\langle l\rangle$ (15.27) · [м²/с] · (EN) Fick’s law · т. 1, с. 356–357

- **внутрішнє тертя (в’язкість)** — гальмівні сили між шарами газу, зумовлені обміном імпульсом впорядкованого руху · закон Ньютона $F = -\eta \frac{du}{dx} \Delta S$ (15.10); $\eta = \frac{1}{3}\rho\langle v\rangle\langle l\rangle$ (15.14) · [Па·с] · (EN) viscosity · т. 1, с. 348–350
- **теплопровідність** — молекулярне перенесення енергії в суцільному середовищі, зумовлене градієнтом температури · закон Фур’є $j_q = -\lambda \operatorname{grad} T$ (15.16); $\lambda = \frac{1}{3}\rho\langle v\rangle\langle l\rangle c_V$ (15.21) · [Вт/(м·К)] · (EN) thermal conductivity · т. 1, с. 352–354

Блок D–E. U · Q, A, C · I закон · C газів · Ізопроцеси · Адіабата

- **термодинаміка** — наука про найбільш загальні властивості макроскопічних систем у стані термодинамічної рівноваги та про процеси переходу між цими станами · (EN) thermodynamics · т. 1, с. 371
- **термодинамічна система**; ізольована / закрита / відкрита / адіабатна · (EN) thermodynamic system · т. 1, с. 371, 373
- **квазістатичний (квазірівноважний) процес** — ідеалізований процес із неперервної послідовності рівноважних станів · (EN) quasistatic process · т. 1, с. 372
- **функція стану / функція процесу** — U, S — функції стану (dU, dS); A, Q — функції процесу (d’A, d’Q) · (EN) state function / path function · т. 1, с. 375, 378–380
- **калоричне рівняння стану** — залежність внутрішньої енергії від параметрів стану · U = U(V, T) · (EN) caloric equation of state · т. 1, с. 376
- **робота газу** — макроскопічна міра зміни внутрішньої енергії у квазістатичних процесах · $d'A = p\,dV$ (16.5), $A = \int p\,dV$ (16.6) · (EN) work · т. 1, с. 378
- **теплообмін, кількість теплоти** — передача енергії від більш нагрітого тіла до менш нагрітого без виконання макроскопічної роботи; Q — її міра · [Дж] · (EN) heat transfer, heat · т. 1, с. 380
- **теплоємність** · $C_0 = d'Q/dT$ (16.7); **питома** c: $C_0 = mc$ (16.8); **молярна** C = Mc (16.9) · (EN) heat capacity · т. 1, с. 380–381
- **перший закон термодинаміки** — у теплових процесах зміна внутрішньої енергії відбувається за рахунок приросту кількості теплоти і виконаної роботи · $dU = d'Q - d'A$ (16.10), $Q = \Delta U + A$ (16.12) · (EN) first law of thermodynamics · т. 1, с. 381–382
- **вічний двигун першого роду** — машина, що виконувала б роботу без одержання енергії ззовні; неможливий · (EN) perpetual motion machine of the first kind · т. 1, с. 382
- **рівняння Майєра** · $C_p = C_V + R$ (16.19) · (EN) Mayer’s relation · т. 1, с. 383
- **показник адіабати (коефіцієнт Пуассона)** · $\gamma = C_p/C_V$ · (EN) adiabatic index · т. 1, с. 384
- **ізохорний процес** (syllabus: «ізохоричний») · $A = 0$, $Q = \Delta U$ (16.26)–(16.28) · (EN) isochoric process · т. 1, с. 386–387
- **ізобарний процес** · $A = p(V_2 - V_1) = \nu R \Delta T$ (16.29), $Q = \nu C_p \Delta T$ (16.30) · (EN) isobaric process · т. 1, с. 387
- **ізотермічний процес** · $\Delta U = 0$, $Q = A = \nu RT \ln(V_2/V_1)$ (16.32) · (EN) isothermal process · т. 1, с. 387–388
- **адіабатний процес** (syllabus: «адіабатичний») — процес без теплообміну з навколишнім середовищем · $d'A = -dU$ (16.20) · (EN) adiabatic process · т. 1, с. 383–384
- **рівняння Пуассона** · $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ (16.23), $pV^{\gamma} = \text{const}$ (16.23a) · (EN) Poisson’s (adiabat) equation · т. 1, с. 384
- **політропний процес** — процес в ідеальному газі зі сталою теплоємністю · $pV^n = \text{const}$ (16.40), $n = (C_p - C)/(C_V - C)$ (16.37) · (EN) polytropic process · т. 1, с. 388–389

Блок F. Колові процеси · Карно · II закон · Ентропія · Нернст

- **оборотний процес** — процес, при якому система, проведена в зворотному напрямі, повертається в початковий стан через ті самі проміжні стани, а стан тіл поза системою залишається незмінним · (EN) reversible process · т. 1, с. 397
- **необоротний процес** — процес, який не можна здійснити у зворотному напрямі без відповідних змін у системі або оточенні; всі реальні процеси — необоротні · (EN) irreversible process · т. 1, с. 397
- **цикл (коловий процес)** — процес, у результаті якого система повертається в початковий стан; робота = площа циклу на p–V · (EN) cycle · т. 1, с. 398
- **прямий / обернений цикл** — цикл теплової машини (за годинниковою стрілкою) / холодильної машини (проти) · (EN) direct / reverse cycle · т. 1, с. 399
- **цикл Карно** — оборотний цикл з двох ізотерм і двох адіабат; цикл ідеальної теплової машини · $\eta = 1 - Q_2/Q_1$ (16.53) $= 1 - T_2/T_1$ (16.64) · (EN) Carnot cycle · т. 1, с. 399–401
- **холодильний коефіцієнт** · $\varepsilon = Q_2/A$ (16.68) · (EN) coefficient of performance (refrigerator) · т. 1, с. 403
- **коефіцієнт перетворення (теплового насоса)** · $\varphi = Q_1/A = T_1/(T_1 - T_2)$ (16.67) · (EN) heat pump COP · т. 1, с. 402–403
- **другий закон термодинаміки** — Клаузіус: теплота не може сама собою переходити від менш нагрітого тіла до більш нагрітого; Томсон: неможлива періодична машина, що перетворює теплоту в роботу лише охолодженням одного тіла · (EN) second law of thermodynamics · т. 1, с. 403–404
- **вічний двигун другого роду** — неможливий (Оствальд) · (EN) perpetual motion machine of the second kind · т. 1, с. 404
- **теорема Карно** — ККД оборотного циклу Карно не залежить від робочого тіла; ККД необоротного циклу завжди менший · $\eta \le \eta_0$ (16.69) · (EN) Carnot's theorem · т. 1, с. 404
- **зведена теплота**; **нерівність Клаузіуса** · $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 \le 0$ (16.71), $\oint d'Q/T \le 0$ (16.74) · (EN) reduced heat, Clausius inequality · т. 1, с. 404–405
- **ентропія** — функція стану, повний диференціал якої при оборотному процесі $dS = d'Q/T$ (16.75); адитивна; закон зростання: $dS > 0$ (16.82) для ізольованої системи при необоротних процесах, $dS = 0$ (16.83) у рівновазі · [Дж/К] · (EN) entropy · т. 1, с. 406–408
- **термодинамічна ймовірність** — число мікростанів, які реалізують даний макростан · (16.90) · (EN) thermodynamic probability (statistical weight) · т. 1, с. 411–412
- **принцип Больцмана** · $S = k \ln w$ (16.91) · (EN) Boltzmann's entropy formula · т. 1, с. 413
- **третій закон термодинаміки (теорема Нернста)** — при T → 0 ентропія рівноважної системи перестає залежати від параметрів і прямує до сталої (нуля); $\lim_{T \to 0} S = 0$ (16.93, Планк) · (EN) third law, Nernst theorem · т. 1, с. 414–415

Блок G–H. Реальний газ · Ван-дер-Ваальс · Кристали · Дефекти · Рідини

- **реальний газ** — газ, для якого суттєву роль відіграють міжмолекулярні сили взаємодії · (EN) real gas · т. 1, с. 419
- **сили Ван дер Ваальса** — орієнтаційні (Кеєзом), індукційні (Дебай), дисперсійні (Лондон) · (EN) van der Waals forces · т. 1, с. 421–422
- **рівняння Ван-дер-Ваальса** · $(p + a/V_M^2)(V_M - b) = RT$ (17.4); a/V² — **внутрішній тиск**, b — поправка на власний об'єм · (EN) van der Waals equation · т. 1, с. 423
- **критичний стан**; **критичні параметри** · $p_к = a/27b^2$, $V_к = 3b$, $T_к = 8a/27Rb$

(17.12) · (EN) critical state · т. 1, с. 426

- **метастабільні стани** — пересичена пара, перегріта рідина · (EN) metastable states · т. 1, с. 429
- **бінодаль / спінодаль** — межа двофазної області / межа нестійких станів · (EN) binodal / spinodal · т. 1, с. 429–430
- **тверде тіло** — агрегатний стан зі стабільністю форми та об’єму і впорядкованим розміщенням атомів · (EN) solid · т. 1, с. 444
- **дальній / ближній порядок** — строга повторюваність структури на великих відстанях (кристали) / узгодження лише сусідніх частинок (аморфні тіла, рідини) · (EN) long-range / short-range order · т. 1, с. 444, 463
- **анізотропія** — залежність фізичних властивостей від напряму · (EN) anisotropy · т. 1, с. 445
- **елементарна комірка; гратки Браве; сингонія** — 14 граток Браве, 7 сингоній · $\vec{r}_n = m\vec{a}_1 + n\vec{a}_2 + p\vec{a}_3$ (18.1) · (EN) unit cell, Bravais lattices, crystal system · т. 1, с. 446–447
- **точкові дефекти** — за Шотткі (вакансія), за Френкелем (вакансія + міжвузловий атом), домішки · $n_{\text{в}} = n_0 e^{-W_{\text{в}}/kT}$ (18.4) · (EN) point defects · т. 1, с. 453–455
- **дислокація** (крайова, гвинтова); **вектор Бюргерса** · (EN) dislocation, Burgers vector · т. 1, с. 455–456
- **рідина** — «розупорядковане тверде тіло» з ближнім порядком; тепловий рух за Френкелем: коливання + стрибки · $\tau = Ae^{\Delta W/kT}$ (19.1) · (EN) liquid · т. 1, с. 462–464
- **формула Френкеля (в’язкість рідин)** · $\eta = Ae^{\Delta W/kT}$ (19.7), спадає з T · (EN) Frenkel viscosity formula · т. 1, с. 467