

Exercices, ECN 6338, Hiver 2022

William McCausland

2022-02-18

Cours 1. Introduction

Exercices théorique

1. Montrez que $6n^2 + 3n + 10 = O(n^2)$.

Exercices de computation

1. Lisez l'aide sur la fonction `expm1` et démontrez son avantage par rapport à la fonction `exp` pour évaluer $e^x - 1$ quand $|x|$ est près de zéro. Vous pouvez suivre l'exemple sur `log1p` dans les diapos.
2. Téléchargez le paquet R `microbenchmark`, lisez l'aide sur la fonction `microbenchmark` et mesurez le temps nécessaire pour faire les opérations $\mathbf{x} * \mathbf{y}$, \mathbf{x} / \mathbf{y} , `exp(y)` et `log(x)`, pour un vecteur $x > 0$ de mille éléments et un vecteur y de mille éléments.

Cours 2. La résolution de systèmes d'équations linéaires

Exercices préliminaires

1. Soit L_1 et L_2 des matrices triangulaires inférieures $n \times n$. Soit U_1 et U_2 des matrices triangulaires supérieures $n \times n$. Supposez que L_1 et U_1 sont inversibles.
 - a. Parmi les matrices suivantes, lesquelles sont toujours triangulaires inférieures : $L_1 L_2$, $L_1 + L_2$, L_1^{-1} , L_1^\top , U_1^\top , $L_1 U_1$?
 - b. Parmi les matrices suivantes, lesquelles sont toujours triangulaires supérieures : $U_1 U_2$, $U_1 + U_2$, U_1^{-1} , U_1^\top , L_1^\top , $L_1 U_1$?
2. (Substitution avant et substitution arrière) Soit L et U des matrices inversibles $n \times n$, où L est triangulaire inférieure et U est triangulaire supérieure. Soit y un vecteur $n \times 1$. Notez que Judd utilise le terme “back substitution” pour décrire deux algorithmes distincts (a. et b.). Plusieurs auteurs font une distinction entre “back substitution” (b.) et “forward substitution” (a.).
 - a. Trouver un algorithme pour résoudre l'équation $Lx = y$. Notez que $L_{11}x_1 = y_1$, alors $x_1 = y_1/L_{11}$.
 - b. Trouvez un algorithme pour résoudre l'équation $Ux = y$. Commencez par x_n .
3. Soit x un n -vecteur aléatoire avec moyenne μ ($n \times 1$) et variance Σ ($n \times n$). Soit A une matrice constante $m \times n$. Quelles sont la moyenne et la variance de Ax ?

Exercices théoriques

1. Quelquefois, il est plus facile de spécifier la matrice de précision $H = \Sigma^{-1}$ que la matrice de variance Σ , pour une loi gaussienne multivariée $N(\mu, \Sigma)$. Si vous avez la matrice H et non la matrice Σ , décrivez comment on peut tirer des variables aléatoires $N(\mu, \Sigma)$ et évaluer la densité gaussienne multivariée. Commencez par la décomposition cholesky de H .
2. La matrice de précision H pour un processus AR(1) gaussien est tridiagonale ($H_{ij} = 0$ pour $|i - j| > 1$) et symétrique. Si $\omega = \sigma^{-2}$ est la précision de l'innovation et ϕ est le coefficient d'autorégression, le diagonal de H est $\omega(1, 1+\phi^2, \dots, 1+\phi^2, 1)$ et le sous-diagonal est $-\omega(\phi, \dots, \phi)$. Trouvez la décomposition cholesky de H , en utilisant une description de l'algorithme (page 59 de Judd, par exemple).
3. Dans l'exemple MCO, calculez le vecteur $e = y - Xb$ des résiduelles et $\hat{\sigma}^2(X^\top X)^{-1}$, une estimation de la variance de b . Utilisez seulement y et la décomposition QR de X , pas X elle-même. Notez que $\hat{\sigma}^2 = e^\top e / (n - k)$.
4. Donnez la matrice creuse des diapos en format colonne compressée après les deux opérations suivantes. Décrivez brièvement les algorithmes pour l'insertion et la suppression en général.
 - a. Une insertion `A[2,4] <- 24`,
 - b. Une suppression `A[3,2] <- 0`.

Exercices de computation

1. Regardez la démonstration `GPA.R` (au site Github du cours) de l'analyse d'une régression linéaire, exemple 3.1 dans Wooldridge (2016) *Introductory Econometrics*. Calculez b , e et $\hat{\sigma}^2(X^\top X)^{-1}$ en utilisant la décomposition QR. La fonction `qr` effectue la décomposition QR, les fonctions `qr.Q` et `qr.R` extraient les matrices Q_1 et R_1 du résultat. Les fonctions `backsolve` et `t` (transpose) pourraient être utiles.

Cours 3. Quelques sujets préalables

Exercices préliminaires

1. Trouvez le panier de consommation (x_1^*, x_2^*) qui maximise $U(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ sous les contraintes $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$, $x_1 \geq 0$ et $x_2 \geq 0$, où $m > 0$, $p_1 > 0$ et $p_2 > 0$. Utilisez la méthode de Lagrange.
2. Si $X_i | \lambda \sim \text{iid Exp}(\lambda)$ (loi exponentielle) et $\lambda \sim \text{Ga}(\alpha, \beta)$ (loi gamma) écrivez
 - a. la fonction de densité conditionnelle de (X_1, \dots, X_n) sachant λ .
 - b. la densité conjointe de (X_1, \dots, X_n) et λ .

Exercices théoriques

1. Considérez l'exercice préliminaire 1, avec la contrainte remplacée par $(p_1 x_1 + p_2 x_2 - m)^3 = 0$. La solution du problème doit être pareille. Décrivez le problème qui se présente quand vous essayez d'utiliser la méthode de Lagrange. Expliquez brièvement pourquoi ce problème ne représente pas une contradiction du théorème de Lagrange.
2. Pour le modèle de l'exercice préliminaire 2,
 - a. trouvez l'estimateur maximum de vraisemblance $\hat{\lambda}$ de λ ; trouvez la moyenne et la variance de $\hat{\lambda}^{-1}$. (La moyenne et la variance de $\hat{\lambda}$ n'ont pas d'expression simple.)
 - b. trouvez la distribution postérieure $\lambda | x^\circ$, où x° est une réalisation de (X_1, \dots, X_n) .

Exercices de computation

Aucune, étant donnée la nature du cours 3.

Cours 4. L'optimisation statique

Exercice préliminaire

1. Lisez la section “Newton’s Method” pp 96-97 dans Judd.
2. Prenez la fonction de log vraisemblance (graphique, diapo 19, cours 3) $L(\theta; y) = n_1 \log \theta + n_0 \log(1 - \theta)$, pour $n_0 = 200$ et $n_1 = 230$.
 - a. Calculez l’expansion Taylor d’ordre deux (quadratique) de $L(\theta; y)$ autour de $\theta = 1/2$.
 - b. Trouvez la valeur de θ qui maximise cette fonction quadratique.
 - c. Considérez le même problème que a., mais pour la vraisemblance $\mathcal{L}(\theta; y) = \theta^{n_1}(1 - \theta)^{n_0}$. Faites assez de ce problème pour vous convaincre que c’est plus difficile.

Exercices théoriques

1. On veut modéliser le choix binaire $y_i \in \{0, 1\}$ d’un individu i comme fonction du vecteur $x_i \in \mathbb{R}^k$ des variables explicatives, pour un échantillon aléatoire $\{(y_i, x_i)\}$, $i = 1, \dots, n$. Le modèle probit donne la probabilité conditionnelle $\Pr[y_i|x_i]$ comme $\Pr[y_i|x_i] = \Phi(x_i^\top \beta)$ où $\beta \in \mathbb{R}^k$ et Φ est la fonction de répartition d’une variable aléatoire gaussienne standard (**pnorm** en R; sa dérivée de première ordre est la densité, **dnorm** en R).
 - a. Écrivez la fonction de log vraisemblance $L(\beta; y, X)$, où $y = (y_1, \dots, y_n)$ est X et la matrice $n \times k$ de variables explicatives.
 - b. Donnez le gradient et la matrice hessienne de $L(\beta; y, X)$. Montrez que la matrice hessienne est négative définie.

Exercices de computation

L’exercice est de reproduire les résultats du modèle probit de l’exemple 17.1 de Wooldridge, qui concerne le choix des femmes mariées d’être dans la population active ou non. Vous pouvez charger les données avec

```
library(wooldridge)
data(mroz, package='wooldridge')
```

et ensuite voir les statistiques sommaires avec `summary(mroz)`.

1. Écrivez des fonctions en R pour calculer la valeur, le gradient et la matrice hessienne de la fonction de log vraisemblance $L(\beta; y, X)$ du modèle probit.
2. Trouvez l’estimation maximum de vraisemblance $\hat{\beta}$ pour le modèle probit de l’exemple 17.1 de Wooldridge, avec les méthodes Nelder-Mead et BFGS. Les variables sont une constante, **nwifeinc**, **educ**, **exper**, **exper** carré, **age**, **kidslt6**, **kidsge6**.
3. Calculer moins la matrice hessienne de la log vraisemblance au point $\hat{\beta}$. Calculer l’inverse de cette matrice et donnez les écarts-types asymptotiques des éléments de $\hat{\beta}$ (les racines carrées des éléments diagonaux).

Cours 5. La résolution de systèmes d'équations non-linéaires

Exercices préliminaires

1. Considérez le problème de trouver une racine de la fonction $f(x) = e^x - x - 2$ dans l'intervalle $[0, 2]$. Faites avec une calculatrice :
 - a. trois cycles de l'algorithme 5.1 (bisection).
 - b. trois cycles de l'algorithme 5.2 (Newton).

Exercices théoriques

1. Si on utilise la méthode de dichotomie pour trouver une racine de la fonction $f(x)$ dans l'intervalle $[0, 1]$, combien de fois est-ce qu'il faut évaluer f pour obtenir un intervalle de longueur $\sqrt{\epsilon}$ (ou moins) qui contient une racine, où ϵ est l'epsilon de la machine utilisée, égale à 2.22×10^{-16} .
2. Considérez une économie avec deux agents et deux biens. Agent a a une dotation de $(\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$ des deux biens et une fonction d'utilité $u^a(x_1^a, x_2^a)$, où (x_1^a, x_2^a) représente sa consommation des deux biens. Agent b a une dotation de $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$ et une fonction d'utilité $u^b(x_1^b, x_2^b)$. L'agent b peut offrir un échange à l'agent a , à prendre ou à laisser. Supposons que a accepte n'importe quelle échange où a consomme un panier avec utilité égale ou supérieure à sa dotation (nonobstant les résultats empiriques sur les jeux de l'ultimatum). Supposons que les deux fonctions d'utilité sont strictement croissantes et concaves, ainsi que continument dérivables. Donnez un système $f(x) = 0$ de deux équations en deux variables dont on peut utiliser la solution pour trouver le choix optimal de b .

Exercices numériques

1. Pour le jeu de duopole (pages 162-163 de Judd et plusieurs diapos),
 - a. écrivez des fonctions en R pour évaluer les fonctions $u(e^y, e^z)$, $u_Y(e^y, e^z)$, $u_Z(e^y, e^z)$, $\Pi_1^Y(e^y, e^z)$ et $\Pi_2^Z(e^y, e^z)$ et testez ces fonctions en utilisant les dérivées numériques.
 - b. trouvez l'équilibre en utilisant la fonction **broyden** du paquet **pracma**.
 - c. évaluez les gains et les pertes (pour les deux firmes et le consommateur) si firme 2 trouve une technologie qui réduit le coût de production unitaire de Z de 0.08 à 0.06.

Cours 6. L'approximation de fonctions

Exercices préliminaires

1. Montrez que les trois premiers polynômes de Legendre, 1, x et $(3x^2 - 1)/2$ sont orthogonaux selon le produit intérieur défini à la page 203 de Judd. Regardez le tableau 6.3 pour la spécification de a , b et $w(x)$ pour les polynômes de Legendre.

Exercices théoriques

1. Trouvez l'approximation Padé (2,1) de $f(x) = \log x$ au point $x_0 = 1$.
2. Trouvez les valeurs des paramètres α et β de la fonction de pondération $w(x)$ associée aux polynômes Jacobi, pour les cas spéciaux
 - a. Legendre
 - b. Tchebyshev
3. Soit $f(x) = x^3$. Trouvez le polynôme p_2 d'ordre 2 qui minimise $\langle f - p_2, f - p_2 \rangle$, pour le produit intérieur défini par

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\infty e^{-x} f(x) g(x) dx.$$

Notez que

$$\int_0^\infty x^k e^{-x} = k!.$$

4. Montrez que $b'_{i,n}(x) = n(b_{i-1,n-1}(x) - b_{i,n-1}(x))$, où $b_{i,n}(x)$ est le i -ième polynôme Bernstein d'ordre n et $b'_{i,n}(x)$ est sa dérivé.

Exercices numériques

1. Considérez l'approximation de la fonction $f(x) = \sin(\pi x/2)$ sur l'intervalle $[0, 4]$, un cycle complet. Faites les graphiques de la fonction et des approximations suivantes :
 - a. Approximation Taylor d'ordre $n = 3$ autour de $x_0 = 2$,
 - b. Approximation Bernstein d'ordre $n = 10$,
 - c. Approximation spline cubique d'hermite qui utilise la fonction f et sa première dérivé f' , évalués aux points $x = 0, 1, 2, 3, 4$.