

ECN 7060, cours 11

William McCausland

2019-11-12

Hypothèses sur un paramètre $\theta \in \Theta$

- ▶ Deux hypothèses sur θ :
 - ▶ hypothèse nulle $H_0, \theta \in \Theta_0$
 - ▶ hypothèse alternative $H_1, \theta \in \Theta_0^c$
- ▶ Notes :
 - ▶ une question scientifique d'intérêt
 - ▶ rien ici de classique ou de bayésien
 - ▶ la spécification de Θ_0 précède la recherche d'un test, l'évaluation d'un test
 - ▶ asymétrie implicite, pas explicite ici
 - ▶ l'asymétrie comme une question d'erreur : favoriser le control d'un type d'erreur

Tests

- ▶ Deux décisions (en termes de la notation pour les actions)
 - ▶ a_0 , ne pas rejeter H_0
 - ▶ a_1 , rejeter H_0
- ▶ Deux régions de l'espace échantillonal :
 - ▶ région critique (ou de rejet) $R \subseteq \mathcal{X}$
 - ▶ région de non-rejet R^c
- ▶ Notes :
 - ▶ Une règle de décision est un $\delta: \mathcal{X} \rightarrow \{a_0, a_1\}$
 - ▶ $R = \{x: \delta(x) = a_1\}$, $R^c = \{x: \delta(x) = a_0\}$.
 - ▶ réduction de dimension ici aussi : il y a souvent une statistique $W(X)$ scalaire tel que R ou R^c prend la forme $\{x: W(x) \in [a, b]\}$
 - ▶ attention : quand $W(X)$ est un estimateur de θ , il est facile de confondre une hypothèse avec une région (R ou R^c).

Optimalité par fonction de perte

- Une fonction de perte assez générale :

$$L(\theta, a_0) = \begin{cases} 0 & \theta \in \Theta_0 \\ c_{II} & \theta \in \Theta_0^c \end{cases}$$

$$L(\theta, a_1) = \begin{cases} c_I & \theta \in \Theta_0 \\ 0 & \theta \in \Theta_0^c \end{cases}$$

- Notes :
 - c_I est le coût d'une erreur du type I, c_{II} le coût d'une erreur du type II
 - Avec cette généralité, on peut briser l'asymétrie des deux hypothèses.

Les fonctions de risque et de puissance

- Le risque $R(\theta, \delta) = E_{\theta}[L(\theta, \delta(X))]$ est

$$R(\theta, \delta) = \begin{cases} 0 \cdot P_{\theta}(\delta(X) = a_0) + c_I \cdot P_{\theta}(\delta(X) = a_1), & \theta \in \Theta_0, \\ c_{II} \cdot P_{\theta}(\delta(X) = a_0) + 0 \cdot P_{\theta}(\delta(X) = a_1), & \theta \in \Theta_0^c. \end{cases}$$

- Cela motive la définition de la fonction de puissance :

$$\beta(\theta) \equiv P_{\theta}(X \in R) = P_{\theta}(\delta(X) = a_1)$$

- On peut écrire tout court

$$R(\theta, \delta) = \begin{cases} c_I \beta(\theta), & \theta \in \Theta_0, \\ c_{II}(1 - \beta(\theta)), & \theta \in \Theta_0^c \end{cases}$$

- Rappel : c'est une exercice *ex ante*

Risque de Bayes

- ▶ Rappel : $r(\pi, \delta) = \int R(\theta, \delta) \pi(\theta) d\theta = E[E[L(\theta, \delta(X))|\theta]] = E[L(\theta, \delta(X))] = E[E[L(\theta, \delta(X))|X]]$.
- ▶ Pour un échantillon x observé, la perte espérée *a posteriori* est

$$\begin{aligned} & E[L(\theta, \delta(X))|x] \\ &= \begin{cases} 0 \cdot P[\theta \in \Theta_0|x] + c_{II} \cdot P[\theta \in \Theta_0^c|x], & \delta(x) = a_0 \\ c_I \cdot P[\theta \in \Theta_0|x] + 0 \cdot P[\theta \in \Theta_0^c|x], & \delta(x) = a_1 \end{cases} \end{aligned}$$

- ▶ La solution $\delta(x)$ qui minimise la perte *a posteriori* est

$$\delta(x) = \begin{cases} a_0, & \frac{c_{II}}{c_I} \frac{P[\theta \in \Theta_0^c|x]}{P[\theta \in \Theta_0|x]} \leq 1, \\ a_1, & \text{autrement.} \end{cases}$$

- ▶ Notes :
 - ▶ C'est une exercice *ex post*
 - ▶ Pas de distinction importante entre H_0 et H_1 (échangeable)

Exemple récurrent Bernoulli

► Rappel :

1. $X_1, \dots, X_n \sim \text{iid Bn}(\theta)$, $\theta \in [0, 1]$.
2. $L(\theta, x) = \theta^r (1 - \theta)^{(n-r)}$, où r est le nombre de uns.
3. $\hat{\theta}_{\text{EMV}} = \hat{\theta} = r/n$.

► Considérons les hypothèses $H_0 : \theta \geq 1/2$ et $H_1 : \theta < 1/2$

1. $\Theta_0 = [1/2, 1]$, $\Theta = [0, 1]$, $\Theta_0^c = [0, 1/2)$

► Calculer le rapport des vraisemblances

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta|x) = \begin{cases} L(\hat{\theta}|x) & \hat{\theta} \geq 1/2 \\ L(1/2|x) = \left(\frac{1}{2}\right)^n & \hat{\theta} < 1/2 \end{cases}$$

$$\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta|x) = L(\hat{\theta}|x)$$

$$\lambda(x) = \begin{cases} 1, & r \geq n/2, \\ \frac{(n/2)^n}{r^r (n-r)^{n-r}}, & r < n/2. \end{cases}$$

Les valeurs de $\lambda(x)$ pour $n = 12$

r	$\lambda(x)$	$P_{\theta}(R \leq r)$
0	0.0002441406	$(1 - \theta)^n$
1	0.007629489	$(1 - \theta)^n + n\theta(1 - \theta)^{n-1}$
2	0.054419558	
3	0.208098359	
4	0.506821632	
5	0.845821466	
6	1	
...		
12	1	1

La forme d'un LRT

- ▶ La forme en général :

$$\left\{ x \in \mathcal{X} : \lambda(x) \equiv \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta|x)}{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta|x)} \leq c \right\}$$

- ▶ Notes :

- ▶ attraction intuitive
 - ▶ réduction de dimension
- ▶ $c \in [0, 1]$ à spécifier
- ▶ Ici, la forme d'un LRT est

$$\{x \in \mathcal{X} : \sum_i x_i \leq r\}, \quad r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 12$$


Quelques fonctions de puissance $\beta_r(\theta)$

- Soit $\beta_r(\theta)$ la fonction de puissance pour la région critique $\{x: \sum_i x_i \leq r\}$

```
theta = seq(0, 1, by=0.01); n=12  
beta_0 = pbinom(0, n, theta) # R = {r <= 0}  
beta_2 = pbinom(2, n, theta) # R = {r <= 2}  
beta_3 = pbinom(3, n, theta)  
beta_4 = pbinom(4, n, theta)
```

Graphique des fonctions de puissance

```
plot(theta, beta_0, type='l'); lines(theta, beta_2)  
lines(theta, beta_3); lines(theta, beta_4)
```



Exemple, même modèle, hypothèse ponctuelle

- ▶ Considérons les hypothèses $H_0 : \theta = 1/2$ et $H_1 : \theta \neq 1/2$
- ▶ Ici, la LRT $\lambda(x)$ est

$$\lambda(x) = \frac{(n/2)^n}{r^r (n-r)^{n-r}}.$$

Les valeurs de $\lambda(x)$ pour $n = 12$

r	$\lambda(x)$
0	0.0002441406
1	0.0076294893
2	0.0544195584
3	0.2080983590
4	0.5068216324
5	0.8458214659
6	1.0000000000
7	0.8458214659
8	0.5068216324
9	0.2080983590
10	0.0544195584
11	0.0076294893
12	0.0002441406


Quelques fonctions de puissance $\beta_r(\theta)$

- Soit $\beta_c(\theta)$ la fonction de puissance pour la région critique $\{x: |\sum_i x_i - n/2| \geq c\}$

```
theta = seq(0, 1, by=0.01); n=12
# R = {0,12}
beta_6 = pbinom(0, n, theta) + pbinom(0, n, 1-theta)
# R = {0,1,11,12}
beta_5 = pbinom(1, n, theta) + pbinom(1, n, 1-theta)
beta_4 = pbinom(2, n, theta) + pbinom(2, n, 1-theta)
beta_3 = pbinom(3, n, theta) + pbinom(3, n, 1-theta)
```

Graphique des fonctions de puissance

```
plot(theta, beta_6, type='l'); lines(theta, beta_5)  
lines(theta, beta_4); lines(theta, beta_3)
```



La probabilité *a posteriori* $P(\theta \geq 1/2|x)$, plusieurs r

- Soit $n = 12$, $\alpha = 1$, $\beta = 1$, $\Omega_0 = [1/2, 1]$
- La probabilité *a posterior* dépend du r observé:

r	$P[\theta \in \Omega_0 x]$
0	0.0001220703
1	0.0017089844
2	0.0112304688
3	0.0461425781
4	0.1334228516
5	0.2905273437
6	0.5000000000
7	0.7094726563
8	0.8665771484
9	0.9538574219
10	0.9887695312
11	0.9982910156
12	0.9998779297

DID THE SUN JUST EXPLODE? (IT'S NIGHT, SO WE'RE NOT SURE.)

THIS NEUTRINO DETECTOR MEASURES
WHETHER THE SUN HAS GONE NOVA.

THEN, IT ROLLS TWO DICE. IF THEY
BOTH COME UP SIX, IT LIES TO US.
OTHERWISE, IT TELLS THE TRUTH.

LET'S TRY.

DETECTOR! HAS THE
SUN GONE NOVA?

(ROLL)
YES.



FREQUENTIST STATISTICIAN:

THE PROBABILITY OF THIS RESULT
HAPPENING BY CHANCE IS $\frac{1}{36} = 0.027$.
SINCE $p < 0.05$, I CONCLUDE
THAT THE SUN HAS EXPLODED.



BAYESIAN STATISTICIAN:

BET YOU \$50
IT HASN'T.



Devoirs et lectures

Devoirs, Casella et Berger (matière du cours 11)

1. Exercise 8.12
2. Exercise 8.13
3. Exercise 8.53

Préparation du cours 12, Casella et Berger

1. Chapitre 9 (pas tous les détails des exemples)
2. Questions suggérées : 9.1, 9.2, 9.6, 9.26