

ECN 6578A, Économétrie des marchés financiers, Hiver 2020

Cours 4

William McCausland

2020-01-19

Plan

1. Prédiction linéaire avec un modèle ARMA(p,q)
2. Modèles pour les deux premiers moments conditionnels (GARCH)
3. Simulation des modèles GARCH
4. Vraisemblance des modèles GARCH

Prévision avec un modèle ARMA(p,q)

- ▶ Le problème : prévoir r_{t+h} à t , mesurer l'incertitude.
- ▶ Types de prévision
 - ▶ ponctuelle,
 - ▶ par intervalle,
 - ▶ par densité
- ▶ Si l'objectif est de choisir $\hat{r}_t(h)$ pour minimiser $E[(r_{t+h} - \hat{r}_t(h))^2 | F_t]$, la meilleure prévision ponctuelle est $\hat{r}_t(h) = E[r_{t+h} | F_t]$ et la valeur minimal est $\text{Var}[r_{t+h} | F_t]$.
- ▶ Dans un modèle ARMA(p,q), $E[r_{t+h} | F_t]$ est linéaire en $r_t, r_{t-1}, \dots, r_{t-p}$ et $a_t, a_{t-1}, \dots, a_{t-q}$.
- ▶ Avec les coefficients ϕ_i et θ_i , on peut évaluer $E[r_{t+h} | F_t]$.
- ▶ Ajouter σ_a^2 et on peut évaluer $\text{Var}[r_{t+h} | F_t]$ aussi.
- ▶ Pour simplifier un peu, F_t comprend r_t, r_{t-1}, \dots et a_t, a_{t-1}, \dots .

Prévision avec un modèle ARMA(2,2) à un horizon $h = 1$

- ▶ Équation ARMA(2,2) pour r_{t+1} :

$$r_{t+1} = \phi_1 r_t + \phi_2 r_{t-1} + a_{t+1} - \theta_1 a_t - \theta_2 a_{t-1}.$$

- ▶ Prenez l'espérance conditionnelle $E[\cdot|F_t]$ des deux côtés pour obtenir une prévision :

$$E[r_{t+1}|F_t] = \phi_1 r_t + \phi_2 r_{t-1} - \theta_1 a_t - \theta_2 a_{t-1}$$

- ▶ Calculez l'erreur de la prévision :

$$r_{t+1} - E[r_{t+1}|F_t] = a_{t+1}.$$

- ▶ Calculez la variance de l'erreur de la prévision :

$$\text{Var}[r_{t+1}|F_t] = \text{Var}[a_{t+1}|F_t] = \sigma_a^2.$$

Prévision à un horizon $h = 2$: 1er perspectif de trois

- Équation pour r_{t+2} :

$$r_{t+2} = \phi_1 r_{t+1} + \phi_2 r_t + a_{t+2} - \theta_1 a_{t+1} - \theta_2 a_t.$$

- Prenez l'espérance conditionnelle $E[\cdot|F_t]$ des deux côtés pour obtenir une prévision :

$$E[r_{t+2}|F_t] = \phi_1 E[r_{t+1}|F_t] + \phi_2 r_t - \theta_2 a_t,$$

où $E[r_{t+1}|F_t] = \phi_1 r_t + \phi_2 r_{t-1} - \theta_1 a_t - \theta_2 a_{t-1}$.

- Calculez l'erreur de la prévision :

$$\begin{aligned} r_{t+2} - E[r_{t+2}|F_t] &= \phi_1 (r_{t+1} - E[r_{t+1}|F_t]) + a_{t+2} - \theta_1 a_{t+1} \\ &= (\phi_1 - \theta_1) a_{t+1} + a_{t+2}. \end{aligned}$$

- Calculez la variance de l'erreur de la prévision :

$$\text{Var}[r_{t+2}|F_t] = [(\phi_1 - \theta_1)^2 + 1] \sigma_a^2.$$

Prévision à un horizon $h = 2$: 2e perspectif de trois

- ▶ Par la loi de variance totale :

$$\text{Var}[r_{t+2}|F_t] = E[\text{Var}[r_{t+2}|F_{t+1}]|F_t] + \text{Var}[E[r_{t+2}|F_{t+1}]|F_t]$$

- ▶ Puisque $\text{Var}[r_{t+2}|F_{t+1}] = \sigma_a^2$,

$$E[\text{Var}[r_{t+2}|F_{t+1}]|F_t] = \sigma_a^2.$$

- ▶ Puisque $E[r_{t+2}|F_{t+1}] = \phi_1 r_{t+1} + \phi_2 r_t - \theta_1 a_{t+1} - \theta_2 a_t$,

$$\text{Var}[E[r_{t+2}|F_{t+1}]|F_t] = \text{Var}[(\phi_1 - \theta_1)a_{t+1}] = (\phi_1 - \theta_1)^2 \sigma_a^2$$

- ▶ Alors,

$$\text{Var}[r_{t+2}|F_t] = [1 + (\phi_1 - \theta_1)^2] \sigma_a^2.$$

Prévision à un horizon $h = 2$: 3e perspectif de trois

- La représentation MA infinie donne

$$r_{t+2} = a_{t+2} + \psi_1 a_{t+1} + \psi_2 a_t + \dots$$

- La variance conditionnelle est donc

$$\begin{aligned}\text{Var}[r_{t+2}|F_t] &= \text{Var}[a_{t+2} + \psi_1 a_{t+1}|F_t] \\ &= (1 + \psi_1^2)\sigma_a^2 \\ &= [1 + (\phi_1 - \theta_1)^2]\sigma_a^2.\end{aligned}$$

Le modèle ARMA(p,q) comme modèle pour la moyenne conditionnelle

- L'équation ARMA(p,q) :

$$r_t = \phi_1 r_{t-1} + \dots + \phi_p r_{t-p} + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}.$$

- La moyenne conditionnelle :

$$\mu_t \equiv E[r_t | F_{t-1}] = \phi_1 r_{t-1} + \dots + \phi_p r_{t-p} - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}.$$

- Notez que l'innovation est une erreur de prévision :

$$a_t = r_t - E[r_t | F_{t-1}].$$

- Si on connaît r_{t-1}, \dots, r_{t-p} et a_{t-1}, \dots, a_{t-q} , on apprend a_t en même temps qu'on observe r_t .

Introduction aux modèles ARCH, GARCH

- ▶ Modèles pour les deux premiers moments conditionnels de r_t .
- ▶ F_{t-1} représente toute l'information connue à $t - 1$.
- ▶ Au minimum, F_{t-1} comprend r_{t-1}, r_{t-2}, \dots
- ▶ Définitions de la moyenne, de la variance conditionnelle de r_t :

$$\mu_t \equiv E[r_t|F_{t-1}], \quad \sigma_t^2 \equiv \text{Var}[r_t|F_{t-1}].$$

- ▶ 'Hétéroscédasticité conditionnelle' veut dire que σ_t^2 varie avec t .
- ▶ Convention alternative où l'indice indique le moment où la quantité est connue. : $\mu_{t-1} \equiv E[r_t|F_{t-1}]$.
- ▶ D'autres définitions : $a_t \equiv r_t - \mu_t$, $\epsilon_t \equiv a_t/\sigma_t$, alors

$$r_t = \mu_t + \sigma_t \epsilon_t.$$

- ▶ Notez que $\epsilon_t|F_{t-1} \sim (0, 1)$.

Exemple ARMA(p,q)-GARCH(m,s)

- Un modèle pour μ_t : (cas spécial de 3.3)

$$\mu_t = \phi_0 + \sum_{i=1}^p \phi_i r_{t-i} - \sum_{i=1}^q \theta_i a_{t-i}.$$

- Un modèle pour σ_t^2 : (3.14)

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^m \alpha_i a_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^s \beta_j \sigma_{t-j}^2.$$

- $r_t | F_{t-1} \sim (\mu_t, \sigma_t^2)$

Modèle ARCH

- ▶ Le modèle ARCH(m) d'Engle

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2 + \dots + \alpha_m a_{t-m}^2$$

$$a_t = \sigma_t \epsilon_t, \quad \epsilon_t | F_{t-1} \sim (0, 1)$$

- ▶ On suppose que a_t est covariance stationnaire, ce qui entraîne des restrictions.
- ▶ Une spécification de σ_t^2 et non μ_t .
- ▶ σ_t connu à $t - 1$, ϵ_t à t .

Moyenne et variance inconditionnelle du modèle ARCH(1)

- ARCH(1)

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2, \quad E[a_t | F_{t-1}] = 0, \quad \text{Var}[a_t | F_{t-1}] = \sigma_t^2.$$

- Moyenne inconditionnelle

$$E[a_t] = E[E[a_t | F_{t-1}]] = E[0] = 0.$$

- Variance inconditionnelle

$$\text{Var}[a_t] = E[a_t^2] = E[E[a_t^2 | F_{t-1}]] = E[\alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2],$$

$$(1 - \alpha_1)\text{Var}[a_t] = \alpha_0, \quad \text{Var}[a_t] = \alpha_0 / (1 - \alpha_1).$$

- Il faut que $\alpha_1 < 1$ par covariance stationnarité.
- Il faut que $\alpha_0 > 0$ et $\alpha_1 \geq 0$ par positivité de la variance.

Asymétrie et effet de levier

- ▶ L'asymétrie conditionnelle, $E[a_t^3|F_{t-1}]$, est souvent zéro, constant ou non spécifiée.
- ▶ L'effet de levier est $\text{Cov}[(\sigma_{t+1}^2 - \sigma_t^2), a_t] < 0$.
- ▶ Pas assez d'information pour calculer l'effet de levier:

$$E[(\sigma_{t+1}^2 - \sigma_t^2)a_t] = E[(\alpha_0 + \alpha_1 a_t^2 - \sigma_t^2)a_t] = \alpha_1 E[a_t^3].$$

- ▶ Si l'asymétrie conditionnelle est nulle, l'asymétrie inconditionnelle et $\text{Cov}[(\sigma_{t+1}^2 - \sigma_t^2), a_t]$ sont nulles aussi.

$$E[a_t^3] = E[E[a_t^3|F_{t-1}]] = E[0] = 0.$$

- ▶ Conclusion: pour un ARCH(1), une asymétrie inconditionnelle ou un effet de levier passe par une asymétrie conditionnelle.
- ▶ Même chose pour un ARCH(m).

Aplatissement

- ▶ En général, on ne connaît pas le 4^{ième} moment conditionnel.
- ▶ Pour un modèle ARCH(1) gaussien,

$$E[a_t^4 | F_{t-1}] = 3E[\sigma_t^4 | F_{t-1}] = 3(\alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2)^2.$$

$$E[a_t^4] = 3E[\alpha_0^2 + 2\alpha_0\alpha_1 a_{t-1}^2 + \alpha_1^2 a_{t-1}^4]$$

- ▶ Si $E[a_t^4] = E[a_{t-1}^4]$, alors

$$E[a_t^4] = \frac{3\alpha_0^2(1 + \alpha_1)}{(1 - \alpha_1)(1 - 3\alpha_1^2)}.$$

- ▶ Il faut que $\alpha_1^2 < 1/3$ pour l'existence de l'aplatissement. Un peu inflexible.
- ▶ L'aplatissement est $3(1 - \alpha_1^2)/(1 - 3\alpha_1^2) > 3$.

Les autocorrélations

- ▶ Autocorrélation de première ordre de r_t ou a_t :

$$E[a_t a_{t-1}] = E[E[a_t a_{t-1} | F_{t-1}]] = E[a_{t-1} E[a_t | F_{t-1}]] = E[a_{t-1} 0] = 0.$$

- ▶ Autocorrélation de a_t^2 :

$$\begin{aligned} E[a_t^2 a_{t-1}^2] &= E[E[a_t^2 a_{t-1}^2 | F_{t-1}]] = E[a_{t-1}^2 E[a_t^2 | F_{t-1}]] \\ &= E[a_{t-1}^2 (\alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2)] = \frac{\alpha_0^2}{1 - \alpha_1} + \alpha_1 E[a_{t-1}^4] \end{aligned}$$

$$\text{Cov}[a_t^2, a_{t-1}^2] = E[a_t^2 a_{t-1}^2] - E[a_t^2] E[a_{t-1}^2] = \alpha_1 E[a_{t-1}^4] - \frac{\alpha_0^2 \alpha_1}{(1 - \alpha_1)^2}$$

$$\text{Var}[a_t^2] = E[a_t^4] - E[a_t^2]^2 = E[a_t^4] - \frac{\alpha_0^2}{(1 - \alpha_1)^2}$$

- ▶ Avec stationnarité en 4e moment, $\text{corr}[a_t^2, a_{t-1}^2] = \alpha_1$.

Résumé des conclusions théoriques

Le modèle ARCH

- ▶ capture la variabilité et la persistance de la volatilité
- ▶ capture l'aplatissement inconditionnel plus grand que 3
- ▶ un peu d'inflexibilité pour l'autocorrélation de a_t^2
- ▶ pas de longue mémoire pour la volatilité
- ▶ ne capture pas l'asymétrie inconditionnelle, indépendant de l'asymétrie conditionnelle
- ▶ ne capture pas l'effet de levier, indépendant de l'asymétrie conditionnelle


Simulation du modèle ARCH(3)

```
# Paramètres (de l'exemple Intel, Exemple 3.1)
mu = 0.0122
al0 = 0.0106; al = c(0.2131, 0.0770, 0.0599)
variance = al0/(1-al[1]-al[2]-al[3])

T = 2000 # Nombre de périodes
epsilon = rnorm(T) # Innovations gaussiennes
a = rep(0, T); r = rep(0, T) # Mémoire réservé
a[1:3] = rnorm(3, sd=sqrt(variance));
r[1:3] = a[1:3] + mu
for (t in 4:T) {
  mu_t = mu
  sigma2_t = al0 + al %*% a[(t-1):(t-3)]^2
  a[t] = sqrt(sigma2_t) * epsilon[t]
  r[t] = a[t] + mu_t
}
```


Graphique de r_t artificiel

```
plot(r, type='l')
```




La fonction d'autocorrélation de r_t artificiel

`acf(r)`




La fonction d'autocorrélation de r_t^2 artificiel

```
acf(r^2)
```




La fonction d'autocorrélation de r_t , Intel 1973-2008

```
r_intel = read.table('m-intc7308.txt', header=TRUE)
acf(r_intel$rtn)
```



La fonction d'autocorrélation de r_t^2 , Intel 1973-2008

```
acf(r_intel$rt^n^2)
```



Test des effets ARCH, Intel

```
Box.test(r_intel$rtn, lag=12)
```

```
##  
## Box-Pierce test  
##  
## data:  r_intel$rtn  
## X-squared = 15.987, df = 12, p-value = 0.1918
```

```
Box.test(r_intel$rtn^2, lag=12)
```

```
##  
## Box-Pierce test  
##  
## data:  r_intel$rtn^2  
## X-squared = 78.075, df = 12, p-value = 9.599e-12
```

La log-vraisemblance pour un ARCH(1) gaussien, $\mu_t = \mu$

- En générale, pour une séries r_t , la log-vraisemblance est

$$L(\theta; r_1, \dots, r_T) = \sum_{t=1}^T \log[f(r_t | \theta, r_1, \dots, r_{t-1})]$$

- La densité d'une aléa $N(\mu, \sigma^2)$:

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}.$$

- La log-densité :

$$\log f(x; \mu, \sigma) = -\frac{1}{2}[\log \sigma^2 + \log 2\pi + (x - \mu)^2/\sigma^2]$$

La log-vraisemblance pour un ARCH(1) gaussien, $\mu_t = \mu$

- ▶ Terme $t = 1$:

$$\log f(r_1) = -\frac{1}{2} \left[\log \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_1} + \log 2\pi + \frac{(r_1 - \mu)^2}{\alpha_0 / (1 - \alpha_1)} \right].$$

- ▶ Termes $t > 1$:

$$\log f(r_t | r_{t-1}) = -\frac{1}{2} \left[\log[\alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2] + \log 2\pi + \frac{(r_t - \mu)^2}{\alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2} \right].$$

- ▶ La somme de tous les termes donne $L(\mu, \alpha_0, \alpha_1; r_1, \dots, r_T)$
- ▶ Les “constantes” qui importent.
- ▶ Pourquoi en logs?

Évaluation de la vraisemblance

```
vraisemblance <- function(mu, al0, al1, r) {  
  T = length(r)  
  a = rep(0, T); # Mémoire réservé  
  mu_t = mu  
  sigma2_t = al0/(1-al1)  
  a[1] = r[1]-mu_t  
  L = -0.5*(sigma2_t + log(2*pi) + a[1]^2/sigma2_t)  
  for (t in 2:T) {  
    mu_t = mu  
    sigma2_t = al0 + al1 * a[t-1]^2  
    a[t] = r[t] - mu_t  
    L = L - 0.5*(sigma2_t + log(2*pi) + a[t]^2/sigma2_t)  
  }  
}
```

Prévision avec un ARCH(m)

- ▶ La meilleure prévision ponctuelle, en termes de perte quadratique, est la moyenne.
- ▶ Prévision de σ_{t+1}^2 à t :

$$\sigma_t^2(1) \equiv E[\sigma_{t+1}^2 | F_t] = \alpha_0 + \alpha_1 a_t^2 + \dots + \alpha_m a_{t+1-m}^2.$$

- ▶ Prévision de σ_{t+2}^2 à t :

$$\sigma_t^2(2) \equiv E[\sigma_{t+2}^2 | F_t] = E[E[\sigma_{t+2}^2 | F_{t+1}] | F_t]$$

$$\sigma_t^2(2) = E[\alpha_0 + \alpha_1 a_{t+1}^2 + \dots + \alpha_m a_{t+2-m}^2 | F_t]$$

$$\sigma_t^2(2) = \alpha_0 + \alpha_1 \sigma_t^2(1) + \alpha_2 a_t^2 + \dots + \alpha_m a_{t+2-m}^2.$$

- ▶ Prévision de σ_{t+h}^2 à t :

$$\sigma_t^2(h) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^m \alpha_i \sigma_t^2(h-i),$$

$$\text{où } \sigma_t(h-i) = a_{t+h-i}^2 \text{ si } h-i \leq 0 \text{ (} t+h-i \leq t \text{)}$$

Notes sur la prévision ponctuelle

- ▶ Il faut avoir plus de structure pour évaluer l'incertitude associée à σ_{t+h} .
- ▶ L'incertitude concernant les paramètres et le modèle n'est pas pris en compte.

Questions théoriques

1. Mettons que r_t suit un modèle ARMA(1,3) avec moyenne zéro. Au moment t , trouvez les prévisions de r_{t+1} et de r_{t+2} qui minimisent l'erreur moyenne carrée. Trouvez la variance de l'erreur de prévision dans les deux cas.
2. Mettons que r_t suit un GARCH(1,1) gaussien avec moyenne zéro. Calculez la variance, l'asymétrie et l'aplatissement de r_t . Vous pouvez vérifier la variance et l'aplatissement en comparant vos résultats aux résultats à la page 132 de Tsay.

Exercices R

1. Prenez le code de la diapo 'Simulation du modèle ARCH(3)' et modifiez-le pour simuler un GARCH(1,1) gaussien à moyenne zéro pendant $T = 1000$ périodes. Utilisez les valeurs des paramètres $\alpha_0 = 0.000084$, $\alpha_1 = 0.1213$, $\beta_1 = 0.8523$. Calculez la variance, l'asymétrie et l'aplatissement de l'échantillon. Suggestion : comparez à la variance, à l'asymétrie et l'aplatissement de la population obtenues ci-haut. Faites la graphique de r_t et de σ_t^2 .

Cours 5, la semaine prochaine

Plan préliminaire

1. La théorie des estimateurs maximum de vraisemblance
2. Évaluation de la vraisemblance des modèles GARCH
3. Modèle EGARCH et l'effet de levier
4. Introduction à l'inférence bayésienne
5. Modèles de volatilité stochastique

Lectures

- ▶ Dans Tsay, 3e édition :
 - ▶ Sections 1.2.2, 1.2.4, 3.8 intro, 3.8.1
- ▶ Au site web suivant :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_de_vraisemblance
 - ▶ Sections Exemple, Principe, Définitions, Propriétés, Exemples