

Lectures et exercices

ECN 6578, Hiver 2021

William McCausland

2021-02-15

Cours 1, le 18 janvier

Sujets

1. Notation pour les rendements des actifs et des portefeuilles
2. Fonctions linéaires des variables aléatoires, mélanges des lois.
3. La loi des espérances itérées, avec applications
4. L'inégalité de Jensen, avec applications

Exercices théoriques

1. Pour les deux placements décrits à la diapo “Fonctions linéaires vs mélanges, un exemple”, calculez la moyenne et la variance du rendement.
2. Étudiez la preuve du théorème de variance totale et prouvez le théorème de covariance totale : pour variables aléatoires X , Y et Z telles que les moments suivants existent,

$$\text{Cov}[X, Y] = E[\text{Cov}[X, Y|Z]] + \text{Cov}[E[X|Z], E[Y|Z]].$$

3. Soit Z une variable aléatoire qui prend la valeur 1 avec probabilité 1/2 et la valeur -1 avec probabilité 1/2. Soit (X, Y) un vecteur aléatoire avec la loi conditionnelle sachant Z suivante: $(X, Y)|Z \sim N((Z, -Z), I)$, où I est la matrice identité 2×2 . Trouvez $\text{Cov}[X, Y]$.
4. Trouvez l'aplatissement du mélange suivant de deux lois gaussiennes, chacune avec probabilité 0.5 : $N(0, 0.9)$ et $N(0, 1.1)$.

Exercices avec R (Travail préliminaire, pas à remettre)

1. Téléchargez R et R Studio.
2. Créez un fichier HTML à partir du gabarit R Markdown.

Cours 2, le 25 janvier

Sujets

1. Log rendements, rendements multi-période, annualisation
2. Asymétrie et aplatissement, non-normalité des rendements
3. Stationnarité et covariance-stationnarité
4. Non-corrélation versus indépendance.
5. Autocorrélation
6. Faits empiriques

Lectures préparatoire (à faire avant le cours) Dans le livre de Tsay, 3e édition

1. Dans la section 1.1, “Asset Returns”
 - a. Multiperiod simple returns
 - b. Continuous compounding
 - c. Continuously compounded returns
2. Dans la section 1.2, “Distributional properties of returns”
 - a. Moments of a random variable (jusqu’à la fin de la page 9)
3. Dans la section 2.2, “Correlation and Autocorrelation”
 - a. Introduction (sans nom)
 - b. Autocorrelation

Autres lectures

1. L’article de Cont (2001) que j’ai mis sur StudiUM.
2. Tsay, 3e édition :
 - a. 1.2.1 (lois statistiques et leurs moments)
 - b. 1.2.2 (la loi des rendements)
 - c. 1.2.3 (rendements multivariés)
 - d. 1.2.5 (propriétés empiriques des rendements)
 - e. 2.1 (stationnarité)
 - f. 2.2 (corrélation et la fonction d’autocorrélation)
 - g. 2.3 (le bruit blanc et les séries temporelles linéaires)

Exercices

1. La v.a. X suit une loi qui est un mélange de deux lois gaussiennes, chacune avec probabilité 0.5 : $N(\mu, \sigma^2)$ et $N(-\mu, \sigma^2)$. Calculez l’aplatissement K_x et $\lim_{\sigma^2 \downarrow 0} K_x$.
2. Trouvez l’asymétrie et l’aplatissement d’un mélange général de deux v.a. gaussiennes. Le site suivant donne les quatre premiers moments non centraux d’une v.a. $N(\mu, \sigma^2)$: https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale#Moments.
3. Le prix d’un actif le 4 janvier est de 14.50 dollars. Le prix de l’actif le 15 février est de 13.15. Quel est le rendement simple annualisé et le log rendement annualisé?
4. On observe un échantillon X_1, \dots, X_T , où $X_t \sim \text{iid } N(\mu, \sigma^2)$. Si on fait les tests 1 et 2 de la diapo “Attention : tests multiples!” quelle est la probabilité d’au moins un rejet, comme fonction de α ?

Exercices avec R Travail, cours du 25 janvier

1. Téléchargez le fichier des données `d-3m7008.txt` et faites la graphique des rendements journaliers de l’action 3M avec la commande `plot`, option ‘l’ (L minuscule).
2. Faites un test de l’hypothèse que les rendements sont iid gaussiens, avec la statistique test Jarque-Bera. Calculez les valeurs critiques en utilisant la fonction de quantile (comme `qnorm` ou `qchisq`) de la loi asymptotique de la statistique test sous l’hypothèse nulle.

3. Faites un test de l'hypothèse que les rendements sont iid avec variance finie, avec la statistique test Box-Pierce. Utilisez la commande `acf` pour obtenir la fonction d'autocorrélation et calculez la statistique test à partir de cette fonction. Utilisez $m = 10$ retards. Confirmez ensuite votre réponse en utilisant la commande `Box.test`.

Cours 3, le 1 février

Sujets

1. Le bruit blanc et des séries temporelles linéaires
2. Le modèle AR(p)
3. Le modèle MA(p)
4. Le modèle ARMA(p,q)

Lectures préparatoire

1. Tsay, 3e édition :
 - a. 2.3
 - b. 2.4 Intro (avant 2.4.1)
 - c. 2.5 Intro (avant 2.5.1)
 - d. 2.6 Intro (avant 2.6.1)

Autres lectures

1. Tsay, 3e édition :
 - a. 2.4 (modèles AR)
 - b. 2.5 (modèles MA)
 - c. 2.6 (modèles ARMA)
 - d. 2.8.1 et 2.8.2 (pour faire l'exercice 2.4)

Exercices

1. Ecrivez les équations Yule-Walker pour un process AR(3) et pour un processus ARMA(1,1).
2. Trouvez la fonction d'autocorrélation pour un processus MA(3).
3. Considérez le process AR(3) suivant :

$$r_t = 1.9r_{t-1} - 1.4r_{t-2} + 0.45r_{t-3} + a_t.$$

- a. Il y a une racine réelle du polynôme caractéristique du processus : 0.9^{-1} . Trouvez les autres racines.
 - b. Est-ce que la condition de stationnarité tient?
4. Trouvez ψ_1, ψ_2, ψ_3 de la représentation MA infinie pour un ARMA(1,2) général.

Exercices avec R Travail, cours du 1 février

1. Considérez le process ARMA(3,1) suivant :

$$r_t = 1.9r_{t-1} - 1.4r_{t-2} + 0.45r_{t-3} + a_t - 0.3a_{t-1}.$$

- a. Simulez le séries pour $T = 500$ observations.
 - b. Faites la graphique de la fonction d'autocorrélation ρ_k de la population, pour $k = 1, \dots, 25$
 - c. Faites la graphique de la fonction d'autocorrélation $\hat{\rho}_k$ de l'échantillon, pour $k = 1, \dots, 25$.
 - d. Estimez les paramètres d'un modèle ARMA(3,1) en vous servant de l'échantillon que vous avez tiré. Donnez des estimations ponctuelles avec leurs écarts-types.
2. Tsay, Exercice 2.4. Lisez les sections 2.8.1 et 2.8.2 sur la saisonnalité.

Cours 4, le 8 février

Sujets

1. Prévision avec un modèle ARMA(p,q)
2. Modèles pour la moyenne conditionnelle, modèles pour la variance conditionnelle.
3. Modèles ARCH et GARCH
 - a. propriétés théorique, moments
 - b. simulation
 - c. évaluation de la log-vraisemblance

Lectures préparatoires

1. Tsay, 3e édition
 - a. 3.1
 - b. 3.2

Autres lectures

1. Tsay 3e édition :
 - a. Sections 1.2.2 (Distributions des rendements)
 - b. Sections 1.2.4 (Fonction de vraisemblance des rendements)
 - c. Section 3.3 (Construction des modèles)
 - d. Section 3.4.1 (Propriétés des modèles ARCH)
 - e. Section 3.4.2 (Faiblesses des modèles ARCH)

Exercices

1. Mettons que r_t suit un modèle ARMA(1,3) avec moyenne zéro. Au moment t , trouvez les prévisions de r_{t+1} et de r_{t+2} qui minimisent l'erreur moyenne carrée. Trouvez la variance de l'erreur de prévision dans les deux cas.
2. Mettons que r_t suit un GARCH(1,1) gaussien avec moyenne zéro. Calculez la variance, l'asymétrie et l'aplatissement de r_t . Vous pouvez vérifier la variance et l'aplatissement en comparant vos résultats aux résultats à la page 132 de Tsay.

Exercices en R Travail, cours du 8 février

1.
 - a. Prenez le code de la diapo 'Simulation du modèle ARCH(3)' et modifiez-le pour simuler un GARCH(1,1) gaussien à moyenne zéro pendant $T = 1000$ périodes. Utilisez les valeurs des paramètres $\alpha_0 = 0.000084$, $\alpha_1 = 0.1213$, $\beta_1 = 0.8523$.
 - b. Calculez la variance, l'asymétrie et l'aplatissement de l'échantillon. Suggestion : comparez à la variance, à l'asymétrie et l'aplatissement de la population obtenues dans les exercices théoriques.
 - c. Faites la graphique de r_t et de σ_t^2 .

Cours 5, le 15 février

Sujets

1. La théorie des estimateurs maximum de vraisemblance
2. Évaluation de la vraisemblance des modèles GARCH
3. Modèle EGARCH et l'effet de levier
4. Introduction à l'inférence bayésienne
5. Modèles de volatilité stochastique

Lectures préparatoires

1. Dans Tsay, 3e édition :
 - a. 3.5 intro (avant 3.5.1) (Modèle GARCH)
 - b. 3.8 intro, 3.8.1 (Modèle EGARCH)
2. Au site web suivant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_de_vraisemblance
 - a. Sections Exemple, Principe, Définitions, Propriétés, Exemples (au moins l'exemple Poisson)

Autres lectures

1. Dans Tsay, 3e édition :
 - a. 3.5.1 (exemple GARCH)

Exercices

1. Trouvez la moyenne et la variance de $\ln \sigma_t^2$ pour un modèle EGARCH(1,1) avec $\theta = 0$ et $\epsilon_t \sim N(0, 1)$.
2. Faites des prévisions du rendement r_{T+1} pour un modèle AR(1)-GARCH(1,1). Quelle est la variance conditionnelle des erreurs de prévision? Exprime le résultat en termes des paramètres, de r_T et de σ_T^2 .

Exercices avec R Travail, cours du 15 février

1. Pour cette question, utilisez les données dans le fichier d-3m7008.txt (action 3M, rendements journaliers, 1970-2008). Je recommande le paquet fGARCH, utilisé pour les démonstrations du cours 5. Pour tous les modèles suivants, calculez la valeur maximale de la log-vraisemblance. Quel est le meilleur modèle selon le critère AIC? Pour ce modèle, reportez les estimations MV (maximum de vraisemblance) des paramètres et leurs écarts-types asymptotiques et faites la graphique de la séquence de volatilités estimées.
 - a. GARCH(1,1), distribution conditionnelle gaussienne.
 - b. GARCH(1,1), distribution conditionnelle t de Student.
 - c. ARCH(2), distribution conditionnelle t de Student.
 - d. GARCH(2,1), distribution conditionnelle t de Student.
 - e. AR(1)-GARCH(1,1), distribution conditionnelle t de Student.