

ÁCIDO BÓRICO

Fórmula molecular: H_3BO_3



MCKENNA GROUP®

Materia prima grado farmacológico Ph. Eur. JPC. USP; COA

Cristales incoloros o polvo blanco. Se obtiene a través de la reacción del bórax (tetraborato de sodio) con un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico. Tiene una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias y campos, siendo utilizado como agente tampón para regular el pH, antiséptico, bactericida y en el tratamiento del acné, además de desempeñar un papel en la protección contra incendios, conservación de alimentos y absorción de neutrones en la industria nuclear. También se utiliza como pesticida, suavizante de agua, en la fabricación de vidrio y cerámica, metalurgia y en la formación de aleaciones con otros metales.

En 1 gramo de ácido bórico hay aproximadamente 10.81 miligramos (mg) de boro elemental.

Concentración: 99 %

CAS: 10043-35-3



- Puede ser nocivo si se inhala.



- Revise que el envase este en perfectas condiciones antes de abrirlo.

- Mantenga bien cerrado, en un lugar fresco y seco, alejado de la luz, el calor y la humedad.

Desarrollado por:
MCKENNA GROUP S.A.S
NIT. 901316016-3

BOGOTÁ – COLOMBIA
Descarga ficha técnica en:
www.mckennagroup.co



7 701970 012347

1.000 g