



Protocolo: **2 43558**
Paciente: **BARBERAN.LUIS.JOSE(CHIQUEI),**
CANINO
Médico: **VETERINARIA, VET24**

Fecha: **03/08/2026**
auto: **34976**

HEMOGRAMA Canino (p)

Método: Impedancia/MO
Material: Sangre Entera con EDTA

SERIE BLANCA

Glóbulos Blancos: 9.700 /mm³ V.N.: 6.000 -17.000 mm³

FÓRMULA LEUCOCITARIA

Células Inmaduras: 0,00 %

Neutrófilos en Cayado: 0,00 %

Neutrófilos Segmentados: 70,00 %

Eosinófilos: 2,00 %

Basófilos: 0,00 %

Linfocitos: 24 %

Monocitos: 4,00 %

Total Fórmula 100,00 %

Neutrof. en Cayado Abs 0 /mm³ V.N.: 0-300 mm³

Neutrof. Segmentados Abs 6.790 /mm³ V.N.: 3.000 -11.500 mm³

Eosinófilos Abs 194 /mm³ V.N.: 100 -1.250 mm³

Basófilos Abs 0 /mm³ V.N.: 0 - 50 mm³

Linfocitos Abs 2.328 /mm³ V.N.: 1.000 - 4.800 mm³

Monocitos Abs 388 /mm³ V.N.: 150 -1.350 mm³

Comentarios serie blanca Numerosas sombras celulares en el frotis. Posible alteración artefactual del recuento estimado y el diferencial leucocitario.

SERIE ROJA

Glóbulos Rojos: 6,25 millo./mm³ V.N.: 5,5 a 8,5 millones/mm³

Hematocrito: 44,10 % V.N.: 37 % - 55 % F

Hemoglobina: 14,70 g/dl V.N.: 12 -19 g/dl

VCM: 70,60 fl V.N.: 60 a 77 fl

HCM: 23,50 pg V.N.: 19 a 24 pg

MCHC: 33,30 % V.N.: 30 a 36 %

Comentarios serie roja: Sin particularidades

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas: 194.000 /mm³ V.N.: 160.000 - 500.000 / mm³

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462



HEMOGRAMA Canino (p)

Método: Impedancia/MO

Material: Sangre Entera con EDTA

Comentarios plaquetas: En el frotis se observan pequeños y aislados agregados plaquetares. El recuento de plaquetas puede estar subestimado. Valorar clínicamente.

Urea Can (p)

Método: Colorimétrico

Material: Suero

Resultado 95 mg/dL V.N.: Caninos : 20 - 50 mg/dL

Creatinina S. Can (p)

Método: Colorimétrico

Material: Suero

Resultado 1,18 mg/dL V.N.: Caninos : 0,5- 1,5 mg/dL

Fósforo Can

Método: UV -VIS

Material: Suero

Resultado 6,30 mg/dL V.N.: Caninos : 3-6 mg/dL

ast-GOT (p)

Método: UV -VIS

Material: Suero

Resultado 56 UI/L V.N.: Can/Fel : 10-60 UI/L

alt-GPT (p)

Método: UV -VIS

Material: Suero

Resultado 344 UI/L V.N.: Can/Fel : 10-60 UI/L

Fosfatasa alcalina Can (p)

Método: Colorimétrico

Material: Suero

Resultado 283 UI/L V.N.: Canino : hasta 300 UI/L
La muestra recomendada para FAL es suero. Otros tipos de muestras generan interferencia con el anticoagulante.

Relación Albumina / Globulinas Caninos (p)

Método: Colorimétrico

Material: Suero

Proteínas totales (Can) 7,84 g/dl V.N.: 5,5 -7,5 g/dl
Albumina (Can) 3,39 g/dl V.N.: 2,5 - 4 g/dl
Globulina (Can) 4,45 g/dl V.N.: 2,7 - 4,4 g/dl
Relación A/G (Can) 0,76 V.N.: 0,6 - 1,1

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462



Colesterol Total Can			Método: Colorimétrico
			Material: Suero
Resultado	281,00	mg/dL	V.N.: Canino : 150-280 mg/dL
Trigliceridos Can			Método: Colorimétrico
			Material: Suero
Resultado	277,00	mg/dL	V.N.: Caninos : 10 - 150 mg/dL
Ionograma			Material: Suero
Ionograma	3 determinaciones		
Sodio (p)			Método: Electrodo de Ion Selectivo
			Material: Plasma
Resultado (Can)	141	mEq/L	V.N.: Caninos : 140- 155 mEq/L
Cloro sérico (p)			Método: Electrodo de Ion Selectivo
			Material: Plasma
Resultado (Can-Fel)	103	mEq/L	V.N.: Caninos/Felinos : 105- 129 mEq/L
Potasio (p)			Método: Electrodo de Ion Selectivo
			Material: Plasma
Resultado (Can)	5,5	mEq/L	V.N.: Caninos : 3,8 - 5,8 mEq/L
Relación Na⁺/K⁺			Método: Electrodo de Ion Selectivo
			Material: Suero
Relación Na ⁺ /K ⁺ en Caninos	25,64	mEq/L	V.N.: Na ⁺ /K ⁺ : 27 a 40
			< 27 → Sospecha de hipoadrenocorticismo También puede observarse en: Obstrucción urinaria Insuficiencia renal aguda o crónica severa Peritonitis séptica Parasitosis severos Pérdidas gastrointestinales intensas (diarrea prolongada) > 40 → No suele tener valor diagnóstico por sí sola, pero puede verse en deshidratación o en hipopotasemia.

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462



Orina Completa para PERFIL

Método: MO
Material: Orina

EXAMEN FÍSICO

Color:	Ambarino	
Olor:	sui generis	
Aspecto:	Límpido	
Densidad:	1.035,00 g/L	V.N.: V.N. caninos y felinos: >1035

EXAMEN QUÍMICO

PH:	6,00	V.N.: V.N. caninos y felinos: 6 a 7,5
Proteínas:	Trazas	V.N.: V.N. caninos: Trazas/No contiene V.N. felinos: No contiene Sensibilidad analítica : a partir de 15 mg/dL
Glucosa:	Contiene ++ (232 mg/dL)	V.N.: V.N. caninos y felinos: No contiene
Cetonas:	No contiene	V.N.: V.N. caninos y felinos: No contiene
Urobilinógeno:	No contiene	V.N.: V.N. caninos y felinos: No contiene
Bilirrubina:	No contiene	V.N.: V.N. caninos: Trazas/No contiene V.N. felinos: No contiene
Nitritos:	No contiene	V.N.: V.N. caninos y felinos: No contiene
Hemoglobina:	No contiene	V.N.: V.N. caninos y felinos: No contiene

SEDIMENTO MICROSCÓPICO

Leucocitos:	No se observa	V.N.: V.N. caninos: <1/CGA V.N. felinos: No contiene
Piuria:	No se observa	V.N.: V.N. caninos y felinos: No contiene
Células Epiteliales Planas:	Se observan escasas	V.N.: V.N. caninos y felinos: No contiene/Asl. La metodología de toma de muestra puede hacer varias esta determinación
Hematíes:	No se observan	V.N.: V.N. caninos: <3/CGA V.N. felinos: No contiene La metodología de toma de muestra puede hacer varias esta determinación
Cilindros:	No se observan	V.N.: V.N. caninos y felinos: No contiene/Asl.
Cristales:	de Oxalato de calcio escasos	
Mucus:	No se observan	
Gérmenes:	No se observan	V.N.: V.N. caninos y felinos: No contiene/Asl. La metodología de toma de muestra puede hacer varias esta determinación
Comentarios	Sin comentarios	

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462



Relación Proteínas / Creatinina orina (UPC)			Método: Colorimétrico Material: Orina
Proteínas Orina	6,26	mg/dL	V.N.: Canino - Felino : 70 - 150 mg/dL V.N.: Canino no proteinúrico : menor a 0,2 Canino Límite proteinúrico : 0,2 a 0,5 Canino Proteinúrico : mayor a 0,5 Felino no proteinúrico : menor a 0,2 Felino Límite proteinúrico : 0,2 a 0,4 Felino proteinúrico: mayor a 0,4
Creatinina orina	118,10	mg/dL	
Relación Proteínas O. /Creatinina O.	0,05		

Relación cortisol/creatinina urinaria			Método: cálculo Material: Orina
cortisol urinario:	24,40	ug/l	V.N.: Normal: < 40 Dudoso: 40 a 50 Elevado: Mayor a 50
creatinina urinaria:	107,00	mg%	
relación cortisol/creatinina urinaria:	22,80		
Comentarios:	Relación expresada x10-6		

Tiroxina libre (FT4 / T4L)			Método: Quimioluminiscencia Material: Suero
Resultado (Can)	0,70	ng/dl	V.N.: V.N Canino: 0,8 a 2,5 ng/dl La muestra recomendada para Hormonas es suero. Otros tipos de muestras generan interferencia con el anticoagulante V.N Galgos: 0,1 a 1,8 ng/dl En galgos, valores bajos de T4 total y/o T4 libre pueden ser fisiológicos; para confirmación de hipotiroidismo se recomienda correlacionar con la clínica y la TSH canina.

Perfil básico		Material: Suero, Sangre Entera con EDTA
Compuesto por	9 parámetros.	

Comentarios	
Comentarios:	Suero lipémico, posible interferencia de los valores informados.

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462