

Historial de recetas

2 recetas emitidas · orden cronológico

Índice de recetas

Buscá el mismo número en el detalle de cada receta.

01 · 1 oct de 2026 · Amoxicilina con ácido clavulánico 875 mg / 125 mg · Emitida

02 · 1 sept de 2026 · Amoxicilina con ácido clavulánico 875 mg / 125 mg · Emitida

Historial de recetas

Detalle de las recetas

RECETA 1 DE 2

RECETA EMITIDA

PACIENTE

María Fernanda Pérez Quispe

FECHA DE EMISIÓN

1 oct de 2026, 8:00 a. m.

PROFESIONAL

Dra. Valeria Salazar

MATRÍCULA

MP-45821

AUTORIDAD

Colegio Médico de Bolivia

Amoxicilina con ácido clavulánico 875 mg / 125 mg

DOSIS

Una tableta de 875 mg / 125 mg por vía oral

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral

FRECUENCIA

Cada 12 horas durante 7 días

CANTIDAD

14 tabletas

VIGENCIA

31 oct de 2026, 8:00 a. m.

INDICACIONES AL PACIENTE

1. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
2. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
3. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
4. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
5. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
6. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
7. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
8. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
9. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
10. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
11. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
12. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.

Historial de recetas · continuación

13. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
14. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
15. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
16. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
17. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
18. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
19. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
20. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
21. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
22. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
23. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
24. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
25. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
26. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
27. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
28. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
29. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.
30. Tomar después de comer. Si aparecen molestias persistentes, consultar con el profesional tratante.

Identificador de receta: rx-preview-1

Historial de recetas

Receta 2 de 2

RECETA EMITIDA

PACIENTE

María Fernanda Pérez Quispe

FECHA DE EMISIÓN

1 sept de 2026, 8:00 a. m.

PROFESIONAL

Dra. Valeria Salazar

MATRÍCULA

MP-45821

AUTORIDAD

Colegio Médico de Bolivia

Amoxicilina con ácido clavulánico 875 mg / 125 mg

DOSIS

500 mg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral

FRECUENCIA

Cada 8 horas

CANTIDAD

21 tabletas

INDICACIONES AL PACIENTE

Completar el tratamiento indicado.

Identificador de receta: rx-preview-2