


Biotechnology

DNA cloning

การเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอที่เหมือนกันโดยชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่สนใจจะถูกนำเข้าไปแทรกในพลาสมิด พลาสมิดคือดีเอ็นเอแบบวงที่เพิ่มจำนวนได้ พลาสมิดที่มีชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่สนใจเมื่อถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยเอนไซม์ DNA ligase แล้วจะเรียกว่า recombinant plasmid ซึ่ง recombinant plasmid นี้จะถูกนำเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย เมื่อแบคทีเรียแบ่งตัวก็จะมีพลาสมิดติดไปด้วย วิธีการนี้ทำให้ได้ชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ต้องการได้คราวละมากๆ วิธีโคลนนิ่งนี้นิยมใช้เพื่อเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอเพื่อผลิตโปรตีนที่สนใจ


พลาสมิดที่ใช้สำหรับโคลนนิ่งเรียกว่า cloning vector พลาสมิดของแบคทีเรียเป็นที่นิยมในการใช้เป็นเวกเตอร์เพราะสามารถนำเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียได้ง่าย

วิธีที่จะใช้ตรวจสอบว่า recombinant plasmid ที่ได้นั้นมีชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่เราสนใจอยู่หรือไม่ ทำได้โดยตัดพลาสมิดนั้นหรือใช้วิธี polymerase chain reaction (PCR) แล้วนำมาทำ gel electrophoresis




© 2017 Pearson Education, Inc.


รูปที่ 1 DNA cloning



รูปที่ 2 การสร้าง recombinant plasmid



a) Negatively charged DNA molecules will move toward the positive electrode.




b) Shorter molecules are slowed down less than longer ones, so they move faster through the gel.

รูปที่ 3 Gel electrophoresis


การเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ

Polymerase chain reaction (PCR) เป็นการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอบริเวณที่สนใจ เทคนิคนี้ประกอบด้วยสามขั้นตอน คือ **denaturation** ใช้ความร้อนแยกสายดีเอ็นเอออกจากกัน **annealing** ลดความร้อนลงเพื่อให้ DNA primers สามารถเข้าจับกับบริเวณที่เราสนใจ และขั้นตอนสุดท้ายคือ **extension** เป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพื่อให้นิวคลีโอไทด์เข้ามาต่อกับไพรเมอร์ สามขั้นตอนนี้จะถูกทำซ้ำหลายรอบจนในที่สุดได้จำนวนดีเอ็นเอที่สนใจในปริมาณมาก

เทคนิค PCR นี้ใช้เอนไซม์ DNA polymerase ที่ทนต่อความร้อนได้ดีคือ *Taq polymerase*




รูปที่ 4 Polymerase Chain Reaction




รูปที่ 5 ดีเอ็นเอที่ได้จาก PCR สามารถนำไปใช้สำหรับ gene cloning

การศึกษายีนที่สนใจมีการแสดงออกเมื่อไหร่และที่ไหนสามารถทำได้โดยศึกษาผ่านmRNAsที่สร้างขึ้น mRNAสามารถตรวจจับได้เช่นวิธี fluorescence *in situ* hybridization (FISH) หรือการสกัดmRNAจากเนื้อเยื่อที่สนใจ mRNAที่สกัดได้จะถูกเปลี่ยนเป็นดีเอ็นเอคู่สมกัน (complementary DNA, cDNA)โดยใช้เอนไซม์reverse transcriptaseแล้วนำไปเพิ่มจำนวนโดยใช้PCRซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่า reverse transcriptase-PCR หรือRT-PCR



รูปที่ 6 การสร้าง complementary DNA



รูปที่ 7 Reverse transcriptase-PCR

DNA sequencing


Sanger sequencing: The chain termination method

Sanger sequencing ถูกพัฒนาโดย Fred Sanger และคณะในปี 1977 วิธีนี้ยังเป็นที่นิยมในการศึกษาลำดับเบสของ ยีนหรือลำดับเบสหนึ่งๆ


Sanger sequencing ใช้วิธีคล้ายกับการทำPCR นั่นคือมีส่วนประกอบคือ

- DNA polymerase
- Primer ที่จับกับส่วนดีเอ็นเอที่สนใจ
- DNA nucleotides (dATP, dTTP, dCTP, dGTP)
- template DNA

แต่ Sanger sequencing จะใช้ ddATP, ddTTP, ddCTP, ddGTP ที่ติดฉลากฟลูออเรสเซนต์ไว้ แทนที่ dATP, dTTP, dCTP, dGTP ตามลำดับ




Dideoxynucleotide (ddNTP)




Deoxynucleotide (dNTP)

รูปที่ 8 ddNTP และ dNTP



รูปที่ 9 Sanger sequencing



รูปที่ 10 Chromatogram

Dideoxy nucleotides มีโครงสร้างคล้ายกับ deoxy nucleotides แต่มันไม่มีหมู่ hydroxyl ที่คาร์บอนที่ 3 ในน้ำตาล

เมื่อ dideoxy nucleotide ถูกเพิ่มเข้าไปในสายดีเอ็นเอ เพราะว่ามันไม่มีไฮดรอกซิลทำให้นิวคลีโอไทด์มาเชื่อมต่ออีกไม่ได้ สายจึงหยุดอยู่เท่านั้นและเนื่องจากมันได้ติดฉลากสีเอาไว้ เมื่อนำมาอ่านจึงเห็นเป็นลำดับเบส

Next Generation Sequencing

“Next Generation Sequencing” (NGS หรือ “massively parallel sequencing”) เป็นชื่อรวมๆของเทคนิคที่ใช้หาลำดับเบสได้คราวละมากๆ เช่นการศึกษจีโนม NGSที่เป็นที่รู้จักได้แก่

a) 454 (หรือ pyrosequencing หรือ Roche GS FLX) “sequencing by synthesis”

b) Illumina (หรือ Solexa) “sequencing by synthesis”

c) SOLiD “sequencing by ligation”

ปัจจุบันมีเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นทำให้การอ่านลำดับเบสได้ยาวมากขึ้น ได้แก่

d) Ion Torrent

e) Pacific Biosciences (PacBio)


The first machine that can perform Single Molecule Real Time (SMRT) sequencing.

f) Oxford Nanopore

ศึกษาการแสดงออกของยีนหลายยีน

การศึกษากการแสดงออกของยีนทั้งจีโนม


DNA microarrays



รูปที่ 8 Microarrays

RNA sequencing


RNA ถูกสกัด ตัดและเปลี่ยนเป็น cDNA และถูก sequenced ในคราวเดียว วิธีนี้สามารถศึกษา ยีนได้ทั้งหมดในคราวเดียว



รูปที่ 10 RNA sequencing


การศึกษาน้ำที่ของยีน

RNA interference (RNAi)



รูปที่ 11 RNA interference

CRISPR-Cas9



รูปที่ 12 CRISPR-Cas9

แบบฝึกหัด

ข้อใดถูกเกี่ยวกับ polymerase chain reaction (PCR)


- A. Denaturation - แยกดีเอ็นเอด้วยอุณหภูมิสูง
- B. Extension - ลดอุณหภูมิลงเพื่อให้ DNA primers เข้าจับกับ DNA template
- C. Annealing - นิวคลีโอไทด์เข้ามาต่อจาก primers โดยใช้เอนไซม์ *Taq* polymerase

Polymerase chain reaction (PCR) มีวิธีการคล้ายกับกระบวนการใดที่ทำให้ได้ดีเอ็นเอจำนวนมาก

- A. Translation
- B. Replication
- C. Transcription
- D. Mitosis

ผลจาก gel electrophoresis ของสิ่งมีชีวิตสี่ชนิด ด้านล่างมีแถบ X แถบนี้มีความหมายว่าอย่างไร

- A. DNA ชิ้นใหญ่ที่สุด เคลื่อนที่ได้ช้าที่สุด



- B. DNA ชิ้นเล็กสุด เคลื่อนที่ช้าสุด
- C. DNA ชิ้นเล็กสุด เคลื่อนที่เร็วสุด
- D. DNA ชิ้นใหญ่ที่สุด เคลื่อนที่ได้เร็วสุด