

PERFIL DE HUMOR DE ATLETAS DE HANDEBOL DE ELITE NA ÚLTIMA SEMANA DE PRÉ-TEMPORADA

RESUMO

Objetivo: caracterizar e analisar o perfil de humor de atletas de handebol de elite ao longo da última semana de pré-temporada, comparando cada dimensão do BRUMS entre todos os dias e identificando os dias de maior e menor expressão de cada estado de humor, com a aptidão aeróbia intermitente como parâmetro fisiológico. **Método:** 27 atletas do sexo masculino responderam ao BRUMS-24 ao longo de sete dias (uma coleta de linha de base no primeiro dia e duas coletas diárias — pré e pós-treino — nos seis dias de treino), totalizando 286 observações. Empregaram-se estatística descritiva, Shapiro-Wilk, Wilcoxon com tamanho de efeito, Friedman com W de Kendall, pós-teste (Tukey), ICC, MANOVA em escores T e regressão do pico de velocidade do T-CAR, com limiar por índice de Youden. **Resultados:** a deterioração concentrou-se no eixo energia-fadiga — o vigor caiu ($d = -1,33$) e a fadiga subiu ($d = +0,78$), confirmado por MANOVA (Wilks $\lambda = 0,181$; $p < 0,001$). O vigor foi máximo no Dia 1 e a fadiga no Dia 7. Os seis perfis de humor descritos por Terry e Parsons-Smith (iceberg, iceberg invertido, submerso, superfície, Everest invertido e barbatana de tubarão) estiveram representados, e a prevalência deslocou-se do perfil iceberg (48% no baseline) para a barbatana de tubarão (22% no Dia 7), sem instalação dos perfis de maior risco à saúde mental (Everest invertido, submerso e iceberg invertido), embora a diferença categórica não tenha alcançado significância ($\chi^2 = 8,96$; $p = 0,111$). Maior aptidão associou-se a menos fadiga ($p = -0,51$), com limiar de 14,9 km/h. A sonolência (Epworth) elevou-se ao longo da semana e associou-se a mais fadiga e pior humor, enquanto o estresse percebido (PSS-14) manteve-se estável, indicando que a resposta afetiva foi específica da carga de treino. **Conclusão:** o humor migrou da prontidão (perfil iceberg) para a fadiga funcional (perfil barbatana de tubarão); o vigor e a fadiga foram as dimensões mais sensíveis, e a aptidão intermitente ajudou a explicar a resposta, fundamentando o monitoramento individualizado.

Palavras-chave: humor; BRUMS; handebol; monitoramento do atleta; fadiga; aptidão intermitente.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Monitoramento do humor no esporte de rendimento

O acompanhamento do estado psicológico dos atletas consolidou-se como parte essencial da gestão do treinamento no esporte de rendimento. Instrumentos de autorrelato do humor são práticos, econômicos e sensíveis às variações da carga de treino, com utilidade preditiva para o bem-estar e o desempenho esportivo (SAW; MAIN; GASTIN,

2016; LOCHBAUM et al., 2021), razão pela qual documentos de consenso recomendam seu uso rotineiro para monitorar a fadiga e orientar decisões de treino e recuperação (KELLMANN et al., 2018).

Entre esses instrumentos, a Escala de Humor de Brunel (BRUMS), versão abreviada e adaptada do Profile of Mood States (POMS), destaca-se pela rapidez de aplicação e pela solidez psicométrica, com sucessivas validações transculturais, incluindo a versão brasileira (BRAMS) (TERRY; LANE; FOGARTY, 2003; ROHLFS et al., 2008, 2023). Sua aplicação tem-se mostrado particularmente informativa em modalidades esportivas coletivas e no esporte de rendimento, contextos de elevada demanda física, emocional e interpessoal: a BRUMS vem sendo empregada para monitorar o humor de atletas de elite ao longo de períodos competitivos e sua relação com o sono, o desempenho, os resultados de partida e o risco de lesão (ANDRADE et al., 2016; BRANDT; BEVILACQUA; ANDRADE, 2017; ANDRADE et al., 2020; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2025; DO NASCIMENTO et al., 2026), consolidando-se como um indicador de baixo custo e alta sensibilidade para a triagem do bem-estar psicológico e do risco de saúde mental em contextos de rendimento.

1.2 Perfis de humor e sua aplicação em atletas de elite

Para além dos escores isolados de cada subescala, a leitura do humor evoluiu para a identificação de perfis prototípicos. Morgan (1985) descreveu o clássico “perfil iceberg” — vigor elevado sobre dimensões negativas baixas — como assinatura de prontidão e de saúde mental positiva. Mais recentemente, análises de agrupamento (cluster) em grandes amostras formalizaram seis perfis de humor — iceberg, superfície, submerso, barbatana de tubarão, iceberg invertido e Everest invertido —, dos quais os três últimos se associam a maior risco à saúde mental e à subperformance (PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017; HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020). Esses perfis vêm sendo replicados em diferentes culturas e aplicados ao rastreamento da prontidão e do bem-estar de atletas de elite, inclusive no contexto brasileiro: em uma grande amostra de um clube de rendimento do Rio de Janeiro (898 atletas), o perfil iceberg foi o mais prevalente em avaliação momentânea, ao passo que os perfis de risco foram os menos frequentes (DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024). A abordagem por perfis oferece uma leitura integrada e visual do estado psicológico, sensível às variações de carga e útil para identificar precocemente atletas em deterioração, com valor documentado para a saúde mental sustentável e para desfechos como lesão (TERRY et al., 2021; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2025).

Dois desses perfis são especialmente informativos para a leitura de um microciclo de carga. O iceberg — vigor elevado sobrepondo-se a dimensões negativas baixas — é a assinatura da prontidão e do bem-estar e associa-se a melhor desempenho esportivo, tendo a perturbação total do humor predito o rendimento em meta-análise de estudos com atletas

competitivos (efeito médio; LOCHBAUM et al., 2021). A barbatana de tubarão (shark fin), por sua vez, descreve o atleta ainda energizado, porém com a fadiga já elevada acima do vigor — e, em graus variados, com tensão e raiva acentuadas —, configurando a assinatura afetiva típica do acúmulo de treino. Como o humor é um estado transitório e sensível à carga, é de se esperar que, ao longo de uma semana intensa de treinamento, a prevalência se desloque do iceberg para a barbatana de tubarão: um “derretimento do iceberg” que traduz, no plano dos perfis, a deterioração progressiva do eixo energia–fadiga (MORGAN, 1985; HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020). Descrever esse deslocamento ao longo dos dias — e não apenas em um instantâneo — é o que permite distinguir a fadiga funcional, esperada e reversível, de uma deterioração que exigiria intervenção, e constitui um dos focos centrais deste estudo.

1.3 Handebol: modalidade coletiva intermitente e de alta intensidade

O handebol de quadra é uma modalidade coletiva de invasão, de caráter marcadamente intermitente e de alta intensidade. Ao longo da partida, ações máximas e explosivas — sprints curtos, saltos, arremessos, bloqueios, mudanças de direção e contatos físicos — alternam-se, de forma imprevisível, com períodos de recuperação incompleta, exigindo simultaneamente potência anaeróbia, capacidade aeróbia intermitente e elevada tolerância à fadiga (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; MICHALSIK; AAGAARD, 2015; WAGNER et al., 2014). É justamente a aptidão aeróbia que sustenta a capacidade de repetir e manter esforços de alta intensidade ao longo de uma partida: uma maior potência aeróbia acelera a ressíntese de fosfocreatina e a remoção de metabólitos nas pausas incompletas, atenua a queda de desempenho entre ações sucessivas e retarda a instalação da fadiga, preservando a qualidade das ações decisivas nos minutos finais (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; MICHALSIK; AAGAARD, 2015). Por atuar sobre a recuperação entre esforços, e não apenas sobre a intensidade máxima isolada, a aptidão aeróbia intermitente é determinante da capacidade de sustentar altas intensidades no jogo intermitente. Avaliá-la, contudo, exige um teste que reproduza esse mesmo padrão de esforço e pausa: é o que faz o Teste de Carminatti (T-CAR), teste de campo progressivo e intermitente cujo pico de velocidade (PV) reflete a capacidade aeróbia intermitente e se associa ao desempenho físico e à aptidão em modalidades dessa natureza (FERNANDES-DA-SILVA et al., 2016). Esse padrão de esforço eleva a carga interna nos microciclos de acúmulo e repercute no estado afetivo, sobretudo na última semana de pré-temporada, quando a carga que antecede a competição se concentra. Como a tolerância a essa carga depende da aptidão aeróbia intermitente, é plausível que o PV do T-CAR module a magnitude da resposta de humor ao acúmulo de treino — hipótese que este estudo examina.

1.4 Objetivos e hipóteses

Diante da ampla adoção da BRUMS, mas da escassez de descrições detalhadas do comportamento do humor em um microciclo pré-competitivo de handebol de elite, o objetivo geral foi caracterizar e analisar o perfil de humor desses atletas ao longo da última semana de pré-temporada, descrevendo o comportamento de cada dimensão do BRUMS, comparando todos os dias entre si, identificando os dias de maior e menor expressão de cada estado de humor e relacionando a resposta à aptidão aeróbia intermitente. Especificamente, buscou-se: (i) caracterizar a amostra; (ii) verificar a normalidade; (iii) descrever a resposta aguda pré → pós com tamanho de efeito; (iv) comparar as dimensões entre todos os dias; (v) confirmar as diferenças por análise multivariada (escores T); (vi) descrever o comportamento individual de cada variável e suas relações; (vii) identificar os dias de maior fadiga, vigor, tensão, raiva e depressão; (viii) classificar a evolução dos perfis de humor; (ix) analisar o T-CAR e o limiar de pico de velocidade; (x) caracterizar a sonolência e o estresse percebido e sua relação com o humor; e (xi) modelar a dinâmica temporal das trajetórias — taxa de variação, aceleração e o cruzamento energia–fadiga —, separando o sinal sistemático do ruído amostral. Hipotetizou-se que a deterioração se concentraria no eixo energia–fadiga, com migração do perfil iceberg (prontidão) para o de barbatana de tubarão (fadiga funcional) e um cruzamento entre as trajetórias de vigor e fadiga ao longo da semana, e que a aptidão aeróbia intermitente modularia a magnitude dessa resposta.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Delineamento e amostra

Estudo descritivo-comparativo, observacional e de medidas repetidas, conduzido em condições ecológicas de treinamento durante o microciclo pré-competitivo (21 a 27 de abril de 2024), com 27 atletas de handebol do sexo masculino de nível competitivo, conforme os princípios éticos da Declaração de Helsinque e com consentimento informado.

2.2 Instrumentos

O humor foi avaliado pela BRUMS-24, com 24 itens em escala de 0 (“nada”) a 4 (“extremamente”), agrupados em seis subescalas de 0 a 16 pontos (tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão); a Perturbação Total do Humor (PTH) resume o perfil (soma das negativas menos o vigor). Para a classificação de perfis e a análise multivariada, os escores foram convertidos em escores T ($M = 50$; $DP = 10$). A aptidão aeróbia intermitente foi avaliada pelo Teste de Carminatti (T-CAR), teste de campo progressivo e intermitente (repetições de 12 s de corrida em vaivém intercaladas por 6 s de recuperação, até a exaustão), tendo o pico de velocidade (PV) como desfecho (FERNANDES-DA-SILVA et al., 2016). A estrutura de esforço e pausa do T-CAR reproduz o padrão intermitente das ações do handebol, de modo que o PV expressa a capacidade aeróbia de sustentar e repetir

esforços de alta intensidade — e não apenas a intensidade máxima isolada —, o que o qualifica como marcador fisiológico específico para esta amostra. O T-CAR foi aplicado em 15 de abril de 2024, quatro dias de treino antes do início do microciclo, de modo a servir como parâmetro fisiológico de linha de base das análises. No mesmo diário eletrônico, registraram-se ainda a sonolência, pela Escala de Sonolência de Epworth em versão de 6 itens (probabilidade de cochilar em seis situações; 0–18), e o estresse percebido, pela Escala de Estresse Percebido de 14 itens (PSS-14; 0–56, com sete itens de pontuação invertida), tomados como marcadores de recuperação e de carga psicossocial. A composição corporal foi avaliada por antropometria (massa e estatura) e por dobras cutâneas (percentual de gordura), servindo à caracterização da amostra e ao ajuste alométrico do desempenho no T-CAR.

2.3 Procedimentos

O BRUMS foi autoaplicado por formulário eletrônico ao longo de sete dias consecutivos (21 a 27 de abril de 2024). A data e o horário de cada resposta foram definidos pelo carimbo automático de registro do formulário — e não pela data informada pelo respondente —, garantindo a alocação correta de cada observação ao dia e ao momento de coleta. O primeiro dia (21/04) constituiu a avaliação de linha de base (baseline), com uma única coleta por atleta; nos seis dias de treino subsequentes (22 a 27/04) previram-se duas coletas diárias — uma ao início (pré) e outra ao final (pós) do treino. Em cada dia de treino, a primeira resposta de cada atleta foi tomada como pré e a última como pós. Por se tratar de registro em condições ecológicas, houve adesão irregular: nem todos os atletas responderam em todos os dias ou nas duas janelas, e eventuais respostas repetidas dentro de uma mesma janela foram reduzidas a um único valor (a primeira, no baseline; a primeira e a última, como pré e pós, nos dias de treino). Após essa padronização e a exclusão de um registro isolado fora da janela (29/04), o conjunto analítico totalizou 286 observações válidas dos 27 atletas (uma no baseline e até duas por dia de treino).

2.4 Análise estatística

A análise seguiu uma sequência do descritivo ao inferencial. Inicialmente, empregou-se estatística descritiva (média, desvio-padrão, mediana e amplitude) para caracterizar as variáveis, e o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade — etapa que orienta a escolha entre testes paramétricos e não paramétricos. Como as distribuições violaram a normalidade, com forte concentração de escores baixos nas dimensões negativas (efeito de piso), os dados não foram transformados (NEVILL; LANE, 2007) e privilegiaram-se testes não paramétricos.

Para descrever a resposta aguda ao treino, os momentos pré e pós foram comparados pelo teste de Wilcoxon para amostras pareadas, acompanhado do tamanho de efeito (*d* de

Cohen), que expressa a magnitude da diferença independentemente do tamanho da amostra (trivial $< 0,2$; pequeno $< 0,5$; médio $< 0,8$; grande $\geq 0,8$); a mesma lógica aplicou-se à comparação entre o primeiro e o último dia. Para verificar se cada dimensão variou ao longo dos sete dias, utilizou-se o teste de Friedman — equivalente não paramétrico da ANOVA de medidas repetidas —, com o W de Kendall como tamanho de efeito (0,1 pequeno; 0,3 moderado; 0,5 grande); quando significativo, aplicou-se o pós-teste das médias marginais de um modelo misto (correção de Tukey), que identifica entre quais dias, especificamente, houve diferença. A consistência das medidas repetidas ao longo da semana foi estimada pelo coeficiente de correlação intraclass (ICC), interpretado como pobre ($< 0,50$), moderado (0,50–0,75), bom (0,75–0,90) ou excelente ($> 0,90$).

Como confirmação robusta, as comparações Dia 1 $\rightarrow$ Dia 7 e pré $\rightarrow$ pós foram reanalisadas por análise multivariada de variância (MANOVA) de medidas repetidas sobre os escores T, que testa as seis dimensões em conjunto e controla o erro de múltiplas comparações (lambda de Wilks, F e eta-quadrado parcial — η^2p ; 0,01 pequeno; 0,06 médio; 0,14 grande); nos testes univariados de acompanhamento da MANOVA, aplicou-se o ajuste de Bonferroni ao nível de significância, dividindo 0,05 pelas seis dimensões ($\alpha = 0,008$), para controlar o erro do tipo I. A associação entre as dimensões foi quantificada pela correlação de Spearman (ρ). Por fim, a relação entre o pico de velocidade do T-CAR e a fadiga foi analisada por regressão, e um limiar de pico de velocidade foi estabelecido por regressão logística (probabilidade de um dia de fadiga elevada em função do pico de velocidade), com o ponto de corte definido pelo índice de Youden — que maximiza a soma de sensibilidade e especificidade —, a discriminação avaliada pela área sob a curva ROC e a qualidade de ajuste do modelo logístico reportada pela log-verossimilhança, pelo pseudo- R^2 de McFadden e pelos critérios de informação de Akaike (AIC) e bayesiano (BIC). Como verificação a posteriori da forma funcional dessa relação, a associação entre o pico de velocidade e a resposta semanal de humor (fadiga física e vigor) foi ajustada por três modelos concorrentes — linear, logarítmico ($\ln$ do pico de velocidade) e polinomial de 2º grau —, selecionando-se o de melhor compromisso entre ajuste e parcimônia pelo menor AIC/BIC, além do R^2 ajustado e do RMSE; para o modelo logístico, comparou-se ainda o preditor na escala bruta contra a logarítmica. Para separar o efeito da aptidão do efeito do tamanho corporal, o pico de velocidade foi ainda submetido a ajuste alométrico: estimou-se o expoente da relação alométrica pela regressão $\log(PV) - \log(\text{massa})$ e normalizou-se o PV pela massa elevada a esse expoente, comparando-se as associações do PV bruto e do PV normalizado com a fadiga e o vigor. A dinâmica temporal foi ainda modelada ajustando-se uma função polinomial às médias diárias de cada dimensão, da qual se obtiveram, por derivação, a taxa de variação instantânea (derivada primeira), os pontos críticos (máximos e mínimos) e o ponto de inflexão (raiz da derivada segunda). A mesma componente suave foi

usada para decompor cada trajetória em sinal e ruído, quantificando a razão sinal-ruído (SNR) e permitindo uma visualização suavizada das curvas. Adotou-se nível de significância de 5% ($p < 0,05$), com as análises conduzidas em ambiente Python (bibliotecas pandas, NumPy, SciPy e statsmodels).

3 RESULTADOS

3.1 Caracterização da amostra

Tabela 1 – Distribuição da amostra por posição de jogo ($n = 27$).

Posição	n	%
Armador	11	40,7
Ala	9	33,3
Pivô	4	14,8
Goleiro	3	11,1
Total	27	100,0

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Tabela 2 – Caracterização sociodemográfica e antropométrica ($n = 27$).

Variável	Média	DP	Mín-Máx
Idade (anos)	22,0	3,8	17,0–38,0
Estatuta (cm)	182,5	6,5	170,8–200,0
Massa corporal (kg)	85,8	15,7	58,8–132,6
Percentual de gordura (%)	11,6	5,3	5,0–25,0
Experiência (anos)	10,5	3,8	6,0–23,0

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Participaram 27 atletas do sexo masculino (idade $22,0 \pm 3,8$ anos; estatura $182,5 \pm 6,5$ cm; massa corporal $85,8 \pm 15,7$ kg), distribuídos entre as posições de jogo (Tabela 1) e com caracterização sociodemográfica e antropométrica compatível com a de handebolistas de nível competitivo (Tabela 2).

3.2 Normalidade das distribuições

Tabela 3 – Teste de normalidade (Shapiro-Wilk) das dimensões do BRUMS.

Dimensão	Estatística (W)	p
Vigor	0,973	$< 0,001$
Fadiga	0,938	$< 0,001$
Tensão	0,776	$< 0,001$
Depressão	0,485	$< 0,001$
Raiva	0,651	$< 0,001$
Confusão	0,468	$< 0,001$

Fonte: dados da pesquisa (2026).

As seis dimensões não seguem distribuição normal ($p < 0,001$; Tabela 3), justificando os testes não paramétricos.

3.3 Estatística descritiva das dimensões

Tabela 4 – Estatística descritiva das dimensões do BRUMS e da PTH (286 observações).

Dimensão	Média	Mediana	DP	Mín-Máx
Tensão	1,43	1,0	1,84	0–8
Depressão	1,01	0,0	2,36	0–16
Raiva	1,64	0,0	2,82	0–14
Vigor	5,67	6,0	3,33	0–15
Fadiga	5,46	4,0	4,05	0–16
Confusão	0,51	0,0	1,26	0–8
PTH	4,38	2,0	10,05	-12–52

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A descritiva geral consta na Tabela 4: o vigor e a fadiga concentram as maiores médias e variabilidade.

3.4 Diferenças entre pré e pós-treino (com tamanho de efeito)

Tabela 5 – Diferenças entre pré e pós-treino (agregado da semana; Wilcoxon e d de Cohen).

Dimensão	Pré (M)	Pós (M)	Variação (%)	p	d de Cohen	Magnitud e
Tensão	1,30	1,60	+23%	= 0,057	+0,43	pequeno
Depressão	1,03	1,21	+17%	= 0,687	+0,24	pequeno
Raiva	1,31	1,51	+15%	= 0,745	+0,13	trivial
Vigor	5,76	4,94	-14%	= 0,025	-0,47	pequeno
Fadiga	4,61	6,28	+36%	= 0,005	+0,57	médio
Confusão	0,41	0,41	-1%	= 0,706	-0,01	trivial
PTH	2,91	6,06	+108%	= 0,009	+0,58	médio

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A resposta aguda foi consistente (Tabela 5): o vigor caiu (14%; $d = -0,47$) e a fadiga e a PTH subiram do pré para o pós, com efeito médio.

3.5 Comportamento diário e comparação entre todos os dias




Figura 1 – Comportamento das dimensões do humor ao longo da semana (médias diárias; áreas sombreadas = IC95%).

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura 2 – Diagramas de caixa (box plot) das seis dimensões do BRUMS por dia da semana.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Tabela 6 – Médias diárias das dimensões do BRUMS e teste de Friedman com W de Kendall (variação entre os sete dias).

Dimensão	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	χ^2	p	W de Kendall
Tensão	2,1	1,8	1,1	1,4	1,2	1,5	1,1	14,5	= 0,025	0,13
Depressão	0,6	1,3	0,7	1,2	0,7	1,2	1,4	3,5	= 0,751	0,03
Raiva	1,7	1,7	1,6	1,6	0,6	1,8	2,5	7,9	= 0,247	0,07
Vigor	8,3	5,4	5,5	5,4	5,9	5,7	4,4	23,6	< 0,001	0,21

Dimensão	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	χ^2	p	W de Kendall
Fadiga	3,4	5,2	5,1	5,8	5,1	6,0	7,2	17,9	= 0,007	0,16
Confusão	1,0	0,6	0,3	0,4	0,2	0,7	0,6	22,9	< 0,001	0,20
PTH	0,6	5,3	3,3	5,0	1,9	5,5	8,3	13,8	= 0,032	0,12

W de Kendall = tamanho de efeito do teste de Friedman (0,1 pequeno; 0,3 moderado; 0,5 grande).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

As médias diárias, o teste de Friedman e o W de Kendall constam na Tabela 6 (Figuras 1 e 2): houve diferença significativa entre os dias para o vigor ($p < 0,001$; $W = 0,21$), a fadiga ($p = 0,007$; $W = 0,16$), a tensão ($p = 0,025$) e a confusão ($p < 0,001$), sempre com magnitude pequena a moderada, coerente com um microciclo de acúmulo dentro da faixa funcional.

Tabela 7 – Consistência das medidas repetidas ao longo da semana (coeficiente de correlação intraclasse, ICC).

Dimensão	ICC(2,1)	ICC(2,k)	Consistência
Vigor	0,53	0,89	moderada
Fadiga	0,61	0,92	moderada
Tensão	0,64	0,93	moderada
Depressão	0,68	0,94	moderada
Raiva	0,39	0,82	pobre
Confusão	0,36	0,80	pobre

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A consistência das medidas repetidas (Tabela 7) foi moderada a boa, sendo mais baixa para a raiva e a confusão — dimensões mais reativas dia a dia.

Tabela 8 – Pós-teste (médias marginais do modelo misto) por dia, com comparação de cada dia ao Dia 1.

Dia	Vigor	Fadiga	Fadiga física
Dia 1	8,30	3,37	3,59
Dia 2	5,45*	5,18	5,44*
Dia 3	5,65*	4,84	5,81*
Dia 4	5,31*	5,70*	6,36*
Dia 5	5,80*	5,01	5,67*
Dia 6	5,63*	5,72*	6,26*
Dia 7	4,10*	6,93*	7,55*

* diferença significativa em relação ao Dia 1 (Tukey, $p < 0,05$).

Fonte: dados da pesquisa (2026).




Figura 3 – Trajetória diária (médias marginais) com comparação de todos os dias ao Dia 1 (* $p < 0,05$).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Comparando todos os dias entre si (pós-teste de Tukey; Tabela 8; Figura 3), o vigor diferiu significativamente em 9 dos 21 pares de dias e a fadiga em 6 — sempre no sentido de piora em relação aos primeiros dias —, confirmando a deterioração progressiva do eixo energia–fadiga.

3.6 Confirmação por análise multivariada (MANOVA em escores T)




Figura 4 – Perfil de humor em escores T (M = 50; DP = 10) no Dia 1 e no Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Tabela 9 – Comparação Dia 1 → Dia 7 das seis dimensões em escores T (MANOVA de medidas repetidas; $n = 21$).

Dimensão	D1 M	D1 DP	D7 M	D7 DP	F	p	d	η^2p
Tensão	54,1	11,9	47,3	9,0	7,57	= 0,012	-0,60	0,275
Depressão	47,9	4,2	51,2	14,2	1,05	= 0,317	+0,22	0,050
Raiva	52,0	10,7	53,6	14,4	0,18	= 0,678	+0,09	0,009
Vigor	58,3	10,3	45,8	7,7	37,14	< 0,001*	-1,33	0,650
Fadiga	45,0	7,6	54,7	11,5	12,73	= 0,002*	+0,78	0,389
Confusão	55,4	15,4	50,1	13,1	6,75	= 0,017	-0,57	0,252

Wilks $\lambda = 0,181$; $F(6,15) = 11,32$; $p < 0,001$; $\eta^2p = 0,82$. * $p < 0,008$ (α ajustado por Bonferroni para as seis dimensões).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A análise multivariada confirmou a diferença entre o Dia 1 e o Dia 7 (Wilks $\lambda = 0,181$; $F(6,15) = 11,32$; $p < 0,001$; $\eta^2p = 0,82$). Nos testes univariados com o critério corrigido de Bonferroni ($\alpha = 0,008$), apenas o vigor ($d = -1,33$) e a fadiga ($d = +0,78$) permaneceram significativos — evidenciando que o efeito se concentra no eixo energia–fadiga —, enquanto a tensão ($p = 0,012$) e a confusão ($p = 0,017$), significativas apenas sob $\alpha = 0,05$, não resistiram à correção (Tabela 9; Figura 4). A resposta aguda pré → pós também foi multivariadamente significativa (Wilks $\lambda = 0,539$; $p = 0,028$), reforçando o achado.

3.7 Dias de maior expressão de cada estado de humor

Tabela 10 – Dia de maior e de menor expressão de cada dimensão do humor (médias diárias).

Dimensão	Dia de maior valor	Valor	Dia de menor valor	Valor
Tensão	Dia 1	2,15	Dia 7	1,05
Depressão	Dia 7	1,35	Dia 1	0,59
Raiva	Dia 7	2,54	Dia 5	0,57
Vigor	Dia 1	8,30	Dia 7	4,43
Fadiga	Dia 7	7,22	Dia 1	3,37
Confusão	Dia 1	1,04	Dia 5	0,21
PTH	Dia 7	8,30	Dia 1	0,59

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A Tabela 10 sintetiza os dias de pico: o vigor foi máximo no Dia 1 e mínimo no Dia 7; a fadiga foi máxima no Dia 7; a tensão, máxima no Dia 1; a raiva, máxima no Dia 7; e a depressão, máxima no Dia 7. Em síntese, o início da semana reúne maior prontidão (vigor, tensão e confusão mais altos) e o final concentra a fadiga e a raiva.

3.8 Comportamento individual de cada variável e suas relações

As Figuras 5 a 10 apresentam, para cada dimensão, o comportamento ao longo da semana com a média diária, a banda de confiança de 95% (área sombreada), os diagramas

de caixa por dia e o efeito do microciclo, permitindo visualizar individualmente como cada estado de humor evolui. Nessas figuras, o efeito Dia 1 → Dia 7 é expresso pelo dz (mudança padronizada intraindividual), numericamente idêntico ao d relatado na análise multivariada (Tabela 9), e o valor de p é o do teste de Friedman apresentado na Tabela 6.




Figura 5 – Tensão ao longo da semana: média diária (banda = IC95%), diagramas de caixa por dia e efeito Dia 1 → Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura 6 – Depressão ao longo da semana: média diária (banda = IC95%), diagramas de caixa por dia e efeito Dia 1 → Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura 7 – Raiva ao longo da semana: média diária (banda = IC95%), diagramas de caixa por dia e efeito Dia 1 → Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura 8 – Vigor ao longo da semana: média diária (banda = IC95%), diagramas de caixa por dia e efeito Dia 1 → Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura 9 – Fadiga ao longo da semana: média diária (banda = IC95%), diagramas de caixa por dia e efeito Dia 1 → Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura 10 – Confusão ao longo da semana: média diária (banda = IC95%), diagramas de caixa por dia e efeito Dia 1 → Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Tabela 11 – Correlação de Spearman entre as dimensões do BRUMS com associação significativa (n = 27 atletas).

Par de dimensões	ρ	p
Vigor × Fadiga	-0,40	= 0,037
Fadiga × Depressão	+0,42	= 0,028
Fadiga × Raiva	+0,49	= 0,010
Tensão × Confusão	+0,45	= 0,017
Depressão × Raiva	+0,53	= 0,005
Depressão × Confusão	+0,43	= 0,027

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Quanto às relações entre as dimensões (Tabela 11), as dimensões negativas associam-se entre si e a fadiga relaciona-se com a depressão e a raiva; o vigor mantém-se relativamente independente. Esse acoplamento depende da carga: no dia de maior vigor a depressão é independente da fadiga ($\rho = +0,38$), mas no dia de maior fadiga torna-se forte ($\rho = +0,76$).

3.9 Classificação dos perfis de humor

A classificação de cada observação em um dos seis perfis de humor oferece uma leitura integrada e visual do estado psicológico da equipe. Ao longo do microciclo, os seis perfis estiveram representados na amostra, com reorganização de prevalência entre o baseline e o último dia de treino.




Figura 11 – Distribuição (%) dos seis perfis de humor no baseline (Dia 1) e no Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Tabela 12 – Distribuição dos perfis de humor no baseline e no último dia de treino: n (%).

Perfil	Baseline n (%)	Dia 7 n (%)
Iceberg	13 (48,1)	8 (21,6)
Everest invertido	4 (14,8)	4 (10,8)
Iceberg invertido	2 (7,4)	2 (5,4)
Submerso	1 (3,7)	5 (13,5)
Barbatana de tubarão	1 (3,7)	8 (21,6)
Superfície	6 (22,2)	10 (27,0)

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A prevalência deslocou-se do iceberg (48% no baseline) para a barbatana de tubarão (22% no Dia 7), com o iceberg recuando para 22% (Figura 11; Tabela 12). Essa reorganização categórica, contudo, não alcançou significância estatística ($\chi^2 = 8,96$; $p = 0,111$) — resultado esperado dado o pequeno número de observações distribuído por seis perfis, que reduz a contagem esperada por célula e a potência do teste qui-quadrado; a mudança é, portanto, uma tendência descritiva, coerente com a queda multivariada do vigor e a elevação da fadiga.




Figura 12 – Perfis de humor (clusters) identificados na amostra, representados em escores T (M = 50; DP = 10) nas seis dimensões; percentuais entre parênteses.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A forma de cada cluster identificado na amostra (Figura 12) reproduz a taxonomia consagrada dos seis perfis de humor (PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017): o iceberg, com vigor elevado sobre dimensões negativas baixas; a barbatana de tubarão, com pico isolado de fadiga; o submerso, com todas as dimensões abaixo da média; e o Everest invertido, com todas as negativas elevadas. Comparada à distribuição de referência de uma grande amostra do mesmo contexto brasileiro (898 atletas de elite e de base; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024) — na qual, em avaliação momentânea, o iceberg foi o perfil mais prevalente (34,3%) e os perfis de risco os menos prevalentes (barbatana de tubarão 11,6%; iceberg invertido 6,2%; Everest invertido 2,7%) —, a nossa amostra parte de um predomínio de iceberg semelhante no Dia 1 (48%), mas, ao final do microciclo, eleva marcadamente a barbatana de tubarão (22% no Dia 7), muito acima do patamar de referência. Isso evidencia o efeito específico do acúmulo de carga da última semana de pré-temporada sobre o perfil de fadiga, sem instalação relevante dos perfis de maior risco à saúde mental (Everest invertido e submerso).

3.10 Aptidão intermitente (T-CAR): regressão, comparação de modelos e limiar de pico de velocidade

Tabela 13 – Estatística descritiva do desempenho no Teste de Carminatti (T-CAR).

Parâmetro	n	Média	DP	Mín-Máx
Pico de velocidade — T-CAR (km/h)	25	14,9	1,1	13,2–17,5
Distância percorrida (m)	26	3329,3	758,9	2070,0–5360,7
Repetições completadas (n)	26	62,3	9,5	45,0–86,0

Parâmetro	n	Média	DP	Mín-Máx
FC máxima (bpm)	26	198,5	5,9	190,0–209,0
FC de pico no teste (bpm)	26	182,5	4,8	174,0–191,3
FC média no teste (bpm)	26	178,7	4,8	168,9–186,8
Recuperação da FC em 1 min (bpm)	26	27,2	3,8	19,7–37,3
Impulso de treino – TRIMP (u.a.)	26	111,8	5,4	100,2–121,8
Percepção subjetiva de esforço (0–10)	26	6,7	0,7	5,1–8,4

PV = pico de velocidade; FC = frequência cardíaca; TRIMP = training impulse.

Fonte: dados da pesquisa (2026).




Figura 13 – Dispersão e reta de regressão (com banda de IC95%) entre o pico de velocidade do T-CAR e as médias semanais de vigor, fadiga, PTH e fadiga física.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

O desempenho no T-CAR consta na Tabela 13. A regressão mostrou que atletas com maior pico de velocidade reportaram menos fadiga física ($\rho = -0,51$; $p = 0,008$) e mais vigor ($\rho = +0,47$; $p = 0,017$) ao longo da semana (Figura 13). A partir de um modelo que estima a probabilidade de um dia de fadiga elevada em função do pico de velocidade, identificou-se um limiar de aproximadamente 14,9 km/h (área sob a curva = 0,67; sensibilidade = 0,77; especificidade = 0,58): abaixo desse valor, os atletas apresentaram maior probabilidade de dias de fadiga elevada, o que fornece uma referência objetiva para individualizar a carga.

Tabela 14 – Comparação a posteriori de modelos de curva (linear, logarítmico e polinomial) para a relação entre o pico de velocidade do T-CAR e a resposta semanal de humor, por qualidade de ajuste.

Relação	Modelo	R ²	R ² ajustado	AIC	BIC	RMSE
Fadiga física × T-CAR	Linear †	0,192	0,157	93,1	96,8	1,381
	Logarítmica	0,189	0,154	93,2	96,9	1,384
	Polinomial (2º grau)	0,196	0,123	95,0	99,9	1,378
Vigor × T-CAR	Linear †	0,174	0,138	117,9	121,6	2,269
	Logarítmica	0,169	0,133	118,0	121,7	2,274
	Polinomial (2º grau)	0,180	0,106	119,7	124,6	2,259

AIC = critério de informação de Akaike; BIC = critério bayesiano; RMSE = raiz do erro quadrático médio. † modelo de melhor ajuste (menor AIC). Valores menores de AIC/BIC indicam melhor compromisso entre ajuste e parcimônia.

Fonte: dados da pesquisa (2026).




Figura 14 – Dispersão do pico de velocidade do T-CAR contra as médias semanais de fadiga física e de vigor, com os três modelos ajustados sobrepostos (o de menor AIC em linha cheia mais grossa).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Para verificar se a relação entre a aptidão e a resposta de humor seria mais bem descrita por uma forma não linear, ajustaram-se a posteriori três modelos de curva à relação entre o pico de velocidade do T-CAR e as médias semanais de fadiga física e de vigor — linear, logarítmico (ln do pico de velocidade) e polinomial de 2º grau —, comparados por R² ajustado, AIC e BIC (Tabela 14; Figura 14). Em ambas as relações, o modelo linear ofereceu o melhor compromisso entre ajuste e parcimônia (fadiga física: AIC = 93,1; vigor: AIC = 117,9); o ajuste logarítmico foi praticamente equivalente ($\Delta AIC \approx 0,1$) e o termo quadrático não compensou o parâmetro adicional (AIC maior, R² ajustado menor). Dentro da faixa de aptidão observada, portanto, a associação aptidão–humor é essencialmente linear, o que respalda descrevê-la pela reta de regressão. Para o desfecho binário — a probabilidade de um dia de fadiga elevada —, a regressão logística apresentou poder

discriminativo moderado (pseudo- R^2 de McFadden = 0,057; AUC = 0,67), e a comparação do preditor na escala bruta contra a logarítmica favoreceu marginalmente a escala bruta (AIC 203,6 vs. 204,1), mantida, assim, na definição do limiar de pico de velocidade.

3.11 Sonolência (Epworth) e estresse percebido (PSS-14)

Tabela 15 – Sonolência (Epworth, 6 itens, 0–18) e estresse percebido (PSS-14, 0–56) no microciclo: descritivos por observação e por atleta, e variação entre os dias.

Variável	M ± DP (obs.)	Mediana (mín–máx)	M ± DP (atleta)	Friedman p
Sonolência (Epworth)	9,9 ± 5,1	10 (0–18)	9,5 ± 4,4	0,027
Estresse (PSS-14)	22,0 ± 4,9	22 (9–40)	22,0 ± 4,5	0,677

Friedman: teste da variação entre os sete dias. Epworth em versão de 6 itens (sem ponto de corte clínico padrão).

Fonte: dados da pesquisa (2026).




Figura 15 – Trajetória diária (média ± IC95%) da sonolência (Epworth) e do estresse percebido (PSS-14) ao longo do microciclo.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A sonolência e o estresse percebido, coletados no mesmo diário, tiveram comportamentos distintos ao longo do microciclo (Tabela 15; Figura 15). A sonolência (Epworth) elevou-se progressivamente do primeiro ao último dia (Friedman $p = 0,027$; $W = 0,13$), padrão compatível com o acúmulo de fadiga e de débito de sono ao fim da semana de carga. No plano interindividual (média semanal por atleta), atletas mais sonolentos reportaram mais fadiga ($\rho = +0,52$; $p = 0,005$) e pior humor global (PTH; $\rho = +0,54$; $p = 0,004$), o que posiciona a sonolência como um marcador de recuperação que acompanha a resposta afetiva à carga. O estresse percebido (PSS-14), ao contrário, manteve-se estável entre os dias (Friedman $p = 0,677$) e em patamar moderado, sem associação significativa com o vigor ($\rho = -0,09$; $p = 0,643$) ou com a fadiga ($\rho = -0,15$; $p = 0,466$); nenhuma das duas variáveis diferiu entre pré e pós-treino (Epworth $p = 0,788$; PSS $p = 0,882$), coerente

com a natureza mais estável desses instrumentos. A estabilidade do estresse indica que a deterioração do humor no eixo energia–fadiga foi específica da carga de treino, e não reflexo de um aumento concomitante do estresse percebido.

3.12 Composição corporal e ajuste alométrico do pico de velocidade

Tabela 16 – Composição corporal da amostra (n = 25) e associação com a fadiga.

Variável	M ± DP	Amplitude
Massa corporal	85,8 ± 15,7	58,8–132,6 kg
Estatura	182,5 ± 6,5	170,8–200,0 cm
Gordura corporal	11,6 ± 5,3	5,0–25,0 %

Massa e estatura por antropometria; gordura corporal por dobras cutâneas.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A caracterização da composição corporal (Tabela 16) mostrou massa de 85,8 kg e gordura corporal de 11,6%. Nem a massa ($\rho = +0,32$ com a fadiga física; $p = 0,113$) nem o percentual de gordura ($\rho = +0,33$; $p = 0,113$) associaram-se significativamente à fadiga, embora com tendência positiva. Como o pico de velocidade do T-CAR depende do porte corporal, examinou-se sua escala alométrica: o expoente da relação $\log(PV)$ – $\log(\text{massa})$ foi de $-0,19$ ($r = -0,48$; $p = 0,016$), confirmando que atletas mais pesados atingem menor PV. Ao normalizar o PV pela massa elevada a esse expoente ($PV \cdot \text{massa}^{0,19}$), a associação com o vigor manteve-se praticamente inalterada ($\rho = +0,49$; $p = 0,012$), ao passo que a associação com a fadiga física atenuou-se e perdeu significância (de $\rho = -0,51$ para $\rho = -0,36$; $p = 0,082$). Ou seja, o vínculo entre aptidão e vigor é um efeito genuíno de capacidade aeróbia, independente do tamanho corporal, enquanto parte da relação entre aptidão e fadiga física é atribuível ao porte do atleta.

3.13 Modelagem polinomial das trajetórias: derivadas e taxa de variação

Tabela 17 – Modelagem polinomial (grau 3) das médias diárias do eixo energia–fadiga: qualidade do ajuste (R^2), taxa de variação média, taxa instantânea (P') e aceleração (P'') nas bordas, e ponto de inflexão.

Dimensão	R^2	Taxa média dia/dia	$P'(D1)$	$P'(D7)$	$P''(D1)$	$P''(D7)$	Inflexão (dia)
Vigor	0,96	-0,64	-3,52	-2,40	+2,51	-2,14	4
Fadiga	0,95	+0,64	+2,23	+2,11	-1,55	+1,51	4
PTH	0,80	+1,28	+5,10	+6,41	-4,25	+4,69	4

P' = derivada primeira (taxa de variação); P'' = derivada segunda (aceleração/concavidade); inflexão = raiz de $P'' = 0$. As dimensões negativas, com efeito de piso e ajuste fraco, foram omitidas.

Fonte: dados da pesquisa (2026).




Figura 16 – Ajuste polinomial $P(t)$ das médias diárias de vigor e fadiga, com a derivada $P'(t)$ (taxa de variação) e o ponto de inflexão.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Para caracterizar formalmente a dinâmica temporal, ajustou-se uma função polinomial de grau 3 às médias diárias de cada dimensão e derivaram-se as respectivas taxas de variação (Tabela 17; Figura 16). A modelagem restringiu-se ao eixo energia–fadiga (vigor, fadiga e PTH), onde os ajustes foram excelentes (vigor $R^2 = 0,96$; fadiga $R^2 = 0,95$); as dimensões negativas, próximas do piso e com variância reduzida, ajustaram-se mal e foram omitidas da modelagem. O vigor caiu a uma taxa média de $-0,64$ ponto/dia, com a maior velocidade de queda no início da semana (P' no Dia 1 = $-3,52$ ponto/dia) e desaceleração progressiva, ao passo que a fadiga subiu em espelho (taxa média = $+0,64$ ponto/dia; P' no Dia 1 = $+2,23$). A derivada segunda localizou um ponto de inflexão em torno do dia 4 para ambas — o momento em que a taxa de deterioração deixa de acelerar —, o que fornece uma leitura quantitativa do ritmo do desgaste e sinaliza a metade do microciclo como o marco a partir do qual a resposta afetiva muda de regime.

A derivada segunda (P'') descreve a aceleração da mudança e a concavidade da trajetória. No vigor, P'' é positiva no início ($+2,51$) — a queda, embora acentuada, desacelera rumo ao meio da semana — e torna-se negativa ao final ($-2,14$), quando a curva volta a se inclinar para o mínimo do Dia 7; a fadiga apresenta o padrão espelhado ($P'' = -1,55$ no Dia 1; $+1,51$ no Dia 7). A troca de sinal de P'' no dia ≈ 4 confirma, formalmente, a inflexão sincronizada das duas dimensões. Quanto ao comportamento conjunto, as curvas de taxa de variação (P') do vigor e da fadiga são praticamente imagens especulares: a correlação entre elas é de $-0,97$, indicando que a perda de energia e o ganho de fadiga aceleram e desaceleram em uníssono ao longo do microciclo. Ambas acoplam-se fortemente à Perturbação Total do Humor (fadiga–PTH = $+0,97$; vigor–PTH = $-0,88$), o que confirma, no plano das derivadas, que energia e fadiga operam como um eixo único e integrado — o mesmo eixo que domina toda a resposta afetiva à carga.

Tabela 18 – Extremos da função ajustada e limites da derivada, por dimensão: valor máximo e mínimo modelados (com o dia) e os limites da taxa de variação P' — subida máxima e queda máxima.

Dimensão	Valor máx. (dia)	Valor mín. (dia)	P' máx./subida (dia)	P' mín./queda (dia)	R ²
Tensão	2,2 (Dia 1)	1,1 (Dia 7)	+0,06 (Dia 5)	-0,87 (Dia 1)	0,80
Depressão	1,4 (Dia 7)	0,7 (Dia 1)	+0,62 (Dia 7)	-0,10 (Dia 4)	0,42
Raiva	2,6 (Dia 7)	1,1 (Dia 5)	+1,63 (Dia 7)	-0,35 (Dia 3)	0,73
Vigor	8,2 (Dia 1)	4,4 (Dia 7)	+0,55 (Dia 4)	-3,52 (Dia 1)	0,96
Fadiga	7,3 (Dia 7)	3,4 (Dia 1)	+2,23 (Dia 1)	-0,13 (Dia 4)	0,95
Confusão	1,0 (Dia 1)	0,3 (Dia 4)	+0,13 (Dia 5)	-0,67 (Dia 1)	0,85
PTH	8,6 (Dia 7)	0,9 (Dia 1)	+6,41 (Dia 7)	-0,97 (Dia 4)	0,80

Valores e taxas extraídos da função polinomial P(t) no intervalo [Dia 1; Dia 7]. Para as dimensões negativas (baixo R²; efeito de piso), os extremos modelados são apenas indicativos. Os máximos/mínimos observados constam na tabela de dias de pico (seção 3.7).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Os extremos das funções ajustadas e os limites de suas derivadas (Tabela 18) delimitam quantitativamente a resposta. O vigor varia entre um máximo de 8,2 pontos no Dia 1 e um mínimo de 4,4 no Dia 7, com a taxa de variação confinada entre -3,52 ponto/dia (queda máxima, no Dia 1) e +0,55 ponto/dia (leve recuperação em torno do meio da semana); a fadiga percorre o intervalo inverso (mínimo de 3,4 no Dia 1; máximo de 7,3 no Dia 7), com taxa entre -0,13 e +2,23 ponto/dia. Esses limites confirmam que a maior velocidade de mudança ocorre no início do microciclo e que o sistema afetivo opera dentro de uma faixa de variação bem definida.




Figura 17 – Cruzamento energia–fadiga: curvas suavizadas de vigor e fadiga com os pontos exatos de interseção (×) e a área entre elas. O vigor parte muito acima e a fadiga o ultrapassa ao longo da semana.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A sobreposição das curvas suavizadas de vigor e fadiga permite localizar o momento exato de sua inversão (Figura 17). No primeiro dia, o vigor supera a fadiga por ampla margem (4,9 pontos); essa vantagem colapsa já no Dia 2, e as duas dimensões passam a se cruzar repetidamente na região central da semana — os pontos de interseção das funções ocorrem nos dias 2, 4, 6 — refletindo um período em que energia e fadiga ficam estatisticamente entrelaçadas. A partir do último cruzamento (Dia 6), a fadiga assume e se distancia do vigor, encerrando a semana 2,8 pontos acima. Esse cruzamento energia–fadiga é a assinatura gráfica da migração do perfil de prontidão para o perfil de fadiga.

3.14 Decomposição sinal–ruído e suavização das trajetórias

Tabela 19 – Decomposição sinal–ruído das trajetórias diárias: proporção de sinal (variância explicada pela componente suave) e de ruído (resíduo), razão sinal-ruído (SNR) e SNR em decibéis.

Dimensão	Sinal	Ruído	SNR	SNR (dB)
Tensão	80%	20%	4,1	+6,1
Depressão	42%	58%	0,7	-1,4
Raiva	73%	27%	2,7	+4,3
Vigor	96%	4%	25,1	+14,0
Fadiga	95%	5%	18,1	+12,6
Confusão	85%	15%	5,6	+7,4
PTH	80%	20%	4,0	+6,1

Sinal = componente suave (polinômio ajustado); ruído = resíduo em torno do sinal. SNR = variância do sinal / variância do ruído.

Fonte: dados da pesquisa (2026).




Figura 18 – Trajetórias diárias suavizadas: sinal (curva) sobreposto às médias diárias observadas (pontos), separando a tendência do ruído. A) eixo energia–fadiga; B) subescalas negativas.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Para separar a tendência sistemática (sinal) do ruído de amostragem e obter uma leitura visual mais limpa, cada trajetória diária foi decomposta em uma componente suave — a função polinomial ajustada — e um resíduo (Tabela 19; Figura 18). A suavização é altamente informativa no eixo energia–fadiga: o vigor e a fadiga são quase inteiramente sinal (96% e 95% da variância; razão sinal-ruído de 25,1 e 18,1, ou +14,0 e +12,6 dB), de modo que suas curvas suavizadas revelam com nitidez o cruzamento energia–fadiga em torno da metade da semana. Nas dimensões negativas, próximas do piso, a fração de ruído é muito maior — na depressão, o ruído (58%) supera o sinal (42%; $SNR = 0,7$), o que explica por que suas oscilações diárias não devem ser sobreinterpretadas. Em termos aplicados, a decomposição indica que o monitoramento deve priorizar o vigor e a fadiga, cujo sinal é robusto, e tratar as pequenas variações das dimensões negativas com a devida cautela.

3.15 Modelagem individual: trajetórias por atleta




Figura 19 – Trajetórias individuais de vigor e fadiga por atleta (linhas finas) e a média do grupo (linha grossa), evidenciando a heterogeneidade da resposta.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Além da tendência do grupo, a resposta foi modelada por atleta, ajustando-se a cada participante a sua própria trajetória ao longo da semana (Figura 19). A cobertura permitiu a modelagem individual: 19 dos 27 atletas responderam nos sete dias e 24 têm dados suficientes (≥ 4 dias) para um ajuste polinomial individual; para todos foi possível estimar a taxa de variação individual. Em média, o vigor caiu -0,48 ponto/dia (DP 0,52) e a fadiga subiu +0,39 ponto/dia (DP 0,67), mas com nítida heterogeneidade entre atletas: 78% apresentaram a queda esperada de vigor e 78% o aumento esperado de fadiga, enquanto os demais mantiveram-se estáveis ou responderam na direção oposta. Essa dispersão das inclinações individuais mostra que a média do grupo convive com respondedores e não respondedores, reforçando o valor do monitoramento individualizado — a mesma carga produz trajetórias afetivas distintas.

3.16 Trajetória em alta resolução: 13 pontos pré/pós




Figura 20 – Trajetória do grupo em 13 pontos temporais (baseline + pré e pós-treino de cada dia), revelando a dinâmica intradiária além da média diária.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Aproveitando as duas coletas diárias dos dias de treino, a trajetória do grupo foi reconstruída em alta resolução, com 13 pontos temporais — a linha de base e os momentos pré e pós de cada um dos seis dias de treino (Figura 20). Essa resolução revela a dinâmica intradiária que a média diária mascara: em cada dia de treino, o vigor tende a cair e a fadiga (e a PTH) a subir do pré para o pós, com recuperação parcial na manhã seguinte — um padrão de dente de serra sobreposto à tendência semanal de queda de energia e acúmulo de fadiga. A leitura de alta resolução, portanto, confirma que a deterioração semanal resulta da soma de perturbações agudas incompletamente revertidas entre as sessões.

3.17 Auditoria de robustez: filtragem de sinal e ruído

Tabela 20 – Auditoria de robustez: principais resultados antes e depois da remoção de 11 observações atípicas (3.8% do total) por distância de Mahalanobis.

Métrica	Dados brutos	Dados filtrados
Vigor D1→D7 (dz)	-1,33	-1,32
Fadiga D1→D7 (dz)	+0,78	+0,73
MANOVA (Wilks λ)	0,181	0,180
Vigor Friedman (p)	0,0006	0,0010
Fadiga Friedman (p)	0,0066	0,0163
ρ fadiga × fadiga física	+0,72	+0,68

Filtro: observações com distância de Mahalanobis nas seis subescalas acima do limiar de $p < 0,001$.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Por fim, para verificar se as conclusões dependem de ruído amostral, todas as análises centrais foram reexecutadas após filtragem: identificaram-se e removeram-se 11

observações multivariadamente atípicas (3,8% do total) e os principais resultados foram recomputados (Tabela 20). A filtragem praticamente não alterou nada — o tamanho de efeito da queda de vigor (dz de -1,33 para -1,32) e do aumento de fadiga, a MANOVA (Wilks λ de 0,181 para 0,180), os testes de Friedman e as correlações-chave mantiveram magnitude, direção e significância. Essa estabilidade confirma que os achados do estudo são robustos e refletem sinal sistemático, e não artefatos de observações ruidosas.

4 DISCUSSÃO

O presente estudo caracterizou o comportamento do humor de handebolistas de elite ao longo da última semana de pré-temporada, e o achado central é inequívoco: a deterioração concentrou-se no eixo energia–fadiga. O vigor caiu e a fadiga subiu de forma consistente, tanto na resposta aguda a cada treino (pré $\rightarrow$ pós: vigor -14%, $d = -0,47$; fadiga +36%, $d = +0,57$) quanto na comparação do primeiro ao último dia (vigor $d = -1,33$; fadiga $d = +0,78$). A robustez desse achado é sustentada por três abordagens convergentes — o pós-teste do modelo misto comparando todos os dias, o teste de Friedman e a análise multivariada em escores T (Wilks $\lambda = 0,181$; $F(6,15) = 11,32$; $p < 0,001$; $\eta^2p = 0,82$). Sob o critério conservador de Bonferroni, apenas o vigor ($\eta^2p = 0,65$) e a fadiga ($\eta^2p = 0,39$) permaneceram significativos, enquanto as dimensões negativas de valência não fadiga, próximas do piso, mantiveram-se estáveis. Confirma-se, assim, que o vigor e a fadiga são as dimensões subjetivas mais sensíveis à carga de treino, em consonância com a literatura de monitoramento (SAW; MAIN; GASTIN, 2016; THORPE et al., 2017; KELLMANN et al., 2018).

Para além de confirmar a deterioração, os resultados detalham a sua dinâmica temporal — o “quando”, tão relevante para a prática. O humor mais positivo concentrou-se no início da semana (vigor máximo no Dia 1) e a fadiga acumulou-se progressivamente até o pico no último dia (Dia 7), acompanhada da raiva e da Perturbação Total do Humor. Sobrepõem-se dois processos: um choque agudo intra-sessão, em que o vigor cai e a fadiga sobe do pré ao pós a cada treino, e um acúmulo ao longo da semana, que desloca o eixo energia–fadiga rumo ao final do microciclo — como evidenciado pelo pós-teste, em que os dias finais diferem significativamente do Dia 1. Essa leitura temporal é diretamente acionável: sinaliza que o reforço da recuperação deve concentrar-se na transição do início da semana (choque de carga) e no encerramento do microciclo (fadiga acumulada), pontos em que o estado psicofisiológico é mais desfavorável.

Um aspecto metodológico distingue este estudo da tradição descritiva do perfilamento do humor. A literatura clássica caracteriza o humor de atletas por instantâneos — o perfil de um momento — ou, quando muito, por comparações de médias entre condições (LOCHBAUM et al., 2021). Aqui, ao ajustar uma função polinomial às

trajetórias diárias e dela extrair as derivadas, passou-se de uma descrição estática para uma leitura dinâmica e quantitativa do humor, na linha do que Cockerill, Nevill e Lyons (1991) propuseram ao modelar estados de humor com finalidade prescritiva, e não apenas descritiva. A derivada primeira quantifica a velocidade da deterioração e a derivada segunda localiza o momento em que essa velocidade deixa de acelerar (inflexão em torno do Dia 4), fornecendo à comissão técnica não apenas o quanto, mas o ritmo e a aceleração do desgaste — informação alinhada ao papel do monitoramento do humor como indicador precoce de sobrecarga e de excesso de treinamento (FEIJEN et al., 2020; NEDERHOF et al., 2007) e à dinâmica dia-a-dia entre carga de treino e humor descrita em outras modalidades (HAMLIN et al., 2019; ALFONSO; CAPDEVILA, 2022). A decomposição sinal-ruído, por sua vez, agrega rigor à interpretação: ao mostrar que o vigor e a fadiga são quase inteiramente sinal, ao passo que as dimensões negativas próximas do piso são dominadas por ruído, ela fundamenta quantitativamente a decisão de centrar o monitoramento no eixo energia-fadiga e de não sobreinterpretar as pequenas oscilações das demais subescalas — uma resposta direta às conhecidas limitações de fidedignidade e de efeito de piso dessas dimensões em amostras de elite (TERRY; LANE; FOGARTY, 2003). Por fim, o cruzamento energia-fadiga, obtido das curvas suavizadas, condensa em um único marcador visual e objetivo o instante em que a fadiga supera o vigor — evento que o acompanhamento diário isolado dificilmente tornaria tão explícito.

O caráter do handebol ajuda a contextualizar a magnitude dessa resposta. Trata-se de uma modalidade coletiva de invasão, marcadamente intermitente, na qual ações de alta intensidade — sprints, saltos, arremessos, bloqueios, mudanças de direção e contatos — alternam-se com períodos de recuperação incompleta, exigindo simultaneamente potência anaeróbia e capacidade aeróbia intermitente para sustentar o esforço repetido e retardar a instalação da fadiga (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; MICHALSIK; AAGAARD, 2015). Evidências atuais confirmam que o treino e o jogo de handebol constituem exercício de alta intensidade, com elevadas demandas aeróbias e anaeróbias (PEREIRA et al., 2024), e que os esportes de invasão se caracterizam por atividade intermitente de alta intensidade intercalada por recuperação de menor intensidade (VACCARO-BENET et al., 2024). Nesse contexto, o acúmulo de carga da última semana de pré-temporada explica tanto a deterioração do eixo energia-fadiga quanto a migração do perfil de humor observadas, reforçando por que o vigor e a fadiga foram as dimensões mais sensíveis do painel.

Um achado de particular interesse foi a natureza dependente da carga na relação entre o afeto negativo e a fadiga. No dia de maior vigor (Dia 1, grupo descansado), as dimensões negativas mostraram-se praticamente independentes da fadiga (depressão $\times$ fadiga $p = +0,38$; raiva $\times$ fadiga $p = +0,18$); no dia de maior fadiga (Dia 7), esse acoplamento tornou-se forte (depressão $\times$ fadiga $p = +0,76$; raiva $\times$ fadiga $p = +0,65$). Em

outras palavras, quando a equipe está recuperada, o atleta mais irritado ou abatido não é necessariamente o mais cansado; sob carga acumulada, porém, a irritabilidade e o abatimento organizam-se em torno da exaustão e o perfil de humor “fecha”. Esse padrão indica que a interpretação das dimensões negativas deve considerar o estado de fadiga do grupo, e que a elevação conjunta de afeto negativo e fadiga ao fim de um microciclo intenso é, em atletas de elite, uma resposta esperada à carga, e não necessariamente sinal de desajuste.

No plano dos perfis de humor, o deslocamento de prevalência do iceberg (prontidão) para a barbatana de tubarão (fadiga funcional) ao longo da semana — uma tendência descritiva, já que a diferença categórica não atingiu significância — reproduz, em um microciclo de handebol, o “derretimento do iceberg” descrito na literatura de sobrecarga (MORGAN, 1985; HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020). É relevante que, mesmo sob o acúmulo de carga da pré-temporada, os perfis associados a maior risco à saúde mental (Everest invertido, submerso e iceberg invertido) não se tornaram prevalentes: a deterioração restringiu-se ao perfil de fadiga, cuja prevalência no último dia (22%) superou nitidamente o patamar de referência de atletas do mesmo contexto brasileiro (11,6% em avaliação momentânea; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024). Esse contraste sugere que, em handebolistas de elite bem condicionados, a resposta ao acúmulo de carga é funcional e transitória — uma fadiga esperada — e não um sinal de risco psicológico. Tal leitura respalda o emprego do perfilamento do humor como triagem de prontidão e de bem-estar em modalidades coletivas de rendimento (TERRY et al., 2021), no qual a BRUMS já demonstrou sensibilidade a fatores como sono, desempenho e resultados de partida (ANDRADE et al., 2016; BRANDT; BEVILACQUA; ANDRADE, 2017; DO NASCIMENTO et al., 2026) e associação com desfechos como a lesão (DE MIRANDA ROHLFS et al., 2025).

O caráter transitório dessa resposta deve ser lido à luz da posição do microciclo no planejamento. A última semana de pré-temporada corresponde a uma fase de acumulação de carga, que antecede o afinamento (tapering) e a competição. Nesse enquadramento, a queda de vigor e a elevação de fadiga aqui documentadas configuram a assinatura afetiva esperada do acúmulo, e não um estado estável: o modelo de equilíbrio entre estresse e recuperação prevê que, com a redução da carga e o reforço da recuperação nos dias subsequentes, o vigor tende a ser restaurado e o perfil de prontidão (iceberg) a se reinstalar (KELLMANN et al., 2018). Interpretar a fadiga do fim do microciclo como um vale programado — e não como deterioração — é justamente o que habilita a comissão técnica a distinguir a resposta funcional daquela que exigiria intervenção, e reforça o valor de manter o monitoramento do humor na transição para o afinamento, quando a recuperação do estado afetivo é esperada e verificável.

A inclusão do pico de velocidade do T-CAR como parâmetro fisiológico acrescentou uma leitura interindividual à resposta afetiva. Atletas com maior aptidão aeróbia intermitente reportaram mais vigor ($\rho = +0,47$; $p = 0,017$) e menos fadiga física ($\rho = -0,51$; $p = 0,008$) ao longo da semana, e um limiar de pico de velocidade de aproximadamente 14,9 km/h discriminou os dias de maior fadiga (área sob a curva = 0,67). Esse resultado é coerente com o papel da capacidade aeróbia intermitente em sustentar e repetir esforços de alta intensidade — acelerando a recuperação entre ações e retardando a fadiga — e, portanto, em modular a tolerância à carga do handebol, e com a validade do pico de velocidade do T-CAR como marcador de desempenho físico em modalidades intermitentes (FERNANDES-DA-SILVA et al., 2016). Do ponto de vista aplicado, normalizar a resposta de humor pela aptidão física ajuda a distinguir a fadiga esperada — de atletas menos aptos sob a mesma carga — daquela que possa sinalizar sobrecarga, e o limiar identificado oferece à comissão técnica uma referência objetiva para individualizar a prescrição da carga e o reforço da recuperação. O ajuste alométrico refinou essa leitura: como o pico de velocidade escala negativamente com a massa (expoente -0,19), parte da relação entre aptidão e fadiga física reflete o porte corporal e não apenas a capacidade aeróbia — ao normalizar o PV pela massa, essa associação se atenua. Já a relação entre aptidão e vigor resistiu ao ajuste, evidenciando um efeito genuíno de capacidade aeróbia sobre o estado de energia, independentemente do tamanho do atleta.

A comparação a posteriori de modelos de curva reforça a leitura dessa relação e agrega parcimônia à sua interpretação. Testadas as formas linear, logarítmica e polinomial, o modelo linear mostrou o melhor compromisso entre ajuste e parcimônia para a fadiga física e para o vigor (menores AIC e BIC), com o ajuste logarítmico praticamente equivalente e sem ganho do termo quadrático — indicando que, na faixa de aptidão desta amostra, cada incremento de pico de velocidade se associa a uma variação aproximadamente constante da resposta de humor, sem evidência de saturação ou de limiar de rendimentos decrescentes. Esse resultado justifica descrever a associação pela reta de regressão e, ao mesmo tempo, delimita o alcance do modelo: uma relação linear estimada em uma faixa estreita de aptidão não deve ser extrapolada para além dela. Para o desfecho binário, a regressão logística — cuja qualidade de ajuste foi documentada pelo pseudo- R^2 de McFadden e pelos critérios de informação — sustentou o limiar de pico de velocidade como ferramenta prática de triagem, preferindo-se o preditor na escala bruta, de leitura mais direta para a comissão técnica.

A sonolência e o estresse percebido acrescentaram duas leituras convergentes com o padrão central. A sonolência (Epworth) acompanhou a semana de carga, elevando-se rumo ao último dia e associando-se, entre atletas, a mais fadiga e pior humor global — um marcador de recuperação/sono que corrobora, no plano comportamental, a deterioração do

eixo energia–fadiga e reforça a recomendação de vigiar o sono na fase de acumulação (KELLMANN et al., 2018). Já o estresse percebido (PSS-14) permaneceu estável e moderado, sem se relacionar à oscilação do humor; essa ausência de variação é informativa, pois indica que a resposta afetiva ao microciclo teve origem na carga de treino, e não em um aumento concomitante do estresse psicossocial percebido — um argumento a favor da especificidade do achado.

Algumas limitações devem ser consideradas na interpretação dos achados. O tamanho amostral (27 atletas) e o desenho observacional de fase única não permitem inferência causal sobre a carga, e as dimensões negativas, próximas do piso, apresentam variância e fidedignidade reduzidas, o que limita a leitura de suas pequenas variações. A conversão dos escores T foi referenciada à própria amostra — e não a tabelas normativas nacionais de atletas —, o que recomenda cautela na comparação absoluta de prevalências entre estudos e na classificação estrita dos perfis. A sonolência foi medida por uma versão de 6 itens do Epworth (sem ponto de corte clínico validado) e o estresse, pela PSS-14, cujo horizonte de referência é mais amplo que o microciclo; por isso, essas variáveis foram interpretadas por sua média semanal por atleta, e não por flutuações diárias. Como direções futuras, recomenda-se ampliar a amostra e acompanhar múltiplos microciclos, integrar o humor a marcadores de carga externa e interna mensurados continuamente, adotar tabelas normativas e agrupamento semeado (seeded k-means) para a classificação de perfis e testar o valor preditivo dos perfis negativos para desfechos como lesão e sobrecarga (DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024, 2025).

5 CONCLUSÕES

Na última semana de pré-temporada, o humor dos handebolistas migrou da prontidão para a fadiga, com o vigor em queda e a fadiga em ascensão, do início ao fim da semana e dentro de cada treino, confirmado por comparações entre todos os dias e por análise multivariada. Os dias críticos foram identificados — maior vigor no início e maior fadiga no final —, e a aptidão intermitente mostrou-se associada à fadiga, com um limiar de pico de velocidade útil para individualizar a carga. Recomenda-se o acompanhamento contínuo do humor, com atenção especial ao eixo energia–fadiga.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, A. et al. Sleep quality, mood and performance: a study of elite Brazilian volleyball athletes. *Journal of Sports Science and Medicine*, v. 15, n. 4, p. 601–605, 2016.
- ANDRADE, A. et al. Effect of practice exergames on the mood states and self-esteem of elementary school boys and girls during physical education classes: a cluster-randomized controlled trial. *PLoS ONE*, v. 15, n. 6, e0232392, 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0232392.

ALFONSO, C.; CAPDEVILA, L. Heart rate variability, mood and performance: a pilot study on the interrelation of these variables in amateur road cyclists. *PeerJ*, v. 10, e13094, 2022. DOI: 10.7717/peerj.13094.

BRANDT, R.; BEVILACQUA, G. G.; ANDRADE, A. Perceived sleep quality, mood states, and their relationship with performance among Brazilian elite athletes during a competitive period. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 31, n. 4, p. 1033–1039, 2017.

COCKERILL, I. M.; NEVILL, A. M.; LYONS, N. Modelling mood states in athletic performance. *Journal of Sports Sciences*, v. 9, n. 2, p. 205–212, 1991. DOI: 10.1080/02640419108729881.

DE MIRANDA ROHLFS, I. C. P. et al. Prevalence of specific mood profile clusters among elite and youth athletes at a Brazilian sports club. *Sports*, v. 12, n. 7, 195, 2024. DOI: 10.3390/sports12070195.

DE MIRANDA ROHLFS, I. C. P. et al. Mood states, injury status, and countermovement jump performance in Brazilian high-level sports. *Sports*, v. 13, n. 9, 303, 2025. DOI: 10.3390/sports13090303.

DO NASCIMENTO, M. H. et al. Acute psychological responses to official match outcomes in male youth volleyball: an observational repeated-measures study within a single national-level team. *Frontiers in Psychology*, v. 17, 1826372, 2026. DOI: 10.3389/fpsyg.2026.1826372.

FEIJEN, S. et al. Monitoring the swimmer's training load: a narrative review of monitoring strategies applied in research. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, v. 30, n. 11, p. 2037–2043, 2020. DOI: 10.1111/sms.13798.

FERNANDES-DA-SILVA, J. et al. The peak velocity derived from the Carminatti Test is related to physical match performance in young soccer players. *Journal of Sports Sciences*, v. 34, n. 24, p. 2238–2245, 2016. DOI: 10.1080/02640414.2015.1093646.

HAN, C.; PARSONS-SMITH, R. L.; TERRY, P. C. Mood profiling in Singapore: cross-cultural validation and potential applications of mood profile clusters. *Frontiers in Psychology*, v. 11, 665, 2020. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00665.

HAMLIN, M. J. et al. Monitoring training loads and perceived stress in young elite university athletes. *Frontiers in Physiology*, v. 10, 34, 2019. DOI: 10.3389/fphys.2019.00034.

KARCHER, C.; BUCHHEIT, M. On-court demands of elite handball, with special reference to playing positions. *Sports Medicine*, v. 44, n. 6, p. 797–814, 2014. DOI:

10.1007/s40279-014-0164-z.

KELLMANN, M. et al. Recovery and performance in sport: consensus statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 13, n. 2, p. 240–245, 2018. DOI: 10.1123/ijsp.2017-0759.

LOCHBAUM, M. et al. The Profile of Mood States and athletic performance: a meta-analysis of published studies. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, v. 11, n. 1, p. 50–70, 2021. DOI: 10.3390/ejihpe11010005.

MICHALSIK, L. B.; AAGAARD, P. Physical demands in elite team handball: comparisons between male and female players. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, v. 55, n. 9, p. 878–891, 2015.

MORGAN, W. P. Selected psychological factors limiting performance: a mental health model. In: CLARKE, D. H.; ECKERT, H. M. (Ed.). *Limits of human performance*. Champaign: Human Kinetics, 1985. p. 70–80.

NEDERHOF, E. et al. Different diagnostic tools in nonfunctional overreaching. *International Journal of Sports Medicine*, v. 29, n. 7, p. 590–597, 2007. DOI: 10.1055/s-2007-989264.

NEVILL, A. M.; LANE, A. M. Why self-report “Likert” scale data should not be log-transformed. *Journal of Sports Sciences*, v. 25, n. 1, p. 1–2, 2007. DOI: 10.1080/02640410601111183.

PARSONS-SMITH, R. L.; TERRY, P. C.; MACHIN, M. A. Identification and description of novel mood profile clusters. *Frontiers in Psychology*, v. 8, 1958, 2017. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01958.

PEREIRA, R. et al. Exercise intensity and reliability during recreational team handball training for 50–77-year-old unexperienced women. *Biology of Sport*, v. 41, n. 4, p. 253–261, 2024. DOI: 10.5114/biol sport.2024.132995.

ROHLFS, I. C. P. M. et al. A Escala de Humor de Brunel (Brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 14, n. 3, p. 176–181, 2008.

ROHLFS, I. C. P. M. et al. Psychometric characteristics of the Brazil Mood Scale among youth and elite athletes using two response time frames. *Sports*, v. 11, n. 12, 244, 2023. DOI: 10.3390/sports11120244.

SAW, A. E.; MAIN, L. C.; GASTIN, P. B. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, v. 50, n. 5, p. 281–291, 2016. DOI:

10.1136/bjsports-2015-094758.

TERRY, P. C.; LANE, A. M.; FOGARTY, G. J. Construct validity of the Profile of Mood States — Adolescents for use with adults. *Psychology of Sport and Exercise*, v. 4, n. 2, p. 125–139, 2003. DOI: 10.1016/S1469-0292(02)00035-8.

TERRY, P. C. et al. Mood profiling for sustainable mental health among athletes. *Sustainability*, v. 13, n. 11, 6116, 2021. DOI: 10.3390/su13116116.

VACCARO-BENET, P. et al. Internal and external load profile during beach invasion sports match-play by electronic performance and tracking systems: a systematic review. *Sensors*, v. 24, n. 12, 3738, 2024. DOI: 10.3390/s24123738.

WAGNER, H. et al. Individual and team performance in team-handball: a review. *Journal of Sports Science and Medicine*, v. 13, n. 4, p. 808–816, 2014.