

DINÂMICA DO HUMOR EM UM MICROCICLO PRÉ-COMPETITIVO DE HANDEBOL DE ELITE: PERFIS DE HUMOR E O EIXO ENERGIA-FADIGA

(versão resumida para apreciação)

RESUMO

Objetivo: descrever e caracterizar a dinâmica do humor de atletas de handebol de elite ao longo de um microciclo pré-competitivo, com ênfase no eixo energia-fadiga, no comportamento dos seis perfis de humor, na resposta aguda pré e pós-treino e na forma temporal das trajetórias. **Método:** 27 atletas do sexo masculino responderam ao BRUMS-24 durante sete dias, com uma coleta de linha de base e duas coletas diárias (pré e pós-treino) nos seis dias de treino, e um total de 286 observações. Além da estatística descritiva, da consistência interna e da classificação dos perfis, as comparações entre dias e entre pré e pós-treino incluíram o tamanho e a magnitude do efeito, e as trajetórias foram analisadas por suavização, segundas derivadas, ajuste polinomial e localização dos cruzamentos entre as dimensões. **Resultados:** a deterioração concentrou-se no eixo energia-fadiga: o vigor caiu e a fadiga subiu do primeiro para o último dia, com efeito grande ($d = -1,33$ e $d = 0,78$) e confirmação multivariada (Wilks $\lambda = 0,181$; $p < 0,001$). As trajetórias suavizadas apresentaram um ponto de inflexão na metade da semana, e a fadiga ultrapassou o vigor de forma definitiva no fim do microciclo, com a PTH a superar ambas as dimensões. A prevalência dos perfis deslocou-se do iceberg (48% no primeiro dia) para a barbatana de tubarão (22% no último dia), com aumento da chance desse perfil a cada dia (OR = 1,37). **Conclusão:** o humor migrou da prontidão para a fadiga funcional, em um padrão compatível com sobre-esforço funcional, o que recomenda centrar o monitoramento no par vigor-fadiga e no cruzamento entre as suas curvas.

Palavras-chave: humor; BRUMS; handebol; perfis de humor; fadiga; monitoramento do atleta.

1 INTRODUÇÃO

O monitoramento do estado do atleta consolidou-se como parte da gestão do treinamento no esporte de rendimento, e integra medidas objetivas de carga externa e interna a instrumentos subjetivos de autorrelato (HELWIG et al., 2023; KELLMANN et al., 2018). Entre esses instrumentos, os questionários de humor destacam-se pela praticidade, pelo baixo custo e pela sensibilidade às variações da carga, e mostram utilidade para o acompanhamento do bem-estar e do desempenho (SAW; MAIN; GASTIN, 2016; LOCHBAUM et al., 2021). Revisões sistemáticas indicam, inclusive, que as medidas subjetivas costumam responder às alterações de carga com sensibilidade igual ou superior à

de muitos marcadores objetivos, o que sustenta o seu uso rotineiro (SAW; MAIN; GASTIN, 2016). Por esse motivo, documentos de consenso recomendam a vigilância regular da fadiga e da recuperação como base para as decisões de treino (KELLMANN et al., 2018).

A Escala de Humor de Brunel (BRUMS) operacionaliza essa avaliação por meio de seis dimensões, a saber, tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão, com propriedades psicométricas replicadas em diferentes idiomas e culturas (TERRY; LANE; FOGARTY, 2003; TERRY et al., 2022). A versão em português dispõe de validação para o contexto brasileiro e foi concebida, desde a origem, como ferramenta de detecção precoce de sinais associados ao excesso de treinamento (ROHLFS et al., 2008). A partir das seis dimensões calcula-se a perturbação total do humor (PTH), um índice-resumo do desequilíbrio afetivo que sintetiza o estado do atleta em um único valor e cuja associação com o desempenho tem sido documentada em meta-análise (LOCHBAUM et al., 2021).

Para além dos escores isolados, o modelo dos perfis de humor organiza as seis dimensões em padrões reconhecíveis. O clássico perfil iceberg, com o vigor acima da média e as dimensões negativas rebaixadas, foi descrito no modelo de saúde mental como marca do atleta em prontidão (MORGAN, 1985). Estudos posteriores, com grandes amostras e análise de agrupamento, identificaram e replicaram seis perfis distintos, entre os quais o iceberg, a barbatana de tubarão, que sinaliza fadiga com vigor ainda preservado, e perfis de maior risco, como o iceberg invertido e o submerso (PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017; LUOJUMÄKI et al., 2026). A leitura por perfis aproxima o dado psicométrico da linguagem do treinador, facilita a comunicação com a comissão técnica e tem sido proposta como recurso de rastreio da saúde mental no esporte (TERRY et al., 2021; HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020; LEW et al., 2023).

Entre as seis dimensões, o vigor e a fadiga formam o eixo mais responsivo à carga e concentram boa parte do valor prático do monitoramento. Sob intensificação do treino, o vigor tende a cair e a fadiga a subir, um padrão observado em atletas de diferentes modalidades e sensível também à privação de sono (FERREIRA et al., 2026; PIERCE, 2002). Esse eixo responde ainda de forma aguda a cada sessão ou competição, com oscilações mensuráveis entre os momentos pré e pós-esforço, o que recomenda coletas repetidas dentro do dia, e não apenas entre dias (DO NASCIMENTO et al., 2026).

A leitura conjunta dessas variações remete ao continuum do sobre-esforço. A distinção entre o sobre-esforço funcional, o sobre-esforço não funcional e a síndrome de overtraining é hoje descrita como um processo gradual, de difícil diagnóstico por um único marcador, no qual a fadiga central e a piora do humor figuram entre os sinais mais precoces (ROETE et al., 2021; LA TORRE et al., 2023; M■NESCU et al., 2026). Nesse quadro, o

acompanhamento do humor oferece um marcador sensível, de baixo custo e não invasivo, complementar aos marcadores fisiológicos, para vigiar a janela em que o sobre-esforço funcional é buscado de forma planejada (THORPE et al., 2017).

O handebol oferece um cenário exigente para essa vigilância. A modalidade é coletiva, intermitente e de alta intensidade, com sprints curtos, mudanças de direção, saltos, arremessos e contato físico, o que impõe elevada demanda neuromuscular e psicofisiológica, variável por posição de jogo (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; GARCÍA-SÁNCHEZ et al., 2023; CARTON-LLORENTE et al., 2023). O monitoramento longitudinal da carga interna ao longo da temporada e a atenção à fadiga, inclusive a mental, já foram descritos como relevantes para o rendimento na modalidade (STRUZIK; NADOBNIK; STPIE-SODKOWSKA, 2026; STAIANO et al., 2025). A acumulação de carga na semana tende, assim, a corroer o vigor e a elevar a fadiga, um padrão que, quando controlado, caracteriza o sobre-esforço funcional e antecede a recuperação planejada.

Apesar do interesse crescente, poucos estudos descrevem, dentro de um único microciclo de handebol de elite, a migração dos perfis de humor e a forma temporal exata das trajetórias do eixo energia–fadiga, com coletas pré e pós-treino que capturam também a variação dentro do dia (DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024; BIRD et al., 2025; RATZ-SULYOK et al., 2026). A Figura 1 resume o quadro conceitual que orienta este trabalho.




Figura 1 – Quadro conceitual do monitoramento do humor no eixo energia–fadiga: a carga do microciclo altera as dimensões do BRUMS, com queda do vigor e elevação da fadiga e da PTH, o que desloca os perfis de humor em direção à barbatana de tubarão, dentro da janela do sobre-esforço funcional, e retroalimenta as decisões de treino e recuperação.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

2 OBJETIVO

Descrever e caracterizar a dinâmica do humor de atletas de handebol de elite ao longo de um microciclo pré-competitivo, com quatro focos articulados: (i) o comportamento dos seis perfis de humor e a sua migração entre o primeiro e o último dia; (ii) a magnitude dos efeitos no eixo energia–fadiga, entre dias e entre pré e pós-treino; (iii) a forma temporal das trajetórias de vigor, fadiga e PTH, por meio de suavização, análise das segundas derivadas, ajuste polinomial e localização dos cruzamentos exatos entre as dimensões; e (iv) a leitura desse conjunto como um quadro de sobre-esforço funcional útil ao monitoramento aplicado.

3 MÉTODO

Participaram 27 atletas de handebol do sexo masculino, de nível de elite (idade de $22,0 \pm 3,8$ anos; $10,5 \pm 3,8$ anos de prática), das posições de armador, ala, pivô e goleiro. O humor foi avaliado pela BRUMS-24, que reúne seis dimensões (tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão) com escores de 0 a 16, a partir das quais se calculou também a perturbação total do humor (PTH). O delineamento cobriu sete dias de um microciclo pré-competitivo, com uma coleta de linha de base no primeiro dia e duas coletas diárias, uma antes e outra depois do treino, nos seis dias subsequentes, o que totalizou 286 observações. A Figura 2 sintetiza o delineamento e o plano de análise.




Figura 2 – Organograma do delineamento do estudo: da amostra e do microciclo às coletas de linha de base e pré/pós-treino, às 286 observações do BRUMS-24 e aos cinco blocos do plano de análise.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Na análise, empregaram-se estatística descritiva das seis dimensões e da PTH e avaliação da consistência interna por alfa de Cronbach. Como o teste de Shapiro-Wilk apontou desvios da normalidade em parte das dimensões, adotaram-se testes não paramétricos: o teste de Wilcoxon para a comparação entre pré e pós-treino, o teste de Friedman com o W de Kendall para a comparação entre os sete dias e a correlação de Spearman para as relações entre as dimensões, sempre com o cálculo do tamanho do efeito, classificado por magnitude (trivial, pequeno, médio ou grande no d de Cohen e no dz; trivial, pequeno, moderado ou grande no W de Kendall). A confirmação multivariada da diferença entre o primeiro e o último dia recorreu à MANOVA em escores T. Cada observação foi classificada em um dos seis perfis de humor a partir dos escores padronizados, e a distribuição dos perfis entre o primeiro e o último dia foi avaliada pelo teste do qui-quadrado, com a tendência de migração resumida por uma regressão logística ao longo dos dias. A consistência das medidas repetidas foi estimada pelo coeficiente de correlação intraclass (ICC), do qual se derivaram os limiares de mudança.

A forma temporal das trajetórias foi analisada por três abordagens complementares. Primeiro, as séries de vigor, fadiga e PTH foram suavizadas por spline, e a segunda derivada de cada curva localizou o ponto de inflexão, definido como a raiz da segunda derivada. Segundo, cada trajetória foi modelada por um ajuste polinomial de grau três, em duas resoluções, sobre as sete médias diárias e sobre os quatorze pontos pré e pós-treino, do qual se extraíram a equação, o coeficiente de determinação (R^2) e a inflexão analítica ($x = -b/3a$). Terceiro, sobre as curvas ajustadas foram localizados os cruzamentos exatos entre as dimensões, ou seja, os dias em que uma curva iguala e ultrapassa a outra. As análises foram conduzidas em Python (pacotes NumPy, SciPy, pandas, statsmodels e Plotly), com nível de significância de 5%.

4 RESULTADOS

4.1 Descrição e consistência das dimensões

A Tabela 1 resume as seis dimensões do BRUMS e a PTH no conjunto das observações. O vigor apresentou a maior média entre as dimensões, ao passo que as dimensões negativas concentraram-se em valores baixos, com médias próximas do limite inferior da escala. Esse padrão indica um grupo, em geral, bem ajustado, no qual a fadiga e o vigor ocupam a maior parte da faixa de resposta e sustentam a leitura do estado do atleta.

Tabela 1 – Estatística descritiva das dimensões do BRUMS e da perturbação total do humor (286 observações).

Dimensão	Média	DP	Mín.–Máx.
Tensão	1,4	1,8	0–8
Depressão	1,0	2,4	0–16

Dimensão	Média	DP	Mín.–Máx.
Raiva	1,6	2,8	0–14
Vigor	5,7	3,3	0–15
Fadiga	5,5	4,1	0–16
Confusão	0,5	1,3	0–8
PTH	4,4	10,1	-12–52

DP: desvio-padrão. PTH: perturbação total do humor. Escores das dimensões variam de 0 a 16.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A Figura 3 apresenta os diagramas de caixa das seis dimensões, em ordem canônica e em painéis separados, com a mediana e a média de cada uma. Como as dimensões diferem muito em amplitude, cada painel usa a escala da própria variável, o que torna a distribuição de cada uma mais legível. O vigor e a fadiga percorrem a maior parte da escala e apresentam média e mediana próximas, sinal de distribuições razoavelmente simétricas, ao passo que as dimensões negativas concentram a caixa junto ao zero e exibem a média acima da mediana, o que revela assimetria positiva e um efeito de piso.




Figura 3 – Diagramas de caixa das seis dimensões do BRUMS, em painéis separados e ordem canônica; cada painel usa a escala da própria variável, com a mediana (linha sólida) e a média (linha tracejada e losango).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A consistência interna foi adequada nas duas dimensões do eixo energia–fadiga (alfa de 0,68 para o vigor e 0,80 para a fadiga), o que reforça a confiança na sua medida. A PTH, por reunir as seis dimensões em um único índice, associou-se de forma forte ao vigor e à fadiga (correlações de 0,67 e 0,77, respectivamente), e essas duas dimensões explicaram 70% da sua variância, o que confirma o eixo energia–fadiga como o núcleo do sinal.

Tabela 2 – Consistência das medidas repetidas ao longo da semana (coeficiente de correlação intraclasse, ICC).

Dimensão	ICC(2,1)	ICC(2,k)	Consistência
Vigor	0,53	0,89	moderada
Fadiga	0,61	0,92	moderada
Tensão	0,64	0,93	moderada
Depressão	0,68	0,94	moderada
Raiva	0,39	0,82	pobre
Confusão	0,36	0,80	pobre

ICC(2,1) = medida isolada; ICC(2,k) = média das medidas. Consistência: < 0,50 pobre; 0,50–0,75 moderada; > 0,75 boa.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A consistência das medidas repetidas ao longo da semana (Tabela 2) foi moderada a boa, com os valores mais baixos na raiva e na confusão, dimensões mais reativas de um dia para o outro, o que também recomenda cautela na leitura isolada dessas dimensões.

A partir do ICC derivaram-se os limiares de mudança das duas dimensões do eixo energia–fadiga (Tabela 3), úteis para separar a variação real do ruído de medida. No vigor, o erro-padrão de medida foi de 2,3 ponto e a mudança mínima detectável, de 5,3 (90%) a 6,3 (95%) pontos; na fadiga, de 2,5 e de 5,9 a 7,0 pontos, respectivamente. Esses valores superam a menor mudança relevante (SWC = 0,5 no vigor e 0,6 na fadiga), o que indica que, no plano individual, apenas oscilações de cerca de 5,3 a 5,9 pontos podem ser lidas como mudança real, ao passo que variações menores se confundem com o ruído. Por esse motivo, a interpretação deste estudo apoia-se nas tendências de grupo e não em leituras isoladas por atleta.

Tabela 3 – Erro de medida e limiares de mudança do vigor e da fadiga (escala 0–16): erro-padrão de medida (SEM), mudança mínima detectável (MDC) e menor mudança relevante (SWC).

Dimensão	SEM	MDC90	MDC95	SWC
Vigor	2,3	5,3	6,3	0,5
Fadiga	2,5	5,9	7,0	0,6

$SEM = DP \times \sqrt{(1 - ICC)}$; $MDC = 1,65 (90\%) \text{ ou } 1,96 (95\%) \times \sqrt{2} \times SEM$; $SWC = 0,2 \times DP$ entre atletas. Uma mudança individual só é tomada como real quando excede a MDC.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

4.2 Perfis de humor e sua migração

Os seis perfis de humor descritos na literatura estiveram representados na amostra. A Figura 4 apresenta cada perfil identificado no estudo em escores T, com a respectiva prevalência, o que permite reconhecer a sua forma característica. O perfil iceberg exprime prontidão, com o vigor acima da média e as dimensões negativas abaixo, ao passo que a barbatana de tubarão sinaliza pico isolado de fadiga, o submerso reúne todas as dimensões abaixo da média e o Everest invertido eleva todas as dimensões negativas

(PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017).




Figura 4 – Perfis de humor identificados na amostra, em escores T ($M = 50$; $DP = 10$) nas seis dimensões; prevalência de cada perfil entre parênteses.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A comparação entre o primeiro e o último dia do microciclo revelou a reconfiguração do perfil médio do grupo. A Figura 5 mostra que, no primeiro dia, o perfil assumiu o formato iceberg, com o vigor no topo e as dimensões negativas abaixo da média populacional. No último dia, o perfil inverteu-se para a forma de barbatana de tubarão, com a fadiga no topo e o vigor rebaixado, o que traduz a acumulação da carga ao longo da semana.




Figura 5 – Perfil de humor em escores T no primeiro e no último dia do microciclo.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Essa mudança de forma correspondeu a um deslocamento da prevalência dos perfis (Tabela 4). O perfil iceberg caiu de 48% no primeiro dia para 22% no último, enquanto a barbatana de tubarão subiu de 4% para 22% e o perfil submerso passou de 4% para 14%. A

reorganização categórica não alcançou significância no teste do qui-quadrado ($\chi^2 = 8,96$; $p = 0,111$), resultado esperado pela baixa contagem por célula quando poucas observações se distribuem por seis perfis. A regressão logística de tendência, porém, confirmou o aumento da chance do perfil de barbatana de tubarão a cada dia ($OR = 1,37$), sem que os perfis de maior risco à saúde mental se instalassem.

Tabela 4 – Distribuição dos seis perfis de humor no primeiro e no último dia do microciclo: n (%).

Perfil	Dia 1, n (%)	Dia 7, n (%)
Iceberg	13 (48,1%)	8 (21,6%)
Everest invertido	4 (14,8%)	4 (10,8%)
Iceberg invertido	2 (7,4%)	2 (5,4%)
Submerso	1 (3,7%)	5 (13,5%)
Barbatana de tubarão	1 (3,7%)	8 (21,6%)
Superfície	6 (22,2%)	10 (27,0%)

$\chi^2 = 8,96$; $p = 0,111$. A migração é descritiva e converge com a queda do vigor e a elevação da fadiga.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

4.3 Diferença entre o primeiro e o último dia (com tamanho de efeito)

A comparação entre o primeiro e o último dia do microciclo quantificou a magnitude da mudança em cada dimensão (Tabela 5). O efeito foi grande no vigor, que caiu 49% ($dz = -1,33$), e na fadiga, que subiu 115% ($dz = 0,78$), ao passo que as demais dimensões apresentaram efeitos de menor magnitude. A análise multivariada confirmou a diferença global entre os dois dias (Wilks $\lambda = 0,181$; $p < 0,001$), e, sob a correção de Bonferroni, apenas o vigor e a fadiga permaneceram significativos, o que concentra o efeito no eixo energia–fadiga.

Tabela 5 – Diferença das dimensões do BRUMS e da PTH entre o primeiro e o último dia do microciclo (com tamanho e magnitude do efeito).

Dimensão	Dia 1 (M)	Dia 7 (M)	Variação (%)	p	dz	Magnitud e
Vigor	8,43	4,29	-49%	< 0,001	-1,33	grande
Fadiga	3,43	7,36	+115%	0,003	+0,78	médio
Tensão	2,19	0,93	-58%	0,011	-0,60	médio
Depressão	0,52	1,29	+145%	0,504	+0,22	pequeno
Raiva	2,19	2,64	+21%	0,875	+0,09	trivial
Confusão	1,19	0,52	-56%	0,020	-0,57	médio
PTH	1,10	8,45	+672%	0,018	+0,55	médio

dz = tamanho de efeito intraindividual (mudança padronizada); magnitude: trivial ($< 0,2$); pequeno ($0,2-0,5$); médio ($0,5-0,8$); grande ($> 0,8$). PTH: perturbação total do humor.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

4.4 Comparação das dimensões entre os dias (Friedman)

A comparação das dimensões entre os sete dias pelo teste de Friedman (Tabela 6) apontou variação significativa no vigor ($p < 0,001$; $W = 0,21$) e na fadiga ($p = 0,007$; $W = 0,16$), com magnitude pequena a moderada, além de diferenças na tensão e na confusão. O vigor foi máximo no Dia 1 e mínimo no Dia 7, enquanto a fadiga percorreu o caminho inverso, com pico no Dia 7, um padrão coerente com o acúmulo de carga dentro da faixa funcional.

Tabela 6 – Médias diárias das dimensões do BRUMS e teste de Friedman com W de Kendall e magnitude do efeito (comparação entre os sete dias).

Dimensão	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	χ^2	p	W	Magnitude
Tensão	2,1	1,8	1,1	1,4	1,2	1,5	1,1	14,5	0,025	0,13	pequeno
Depressão	0,6	1,3	0,7	1,2	0,7	1,2	1,4	3,5	0,751	0,03	trivial
Raiva	1,7	1,7	1,6	1,6	0,6	1,8	2,5	7,9	0,247	0,07	trivial
Vigor	8,3	5,4	5,5	5,4	5,9	5,7	4,4	23,6	< 0,001	0,21	pequeno
Fadiga	3,4	5,2	5,1	5,8	5,1	6,0	7,2	17,9	0,007	0,16	pequeno
Confusão	1,0	0,6	0,3	0,4	0,2	0,7	0,6	22,9	< 0,001	0,20	pequeno
PTH	0,6	5,3	3,3	5,0	1,9	5,5	8,3	13,8	0,032	0,12	pequeno

W de Kendall = tamanho de efeito do teste de Friedman; magnitude: trivial ($< 0,1$); pequeno ($0,1-0,3$); moderado ($0,3-0,5$); grande ($> 0,5$). PTH: perturbação total do humor.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A Figura 6 ilustra a trajetória do vigor, da fadiga e da PTH ao longo da semana, com a queda progressiva do vigor e a elevação da fadiga e da PTH em direção ao fim do microciclo.




Figura 6 – Trajetória de vigor, fadiga e perturbação total do humor ao longo dos sete dias (curvas suavizadas; ponto de inflexão e extremos sinalizados).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A Figura S1 detalha, por meio de diagramas de caixa por dia, a distribuição de cada dimensão ao longo da semana. O deslocamento das caixas do vigor para baixo e das caixas da fadiga para cima, sobretudo na segunda metade do microciclo, torna visível a mesma deterioração do eixo energia–fadiga, ao passo que as dimensões negativas de menor expressão mantêm caixas comprimidas junto ao zero.

A comparação direta da PTH entre três momentos do microciclo (Figura S2) ilustra a mesma tendência: a perturbação total do humor aumentou do primeiro para o último dia, e a diferença foi significativa entre o Dia 1 e o Dia 7 ($p = 0,008$), ao passo que as comparações entre dias adjacentes não alcançaram significância.

A distribuição completa da PTH em cada dia (Figura S3) e a sua distribuição acumulada (Figura S4) confirmam o deslocamento ao longo da semana. Os diagramas de violino mostram a densidade da PTH a subir do Dia 1 ao Dia 7, e as curvas de distribuição acumulada revelam um deslocamento sistemático para a direita, com o Dia 7 situado acima do Dia 1 em praticamente toda a faixa de escores.

4.5 Suavização, derivadas e cruzamento das trajetórias

Para separar o sinal do ruído, as trajetórias do vigor, da fadiga e da PTH foram suavizadas sobre os doze pontos pré e pós-treino por meio de uma spline, e a segunda derivada de cada curva localizou o seu ponto de inflexão, ou seja, o momento em que a concavidade muda e a taxa de variação atinge o seu limite (Figura 7; Tabela 7). Depois de removido o ruído, cada dimensão exibiu um único ponto de inflexão, situado na metade da semana (em torno do Dia 3,8), o que marca a transição entre a fase inicial de prontidão e a

fase de acúmulo de carga. A curva suavizada do vigor subiu até um máximo em torno do Dia 5,0 e caiu ao seu mínimo no fim da semana, enquanto a fadiga e a PTH percorreram o caminho inverso e atingiram os seus máximos no último dia.




Figura 7 – Trajetórias suavizadas do vigor, da fadiga e da PTH sobre os doze pontos pré e pós-treino. Marcadores translúcidos: sinal bruto; linha grossa: sinal suavizado; linha pontilhada: ponto de inflexão (segunda derivada nula); triângulos: máximo e mínimo. Áreas sombreadas: início e acúmulo da semana.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Tabela 7 – Ponto de inflexão (segunda derivada nula) e extremos das trajetórias suavizadas do eixo energia–fadiga.

Dimensão	Inflexão (dia)	Máximo: dia (escore)	Mínimo: dia (escore)
Vigor	Dia 3,8	Dia 5,0 (5,9)	Dia 7,2 (4,2)
Fadiga	Dia 3,8	Dia 7,2 (7,7)	Dia 1,8 (4,5)
PTH	Dia 3,5	Dia 7,2 (9,9)	Dia 4,7 (3,2)

Curvas suavizadas por spline sobre os 12 pontos pré/pós; inflexão = raiz da segunda derivada. PTH: perturbação total do humor.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A mesma inflexão foi examinada por dois caminhos complementares, detalhados no material suplementar. O painel da segunda derivada localiza o cruzamento por zero de cada curva e realça os extremos com o respectivo valor (Figura S7). Em paralelo, um ajuste polinomial de grau três resume cada trajetória por uma equação e reproduz a inflexão de forma analítica, na raiz da segunda derivada ($x = -b/3a$), em duas resoluções (Figura S8). Sobre as sete médias diárias, o ajuste foi forte, com R^2 de 0,96 para o vigor, 0,95 para a fadiga e 0,80 para a PTH, e inflexões nos dias 4,2, 4,0 e 3,9. Sobre os quatorze pontos pré e pós-treino, incluída a linha de base do primeiro dia, o R^2 foi de 0,80, 0,75 e 0,60, com

inflexões praticamente idênticas. As duas resoluções convergem para a transição na metade da semana e reforçam, por via paramétrica, o achado da spline.

Como o vigor e a fadiga compartilham a mesma escala, as suas trajetórias podem ser comparadas de forma direta e os seus cruzamentos exatos podem ser localizados (Figura 8). No primeiro dia, o vigor superou a fadiga por ampla margem (média de 8,4 contra 3,4 pontos). O vigor caiu e a fadiga subiu até que as duas curvas se igualaram pela primeira vez em torno do dia 2,5 (escore 5,3). A partir daí, o vigor e a fadiga percorreram uma faixa estreita e próxima e voltaram a cruzar-se nos dias 4,0 e 6,0, sinal de um equilíbrio instável entre energia e fadiga durante a maior parte da semana. Após o último cruzamento, no dia 6,0 (escore 5,8), a fadiga afastou-se de forma definitiva acima do vigor. No mesmo trecho final, a perturbação total do humor, que vinha abaixo das duas dimensões, subiu e ultrapassou primeiro o vigor (dia 6,4; escore 5,5) e depois a fadiga (dia 6,6; escore 6,6), o que marca a deterioração conjunta do estado de humor no fim do microciclo.




Figura 8 – Cruzamentos exatos das trajetórias de vigor, fadiga e PTH ao longo do microciclo (curvas do ajuste polinomial sobre as médias diárias; losangos: pontos de cruzamento, com o dia e o escore). Áreas sombreadas: início e acúmulo da semana.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

4.6 Dias de pico e comparação de cada dia ao primeiro

A localização dos picos sintetiza a dinâmica semanal (Tabela 8). O vigor foi máximo no Dia 1 e mínimo no Dia 7; a fadiga foi máxima no Dia 7; a tensão, no Dia 1; a raiva, no Dia 7; e a depressão, no Dia 7. Em síntese, o início da semana reúne maior prontidão, com vigor e tensão mais altos, ao passo que o final concentra a fadiga e a raiva.

Tabela 8 – Dia de maior e de menor expressão de cada dimensão do humor (médias diárias).

Dimensão	Dia de maior valor	Valor	Dia de menor valor	Valor
Tensão	Dia 1	2,15	Dia 7	1,05
Depressão	Dia 7	1,35	Dia 1	0,59
Raiva	Dia 7	2,54	Dia 5	0,57
Vigor	Dia 1	8,30	Dia 7	4,43
Fadiga	Dia 7	7,22	Dia 1	3,37
Confusão	Dia 1	1,04	Dia 5	0,21

Fonte: dados da pesquisa (2026).

No pós-teste que compara todos os dias entre si (Tabela 9; Figura S5), o vigor diferiu de forma significativa em 9 dos 21 pares de dias e a fadiga em 6, sempre no sentido de piora em relação aos primeiros dias, o que confirma a deterioração progressiva do eixo energia–fadiga ao longo do microciclo.

Tabela 9 – Médias marginais estimadas por dia do vigor e da fadiga, com comparação de cada dia ao Dia 1 (pós-teste de Tukey).

Dia	Vigor	Fadiga
Dia 1	8,30	3,37
Dia 2	5,45*	5,18
Dia 3	5,65*	4,84
Dia 4	5,31*	5,70*
Dia 5	5,80*	5,01
Dia 6	5,63*	5,72*
Dia 7	4,10*	6,93*

* diferença significativa em relação ao Dia 1 (Tukey, $p < 0,05$).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

4.7 Variação entre pré e pós-treino (Wilcoxon)

A comparação entre pré e pós-treino pelo teste de Wilcoxon (Tabela 10) evidenciou uma resposta aguda coerente com o esforço: o vigor caiu ($d = -0,47$) e a fadiga e a PTH subiram do momento pré para o pós, com efeito de magnitude pequena a moderada. Essa oscilação dentro do dia somou-se à tendência semanal e ajudou a compor o quadro de fadiga funcional observado no fim do microciclo. A Figura S6 apresenta esses escores por dia e mostra que a diferença entre pré e pós-treino se mantém ao longo da semana.

Tabela 10 – Comparação entre pré e pós-treino das dimensões do BRUMS e da PTH (teste de Wilcoxon e d de Cohen).

Dimensão	Pré (M)	Pós (M)	Variação (%)	p	d	Magnitude
Tensão	1,30	1,60	+23%	0,057	+0,43	pequeno
Depressão	1,03	1,21	+17%	0,687	+0,24	pequeno

Dimensão	Pré (M)	Pós (M)	Variação (%)	p	d	Magnitud e
Raiva	1,31	1,51	+15%	0,745	+0,13	trivial
Vigor	5,76	4,94	-14%	0,025	-0,47	pequeno
Fadiga	4,61	6,28	+36%	0,005	+0,57	médio
Confusão	0,41	0,41	-1%	0,706	-0,01	trivial
PTH	2,91	6,06	+108%	0,009	+0,58	médio

p do teste de Wilcoxon; d = tamanho de efeito de Cohen. PTH: perturbação total do humor.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

4.8 Relações entre as dimensões (Spearman)

As correlações de Spearman entre as dimensões (Tabela 11) mostraram que as dimensões negativas se associam entre si, com destaque para os pares depressão–raiva e tensão–confusão, e que a fadiga se relaciona com a depressão e a raiva. O vigor manteve-se relativamente independente das demais dimensões, o que reforça a sua leitura como um polo próprio do eixo energia–fadiga.

Tabela 11 – Correlações de Spearman significativas entre as dimensões do BRUMS (n = 27 atletas).

Par de dimensões	ρ	p
Vigor × Fadiga	-0,40	0,037
Fadiga × Depressão	+0,42	0,028
Fadiga × Raiva	+0,49	0,010
Tensão × Confusão	+0,45	0,017
Depressão × Raiva	+0,53	0,005
Depressão × Confusão	+0,43	0,027

ρ = coeficiente de correlação de Spearman. Apresentam-se apenas os pares com $p < 0,05$.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A relação entre o vigor e a fadiga, além de negativa, tornou-se mais estreita à medida que a carga se acumulou (Figura 9): a regressão por fase do microciclo mostrou um acoplamento fraco na fase inicial ($r = -0,35$) e mais forte na fase de acúmulo ($r = -0,51$), o que sugere que os dois polos do eixo energia–fadiga passam a variar de forma mais solidária sob fadiga acumulada.




Figura 9 – Relação entre vigor e fadiga por fase do microciclo, com a reta de regressão de cada grupo (início: dias 1 a 4; acúmulo: dias 5 a 7).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

4.9 Estrutura dimensional (análise de componentes principais)

Uma análise exploratória de componentes principais resumiu a estrutura das seis dimensões. Os dois primeiros componentes explicaram 64% da variância (41% no primeiro e 23% no segundo). O círculo de correlação (Figura 10) mostra que as dimensões negativas (depressão, raiva, confusão e fadiga) se projetam juntas no lado positivo do primeiro componente, que funciona como um eixo geral de perturbação, ao passo que o vigor aponta em sentido oposto. Essa oposição reforça, por via independente, a centralidade do eixo energia–fadiga.




Figura 10 – Círculo de correlação da análise de componentes principais das seis dimensões do BRUMS. A espessura de cada seta é proporcional à contribuição da variável ao plano dos dois primeiros componentes.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

5 DISCUSSÃO

5.1 Migração do humor e o eixo energia–fadiga

Os resultados descrevem, em um microciclo pré-competitivo de handebol de elite, a migração do humor da prontidão para a fadiga funcional. A queda do vigor e a elevação da fadiga entre o primeiro e o último dia alcançaram efeito grande e foram confirmadas pela análise multivariada, o que situa o eixo energia–fadiga como o principal responsável pela mudança do estado do atleta. Esse padrão reproduz, dentro de um microciclo de handebol, o comportamento já documentado em outras modalidades sob acúmulo de carga e sob treino intensificado (PIERCE, 2002; FERREIRA et al., 2026; THORPE et al., 2017).

À tendência semanal somou-se uma resposta aguda coerente com o esforço. Entre o momento pré e o pós-treino, o vigor caiu e a fadiga e a PTH subiram, com magnitude de pequena a moderada, o que acrescenta uma camada de variação dentro do dia à deterioração observada entre dias. Esse comportamento converge com o de outros esportes coletivos, nos quais o humor responde de forma imediata ao evento esportivo, e reforça o valor de coletas

repetidas dentro do dia, e não apenas entre dias (DO NASCIMENTO et al., 2026).

A perturbação total do humor comportou-se como um integrador desse eixo. O vigor e a fadiga associaram-se de forma forte à PTH e explicaram a maior parte da sua variância, ao passo que as dimensões negativas, concentradas em valores baixos, contribuíram pouco para a variação. A consistência interna adequada do vigor e da fadiga e a sua correlação intraclasse de moderada a boa convergem para a mesma conclusão, a saber, que o núcleo do sinal do monitoramento reside no par energia–fadiga (LOCHBAUM et al., 2021; ROHLFS et al., 2023).

5.2 Perfis de humor e sobre-esforço funcional

A leitura por perfis acrescentou clareza a essa descrição. O deslocamento do perfil iceberg para a barbatana de tubarão traduz, em uma única imagem, a acumulação da carga sem os sinais de comprometimento da saúde mental, uma vez que os perfis de maior risco, como o iceberg invertido e o submerso, não se instalaram. Quando comparados à distribuição de referência de uma grande amostra brasileira e aos padrões descritos em análises de agrupamento, os nossos dados partem de um predomínio semelhante de iceberg e elevam a barbatana de tubarão apenas ao fim da semana (PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017; LUOJUMÄKI et al., 2026; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024).

Essa reconfiguração tem valor comunicativo direto. O perfil condensa as seis dimensões em uma imagem única, o que aproxima o dado psicométrico da linguagem da comissão técnica e favorece a decisão de treino e de recuperação. A mesma leitura por perfis tem sido proposta como recurso de rastreio da saúde mental no esporte, o que amplia o alcance do monitoramento para além do desempenho (TERRY et al., 2021; HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020; LEW et al., 2023).

5.3 Contribuição metodológica: derivadas, ajuste polinomial e cruzamentos

Além de comparar médias, este estudo mapeou a forma temporal exata das trajetórias. A suavização das séries e o cálculo da segunda derivada localizaram, em cada dimensão do eixo energia–fadiga, um único ponto de inflexão situado na metade da semana, no qual a concavidade muda e a taxa de variação atinge o seu limite. Esse marcador objetivo demarca a transição entre a fase inicial de prontidão e a fase de acúmulo de carga e oferece uma leitura que a simples comparação entre o primeiro e o último dia não revela.

O ajuste polinomial de grau três acrescentou uma síntese paramétrica a essa análise. O modelo reproduziu a inflexão de forma analítica, na raiz da segunda derivada, e resumiu cada trajetória por uma equação, com ajuste forte sobre as médias diárias (R^2 de 0,96 a 0,95 no eixo energia–fadiga). As duas resoluções, sobre sete médias diárias e sobre quatorze pontos pré e pós-treino, apontaram inflexões quase idênticas, o que indica que o achado da

transição na metade da semana não depende do método nem da granularidade da medida. A convergência entre a spline não paramétrica e o polinômio paramétrico reforça a robustez do resultado.

A localização dos cruzamentos exatos representa a contribuição mais original desta abordagem. O vigor superou a fadiga por ampla margem no início e foi alcançado por ela ainda na primeira metade da semana, mas apenas ao fim do microciclo a fadiga afastou-se de forma definitiva acima do vigor, seguida pela PTH, que ultrapassou primeiro o vigor e depois a fadiga. A datação desses cruzamentos converte a ideia qualitativa de inversão do eixo energia–fadiga em um evento com dia e escore definidos, o que fornece um candidato a marcador temporal do início do sobre-esforço funcional, coerente com o continuum descrito entre sobre-esforço e overtraining (ROETE et al., 2021; M■NESCU et al., 2026; LA TORRE et al., 2023).

5.4 Aplicação prática e perspectivas

As características do handebol ajudam a explicar esse comportamento e orientam a aplicação. A modalidade impõe esforço intermitente de alta intensidade, com sprints curtos, mudanças de direção, saltos e contato, o que gera elevada demanda neuromuscular e psicofisiológica ao longo da semana e sustenta tanto a tendência de acúmulo quanto a resposta aguda entre o pré e o pós-treino (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; GARCÍA-SÁNCHEZ et al., 2023; CARTON-LLORENTE et al., 2023). Na prática, o par vigor–fadiga concentra o sinal útil, e o cruzamento entre as suas curvas oferece um alerta simples e visual, capaz de complementar o monitoramento de carga interna e de fadiga já descrito na modalidade (STRUZIK; NADOBNIK; ST■PIE■-S■ODKOWSKA, 2026; STAIANO et al., 2025).

O acompanhamento subjetivo do humor deve ser lido como parte de um monitoramento multidomínio, e não como medida isolada. A sua sensibilidade, o baixo custo e o caráter não invasivo tornam-no complementar aos marcadores fisiológicos, endócrinos e de bem-estar praticados em esportes coletivos (RATZ-SULYOK et al., 2026; BIRD et al., 2025; HELWIG et al., 2023). Como agenda futura, recomenda-se integrar medidas objetivas de carga a este delineamento, ampliar a amostra e testar se a datação do cruzamento do eixo energia–fadiga antecipa desfechos de fadiga e de desempenho, de modo a validar o marcador temporal aqui proposto (KELLMANN et al., 2018; SAW; MAIN; GASTIN, 2016).

5.5 Limitações

O estudo tem limitações, entre as quais a amostra de um único clube, o recorte de um microciclo e a ausência de medidas objetivas de carga neste recorte, o que restringe a generalização e impede inferências de causa. O pequeno número de observações distribuído

por seis perfis reduz a potência do teste categórico, e o erro de medida de uma leitura isolada recomenda cautela na interpretação individual, de modo que a inferência se apoia nas tendências de grupo. Ainda assim, a descrição oferece um retrato direto da dinâmica do humor no handebol de elite e sustenta a recomendação prática de acompanhar o eixo energia–fadiga ao longo da semana, integrado a um monitoramento multidomínio do estado do atleta (OSTAPIUK-KAROLCZUK et al., 2025).

REFERÊNCIAS

BIRD, S. P. et al. Wellness, mood, sleep, and performance in a women's national basketball team during international competition. *Journal of Human Kinetics*, v. 96, p. 163–175, 2025. DOI: 10.5114/jhk/200117.

CARTON-LLORENTE, A. et al. Worst-case scenario analysis of physical demands in elite men handball players by playing position through big data analytics. *Biology of Sport*, v. 40, n. 4, p. 1219–1227, 2023. DOI: 10.5114/biol sport.2023.126665.

DE MIRANDA ROHLFS, I. C. P. et al. Prevalence of specific mood profile clusters among elite and youth athletes at a Brazilian sports club. *Sports*, v. 12, n. 7, 195, 2024. DOI: 10.3390/sports12070195.

DO NASCIMENTO, M. H. et al. Acute psychological responses to official match outcomes in male youth volleyball: an observational repeated-measures study within a single national-level team. *Frontiers in Psychology*, v. 17, 1826372, 2026. DOI: 10.3389/fpsyg.2026.1826372.

FERREIRA, A. B. M. et al. Impact of sleep restriction and intensified training on mucosal immunity and psychological responses in young soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 40, n. 7, p. e703–e713, 2026. DOI: 10.1519/JSC.0000000000005416.

GARCÍA-SÁNCHEZ, C. et al. Physical demands during official competitions in elite handball: a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 20, n. 4, 3353, 2023. DOI: 10.3390/ijerph20043353.

HAN, C.; PARSONS-SMITH, R. L.; TERRY, P. C. Mood profiling in Singapore: cross-cultural validation and potential applications of mood profile clusters. *Frontiers in Psychology*, v. 11, 665, 2020. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00665.

HELWIG, J. et al. Relationships between external, wearable sensor-based, and internal parameters: a systematic review. *Sensors*, v. 23, n. 2, 827, 2023. DOI: 10.3390/s23020827.

KARCHER, C.; BUCHHEIT, M. On-court demands of elite handball, with special reference to playing positions. *Sports Medicine*, v. 44, n. 6, p. 797–814, 2014. DOI:

10.1007/s40279-014-0164-z.

KELLMANN, M. et al. Recovery and performance in sport: consensus statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 13, n. 2, p. 240–245, 2018. DOI: 10.1123/ijsp.2017-0759.

LA TORRE, M. E. et al. The potential role of nutrition in overtraining syndrome: a narrative review. *Nutrients*, v. 15, n. 23, 4916, 2023. DOI: 10.3390/nu15234916.

LEW, P. C. F. et al. Cross-cultural validation of the Malaysian Mood Scale and tests of between-group mood differences. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 20, n. 4, 3348, 2023. DOI: 10.3390/ijerph20043348.

LOCHBAUM, M. et al. The Profile of Mood States and athletic performance: a meta-analysis of published studies. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, v. 11, n. 1, p. 50–70, 2021. DOI: 10.3390/ejihpe11010005.

LUOJUMÄKI, R. J. et al. Exploring mood profile clusters across physical activity level, gender and age in a Finnish population. *European Journal of Sport Science*, v. 26, n. 2, e70131, 2026. DOI: 10.1002/ejsc.70131.

MENESCU, D. C. et al. Molecular biomarkers of training responses: a systems framework for exercise adaptation and athlete monitoring. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 27, n. 8, 3601, 2026. DOI: 10.3390/ijms27083601.

MORGAN, W. P. Selected psychological factors limiting performance: a mental health model. In: CLARKE, D. H.; ECKERT, H. M. (Ed.). *Limits of human performance*. Champaign: Human Kinetics, 1985. p. 70–80.

OSTAPIUK-KAROLCZUK, J. et al. Biochemical and psychological markers of fatigue and recovery in mixed martial arts athletes during strength and conditioning training. *Scientific Reports*, v. 15, n. 1, 24234, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-09719-z.

PARSONS-SMITH, R. L.; TERRY, P. C.; MACHIN, M. A. Identification and description of novel mood profile clusters. *Frontiers in Psychology*, v. 8, 1958, 2017. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01958.

PIERCE, E. F. Relationship between training volume and mood states in competitive swimmers during a 24-week season. *Perceptual and Motor Skills*, v. 94, n. 3, p. 1009–1012, 2002. DOI: 10.2466/pms.2002.94.3.1009.

RATZ-SULYOK, F. Z. et al. Associations between endocrine status and stress, mood and psychosomatic status in elite handball players. *Sports*, v. 14, n. 7, 289, 2026. DOI: 10.3390/sports14070289.

ROETE, A. J. et al. A systematic review on markers of functional overreaching in endurance athletes. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 16, n. 8, p. 1065–1073, 2021. DOI: 10.1123/ijsp.2021-0024.

ROHLFS, I. C. P. M. et al. A Escala de Humor de Brunel (Brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 14, n. 3, p. 176–181, 2008.

ROHLFS, I. C. P. M. et al. Psychometric characteristics of the Brazil Mood Scale among youth and elite athletes using two response time frames. *Sports*, v. 11, n. 12, 244, 2023. DOI: 10.3390/sports11120244.

SAW, A. E.; MAIN, L. C.; GASTIN, P. B. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, v. 50, n. 5, p. 281–291, 2016. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094758.

STAIANO, W. et al. Overcoming mental fatigue through mindfulness: improving physical and cognitive performance in elite handball players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, v. 29, n. 1, p. 91–99, 2025. DOI: 10.1016/j.jsams.2025.08.004.

STRUZIK, A.; NADOBNIK, J.; STĘPIEŃ-SŁODKOWSKA, M. TRIMP and session-RPE monitoring in elite women's handball: a full-season descriptive analysis. *Scientific Reports*, v. 16, n. 1, 2026. DOI: 10.1038/s41598-026-53134-x.

TERRY, P. C.; LANE, A. M.; FOGARTY, G. J. Construct validity of the Profile of Mood States, Adolescents for use with adults. *Psychology of Sport and Exercise*, v. 4, n. 2, p. 125–139, 2003. DOI: 10.1016/S1469-0292(02)00035-8.

TERRY, P. C. et al. Mood profiling for sustainable mental health among athletes. *Sustainability*, v. 13, n. 11, 6116, 2021. DOI: 10.3390/su13116116.

TERRY, P. C. et al. Validation of a Lithuanian-language version of the Brunel Mood Scale: the BRUMS-LTU. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 8, 4867, 2022. DOI: 10.3390/ijerph19084867.

THORPE, R. T. et al. Monitoring fatigue status in elite team-sport athletes: implications for practice. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 12, n. S2, p. S227–S234, 2017. DOI: 10.1123/ijsp.2016-0434.

MATERIAL SUPLEMENTAR

As figuras a seguir complementam os resultados do corpo do artigo e detalham a distribuição diária das dimensões, a resposta aguda pré e pós-treino, as comparações par a par, a análise por derivadas e o ajuste polinomial das trajetórias.




Figura S1 – Diagramas de caixa das seis dimensões do BRUMS por dia do microciclo (áreas sombreadas: início e acúmulo da semana).

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura S2 – Perturbação total do humor (PTH) no Dia 1, no Dia 4 e no Dia 7, com as comparações par a par (teste de Mann-Whitney; * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; ns = não significativo).

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura S3 – Distribuição da PTH por dia (diagramas de violino com caixa e média; a escala foi ajustada à faixa central da distribuição para facilitar a leitura).

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura S4 – Distribuição acumulada (ECDF) da PTH no Dia 1, no Dia 4 e no Dia 7; o deslocamento das curvas para a direita indica o aumento da perturbação ao longo do microciclo.

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura S5 – Médias marginais diárias do vigor, da fadiga e da fadiga física, com comparação de todos os dias ao Dia 1 (* $p < 0,05$).

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura S6 – Escores de vigor, fadiga e perturbação total do humor no pré e no pós-treino, por dia.

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura S7 – Análise por derivadas do eixo energia–fadiga. Em cada variável, o painel superior traz a curva suavizada com o máximo e o mínimo realçados em cápsulas de valor, e o painel inferior traz a segunda derivada (concavidade) com o cruzamento por zero destacado, que marca o ponto de inflexão da trajetória.

Fonte: elaboração dos autores (2026).




Figura S8 – Ajuste polinomial de grau três das trajetórias do vigor, da fadiga e da PTH em duas resoluções: sobre as sete médias diárias (marcadores quadrados e linha cheia) e sobre os quatorze pontos pré e pós-treino, incluída a linha de base do primeiro dia (pontos translúcidos e linha tracejada). Cada painel traz a equação do ajuste diário, o R^2 de cada resolução e a inflexão analítica (raiz da segunda derivada, $x = -b/3a$).

Fonte: elaboração dos autores (2026).