

Pliometria

Seis exercícios · 96 contatos com o chão · a aterrissagem vem antes do salto

Atleta

Data

Duração

Aqui a dose não é a carga: é o contato com o chão. Cada vez que o pé bate no chão é uma dose de impacto, e são **96 nesta sessão** — somadas a todas as que você já dá na quadra. Por isso a ordem começa pela **aterrissagem**: quem se machuca em pliometria quase nunca se machuca subindo. **Aterrissagem silenciosa, joelho na linha do pé, e quando o salto baixar ou a queda ficar barulhenta o exercício acabou** — mesmo faltando série.

Aquecimento — mais longo que o de sala, e não é opcional

Saltar com o tendão frio é a forma mais curta de começar uma tendinite. Esta parte leva 12 minutos e não se pula.

O QUE	QUANTO	OBSERVAÇÃO
Mobilidade de tornozelo, quadril e ombro	6 min	a mesma do app
Corrida leve e deslocamentos laterais	4 min	até suar
Agachamento com o peso do corpo, subida rápida	2 × 8	sem salto
Saltinhos no lugar, bem baixos	2 × 10	o corpo entende o ritmo

A sessão — anote o que você usou em cada série

EXERCÍCIO	SÉRIES	PAUSA	CONTATOS	1ª	2ª	3ª	4ª
1. Aterrissagem do caixote (30 cm) desce do caixote e TRAVA — não é salto, é freio	3 × 5	60 s	15				
2. Salto vertical com parada salta alto e aterrissa travado, 2 s parado	3 × 5	90 s	15				
3. Saltinhos de tornozelo (pogo) joelho quase reto, contato curto no chão	3 × 10	60 s	30				
4. Salto sobre barreiras (40 cm) pés juntos, o menor tempo possível no chão	3 × 4	90 s	12				
5. Salto unilateral com parada 4 em cada perna — aterrissa e segura 2 s	2 × 4 cada	90 s	16				
6. Aproximação de ataque com salto 3 passos e salto máximo, sem bola	4 × 2	2 min	8				

Nas colunas da direita escreva a **altura** que você usou (caixote, barreira) e marque um **X** na série em que o salto baixou ou a aterrissagem ficou barulhenta — e pare o exercício ali. Salto baixo repetido não treina potência: treina impacto.

Duração prevista: 45 a 55 minutos com o aquecimento. É a sessão mais curta do conjunto e a que mais exige qualidade: **pliometria não é condicionamento**. Se você terminou ofegante e suado, fez de outro jeito — a pausa estava curta e os saltos saíram baixos.

Como usar esta ficha

As quatro regras que valem acima dos números

1. **Aterrissagem silenciosa.** Barulho é impacto que a articulação absorveu porque o músculo não absorveu. Caia com joelho e quadril dobrando, na ponta do pé primeiro e o calcanhar descendo em seguida.
2. **Joelho na linha do pé.** Joelho caindo para dentro na aterrissagem é o mecanismo clássico de lesão de ligamento. Se acontecer, pare a série: não é questão de força de vontade, é de controle.
3. **Salto baixou, acabou.** A pliometria vive da altura e do tempo curto no chão. Repetição baixa e pesada não é uma versão mais fácil do exercício — é outro exercício, e esse outro só traz o impacto.
4. **Pausa inteira.** 60 a 90 segundos parecem muito para quem não está ofegante. São exatamente o que permite o salto seguinte sair tão alto quanto o anterior.

Onde esta sessão entra na semana

Nunca no dia anterior ao jogo. O cansaço da pliometria não aparece no mesmo dia: aparece no seguinte, exatamente na perna que você precisa para saltar.

Nem no mesmo dia da sessão de força pesada. E nem depois de um treino de quadra com muito salto. Se o dia já teve salto, este treino fica para outro — a quadra conta contatos igual.

O melhor dia. Começo da semana, com as pernas descansadas, **antes** do treino técnico e não depois. Deixe **48 horas** até a próxima sessão de pliometria.

Se faltar caixote, barreira ou piso

Sem caixote. Um degrau de arquibancada ou um banco firme de 30 a 40 cm. O que não serve é qualquer coisa que deslize ou balance — e altura maior não é melhor: acima de 40 cm o que aumenta é o impacto, não o treino.

Sem barreiras. Cones, um elástico preso entre duas cadeiras, ou uma linha no chão para saltar por cima de um lado para o outro. A altura importa menos que o tempo curto no chão.

O piso. Madeira ou piso de quadra. Em **concreto cru, faça metade dos contatos** — 96 saltos no cimento é onde a dor no tendão da patela começa, e ela leva meses para ir embora.

Dor no tendão logo abaixo da patela é o sinal de parar — principalmente a que aparece no dia seguinte e some ao aquecer, que é a que engana. Avise a comissão antes de insistir: tendinopatia patelar é a lesão mais comum do voleibol e a mais lenta de resolver. E quando for evoluir a sessão, **aumente os contatos antes de aumentar a altura** — nesta ordem, nunca nas duas ao mesmo tempo.

Depois do treino

Mande a sua **PSE** — o quanto a sessão pesou, de 0 a 10 — e a duração. É com esses dois números que a comissão calcula a sua carga da semana e enxerga se você está sendo sobrecarregado antes de o corpo avisar. Um treino que ninguém registra é um treino que não existe na sua análise.

Como foi (dor, sono, algo diferente)