

VII 1.4

DORA ĐMANOVIĆ
0036522607

$$(a) \hat{\mu}_{MLE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{x}^i = (5.483, -0.193, -0.733)$$

$$\begin{aligned} \hat{\Sigma}_{MLE} &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\vec{x}^i - \hat{\mu}_{MLE})(\vec{x}^i - \hat{\mu}_{MLE})^T \\ &= \begin{bmatrix} 8.77 & -1.198 & -4.792 \\ -1.198 & 0.191 & 0.766 \\ -4.792 & 0.766 & 3.062 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(u Pythonu)

$$(b) \vec{x} = (-2, 1, 0)$$

$$p(\vec{x} | \mu, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |\Sigma|^{\frac{1}{2}}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{\mu})^T \Sigma^{-1} (\vec{x} - \vec{\mu}) \right)$$

$$|\Sigma| = 0 \quad ?$$

→ Σ nema inverz i ne možemo deliti s 0

→ gustota $p(\vec{x} | \mu, \Sigma)$ nije dobro definisana

$$(c) \beta_{x_1 x_2} = \frac{\sigma_{x_1 x_2}}{\sqrt{\sigma_{x_1}^2} \sqrt{\sigma_{x_2}^2}} = \frac{-1.198}{\sqrt{8.77 \cdot 0.191}} = -0.926$$

$$\beta_{x_1 x_3} = \frac{\sigma_{x_1 x_3}}{\sqrt{\sigma_{x_1}^2} \sqrt{\sigma_{x_3}^2}} = \frac{-4.792}{\sqrt{8.77 \cdot 3.062}} = -0.925$$

$$\beta_{x_2 x_3} = \frac{\sigma_{x_2 x_3}}{\sqrt{\sigma_{x_2}^2} \sqrt{\sigma_{x_3}^2}} = \frac{0.766}{\sqrt{0.191 \cdot 3.062}} = 1.002$$

→ izbaciti x_3 (sve su korelirane, može bilo koja)

$$\mu' = (5.483, -0.193)$$

$$\Sigma' = \begin{bmatrix} 8.77 & -1.198 \\ -1.198 & 0.191 \end{bmatrix}$$

$$|\Sigma'| = 0.243$$

$$(\Sigma')^{-1} = \begin{bmatrix} 0.786 & 4.922 \\ 4.922 & 36.04 \end{bmatrix}$$

$$p(\vec{x}' | \mu', \Sigma') = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |\Sigma'|^{\frac{1}{2}}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\vec{x}' - \vec{\mu}')^T (\Sigma')^{-1} (\vec{x}' - \vec{\mu}') \right)$$

$$\vec{x}' = (-2, 1)$$

$$7.32$$

$$n=2$$

$$p(\vec{x}' | \vec{\mu}', \Sigma') = 0.012$$

(a) MAP procjenitelj:

$$\hat{\theta}_{MAP} = \operatorname{argmax}_{\theta} p(\theta|D) = \operatorname{argmax}_{\theta} p(D|\theta)p(\theta)$$

→ bolji od MLE-a jer kombinira vjerojatnost oznaka odnosno izglednost parametara θ s apriornom distribucijom parametara, što nam omogućava da u našem balans između apriornog znanja o parametrima i znanja dobivenog iz podataka

(b) Konjugatne distribucije su distribucije iste vrste, a konjugatna apriorna distribucija za funkciju izglednosti znači da ona pomnožena s funkcijom izglednosti daje konjugatnu distribuciju.


To nam je bitno da možemo raditi "online" učenje.

(c) $\mu \sim B(\alpha, \beta)$

$$p(\mu|\alpha, \beta) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} \mu^{\alpha-1} (1-\mu)^{\beta-1}$$


(1) $\alpha = \beta = 1$

$$p(\mu|1, 1)$$




(2) $\alpha = \beta = 2$


$$p(\mu|2, 2) = \frac{1}{B(2, 2)} \mu(1-\mu)$$



(3) $\alpha = 2, \beta = 4$



(4) $\alpha = 4, \beta = 2$



(d) $p(\mu|N, m, \alpha, \beta) = ?$

Bayes: $p(\mu|D) = \frac{p(D|\mu)p(\mu)}{p(D)}$

izglednost μ : $p(D|\mu) = \mu^m (1-\mu)^{N-m}$


apriorna: $p(\mu|\alpha, \beta) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} \mu^{\alpha-1} (1-\mu)^{\beta-1}$

$$\begin{aligned} p(\mu|N, m, \alpha, \beta) &= \mu^m (1-\mu)^{N-m} \mu^{\alpha-1} (1-\mu)^{\beta-1} \frac{1}{B(\alpha, \beta) p(D)} \\ &= \mu^{m+\alpha-1} (1-\mu)^{N-m+\beta-1} \frac{1}{B(\alpha, \beta) p(D)} \\ &= \frac{1}{B(\alpha', \beta')} \mu^{\alpha'-1} (1-\mu)^{\beta'-1} \end{aligned}$$


(e) $\alpha = \beta = 2$

$N = 10$


$m = 1$



apriorna
 $p(\mu|\alpha, \beta)$



izglednost
 $L(\mu|N, m)$



umnožak
 $\text{mod} = \frac{\alpha'-1}{\alpha'+\beta'-2} = \frac{3-1}{3+2-2} = \frac{2}{12}$

$$(f) \hat{\mu}_{MAP} = \frac{\alpha' - 1}{\alpha' + \beta' - 2} = \frac{m + \alpha - 1}{m + \alpha + N + \beta - 2} = \frac{m + \alpha - 1}{N + \alpha + \beta - 2} = \frac{1}{6}$$

$$\hat{\mu}_{MLE} = \frac{m}{N} = \frac{1}{10} \rightarrow \text{samo iz D}$$

↓
iz D i iz
apriorne

Ako povećamo N , više uzimamo podatke u obzir i smanjuje se razlika između MAP i MLE.

(g) Ako $\alpha = \beta = 2$, za $\hat{\mu}_{MAP}$ dobivamo

$$\hat{\mu}_{MAP} = \frac{m+1}{N+2} \quad \text{Laplaceov procjenitelj.}$$

DORA ĐMANOVIĆ
0036922609

VA5 1.3

$X \sim R$

$K = 3$

$$P(y=1) = 0.3$$

$$P(y=2) = 0.2$$

$$P(y=3) = 0.5$$

$$\mu_1 = -5$$

$$\mu_2 = 0$$

$$\mu_3 = 5$$


$$\sigma_1^2 = 5$$

$$\sigma_2^2 = 1$$


$$\sigma_3^2 = 10$$

$$P(y=j | \bar{x}) = \frac{p(\bar{x} | y=j) P(y=j)}{\sum_{y'} p(\bar{x} | y=y') P(y=y')}$$


$p(x|y) \rightarrow \text{Gauss}$




$$p(x) = \sum p(x, y)$$



$p(x, y) \rightarrow \text{brojnik } \#j$



$$p(y|x) = \frac{p(x, y)}{p(x)}$$



V15 1.5

DORA ĐMANOVIĆ
0036522607

$$y \in \{1, 2\}$$

$$\vec{x} = (\underbrace{x_1, x_2, x_3, x_4}_{\text{ocjene}}, \underbrace{x_5, x_6}_{\text{mature}}) \Rightarrow n=6$$

H_1 dijeljena Σ

H_2 dijagonalna i dijeljena Σ

H_3 izotropna Σ

(a) parametri

$$\vec{\mu}_1, \vec{\mu}_2, \Sigma, P(y=j)$$

$$(H_1): \underbrace{n+n}_{n \cdot K} + \frac{n(n+1)}{2} + 1 = 34$$

$$(H_2): n+n + n + 1 = 3n+1 = 19$$


$$(H_3): n+n + K \cdot 1 + 1 = 15$$

(b) koji najbolje generalizira?

Pretpostavljamo da su značajke vjerojatno međusobno zavisne, pogotovo x_1-x_4 i x_5-x_6 .

H_1 modelira zavisnost značajki, međutim u podacima nije dobro imati nebitne značajke i H_1 bi mogao dovesti do preinaučnosti. H_3 nije dobar jer ima premalo parametara i bih se podnaučio, a H_2 bi onda najbolje generalizirao.

(c)



(d) Za odabir modela trebamo napraviti unakrsnu provjeru.

Treba izbaciti nebitne značajke (neke jako korelirane).

VIA6 1.2

DOKA OMANOVIĆ
0036522607

(a) MLE procjene
Naïvan Bayes

x_1 - mjesto

x_2 - otok

x_3 - smještaj

x_4 - prijevoz

$$P(y=da) = \frac{4}{7}$$

$$P(y=ne) = \frac{3}{7}$$

MJESTO:

$$P(Istra | y=da) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad P(Istra | y=ne) = \frac{0}{3} = 0 \quad (*)$$

$$P(Kvarner | y=da) = \frac{0}{4} = 0 \quad P(Kvarner | y=ne) = \frac{2}{3}$$

$$P(Dalm. | y=da) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad P(Dalm. | y=ne) = \frac{1}{3}$$

OTOK:

$$P(da | y=da) = \frac{3}{4} \quad P(da | y=ne) = \frac{0}{3} = 0 \quad (\square)$$

$$P(ne | y=da) = \frac{1}{4} \quad P(ne | y=ne) = \frac{3}{3} = 1$$

SMJEŠTAJ

$$P(priv | y=da) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad P(priv | y=ne) = \frac{1}{3}$$

$$P(kamp | y=da) = \frac{0}{4} = 0 \quad (*) \quad P(kamp | y=ne) = \frac{2}{3}$$

$$P(hotel | y=da) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad P(hotel | y=ne) = \frac{0}{3} = 0 \quad (\square)$$

PRIJEVOZ

$$P(auto | y=da) = \frac{3}{4} \quad P(auto | y=ne) = 0$$

$$P(bus | y=da) = 0 \quad (*) \quad P(bus | y=ne) = \frac{2}{3}$$

$$P(avion | y=da) = \frac{1}{4} \quad P(avion | y=ne) = \frac{1}{3}$$

$$h(Istra, ne, kamp, bus) = \argmax_y \prod_j P(x_j | y)$$

\Rightarrow zbog (*) ispadne 0 $\forall y$

$$h(Dalm., da, hotel, bus) = \argmax \dots$$

\Rightarrow zbog (\square) ispadne 0 $\forall y$

\Rightarrow ne možemo klasificirati!

(b) Laplaceove procjene: $\frac{m+1}{N+x}$

\leftarrow broj razl. mogućih realizacija:
za MJESTO, SMJEŠTAJ I PRIJEVOZ
je 3, a za OTOK 2.

MJESTO \ y =	da	ne
Istra	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{6}$
Kvarner	$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{6}$
Dalm.	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{6}$

OTOK \ y =	da	ne
da	$\frac{4}{6}$	$\frac{1}{5}$
ne	$\frac{2}{6}$	$\frac{4}{5}$

PRIJEVOZ \ y =	da	ne
auto	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{6}$
bus	$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{6}$
avion	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{6}$

SMJEŠTAJ \ y =	da	ne
privatni	$\frac{3}{7}$	$\frac{2}{6}$
kamp	$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{6}$
hotel	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{6}$

$$h(Istra, ne, kamp, bus) = ne$$

$$\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{4}{7} = 1.666 \cdot 10^{-3} \quad \text{za } y=da$$

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{7} = 0.044 \quad \text{za } y=ne$$

analogno:

$$h(Dalmacij, da, hotel, bus) = da \quad \text{jer } 0.04 \text{ za } y=da \text{ i } 0.002 \text{ za } y=ne$$