


V19

1.1 a)




Minimalna vrijednost fije  $J=0$ ,  
i to za  $k = \text{broj prikaza}$


MARKO ĐUKIN

0036524589


b)



c) Uzmimo  $k_3$



1.2.



Za  $k+1$  najizglednija  
krivulja je ona koja PRVA  
dođe do  $J_3$ . Zato jer  $k+1$  već  
počinje iteracije s "dobrim"  
centroidima.

a) f) Oba algoritma u 1. koraku rade grupiranja kao na slici:  
k-means račun u svakoj grupi računa novi centroid. A to su:

$$\vec{\mu}_k = \left[ \frac{1}{2}((2,8) + (3,6)) \mid \frac{1}{2}((0,4) + (1,4)) \mid \frac{1}{3}((5,2) + (6,2) + (7,1)) \right]$$

k-neboide gleda koji prikaz onim trenutnim centroidima minimizira  
gibnu ~~gibnu~~ u svakoj grupi. Novi mogući medoidi su:

E ili F, C ili G, D  
negarantirano, ista grupa



1.2.

c) k - metoda:  $O(TnNk)$   
 k - metoda:  $O(Tk(N-k)^2)$

N - broj primjera  
 k - broj klasa  
 n - broj razlika

d) Problem je isto moćno rešiti na podatcima koji nisu iz vektorskog prostora. Neizostatak je taj što nema efikasne implementacije pa je složenost velika

V20

MARCO ĐOKIN, 0036524589

1.1

a) EM - algoritam koristi meko grupiranje gdje imamo probabilistički izbor. U odnosu na k-means složeniji je.

b)

$$p(x) = \sum_k p(x, y=k) = \sum_k \pi_k p(x|\theta_k)$$

$$\ln L(\theta|D) = \sum_i \ln \sum_k \pi_k p(x^{(i)}|\theta_k)$$

c)  $p(x, z|\theta) = \prod_k \pi_k^{z_k} p(x|\theta_k)^{z_k}$

$$\ln L(\theta|D, z) = \sum_i \sum_k z_k^i (\ln \pi_k + \ln p(x^{(i)}|\theta_k))$$

Ne moramo još na  $z^{(i)}$  varijable ni na parametre.

d)

$\theta = \text{meko: } \forall x^i, \forall k$

$$h_k^{(i)} = \frac{p(x^{(i)}|\mu_k, \xi_k) \pi_k}{\sum_j p(x^{(i)}|\mu_j, \xi_j) \pi_j}$$


n - broj:  $\forall k$

$$\mu_k = \frac{\sum_i h_k^i x^i}{\sum_i h_k^i}$$

$$\xi_k = \frac{\sum_i h_k^i (x^i - \mu_k)(x^i - \mu_k)^T}{\sum_i h_k^i} \quad \pi_k = \frac{1}{N} \sum_i h_k^i$$



1.1.2)



MARKO ĐUKIN,  
0036524589

2.2


a)  $S =$   
MAX, MAX

	a	b	c	d	e
a	1	0.26	0.15	0.2	0.17
b		1	0.24	0.31	0.31
c			1	0.2	0.5
d				1	0.25
e					1

	a	b	c	d	e
a	1	0.26	0.15	0.17	
b		1	0.31	0.31	
c			1	0.24	
d				1	
e					1

	a	b	c	d	e
a	1	0.26	0.17		
b		1	0.31		
c			1		

Na osnovu gornje li tabele  $S$  i  $S'$ ,  $P$  i  $P'$ ,  $Z$  i  $Z'$




b) MIN

	a	b	c	d	e
a	1	0.26	0.2	0.15	
b		1	0.31	0.24	
c			1	0.24	
d				1	
e					1

	a	b	c	d	e
a	1	0.2	0.15		
b		1	0.24		
c			1		

	a	b	c	d	e
a	1	0.15			
b		1			



Ovakve presjeka

V21.

1.1

pred

	0	1	2
0	1	0	1
1	1	3	2
2	1	1	1

	2	01
2	1	2
01	3	5

0:

	0	12
0	1	1
12	2	7

1:

	1	02
1	3	3
02	1	4

a)  $\text{Točnost} = \frac{\text{po dijagonali}}{N} = \frac{5}{11} = \text{Acc}$

b)

$$P^H = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2} + \frac{3}{6} + \frac{1}{3} \right) = 0.444$$

$$R^H = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{3} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \right) = 0.444$$

$$F_1^H = \frac{1}{3} \left( \frac{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} + \frac{2 \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{3}{6} + \frac{3}{4}} + \frac{2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} \right) = \frac{1}{3} (0.4 + 0.6 + 0.285) = 0.428$$

Mikro TADLICA (2x2 tablica)

$$= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 16 \end{pmatrix}$$

$$P^H = \frac{5}{11}$$

$$R^H = \frac{5}{11}$$

$$F_1^H = \frac{2 \cdot P \cdot R}{P + R} = \frac{5}{11}$$

$$\text{Acc} = F_1^H = P^H = R^H$$

MARCO DUKIN

0036524589