

V14

1.4

$$D = \begin{bmatrix} (9.5, -0.7, -2.8) \\ (8.8, -0.8, -3.2) \\ (6.5, -0.2, -0.8) \\ (7.3, 0.3, 1.2) \\ (2.2, 0, 0) \\ (3.6, 0.3, 1.2) \end{bmatrix}$$

MARKO ĐOKIĆ

0036524589

a) $\hat{\mu}_{MLE} = \frac{1}{N} \sum x^{(i)} = [5.48, -0.18, -0.73]$

$$\hat{\Sigma}_{MLE} = \frac{1}{N} \sum (x^i - \hat{\mu}_{MLE}) \cdot (x^i - \hat{\mu}_{MLE})^T$$

$$= \begin{bmatrix} 5.48 & -0.1833 & -0.73 \\ 8.77 & -1.198 & -4.79 \\ -4.79 & 0.765 & 3.062 \end{bmatrix}$$

matrica nije
valjda definitna
jer numerički
dijelimo s N-om

b) determinanta Σ matrice je 0, a to znači da je kvadratna:

$$* p(x|\mu, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \cdot |\Sigma|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu)\right)$$

c) $\rho_{12} = \frac{-0.183}{[5.48, -1.198]} = -0.92$

$\rho_{13} = -0.92$ $\rho_{23} = 1$

$\hat{\mu}_{MLE} = [5.48, -0.183]$

$\hat{\Sigma}_{MLE} = \begin{bmatrix} 8.77 & -1.19 \\ -1.19 & 0.19 \end{bmatrix}$

Varijable 2 i 3 su najviše ZAVISNE.
Izračunajmo varijable 3

$|\Sigma| \neq 0$

Sada nam prijašnje x^i imaju 2 dimenzije
1. i 2.

* $P([-2, 1]) = 0.0083$

1.5

a) $\theta_{MAP} = \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} p(\theta | D) = \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} p(D | \theta) \cdot p(\theta)$

MAP je bolji od MLE jer kombinira optimizirano značenje i informacije iz nekog podataka.

b) 1) Konjugatna distribucija za neku pripadajuću istoj familiji.


2) Konjugatna apriorna distribucija je ona distribucija, koja pomnožen sa distribucijom podataka, daje istu vrstu distribucije kao posterior.

c) Bitno nam je jer možemo raditi "online" učenje.


$\alpha = \beta = 1$




$\alpha = 2, \beta = 2$



$\alpha = 2, \beta = 4$




$\alpha = 4, \beta = 2$




d)
$$p(\mu | D, \alpha, \beta) \equiv \mu^m (1-\mu)^{N-m} \cdot \frac{1}{B(\alpha, \beta)} \cdot \mu^{\alpha-1} (1-\mu)^{\beta-1} \cdot \frac{1}{p(D)}$$
$$= \mu^{m+\alpha-1} (1-\mu)^{N-m+\beta-1} \cdot \frac{1}{B(\alpha, \beta) \cdot p(D)}$$
$$= \mu^{\alpha'-1} (1-\mu)^{\beta'-1} \cdot \frac{1}{B(\alpha', \beta')}$$

e)


APRIORI



PODACI



UMNOŽAK



MARCO

ĐOKIN

003652458J

$$1) \hat{\mu}_{MAP} = \frac{1+2-1}{2+10+2-2} = \frac{2}{12} = 0.167 = \frac{m+d-1}{d+N+B-2}$$

$$\hat{\mu}_{MLE} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$N \uparrow$: normalizacija

$\hat{\mu}_{MAP}$ i $\hat{\mu}_{MLE}$ lie
u marginalu

eg) Ažuriranje



$$\alpha = \beta = 2$$

$$\hat{\mu}_{MAP} = \frac{m+d-1}{d+N+B-2} = \frac{m+1}{N+2} \Rightarrow \text{Laplace-ov prior}$$

VIS.
1.3



- $p(X|Y=1)$
- $p(X|Y=2)$
- $p(X|Y=3)$

- $p(X|Y=1) \cdot p(Y=1)$
- $p(X|Y=2) \cdot p(Y=2)$
- $p(X|Y=3) \cdot p(Y=3)$



$$p(x) = \sum p(x|y=i) \cdot p(y=i)$$

- $p(Y=1|X)$
- $p(Y=2|X)$
- $p(Y=3|X)$



MARKO ĐUKIN 0036524583


V95.

1.5 a) $H_1: \frac{m}{2}(m+1) + k \cdot m + k - 1 = 34$

$H_2: m + k \cdot m + k - 1 = 19$

$H_3: 1 + k \cdot m + k - 1 = 14$

b) H_2 je niže sklon prenošenosti kao H_1 ili podnošenosti kao H_3 .



d) Unakrsnom provjerom

V96.

1.2 a) $P(Y=DA) = \frac{4}{7}$ u c) Laplace
b) $P(Y=NO) = \frac{3}{7}$

$|X_1| = 1$
 $\Rightarrow P(X_1 = \text{tra} | Y=DA) = \frac{2}{4} \left(\frac{3}{7} \right)$
 $P(X_1 = \text{tra} | Y=NO) = \frac{0}{3} \left(\frac{1}{6} \right)$

$|X_2| = 2$
 $P(X_2 = \text{re} | Y=DA) = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{7} \right)$
 $P(X_2 = \text{re} | Y=NO) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{6} \right)$

$|X_3| = 3$
 $P(X_3 = \text{komp} | Y=DA) = \frac{0}{4} \left(\frac{1}{7} \right)$
 $P(X_3 = \text{komp} | Y=NO) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{6} \right)$

$|X_4| = 3$
 $P(X_4 = \text{brus} | Y=DA) = \frac{0}{4} \left(\frac{1}{7} \right)$
 $P(X_4 = \text{brus} | Y=NO) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{6} \right)$

$P(Y|X) = P(Y) \cdot \prod P(X_i|Y)$

BEZ LAPLACE:

$P(DA|X) = \left(\frac{4}{7} \right) \left(\frac{2}{4} \right) \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{0}{4} \right) \left(\frac{0}{4} \right) = 0$

$P(NO|X) = \left(\frac{3}{7} \right) \left(\frac{0}{3} \right) \left(1 \right) \left(\frac{2}{3} \right) \left(\frac{2}{3} \right) = 0$

Ne možemo raditi klasifikaciju

S LAPLACEOM

$P(DA|X) = \left(\frac{4}{7} \right) \left(\frac{3}{4} \right) \left(\frac{1}{3} \right) \left(\frac{1}{7} \right) \left(\frac{1}{7} \right)$

$P(NO|X) = \left(\frac{3}{7} \right) \left(\frac{1}{6} \right) \left(\frac{1}{5} \right) \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right)$

$DA = 1.65 \cdot 10^{-3}$

$(KE) = 0.019$