

MNUM-PROJEKT, zadanie 3.17

Marcin Dziedzic

7 maja 2018

Spis treści

1	Zadanie I	2
1.1	Tre zadania	2
1.2	Metoda bisekcji	2
1.2.1	Opis teoretyczny	2
1.2.2	Realizacja w programie Matlab	2
1.3	Metoda siecznych	3
1.3.1	Realizacja w programie Matlab	4
1.4	Metoda Newtona	5
1.4.1	Opis teoretyczny	5
1.4.2	Realizacja w programie Matlab	5
1.5	Analiza danych wejściowych	6
1.5.1	Realizacja w programie Matlab	6
1.6	Rozwizanie	9
1.6.1	Metoda bisekcji	9
1.6.2	Metoda siecznych	11
1.6.3	Metoda Newtona	11
1.7	Wnioski	12
2	Zadanie II	12
2.1	Tre zadania	12
2.2	Opis teoretyczny	13
2.3	Rozwizanie	13
2.4	Wyniki	15
2.5	Wnioski	15

1 Zadanie I

1.1 Tre zadania

Prosz znaleźć wszystkie zera funkcji

$$f(x) = 0.7x\cos(x) - \ln(x+1)$$

w przedziale $[2, 11]$, uywajc dla kadego zera programu z implementacj:

- a) metody bisekcji
- b) metody siecznych
- c) metody Newtona

1.2 Metoda bisekcji

1.2.1 Opis teoretyczny

Teoretyczny zarys metody bisekcji moemy przybliy poniszym algorytmem:

1. Poczwszy od przedziau startowego $[a, b] = [a_0, b_0]$ obliczamy rodek przedziau c_n , $c_n = \frac{a_n+b_n}{2}$ i obliczamy warto $f(c_n)$ w tym punkcie.
2. Obliczamy iloczyny $f(a_n) * f(c_n)$ oraz $f(b_n) * f(c_n)$ i jako nowy przedzia $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ wybieramy argumenty tego iloczynu którego warto jest ujemna.

Kroki te powtarzamy a do momentu uzyskania $f(c_n) < \delta$ gdzie δ to oczekiwana dokadno rozwizania. W przypadku "paskich" funkcji warto te kontrolowa dugo rozpatrywanego przedziau. Dokadno wyniku zaley jedynie od iloci iteracji dlatego metoda jest zbiena liniowo z ilorazem zbienoci 0.5, co czyni j stosunkowo wolno zbien w przypadku wyboru szerokiego przedziau pocztkowego.

1.2.2 Realizacja w programie Matlab

Listing 1: Implementacja metody bisekcji

```
% Funkcja wyznaczajaca punkty zerowe funkcji metoda bisekcji
%
% IN:
% a0, b0 - zakres
% fun - funkcja
% iter - maksymalna liczba iteracji
%
% OUT:
% solution - wyznaczone miejsce zerowe
```

```

function soluiton = md_bisection(fun,a0,b0,iter)

a = a0;
b = b0;
% inicjalizacja wartosciami poczatkowymi
fa =feval(fun,a);
fb =feval(fun,b);
for k=1:iter
    % obliczenie srodka odcinka
    xm = a + 0.5*(b-a);
    % f(xm)
    fm = feval(fun,xm);
    fprintf( '%3d' [ %12.10f;%12.10f ] [ %12.16f %12.3e\n' ,k,a,b,xm,fm ) ;
    if (fm == 0)
        return
    end
    % Zero lezy w przedziale [xm,b], zamiana a
    if sign(fm)==sign(fa)
        a = xm;
        fa = fm;
    % Zero lezy w przedziale [a,xm], zamiana b
    else
        b = xm;
        fb = fm;
    end
    %dodatkowy warunek zakonczenia wykonywania
    if (fm == 0)
        return
    end
end
soluiton = xm;
return
end

```

1.3 Metoda siecznych

Metoda siecznych jest bardzo podobna do metody bisekcji, różni się tym, iż przez krótki aktualnego przedziału prowadzimy prostą, która przecina oś rzędnych w punkcie x_0 . Następnie prowadzimy kolejną prostą przez punkt $f(x_n)$ i poprzedni punkt $f(x_{n-1})$. Warto zaznaczyć, że nie dbamy tutaj o przedział izolacji pierwiastka, ani nawet o znak iloczynu wartości na końcach aktualnego przedziału.

Wzór na $n+1$ punkt, przez który ma przejść prosta: $x_{n+1} = \frac{x_{n-1}f(x_n) - x_nf(x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$

Rzeczownicy metody siecznych wynosi $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ zatem metoda ta jest szybsza od metody bisekcji, lecz w praktyce może okazać się niezbędna kiedy przedział izolacji nie jest dostatecznie mały, gdy jest ona zbliżona tylko lokalnie, a nie globalnie jak poprzednia metoda.

1.3.1 Realizacja w programie Matlab

Listing 2: Implementacja metody siecznych

```
% Funkcja wyznaczająca punkty zerowe funkcji metoda siecznych
%
% IN:
% a0, b0 – zakres
% fun – funkcja
% iter – maksymalna liczba iteracji
%
% OUT:
% solution – wyznaczone miejsce zerowe
function solution = md_secans(fun, a0, b0, iter)
    a = a0;
    b = b0;
    % początkowa wartość funkcji
    fa = feval(fun,a);
    for k = 1:iter
        fb = feval(fun,b);
        dx = fb * (b-a) / (fb-fa);
        xm = b-dx;
        if(isnan(xm))
            return
        end
        a = b;
        b = xm;
        fa = fb;
        solution = b;
        fprintf(' %3d %12.10f; %12.10f ] %12.16f %12.3e \n', k, a, b, xm, fb);
        % dodatkowy warunek zakończenia wykonywania
        if(fb == 0)
            return
        end
    end
end
```

end

1.4 Metoda Newtona

1.4.1 Opis teoretyczny

Metoda Newtona polega na wyznaczeniu czciowego (ucitego) rozwinięcia w szereg Taylora danej funkcji, które możemy traktować jak liniowe przybliżenie funkcji według wzoru:

$$f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$$

Następnie wyznaczamy kolejne punkty iteracji poprzez przyrównanie do zera otrzymanej aproksymacji:

$$f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) = 0$$

Prowadzi to do zależności iteracyjnej danej następującym wzorem:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Metoda Newtona jest zbieżna jedynie lokalnie, ponieważ wyznaczając styczną do wykresu w danym punkcie możemy w przypadku ujemnego znaku pochodnej dojść do rozbieżności. Dla przypadków pochodnej większej od zera metoda jest zbieżna kwadratowo. Rząd zbieżności wynosi 2.

1.4.2 Realizacja w programie Matlab

Listing 3: Implementacja metody Newtona

```
% Funkcja wyznaczająca punkty zerowe funkcji metoda Newtona
%
% IN:
% a0 – lewa strona zakresu
% fun – funkcja
% iter – maksymalna liczba iteracji
%
% OUT:
% solution – wyznaczone miejsce zerowe
function solution = md_newton(fun, a0, iter)
    x0 = a0;
    for k = 1:iter
        [fold, fpold] = feval(fun, x0);
```

```

dx = fold / fpold;
x0 = x0 - dx;
fprintf( '%3d %12.10f %12.16f %12.3e \n', k, dx, x0, fold );
if( fold == 0)
    return
end
%dodatkowy warunek zatrzymywania
    if fold==0
        solution = x0;
        break;
    end
end
end
end

```

1.5 Analiza danych wejściowych

W celu wyznaczenia przedziałów izolacji miejsc zerowych został wykorzystany algorytm opisany w skrypcie prof. Tatjewskiego. Wstępna analiza danych rozpoczyna się od wygenerowania wykresu funkcji w danym przedziale i na tej podstawie wyboru przedziału startowego dla algorytmu. Następnie w podanym przedziale w pętli badany jest znak iloczynu funkcji w punktach granicznych. Jeżeli jest on ujemny, oznacza to występowanie miejsca zerowego w danym przedziale. Jeżeli nie, to przedział jest rozszerzany do momentu przekroczenia przedziału danego w zadaniu. Ponieważ wykres funkcji z zaznaczonymi przedziałami izolacji wyznaczonymi przez algorytm.

1.5.1 Realizacja w programie Matlab


Listing 4: Skrypt rozwiązujący zadanie nr 1

```

% zadanie nr 1

clear;
x = 2 : 0.1 : 11;
plot(x, md_fun_1(x))
grid on
axis([2 11 -10 4])
hold on
plot([4 4], [-10 4], 'g-');
plot([6.1 6.1], [-10 4], 'g-');
plot([6.9 6.9], [-10 4], 'b-');
plot([9 9], [-10 4], 'b-');

```



```
plot(5.2353163129141116, 0, ' . ', 'MarkerSize', 24, 'MarkerEdge', 'k');
plot(7.4317177653721664, 0, ' . ', 'MarkerSize', 24, 'MarkerEdge', 'k');
```

```
n=100;
x1 = 4;
x2 = 5;
```

```
% algorytmiczne wyznaczanie przedzialow izolacji
```

```
for k=1:2
```

```
    for j=1:n
```

```
        if md_fun_1(x1)*md_fun_1(x2)<0
```

```
            a = x1;
```

```
            b = x2;
```

```
            fprintf( 'Wyniki_dla_%d_miejsca_zerowego_w_przedziale_%d,%d\n',k,a,
```

```
            bisection( 'md_fun_1',a,b,100);
```

```

        secant('md_fun_1',a,b,100);
        newton('md_fun_1',a,100);
        x1 = 8;
        x2 = 9;
        break;
    elseif abs(md_fun_1(x1))<abs(md_fun_1(x2))
        x1 = x1+1.1*(x1-x2);
    else
        x2 = x2+1.1*(x2-x1);
    end
    %wyjscie z petli po przekroczeniu przedzialu
    if (x1>11)&&(x2<(2))
        break;
    end
end
end
end

```


1.6 Rozwizanie

1.6.1 Metoda bisekcji

Pierwsze miejsce zerowe			
nr	przedzial	rozwiazanie	warto
1	[4.0000000000;6.1000000000]	5.0499999999999998	-6.291e-01
2	[5.0500000000;6.1000000000]	5.5749999999999993	1.081e+00
3	[5.0500000000;5.5750000000]	5.3125000000000000	2.576e-01
4	[5.0500000000;5.3125000000]	5.1812500000000004	-1.826e-01
5	[5.1812500000;5.3125000000]	5.2468750000000002	3.884e-02
6	[5.1812500000;5.2468750000]	5.2140625000000007	-7.163e-02
7	[5.2140625000;5.2468750000]	5.2304687500000000	-1.631e-02
8	[5.2304687500;5.2468750000]	5.2386718749999996	1.129e-02
9	[5.2304687500;5.2386718750]	5.2345703124999998	-2.510e-03
10	[5.2345703125;5.2386718750]	5.2366210937499993	4.389e-03
11	[5.2345703125;5.2366210937]	5.2355957031250000	9.399e-04
12	[5.2345703125;5.2355957031]	5.2350830078125004	-7.849e-04
13	[5.2350830078;5.2355957031]	5.2353393554687502	7.752e-05
14	[5.2350830078;5.2353393555]	5.2352111816406257	-3.537e-04
15	[5.2352111816;5.2353393555]	5.2352752685546875	-1.381e-04
16	[5.2352752686;5.2353393555]	5.2353073120117184	-3.028e-05
17	[5.2353073120;5.2353393555]	5.2353233337402347	2.362e-05
18	[5.2353073120;5.2353233337]	5.2353153228759766	-3.331e-06
19	[5.2353153229;5.2353233337]	5.2353193283081056	1.014e-05
20	[5.2353153229;5.2353193283]	5.2353173255920407	3.407e-06
21	[5.2353153229;5.2353173256]	5.2353163242340086	3.808e-08
22	[5.2353153229;5.2353163242]	5.2353158235549930	-1.646e-06
23	[5.2353158236;5.2353163242]	5.2353160738945004	-8.041e-07
24	[5.2353160739;5.2353163242]	5.2353161990642541	-3.830e-07
25	[5.2353161991;5.2353163242]	5.2353162616491318	-1.725e-07
26	[5.2353162616;5.2353163242]	5.2353162929415706	-6.719e-08
27	[5.2353162929;5.2353163242]	5.2353163085877892	-1.455e-08
28	[5.2353163086;5.2353163242]	5.2353163164108985	1.176e-08
29	[5.2353163086;5.2353163164]	5.2353163124993438	-1.395e-09
30	[5.2353163125;5.2353163164]	5.2353163144551207	5.184e-09
31	[5.2353163125;5.2353163145]	5.2353163134772327	1.894e-09
32	[5.2353163125;5.2353163135]	5.2353163129882887	2.495e-10
33	[5.2353163125;5.2353163130]	5.2353163127438158	-5.729e-10
34	[5.2353163127;5.2353163130]	5.2353163128660523	-1.617e-10
35	[5.2353163129;5.2353163130]	5.2353163129271705	4.393e-11
36	[5.2353163129;5.2353163129]	5.2353163128966109	-5.887e-11
37	[5.2353163129;5.2353163129]	5.2353163129118911	-7.469e-12
38	[5.2353163129;5.2353163129]	5.2353163129195313	1.823e-11
39	[5.2353163129;5.2353163129]	5.2353163129157112	5.382e-12
40	[5.2353163129;5.2353163129]	5.2353163129138007	-1.045e-12

Drugie miejsce zerowe			
nr	przedzial	rozwiazanie	warto
1	[6.9000000000;9.0000000000]	7.9500000000000002	-2.725e+00
2	[6.9000000000;7.9500000000]	7.4250000000000007	3.067e-02
3	[7.4250000000;7.9500000000]	7.6875000000000000	-1.270e+00
4	[7.4250000000;7.6875000000]	7.5562500000000004	-5.950e-01
5	[7.4250000000;7.5562500000]	7.4906250000000005	-2.754e-01
6	[7.4250000000;7.4906250000]	7.4578125000000011	-1.206e-01
7	[7.4250000000;7.4578125000]	7.4414062500000009	-4.450e-02
8	[7.4250000000;7.4414062500]	7.4332031250000004	-6.802e-03
9	[7.4250000000;7.4332031250]	7.4291015625000005	1.196e-02
10	[7.4291015625;7.4332031250]	7.4311523437500000	2.587e-03
11	[7.4311523438;7.4332031250]	7.4321777343750002	-2.106e-03
12	[7.4311523438;7.4321777344]	7.4316650390624996	2.413e-04
13	[7.4316650391;7.4321777344]	7.4319213867187504	-9.320e-04
14	[7.4316650391;7.4319213867]	7.4317932128906250	-3.453e-04
15	[7.4316650391;7.4317932129]	7.4317291259765623	-5.200e-05
16	[7.4316650391;7.4317291260]	7.4316970825195305	9.466e-05
17	[7.4316970825;7.4317291260]	7.4317131042480469	2.133e-05
18	[7.4317131042;7.4317291260]	7.4317211151123050	-1.533e-05
19	[7.4317131042;7.4317211151]	7.4317171096801760	3.001e-06
20	[7.4317171097;7.4317211151]	7.4317191123962409	-6.165e-06
21	[7.4317171097;7.4317191124]	7.4317181110382080	-1.582e-06
22	[7.4317171097;7.4317181110]	7.4317176103591915	7.095e-07
23	[7.4317176104;7.4317181110]	7.4317178606986998	-4.363e-07
24	[7.4317176104;7.4317178607]	7.4317177355289452	1.366e-07
25	[7.4317177355;7.4317178607]	7.4317177981138229	-1.499e-07
26	[7.4317177355;7.4317177981]	7.4317177668213841	-6.633e-09
27	[7.4317177355;7.4317177668]	7.4317177511751646	6.498e-08
28	[7.4317177512;7.4317177668]	7.4317177589982748	2.917e-08
29	[7.4317177590;7.4317177668]	7.4317177629098294	1.127e-08
30	[7.4317177629;7.4317177668]	7.4317177648656063	2.319e-09
31	[7.4317177649;7.4317177668]	7.4317177658434952	-2.157e-09
32	[7.4317177649;7.4317177658]	7.4317177653545503	8.063e-11
33	[7.4317177654;7.4317177658]	7.4317177655990232	-1.038e-09
34	[7.4317177654;7.4317177656]	7.4317177654767868	-4.788e-10
35	[7.4317177654;7.4317177655]	7.4317177654156685	-1.991e-10
36	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653851090	-5.924e-11
37	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653698296	1.070e-11
38	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653774689	-2.427e-11
39	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653736497	-6.789e-12
40	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653717401	1.952e-12
41	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653726949	-2.419e-12
42	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653722180	-2.354e-13
43	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653719790	8.584e-13
44	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653720989	3.091e-13
45	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653721584	3.642e-14
46	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653721878	-9.726e-14
47	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653721735	-3.242e-14
48	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653721664	0.000e+00

1.6.2 Metoda siecznych

Pierwsze miejsce zerowe			
nr	przedzial	rozwiazanie	warto
1	[6.1000000000;5.2721231045]	5.2721231045481129	2.238e+00
2	[5.2721231045;5.2238264588]	5.2238264587735248	1.234e-01
3	[5.2238264588;5.2353558422]	5.2353558421649877	-3.869e-02
4	[5.2353558422;5.2353163517]	5.2353163517211909	1.330e-04
5	[5.2353163517;5.2353163129]	5.2353163129139766	1.306e-07
6	[5.2353163129;5.2353163129]	5.2353163129141116	-4.534e-13
7	[5.2353163129;5.2353163129]	5.2353163129141116	8.882e-16

Drugie miejsce zerowe			
nr	przedzial	rozwiazanie	warto
1	[9.0000000000;7.2966891015]	7.2966891015391813	-8.043e+00
2	[7.2966891015;7.4122825051]	7.4122825051309968	5.855e-01
3	[7.4122825051;7.4328117423]	7.4328117422994682	8.831e-02
4	[7.4328117423;7.4317097704]	7.4317097703803334	-5.009e-03
5	[7.4317097704;7.4317177621]	7.4317177621310275	3.659e-05
6	[7.4317177621;7.4317177654]	7.4317177653721762	1.483e-08
7	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653721664	-4.396e-14
8	[7.4317177654;7.4317177654]	7.4317177653721664	0.000e+00

1.6.3 Metoda Newtona

Pierwsze miejsce zerowe			
nr	przedzial	rozwiazanie	warto
1	2.291e+01	-1.891e+01	-3.440e+00
2	-2.907e+02	2.718e+02	-1.610e+01
3	6.998e+52	-6.998e+52	8.442e+25
4	Inf	-Inf	-Inf
5	NaN	NaN	NaN
6	NaN	NaN	NaN

Drugie miejsce zerowe			
nr	przedzial	rozwiazanie	warto
1	-10.6337977481	17.5337977481481566	1.873e+00
2	-5.4087425453	22.9425402934045692	1.768e-01
3	457.6247656451	-434.6822253516609180	-1.250e+01
4	-94071.6545455790	93636.9723202273016796	-1.325e+02
5	NaN	NaN	Inf
6	NaN	NaN	NaN
7	NaN	NaN	NaN
8	NaN	NaN	NaN

1.7 Wnioski

Dziki graficznej analizie wykresu funkcji w prosty sposób możemy wyznaczyć otoczenie miejsc zerowych i zachowanie funkcji. Zauważymy, że funkcja posiada dwa miejsca zerowe. Wyznaczymy więc przedziały "badania" miejsc zerowych za pomocą algorytmu przedstawionego w książce prof. Piotra Tatjewskiego.

Jak wynika z otrzymanych rezultatów metoda bisekcji w obu przypadkach potrzebowała stosunkowo dużej ilości iteracji (około 50), aby osiągnąć zadaną dokładność. Jej zaletami jest niewrażliwość na szczególne zachowania funkcji więc mimo słabej zbieżności nadaje się do wyznaczania miejsc zerowych funkcji których przebiegu nie znamy w celu zabezpieczenia przez niezbieżności.

Metoda siecznych potrzebowała około 8 iteracji aby dojść do wyniku. W przypadku badanej funkcji metoda ta okazała się najlepsza. O wiele szybsza niż metoda bisekcji oraz zbieżna dla podanej funkcji. Wynika to z większego współczynnika zbieżności. Niestety dla innych funkcji np. gdy licząc przeciętnie wykres funkcji w większej ilości miejsc niż 2 razy może okazać się niezbieżna.

Metoda Newtona zupełnie zawiodła w moim rozwiązaniu. Rozpatrywany przedział zawiera fragment funkcji z ujemną pochodną. Metoda okazała się rozbieżna. Teoretycznie metoda ta powinna okazać się najszybsza, ponieważ ma najwyższy współczynnik zbieżności.

2 Zadanie II

2.1 Treść zadania

Używając metody Mullera MM1, proszę znaleźć wszystkie pierwiastki rzeczywiste i zespolone wielomianu

$$f(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \begin{bmatrix} a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -7 & -4 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

2.2 Opis teoretyczny

Metoda Mullera : Powyższe metody szukania zer funkcji jak najbardziej speniają swoje zadanie, lecz dzięki nim nie znajdziemy pierwiastków zespolonych. Polecana metoda do znalezienia wszystkich pierwiastków jest metoda Mullera zbieżna lokalnie. MM1 Pierwsza metoda Mullera polega na aproksymacji funkcji w otoczeniu rozwiązania funkcja kwadratowa. Może być traktowana jako uogólnienie metody siecznych, gdyż zamiast interpolacji funkcja liniowa w dwóch punktach interpolujemy funkcja kwadratowa w trzech. Weźmy trzy punkty x_0 , x_1 i x_2 oraz wartości funkcji w tych punktach. Istnieje dokładnie jedna funkcja kwadratowa przechodząca przez te trzy wartości $f(x_0)$, $f(x_1)$ i $f(x_2)$. Metoda polega na znajdowaniu pierwiastków funkcji kwadratowej i potraktowaniu jednego z nich jako kolejnego przybliżonego pierwiastka wyjściowej funkcji. Na przykład mamy dwa pierwiastki w czwartej iteracji $x_{4.1}$, $x_{4.2}$ to wybieramy ten, który leży bliżej poprzedniego przybliżenia i tak dalej.

2.3 Rozwiązanie

Listing 5: Implementacja funkcji MM1

```
% implementacja algorytmu Mullera MM1
% Funkcja zwraca rozwiązanie oraz
% macierz wartości i punktów
function [x,mm]= MM1( fun , x0 , x1 , x2 , pre )
    i=1;
    x=100;
    counter = 0;
    while abs( feval( fun , x ))>pre
        counter = counter +1;
        z0=x0-x2;
        z1=x1-x2;
        c=feval( fun , x2 );% Rozwiązujemy układ równań liniowych
% by otrzymać wszystkie współczynniki paraboli
        A=[z0^2,z0;z1^2,z1];
        B=[feval( fun , x0)-c; feval( fun , x1)-c];
        r=A\B;
        a=r(1);
        b=r(2);
        % Wybór warunku minimalnego dla z
        if abs( b+sqrt( b.^2-4*a*c ))>=abs( b-sqrt( b.^2-4*a*c ))
            zmin=((-2)*c)/( b+sqrt( b.^2-4*a*c ));
        else
```

```

        zmin=(((-2)*c)/(b-sqrt(b.^2-4*a*c)));
    end
    % obliczenie szukanego pierwiastka x
    x=x2+zmin;
    mm(i,1)=x;
    mm(i,2)=feval(fun,x);
    %szukamy najblizszego pierwiastka
    %ktory jest oddalony od x
    p0=abs(x-x0);
    p1=abs(x-x1);
    p2=abs(x-x2);
    if p0>p1 %gdy x0 jest dalej
        m=x1;
        x1=x0;
        x0=m;
    end
    if p1>p2 %gdy x1 jest dalej niz x2
        m=x2;
        x2=x1;
        x1=m;
    end
    x2=x;
    if isnan(c)
        break;
    end
    i = i +1;
end
counter
end

```

Listing 6: Skrypt rozwizujcy zadanie nr 2

```

%skrypt generujacy wyniki do zadania 2
clear;
x = -10: .1 : 20;
plot(x, md_fun_2(x))
grid on
% axis([-5 2 -100 50])
hold on
plot(1.0420, 0, ' ','MarkerSize', 24, 'MarkerEdge', 'k');
plot(7.4776, 0, ' ','MarkerSize', 24, 'MarkerEdge', 'k');
n=100;

```

```

x1 = -8;
x2 = -7;
% x1 = 4
% x2=5
% algorytmiczne wyznaczanie przedzialow izolacji
for k=1:10
    for j=1:n
        if md_fun_1(x1)*md_fun_1(x2)<0
            a = x1;
            b = x2;
            fprintf('Wyniki_dla_%d_miejsca_zerowego_w_przedziale_[%d,%d]\n',k,a,
md_MM1('md_fun_2', x1, (x1+x2)/2, x2, 0.001)
            x1 = x1+1;
            x2 = x2 +2;
            break;
        elseif abs(md_fun_1(x1))<abs(md_fun_1(x2))
            x1 = x1+1.1*(x1-x2);
        else
            x2 = x2+1.1*(x2-x1);
        end
        %wyjscie z petli po przekroczeniu przedzialu
        if (x1>11)&&(x2<(2))
            break;
        end
    end
end
end

```

2.4 Wyniki

Wyniki		
nr	cz. rzeczywista	cz. urojona
1	1.0420	0i
2	7.4776	0i
3	-0.75982	0.76009i
4	-0.75982	-0.76009 i

2.5 Wnioski

Metoda Mullera dla wielomianu danego w zadaniu okazała się bardzo skuteczna. Dzięki aproksymacji kwadratowej metoda zawsze zbiega do blizszego od wierzchołka paraboli zera, co uniemożliwia pominięcie rozwiązania podczas badania kolejnych przedziałów. Jeśli chodzi o pierwiastki zespolone spełniają one warunek wzajemnego sprzężenia. Wszystkich rozwiązań

wyszło tyle ile wynosi stopień wielomianu co również jest zgodne z teorią.