KEMPEN KESEDARAN KESIHATAN AWAM

HARI STROK SEDUNIA

Cegah awal sebelum terlambat. Kenali faktor risiko anda dan bertindak pantas apabila tanda strok muncul.

Siapa yang Berisiko?

SEMUA ORANG

- Risiko meningkat 2 kali ganda setiap 10 tahun selepas umur 55 tahun.
- 1/3 daripada kes strok berlaku sebelum umur 55 tahun.

APAKAH FAKTOR RISIKO SAYA?

- **TEKANAN DARAH TINGGI**
- **DIABETES (KENCING MANIS)**
- **MEROKOK**
- **KOLESTEROL TINGGI**
- **PENGAMBILAN ALKOHOL BERLEBIHAN**

CARA-CARA MENGURANGKAN RISIKO

✓ KAWALAN BP
Kawal Tekanan Darah
Kawal tekanan darah mengikut sasaran yang ditetapkan oleh doktor anda.

✓ KAWALAN GULA
Kawal Diabetes
Amalkan senaman berkala, kawalan berat badan & pengambilan ubat.

✓ BEBAS ASAP
Berhenti Merokok
Risiko strok anda akan berkurangan dalam tempoh 5 tahun selepas berhenti.

✓ JAGA LIPID
Turunkan Kolesterol
Amalkan pemakanan sihat, senaman & ubat-ubatan mengikut nasihat doktor.

✓ GAYA SIHAT
Kurangkan Alkohol
Hadkan (1 gelas/hari wanita, 2 gelas/hari lelaki) atau elakkan terus.

KURANGKAN RISIKO ANDA: JOM AKTIF!
Berjalan pantas selama 1 jam, 5 hari seminggu sudah mencukupi untuk membantu menurunkan risiko strok anda.

KENALI TANDA-TANDA STROK

BERTINDAK PANTAS DENGAN AKRONIM "BE FAST"

B — Balance
KESEIMBANGAN
Hilang keseimbangan atau koordinasi badan secara tiba-tiba.

E — Eyes
PENGLIHATAN
Perubahan atau gangguan penglihatan pada sebelah atau kedua-dua mata.

F — Face
MUKA
Muka herot atau jatuh pada sebelah bahagian apabila senyum.

A — Arms
LENGAN & KAKI
Kebas atau lemah pada lengan atau kaki, terutamanya sebelah badan.

S — Speech
PERTUTURAN
Pertuturan pelat, sukar bercakap atau sukar memahami orang lain.

T — Time
MASA / SEGERA
Masa itu emas! Hubungi 999 atau ke hospital dengan segera.

HUBUNGI 999 SEGERA

Jika anda atau sesiapa sahaja mengalami mana-mana tanda BE FAST di atas, jangan tunggu — dapatkan rawatan kecemasan serta-merta!