

PERKARA YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN

- Tukar tiub setiap 2 minggu kecuali tiub silikon.
- Penanda tiub perlu berada selari dengan lubang hidung.
- Ubat dan cecair berkhasiat perlu diberikan secara berasingan.
- Makanan kisar tidak digalakkan kerana boleh menyebabkan tiub tersumbat, jangkitan kuman dan kekurangan zat.
- Rujuk Pegawai Dietetik jika menggunakan produk / cecair berkhasiat selain produk yang disarankan.
- Pemberian makanan melalui mulut perlu mendapat kebenaran Pegawai Perubatan.
- Pastikan produk enteral sentiasa di tutup dan disimpan dengan betul. Untuk produk serbuk, simpan pada suhu bilik tidak melebihi satu bulan. Untuk produk cecair, simpan di dalam peti sejuk tidak melebihi 24 jam.

SARANAN REGIM

MASA	PRODUK / SUSU	REGIM

PERINGATAN

Sila hubungi Klinik Kesihatan berhampiran sekiranya terdapat tanda-tanda berikut :

- Cirit-birit melebihi 3 kali sehari
- Sembelit melebihi 5 hari.
- Muntah berlarutan.
- Kulit sekeliling stoma bengkak / luka.
- Kencing yang sedikit, berwarna kuning pekat dan berbau.
- Cecair *aspirate* melebihi 300ml.
- Keluar cecair berwarna hitam @ coklat kehitaman semasa (*aspirate*).
- Tiub tercabut.
- Susu tidak mengalir atau terlalu perlahan.
- Terdapat lelehan cecair di sekeliling abdomen (tersumbat).
- Demam panas / kelesuan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pegawai dietetik.

Diterbitkan oleh:
Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Blok E6, Parcel E,
Presint 1, 62590 Putrajaya
fh.moh.gov.my • www.moh.gov.my
www.infosihat.gov.my • www.myhealth.gov.my

B.P.K.K

PANDUAN SOKONGAN

PEMAKANAN MELALUI TIUB



APAKAH ITU PEMAKANAN MELALUI TIUB ?

Makanan dalam bentuk CECAIR BERKHASIAT yang diberikan melalui tiub dari hidung, mulut atau abdomen dan disalurkan terus ke perut.

MENGAPA MENGGUNAKAN TIUB ?

Sesetengah pesakit terpaksa menggunakan tiub untuk mendapatkan nutrien makanan dalam keadaan seperti berikut :

- Tidak dapat mengambil makanan yang mencukupi dalam tempoh yang panjang.
- Tidak boleh menelan disebabkan strok, kanser dan sebagainya.
- Berisiko tercekik atau tersedak.
- Tidak sedarkan diri.
- Ia membantu mengelakkan/ mengurangkan risiko kekurangan zat dan meningkatkan daya tahan badan.



PANDUAN PENJAGAAN PEMAKANAN TIUB




SEBELUM

1. **Cuci tangan** dan pastikan **peralatan bersih.**
2. **Bancuh cecair** berkhasiat mengikut **saranan.**
3. **Tegakkan pesakit** dalam kedudukan **45 darjah** atau **3 bantal di belakang.**
4. **Sedut cecair** *(aspirate)* dari perut menggunakan picagari sehingga **tiada lagi sisa.**
5. **Berhenti** *aspirate* **bila** picagari **sukar ditarik.**

SEMASA

1. **Picagari** perlu berada **pada kedudukan setara kepala pesakit.**
2. **Biarkan cecair** berkhasiat **mengalir perlahan-lahan** dengan **sendiri.**



SELEPAS

1. **Sudahi** pemberian makanan dengan 50ml air masak.
2. Biarkan pesakit dalam **kedudukan 45 darjah selama 30 minit.**
3. **Cuci tangan** dan **peralatan.**

Kedudukan 45 darjah selama 30 minit