
Guia de Formulações

DISBIOSE INTESTINAL



medicinal
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

CÁPSULAS EQUILÍBRIO INTESTINAL
FASE 1 · REMOVER

IN

Berberina	500mg
Óleo de Orégano	150mg
Extrato de Alho (Alicina)	200mg
Cravo-da-índia	100mg

Modo de uso: Tomar 1 dose após o almoço e 1 dose após o jantar, por 30 dias.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Berberina

Alcaloide vegetal com **ação antimicrobiana seletiva**, que ajuda a **reduzir o supercrescimento** de bactérias indesejadas sem eliminar a flora benéfica, além de contribuir para o **controle glicêmico** e da **inflamação intestinal**.

Óleo de Orégano

Rico em **carvacrol e timol**, compostos com **amplo espectro antimicrobiano e antifúngico**, que auxiliam no controle de **fungos e bactérias oportunistas** envolvidos na disbiose.



SACHÊ REPARADOR DA MUCOSA

FASE 2 · REPARAR

IN

- **L-Glutamina** 5g
- **Zinco Carnosina** 75mg
- **Sunfiber® (PHGG)** 5g
- **N-Acetilglucosamina** 500mg
- **Sachê sabor limão** ..... 1 un

Modo de uso: Diluir 1 sachê em 200ml de água e tomar em jejum, pela manhã.

COPIE A FÓRMULA AQUI



L-Glutamina

Principal **fonte de energia dos enterócitos**, as células que revestem o intestino. Auxilia na **regeneração da mucosa** e no fortalecimento das **junções firmes**, reduzindo a **permeabilidade intestinal**.

Zinco Carnosina

Complexo de zinco e L-carnosina que **adere à mucosa gastrointestinal**, promovendo **proteção e cicatrização** do revestimento intestinal e gástrico.

Sunfiber® (PHGG)

Fibra prebiótica de goma guar parcialmente hidrolisada, **bem tolerada** e sem gerar distensão, que **alimenta as bactérias benéficas** e estimula a produção de **ácidos graxos de cadeia curta**.

MODULADOR DA MICROBIOTA
FASE 3 · REINOCULAR

IN

Newbiome	200mg
Saccharomyces boulardii	250mg
Lactobacillus Acidophilus	1BLH
Lactobacillus Rhamnosus	1BLH
Bifidobacterium Lactis	1BLH
Bifidobacterium Longum	1BLH

Modo de uso: Tomar 1 dose à noite, por 60 dias.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Newbiome®

Posbiótico avançado padronizado em 50% de tributirina microencapsulada, **fonte de butirato** altamente biodisponível e **sem odor**, que atua na **disbiose intestinal**, na **inflamação de baixo grau** e na **disfunção da barreira intestinal**.

Saccharomyces boulardii

Levedura probiótica resistente a antibióticos, que ajuda a **restabelecer o equilíbrio da microbiota**, competindo com patógenos e reduzindo **diarreia e desconforto abdominal**.



A **disbiose** é o desequilíbrio entre as bactérias benéficas e as potencialmente nocivas do intestino. Ela está ligada a **distensão abdominal**, **alterações do trânsito intestinal**, **inflamação de baixo grau** e reflexos na **pele**, na **imunidade** e no **humor**. Por isso o tratamento segue fases — **remover, reparar e reinocular** — para devolver o equilíbrio de forma duradoura.