Guia de Formulações

DESPARASITAÇÃO

medicinal
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

CÁPSULAS ANTIPARASITÁRIAS

FASE 1 · ELIMINAR

IN

- **Berberina** 500mg
- **Óleo de orégano** 200mg
- **Alicina (extrato de alho)** 150mg

Modo de uso: Tomar 1 dose após o almoço e 1 dose após o jantar, por 30 dias.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Berberina

Alcaloide vegetal com **ação antiparasitária e antimicrobiana** documentada contra protozoários intestinais como a **Giardia**. Também ajuda a **reequilibrar a microbiota** e a reduzir a **inflamação intestinal**.

Óleo de Orégano

Rico em **carvacrol e timol**, compostos de **amplo espectro antiparasitário, antifúngico e antibacteriano**, que atuam sobre a membrana dos microrganismos e completam a ação da berberina.

Alicina

Principal composto ativo do **alho**, com ação **antimicrobiana e antiparasitária**. Torna o intestino um **ambiente desfavorável** a parasitas, bactérias e fungos oportunistas.

TINTURA ANTIPARASITÁRIA

FASE 1 · ELIMINAR

IN

- **Tintura de nogueira-preta** 33%
- **Tintura de absinto** 33%
- **Tintura de cravinho** 34%

Modo de uso: Tomar 30 gotas diluídas em meio copo de água, 1 vez ao dia pela manhã, por 30 dias.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Nogueira-preta

Rica em **juglona e taninos**, de uso tradicional **vermífugo e antifúngico**, com ação **adstringente** sobre a mucosa intestinal. Atua principalmente sobre as **formas adultas** dos parasitas.

Absinto

Planta de **princípios amargos** (absintina) com longa tradição **antiparasitária**. **Estimula a digestão** e a produção de bile, favorecendo a eliminação intestinal.

Cravinho

Concentra **eugenol**, de ação **antimicrobiana e antiparasitária**, com efeito sobre **ovos e larvas**. Fecha o tripé clássico com nogueira e absinto, cobrindo **todo o ciclo de vida** do parasita.

PROTEÇÃO HEPÁTICA
FASE 2 · PROTEGER

IN

- **N-acetilcisteína (NAC)** 600mg
- **Silimarina** 200mg
- **L-metionina** 100mg

Modo de uso: Tomar 1 dose pela manhã, após o café, por 30 dias.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Silimarina

Flavonolignanas do **cardo-mariano** com ação **hepatoprotetora e antioxidante**, que preservam a célula hepática durante a eliminação dos parasitas e das toxinas liberadas.

NAC

Precursora da **glutationa**, o principal antioxidante do fígado. Com a **L-metionina**, sustenta as vias de **detoxificação hepática** e ainda ajuda a **romper o biofilme** que protege os microrganismos.

CONFORTO DIGESTIVO
CÓLICAS, GASES E DIGESTÃO

IN

- **Biointestil®** 300mg
- **Menta piperita** 250mg
- **Bromelina** 100mg
- **Papaína** 100mg

Modo de uso: Tomar 1 dose 15 minutos antes do almoço, por 30 dias.

Biointestil® e Menta piperita

Óleos essenciais de palmarosa e gengibre com **menta piperita**: ação **antiespasmódica e carminativa** que alivia **cólicas, gases e distensão**. As enzimas **bromelina e papaína** completam a digestão e ajudam a degradar a camada proteica que protege os parasitas.

SACHÊ REPARADOR
FASE 3 · REPARAR

IN

- **L-Glutamina** 5g
- **Saccharomyces boulardii** 250mg
- **Aloe vera 200:1** 100mg
- **Sachê sabor limão** ..... 1 un

Modo de uso: Diluir 1 sachê em 200ml de água e tomar à noite, por 60 dias (desde o início do protocolo e por mais 30 dias após o fim da fase 1).

COPIE A FÓRMULA AQUI

Saccharomyces boulardii

Levedura probiótica que não é afetada pelos fitoterápicos antimicrobianos. Compete com patógenos, tem ação documentada contra **Giardia e Blastocystis** e **reduz diarreia e desconforto** durante o tratamento.

L-Glutamina

Principal **fonte de energia dos enterócitos**. Com o **Aloe vera**, ajuda a **regenerar a mucosa** agredida pelos parasitas e a reduzir a **permeabilidade intestinal**.

As **parasitoses intestinais** podem causar **distensão abdominal**, **alterações do trânsito**, **cansaço**, **coceira** e **má absorção de nutrientes**. O protocolo segue três fases simultâneas — **eliminar** os parasitas em todo o ciclo de vida, **proteger** o fígado e **reparar** a mucosa e a microbiota — para um resultado duradouro.

Não indicado para gestantes, lactantes e crianças, nem para pessoas com epilepsia (absinto) ou doença hepática, sem avaliação do prescritor. A berberina pode interagir com medicamentos: informe o prescritor sobre os que você usa.